

APOLLO

ÆSCULAPIVS.



HISTOIRE DES PLANTES,  
**EN LAQUELLE**  
 EST CONTENVE LA DE-  
 SCRPTION ENTIERE DES HER-  
 bés, c'est à dire, leurs Especes, Forme,  
 Noms, Temperament, Vertus & Opera-  
 tions: non seulement de celles qui  
 croissent en ce pais, mais ausi  
 des autres estrangeres qui  
 viennent en viage de  
 Medecine.

PAR REMBERT DODOENS  
 Medecin de la Ville de Malines.

&  
 Nouuellement traduite de bas Aleman en  
 François par Charles de l'Escluse.

EN ANVERS,  
 De l'Imprimerie de lean Lo  
 M. D. LVII.



GENTIVS

METRI  
DATES

ARTEMISA

HYSIMACHVS



HESPERIDVM HORTI



**HARLES** par la diuine clemence Empereur des Romains toujours Auguste Roy de Germanie, de Castille, de Leon, d'Arragon, de Grenade, de Nauarre, de Naples, de Sicille, de Maiorque, de Sardaigne, des Ysles, Indes, & terre ferme de la mer Ocean: Archiduc d'Auſtriche, Duc de Bourgongne, de Lothric, de Brabant, de Lembourg, de Luxenbourg, de Gueldre: Comte de Flandres, d'Artois, de Bourgongne: Palatin de Haynaut, de Hollande, de Zeelande, de Ferreete, de Namur, de Zutphen: Prince de Zunaue, Marquis du ſant Empire, ſeigneur de Frize, de Salins, de Malines, des cité villes & pais d'Vtrecht, Ouerijsſel, & Groeningue, & Dominateur en Aſie & Afrique. A tous ceuz qui ces preſentes lettres verrôt, ſalut. Receuë auôs l'humble ſupplication de Jean Loe Imprimeur demourât en noſtre ville d'Anuers, contenât que au profit du Commun il imprimeroit volontiers vn Herbier, ou Hiſtoire des Plantes compoſée par Rembert Dodoens Docteur en Medecine, avec pluſieurs autres eſcrits bien amples touchât ceſte matiere, ſaits par ledit Dodoens. Pour laquelle cauſe & tant pour les auoir fait deſcrire, que contreſaire au naturel, ledit ſupplicant a fait de grands frais, & fait encore tous les iours tant à faire paindre les herbes, qu'à les faire grauer pour les rendre plus propres à imprimer, Parquoy il nous a prié que luy ſoient données lettres d'Ottroy, par lesquelles ſeroient ſaites inhibitions & deſenſes que nul n'eut à imprimer le ſuſdit Herbier, ny autres liures d'iceluy Rembert Dodoens, traictans de re Herbaria, en dedans dix ans, comptant du iour que ledit ſupplicant les aura acheuë d'imprimer, ſoit qu'ilz ſoient en Aleman, en Latin, ou en François. Il eſt ainſi, qu'auôs auoir conſideré les choſes ſuſdites, nous inclinans audit ſupplicant, luy auôs ottroyé, & accordé ſadite requiſte, ottroyons & accordons, luy donnant congé & licence de grace ſpeciale par ces preſentes, de pouuoir imprimer ledit Herbier compoſé par ledit Dodoens, & autres liures d'iceluy traictés de re Herbaria, ou les faire imprimer par Imprimeuriere reſidēt en noz pais de pardeça (obſerueſt eſt ce toutesſois l'ordonnance par nous faite) & de les pouuoir vendre & diſtribuer par tous nos pais ſuſdits ſans aucunement en ce faiſant meſpreſdre cōtre nous. Et pour plus grande grace, nous faiſons inhibitions & deſenſes à tous autres Imprimeurs, Libraires & autres quelconques, de non imprimer, vendre, ne diſtribuer, les ſuſdits liures de re Herbaria endedans dix ans, à compter depuis le temps que ledit ſupplicant les aura acheuë d'imprimer, ſoit en Aleman, ſoit en Latin, ſoit en François & ce ſur peine de conſiſcation deſdits liures imprimés par autrui durant ledit temps de dix ans, & de perdre dauantage dix Carols d'or pour chacun exemplaire, toutes & quantesſois qu'il aduendra, ſe deuant tourner ladite amende à la moytié à noſtre prouffit, l'autre moytié au prouffit dudit ſupplicant, bien entendu toutesſois que ledit ſupplicant ſera tenu de faire viſiter les liures ſuſdits par quelque ſçauant homme en Theologie à ce deputé. Par quoy nous mandons à noz amés & ſeaux Preſident & gens de noſtre priuë & grand Conſeil, Preſident & gens de noſtre Conſeil en Flandre, Chef & autres de noſtre Conſeil en Hollande, Preſidēt & gens de noſtre Conſeil en Frize & Vtrecht, Chancelier de noſtre Conſeil en Gueldre, & à tous autres noſtres Juſticiers, & Officiers, auxquels ces choſes pourrōt toucher, & à chacun d'iceux de faire ſon deuoir, que ledit ſupplicant puiſſe paisiblement & amiablement iouir & vſer de ceſte noſtre grace, ottroy & conſentement durant le temps, & en la ſorte que deſſus, ſans luy faire, ne luy ſouffrir eſtre fait empêcheſchement, de ſtoubier, ou ſacherie quelconque au contraire, Procedant & faiſant proceder contre les tranſgreſſeurs par l'execution de la peine & amende ſuſdites, comme il appertendra. Car ainſi nous plaiſt il. En teſmoing de quoy nous auons fait mettre noſtre ſeel aux preſentes.

Dōné en noſtre ville de Bruſſelle le xxvij iour de May  
lan de grace mille cinq ceps cinquante & vn  
de noſtre Empire le xxxij, & de nos regnes  
de Caſtille & autres le xxxvj.

Par l'Empereur en ſon Conſeil

Subſigné De la Torre

Ledit Priuilege a eſté ottroyé par l'Empereur & ſon Conſeil de Brabant. Donnē en noſtre ville de Bruſſelle, comme deſſus.

Subſigné P. de Lens.

# REMBERTVS DODONÆVS

STVDIOSIS MEDI-

cinæ Candidatis S.



**S**TIRPIVM ac vniuersæ materiæ Medicæ cognitionem potentissimis Regibus, antiquissimis Heroibus, præstantissimis Medicis ac Philosophis olim in pretio habitam, vtilem ac necessariam Medicæ arti iudicatam, summo studio, nec minori diligentia excultam, adeo manifestum est, vt multis assertionibus opus non sit. Præsertim non paucis herbis Regum ac Heroû, qui has vel primi inuenerunt, vel in frequenti medendi vsu habuerunt, nomina retinentibus, vt Mithridatium, Eupatorium, Gentianâ, Lysimachia, Achillea, Centaurium, Alcibiadium, Telephium, Artemisia, aliæque plures: & veteres ipsos, atq; inter eos Hippocratem Medicorum omnium longe principem, Galenum, nonnullosq; alios, longinquas peregrinationes, cognoscendæ materiæ Medicæ causâ suscepisse, & propria & aliorum scripta testentur.

Eandem verò scientiam, à posteriorum nostroq; tempore vicinorum seculorum medicis ac philosophis, plane neglectam & contemptam fuisse, res ipsa quoq; euidenter docet. Solæ enim illæ Medicinæ partes, ab illorum seculorum medicis coli visæ sunt, quæ ex rationum physicarum fontibus deductæ; hinc dubitandi disputandiq; vberem materiam præberent: aliæ verò, vsu atq; experientia constantes, vt steriles ac ieiunæ spectæ. Cuiusmodi ipsa *Beronicæ* est, Physicarum rationum subsidium vel nullum vel exiguum admittens. Quamobrem eius omni notitia, mulieribus, herbariis analphabetis, vel indoctis pharmacopœis relicta, indignum professione sua ac magnificis titulis parum decorum infelices illi medici existimabant, cognoscendæ alicuius materiæ medicæ, herbæ aut stirpis causâ, vel mi nimum operæ laborisq; sumere: extra vrbes ad montes, conualles, prata, suburbanaq; loca excurrere.

Tantam studiorum dissimilitudinem, fatalis ille seculorum ordo peperit, qui & maximas vrbes, potentissima regna, latissimè patentia imperia, & hanc Medicinæ partem, nonnullasq; alias pessundedit, ac propemodum extinxit. Vnde factum, vt quæ olim facillimè ac nullo propemodum negotio materiæ Medicæ ac Stirpium cognitio percipi poterat, difficilis ac obscura reddita sit.

Tradebant eam Dioscorides, Galenus, eiusq; ætatis Medici, veluti per manus à maioribus acceperant, seruatim eousq; nominibus, quæ magna ex parte incorrupta ad illorum tempora venerant.

Nobis ea scælicitas denegata, multis modis veris ac genuinis appellatio-

## Epistola ad

nibus, corruptis, peruersis, fere abolitis, barbaris in earum locum suppositis, multo tempore intermissa Stirpium noticia, solis veterum descriptionibus relictis, ex quibus hæc disciplina & requirenda & restituenda est. Id quàm difficile sit licet alio loco scripserimus, tamè hîc repetere visum fuit non alienum.

Non leuis autem, difficultatis huius scientiæ, aut vna aliqua causa est, sed maximæ eæque præcipuæ duæ: innumera videlicet multitudo Stirpium, ita mensuræque varietas: & eorum qui de harum historia, aut materia Medicæ scripta reliquerunt, breuitas, incuria, negligetia, subinde varia atque dissimilis, et vel diuersos descriptio: & vtinam non quorûdam errores obscuritatem non exiguam in eam intulissent.

Stirpium siquidem herbarumque infinita sunt genera, variè per orbem terrarum sparsa immensa multitudo, vt non vno loco paucisque regionibus requirere eas liceat, sed ad eas omnes cognoscendas, omnium fere regionum ac prouinciarum peragratione, longi temporis peregrinatione opus videatur. Sunt nonnullæ quibusdam vel insulis dicatæ, vel regionibus propriæ, quæ in alia quæuis loca transferri nequeunt, vel tellure cæloque mutatis mutantur, vt Theophrastus libro quarto ait. Aliæ pluribus quidem terris communes, non omnes tamen passim aut crebro obuiæ, sed certis tractibus peculiare, vel montibus scilicet, promontorijs, præruptis, rupibus, saxosis aut niualibus locis, collibus, densis syluis, ymbrosis lucis, arborum caudicibus, aruis, campestribus, apricis, læto pinguique solo, macro & sterili, humidis, vliginosis, riguis, paludibus, stagnantibus aquis, fontibus, fluminibus, fluuiorum ripis, maris littoribus, scopulis, vel ipso denique mari addictæ. Harum autem istæ eandem fere vbique formam retinent, vel exiguam mutationem assument: illæ in diuersis regionibus pro cæli solique varietate aliam formam & magnitudinem induunt. Quod segetum, fabarum, nucum, aliorumque, apud Indos nascentium (si Herodoto fides) exemplis manifestum est, quorum longè maior magnitudo, quàm in Ægypto nascentium. Segetum enim culmi instar harundinum crassescunt: fabæ triplo maiores Ægyptijs: sesamum miliumque eximiæ magnitudinis: nuces tantæ molis vt miraculi loco in templis suspendantur. Strabo quoque in extremo Mauritanorum quodam tractu, iuxta creditum Nili exortum vitem tantæ crassitudinis nasci tradit, quam vix duo homines complecti queant: omnem herbam cubitalem: Staphylinorum, Hippomarathri, Scolymi caules duodenum cubitorum, crassitudine quatuor palmorum reperiri. Et tantus quidem Stirpium numerus, immensa latissimè sparsa multitudo, varia ac multiplex natura.

Autorum verò ipsorum quanta fuerit negligentia, vel incuria in multarum



## Medicinæ candidatos.

tarum præsertim vulgo notarum, formis differentijsq; describendis, cum multarum extent nomina, quarum formæ non sunt expressæ, aut leuiter tantum descriptæ, nemo fere est qui ignoret, Ruellio id ipsum scriptis suis restante.

Eosdem vero non semper cōuenire, atq; interdum inter sese disfidere, dum sub vno eodemq; nomine alius aliam herbam vel fruticem designat, vel eandem alia nomenclatura exprimit, Dioscoridis cum Theophrasti aliorumq; scriptis diligens collatio ostendit, suppeditabit & huius varietatis Historia nostra non pauca exempla.

Descriptiones verò quorundam erroribus esse conspersas, quod ad Plinianas attinet manifestissimum est, Leoniconi enim libri de Plinij erratis passim prostant, & omnes fere nostri seculi, qui de materia Medica aut Stirpibus scripsere, in redarguendis ac notandis Plinij lapsibus plurimi sunt.

Verum de Dioscoride id nemo forsitan expectauerit aut suspicatus fuerit, Galeni testimonio atque scriptis commendato. Reperiuntur tamen in eius commentarijs non exigui errores. Alias enim dissimilium Stirpium, eiusdem apud diuersos autores nominis, delineationes in vnâ historiam contrahit: alias eandem non iisdem nominibus nuncupatam, veluti membratim diuisam diuersis locis describit, vt ijs commentarijs quos in Stirpium historias quæ apud Dioscoridem extant meditamus, ostensuros, si Deus vitam, valetudinem, ociumq; concesserit nos speramus.

Nec tamen hi errores impediūt, quo minus Dioscorides alijs omnibus longe præstet, cum omnes vel imperfectiorem multò historiam, vel pluribus, maioribus erroribus, ac fabulis, præstigijsque plena scripta reliquerint. Theophrastus reliquos omnes in suo scribendi genere superans, formas expresso non descripsit, sed Stirpium multiplicem differentiam aliaq; philosopho homine digna prosequi studuit. De Plinij scriptis quid iudicandum, jam scripsimus. Nicandri *ἑρπυρία καὶ ἐπιφύερα* solū reperiuntur. Apuleius de paucis tantummodò egit. Galenus, Paulus, Aëtius, figuras à Dioscoride expressas omiserunt. Alij veteres Græci & Latini, Philosophi, Medici, Poætæ, Historiographi, Architecti, Agriculturæ scriptores, Hippia tri siue Veterinarij, quorum lectione ad quarundam plantarum notitiam peruenimus, non nisi obiter quarundam meminerunt. Bithyni Iolæ, Heraclidis Tarentini, Crateus herbarij, Andreae medici, Iulij Balsi, Nicerati, Petronij Nigri, Diodici, Pamphyli, Mantææ, Apollonij antecessorum Dioscoridis & Galeni scripta, neque ad posteritatem peruenerunt, neq; perfectum aliquid tradiderunt. Plerique horum anilibus fabulis aut præstigiaturis Ægyptijs, coniurationibusve pleni sunt: alij de vna aliqua materia, aut paucis tantum, vt Galenus scribit, egerunt: vniuersam verò materiam complecti non studuerunt.

## Epistola ad

Quibus de causis illorum omnium scriptis posthabitis, vni Dioscoridi summam laudem auctoritatemq; Galenus tribuit, quam illi quoque debere nemo negare potest. absque eius siquidem scriptis, Stirpium materiaeq; Medicæ cognitio restitui nulla ratione potest.

Non enim idcirco veluti parum vtilis abdicandus aut reiiciendus quod in plerisque locis lapsus sit, cum nec Plinium multo grauius & pueniliter sæpe hallucinatum minimè negligi oporteat ad Stirpium noticiam plurimum conferentem. Neque enim eam ob causam de erratis eius cœpimus admonere, sed vt huius scientiæ & studij difficultas ab omnibus intelligatur, maioriq; cum attentione, in stirpium cognitione studiosi incumbant: diligentius omnes notas expendant: leuibus coniecturis contenti facile iudicium non promant: minus admirentur si post complures in hoc studio versatos, multa in noticiam nondum perducta adhuc lateant: plures quotidie exoriantur in restituenda hac Medicinæ parte laborantes, aut quod hi qui in lucem subinde nonnulla dedere, sententiam alicubi mutet. Nam hæc omnia, haud dubio, difficultati huius scientiæ magis, quàm negligentia, incuria, aut temeritati huius ætatis scriptorū accepta referre æquū est.

Si enim Dioscorides exercitatisimus vir, qui multum studij, laboris, in Stirpium, materiaeq; Medicæ cognitionem impendit, eo seculo quo nomina magna ex parte incorrupta vulgo retinebantur, ipsarū noticia à maioribus accepta veluti per manus tradebatur, vel immenso numero, multipliciq; earum varietate, vel autorum imperfectis, varijs, fabulosis descriptionibus detentus, errore vitare non potuit: qua ratione nunc quisquam, antiquis nomenclaturis ac appellationibus vix receptis, aut plurimum de prauatis, Stirpium cognitione longo tempore intermissa atque contempta, in tanta veterum (vti diximus) negligentia, incuria, varietate, atque erroribus subinde implicata obscuritate, vel facile vel absque magno labore, diligentissima inquisitione earum noticiam consequi se posse sperabit?

Quum igitur tanta huius scientiæ vel magnitudo vel difficultas sit, vt non nisi diligentissimo omnium stirpium maturoq; examine, plurimorum veterum autorum lectione exactissima, id est, multo labore, diutinis peregrinationibus, cōtinuo studio comprehendi queat: ac fieri vix possit, vt his omnibus, vnius hominis aut paucorum vita diligentiaq; par sit. Citra omnem admirationem esse debet, post multos recentiorum in hac materia diligenter versatos, alios in dies exoriri, qui hanc augere studeant, & nostros quoque de Stirpium historia libros prodire.

Nemine siquidem hanc scientiam ad perfectionem perducete, sed omnibus plurima prætermittentibus, occasio posteris relinquitur, priorum inuentis ac obseruatis plurima adijciendi atque stirpium cognitionem locupletandi. Quod recentiorum non paucis præstātibus, priuato studio, pe-

## Medicinæ candidatos.

reginatione, aliâve occasione comperta in commune proferentibus, & mei officij fore iudicavi, vt eam quam existimabam me huic scientiæ posse accessiorem facere, aut emendatione adhibere, in publicum mitterem, atque veræ Medicinæ Stirpiumque studiosis communicarem.

Non frustra autem vel inutiliter hunc laborem vel recentiores vel nos suscepimus. Pertinet enim hæc scientia ad præcipuas & principes duas Medicinæ partes *Διαγνωτικῆς καὶ φαρμακωτικῆς*. Illa victus ratione: hæc medicamentis sanitati hominis consulit: vtraque herbis, frugibus, stirpibus, earumque; feminibus, fructibus, radicibus, succis, veluti necessarijs & materia & instrumentis vitur. Hæc enim vt plurimum, ad artis operâ medici vel impermixtâ, vel alijs aut inter se commixta adhibet. Si enim nemo illum bonum fabrum aut artificem dixerit, qui malleum, incudem aut ferrû, aliâve artis suæ instrumenta vel materiam non nouerit: Medicum quis habeat doctum, qui Betam à Blito distinguere nesciat, in crassa supinaque; omnium Stirpium Medicæque materiæ ignorantia versetur?

At multum, fortasse dicet aliquis, inter medicum & reliquos artifices interest, neque enim manum medici operibus apponunt, sed veluti architecti tantum præcipiunt, omnem Stirpium & Medicæ materiæ notitiam, præparationem, variam misionem pharmacopœis relinquunt.

Fatemur à multis annis medicos præparandorum miscendorumque pharmacorum morem omisisse, ac à veterum cõsuetudine recessisse, quos abunde constat nulla pharmacopœorum opera vsos, medicamenta etiam proprijs & discipulorum manibus miscuisse, neque vt pharmacopœi rursus fiant requirimus, vt quærendis, terendis, tundendis, præparâdis, miscendis medicamentis occupentur, sed Stirpium & materiæ Medicæ, quarum potissimum frequentior ac quotidianus vsus, notitiam exigimus: non secus ac in Architecto omnis materiæ ædificiorum cognitio requiritur. Qui enim eam ignorauerit, bonus Architectus esse nõ potest. Sic etiam neque doctus aut perfectus medicus, qui artis suæ materiam nõ cognorit. Quod si fabri ex non conuenienti ligno vel trabes vel ædium contignationes struant, Latomi luto pro cæmento parietes compingant, aut reliqui artifices alijs modis imposturas moliantur, admittet aut dissimulabit hæc bonus Architectus: Non existimo quenquam fore, qui non putet harum rerum curam ad eum pertinere. Cur igitur conniuebit Medicus, si pharmacopœus spuria legitimis, genuinis adulterata, recetibus exoleta, calida frigidis, frigida calidis, alexipharmacis deleteria substituatur, ac deficiente vno, alias hoc modo illud, abique vllo iudicio aut delectu supponat? Conniue re autem eum huiusmodi imposturis aut grauissimis erratis oportebit, si huius scientiæ rudis ac imperitus fuerit, cum nulla ratione dolum deprehendere poterit.

## Epistola ad

Omnes igitur Medicinæ studiosos in hac Stirpium materiæque Medi-  
cæ notitia sese exercere conuenit, atque operam & diligentiam summam  
adhibere, vt harum cognitionem reliquis Medicæ artis partibus adiun-  
gant: veterum antiquissimorum, probatissimorumque Medicorum hu-  
ius scientiæ studiosissimorū, vestigijs hac in parte insistant, ac Galeni clarif-  
simi & maximæ autoritatis medici, præceptis & consilio obsequiantur, qui  
omnes Medicos & iuuenes artis candidatos ad Stirpium & Medicamentorū  
materiæ exactam notitiam admonet atque incitat. Medicus (inquit lib.  
de antidotis primo) omnium Stirpium, si fieri potest, peritiam habeat, con-  
sulor: sin minus, plurimum saltem quibus frequenter vtimur. Item tertio de  
Medicamentis secundum genera. Hinc puto bonæ indolis iuuenes incita-  
tum iri, vt medicamentorum materiam cognoscant, ipsimet inspicientes,  
non semel aut bis, sed frequenter: quoniam sensibilibus rerum cognitio  
sedula inspectione perficitur: Et ibidem paulò infra: Vos ergo admono  
amici, vt in hoc quoque me sequamini si artis opera pulchrè obiri velitis.  
Nouistis enim quomodo ex omni natione, præstantissima quotannis me-  
dicamenta mihi adferantur, eò quòd periti illi omnigerarum rerum co-  
emptores (Græci *φάρμακωλάς* vocant) varijs modis ea contaminant. Præstite-  
rat fortassis non hos solum, sed multò magis etiam mercatores, qui illa ad-  
uehunt, incusare: atque his multò magis ipsos herbarios: item nihil minus  
eos qui radicum liquores, succos, fructus, flores & germina ex montibus in  
vrbes conferunt. Hi siquidem omnium primi in eis dolum exercent. Quis-  
quis igitur auxiliorum vndique copiam habere volet, omnis materiæ Stir-  
pium, animalium & metallorū, tum aliorum terrestrium corporum, quæ  
ad Medicinæ vsum ducimus, expertus esto, vt ex eis & exacta & notha co-  
gnoscat. Deinde in commentario meo, quem de simplicium medicamen-  
torum facultate prodidi, sese exercet. Nisi enim hoc modo instructus ad  
præsentis operis præsidia veniat, verbotenus quidem medèdi methodum  
sciet, opus verò nullum ipsa dignum perficiet. Hactenus Galeni verba. Ex  
quibus manifestum est ac indubitatum relinquitur, hanc scientiam medi-  
co & vtilem & necessariam, vt qui absque huius peritia nihil possit meden-  
do certi assequi, aut eximium quicquid ex arte præstare, herbariorum, my-  
ropolarū, pharmacopœorumque, dolis, imposturis, ac subinde crassa vel per-  
tinaci ignorantia delusus. Quod omnes medicos, diligentissimè cauere, cū  
salutis ac valetudinis suæ fidei concreditorum, tum propriæ existimatio-  
nis causâ, maxime decet.

Neque scientiæ huius difficultas, quæ ipsius pene immensam magnitu-  
dinem ostendit, quenquam ab eius studio abtertere debet, sed potius ad  
auxiliares ei manus conferendas omnes studiosos excitare, accendere, in-  
flammarè: ne tam necessaria humanæ vitæ scientia diutius vel neglecta, vel  
con-

contempta iaceat, sed plurimorum communi labore atq; diligentia crescens, ad perfectionem veniat, ab interitu vindicetur, medicinæque reliquis partibus adiungatur, ac veluti postliminio restitatur. Quò enim difficultatis ac magnitudinis scientia aliqua amplius habet, hòc magis bona ingenia in ea occupari libentius solent. Ignauorum existimatur in paruis ac facilibus versari: industriorum verò ac diligetum in grauib; magnis, ac difficilibus. Paruæ ac faciles res nulli opinionem aut autoritatè pariunt. Difficiles & magnæ honores & gloriam conferunt. Magnæ enim rei, quatumcunque quis possederit, participem fieri, non minima est gloria, vt Columella ait.

Sed vt ad hos de Stirpium commentarios veniamus. Contraxeramus in hos, quum primum ederemus, quicquid herbarum plantarumque in cognitionem nostram venerat. Secunda hac æditione seuera animaduersione adhibita, omnia recognouimus, pleraque mutauimus, nõnulla transtulimus, totum opus non exigua accessione locupletauimus & auximus, multarum Stirpium nemini quod sciam adhuc depictarum imagines adiecimus. Vtrobique formas omnium, qua potuimus diligentia tradidimus: nomina Græca, Latina, officinis recepta, Germanica, Gallica, & nobis Brabantis ac vicinis Flandris aut Hollandis Frisissve vernacula, singularum historijs adscripsimus: Temperamenta deinde ac vires ex probatissimorum Medicorum scriptis subiunximus, hand præteritis ijs quæ recentiorum experientia repperit, maximè earum quas in veterum cognitionem non venisse neoterici putant. Atque hæc omnia breuissimè complectentes non elementorum ordine stirpes digessimus, sed vel forma, vel viribus, vel alia ratione congeneres ac similes coniungere studuimus.

His autem describendis non tantum nostro studio vel, si quæ est, industria profecimus, sed antecessorum quoq; scriptis plurimū adiuti sumus, Leoniceni videlicet, Hermolai, Manardi, Ruellij, Cordi vtriusque, Hieronymi Tragi, aliorumque. Leonharti Fuchsi imagines in priores nostros magna ex parte omnes recepimus (vt in ipsa imaginum nostrarum prima æditione adiecta causa scripsimus) non sic tamen vt sententiam eius in omnibus sequeremur, sed adhibito iudicio & animaduersione, verisimiliorem amplecteremur.

In recognoscendis verò & noua accessione augmentandis, licet nostro labore plurimum creuerint, non tamen Petri Bellonij obseruationibus profecisse nos inficiari possumus: aut ex Petri Andreae Matthioli commentarijs quædam mutuatos. Quibus tamen multum pepercimus, propterea quod ea, quas reliquimus, in conspectum nostrum non venissent. Annisi enim sumus ad hoc, vt vix alias describeremus, quàm oculis nostris aliquãdo subiectas & conspectui exhibitas. Itaque paucissimas ex eius commen-

## Epistola.

tarijs accepimus, idque fere non absque illius inuentione, quæ videlicet propter naturæ affinitatem, vel nominis similitudinem cum alijs à nobis descriptis intelligi vix poterant: vel in opinione apud nostros sic versabantur, vt aliena pro veris supponerentur. Quod si autem quæ aliæ sunt nobis cum Matthiolo communes, eas nostra cura depictas fuisse, figuræ magna ex parte aliæ, atque vernaculi commentarij prius quam Matthioli ad nos venirent editi, facile testabuntur. Nec defuit nobis locupletandis nostris Doctis. Andreas Lacuna, qui Corrudam & Palmã in opus nostrum intulit. Profuit etiam industria Caroli Clusij cognitionis vniuersæ materiæ Medicæ, tum ipsius artis studiosiss. qui cōuertendis commentarijs hinc in Gallicum Idioma, benignam ac diligentem suam operã nobis exhibuit. \*

Reliquum est studiosi iuuenes, vt nostris hisce cōmentarijs, cum in Stirpium herbarumque cognitione facilius assequenda adiuti, tum huius scientiæ & Medicinæ partis non minimæ, vtilitate, necessitateque prouocati, excitatis, accensis, inflammatis animis, omni studio in hoc diligentissimè incumbatis, vt non solum quæ à nobis descriptæ sunt, ac per icones expressæ stirpes, in notitiam vestram veniant, verum etiam earum quæ apud veteres supersunt nondum satis notarum, ac vniuersæ materiæ Medicæ peritiam assequamini, vel saltem auctarium aliquod hæctenus repertis ac traditis adijciatis, in quo multorum communi studio, maius ac ma-

ius incrementum hæc scientia accipiens, ad *ἀριστερά* tandem  
ac perfectionem perueniat. Valete,

Mechliniæ Quinto Idus Iulias.

1557.

Errores post operis absolutionem in epistola ad Medicinæ candidatos obseruati.  
pag. 5. linea 6. à fine, lege Diodoti : pag. 7. linea 24. lege requirimus, & quærendis  
pag. 10. linea prima. lege non absque eius mentione : ibidem linea 3. lege descriptis  
negligi : ibidem linea 4. à fine, lege. adijciatis, quod multorum,

# Table des propriétés & vertus des Plantes

contenues en cest Herbiere: le premier nombre, de-  
note la page: le second, le Chapitre: & les  
lettres ensuyuans, l'endroit de cha-  
cune faculté & vertu.

**A** Billemens preferués de Vermine, cherche  
Vestemens.

Abfces. 99. 85. g : 99. 86. a : 198. 84. c : 384. 9. b :  
437. 62. a : 483. 25. a : 484. 26. g : 504. 4. 6. d :

Achores. 147. 39. c :

Agacans. 147. 39. c : 222. 67. c :

induire à faire Aimer. 417. 38. b :  
contre mauuaise Air & infect. 121. 12. d : 184. 71.  
b : 202. 88. c : 208. 91. a, b, c : 210. 95. d : 215. 13. b : 493. 36  
a : 504. 4. 6. h : 536. 82. d :

oster la puanteur sous les Aisselles. 337. 34. g :  
368. 72. a :

Alchimie. 104. 92. a :

courte Aleine. 10. 16. a : 26. 22. a : 98. 85. a : 143. 34  
d : 151. 45. b : 160. 49. a : 164. 51. a : 168. 59. c : 171. 61. a :  
175. 63. c : 191. 78. d : 196. 83. a : 209. 94. a : 210. 95. c : 212  
1. c : 215. 5. a : 220. 9. a : 226. 14. b : 239. 4. 6. c : 262. 48. c :  
279. 68. a : 367. 71. d : 430. 55. b : 438. 64. a : 452. 79. d :  
499. 41. b : 504. 4. 6. f : 544. 90. a : 546. 92. e :

faire bonne Aleine & bien flairante. 191. 78.  
d : 494. 36. c : 515. 57. a : 514. 57. c : 518. 94. d :

Alopecies. 213. 11. k : 447. 73. k : 454. 80. d : 459.  
1. h : 461. 3. f : 515. 58. c :

pour Amaigrir. 257. 4. 4. c : 526. 70. c :

inciter au ieu d'Amours. 2. 1. i : 99. 85. b : 145. 36  
c : 152. 45. a : 156. 4. 6. a : 159. 4. 8. a : 179. 67. a : 180. 68. c :  
190. 77. f : 191. 78. c : 147. 38. b : 432. 57. b : 516. 70. g :  
547. 93. b :

faire perdre appetit du ieu d'Amours. 135. 28.  
c : 143. 36. c : 156. 4. 6. b : 395. 18. c : 396. 19. e : 398. 20.  
c : 484. 26. a : 512. 67. c :

Amygdales. 441. 69. b : 443. 70. g : 452. 79. k :  
504. 4. 6. q :

inflation des Amygdales. 213. 1. a : 462. 4. a : 473  
14. a : 504. 4. 6. h : 506. 47. b : 535. 36. f, g :

inflammation des Amygdales. 491. 33. c : 402.  
44. d :

tumeur des Amygdales. 167. 58. e : 430. 55. d, e :  
524. 68. h : 532. 75. a :

vicerés des Amygdales. 97. 84. h : 239. 27. k :  
473. 14. a : 502. 44. d : 513. 56. f, g :

signes d'Année fertile. 452. 79. m :

Antidotes & Contrepoisons. 187. 74. c : 229.  
17. b : 473. 35. b : 473. 41. d : 412. 34. b : 420. 41. c : 421.  
43. b : 422. 44. c : 441. 70. b :

contre Apoplexie. 187. 73. b : 202. 88. d : 230. 19.  
a : 235. 41. b, c : 239. 46. c : 460. 2. c : 524. 69. e :

faire reucnir la parole à gens touchés d'Apo-  
plexie. 133. 26. a : 186. 72. b : 201. 88. f : 498. 40. g :

guérir Apoftemes. 55. 48. a : 75. 65. g : 84. 72. c :  
103. 91. c : 197. 83. d : 389. 13. d : 504. 4. 6. 1. p : 524. 69. b :

rompre toute sorte d'Apoftemes. 55. 48. b : 83 :  
71. d : 154. 40. g : 239. 4. 6. k : 301. k : 314. 7. b : 320. 15. d

329. 14. c : 403. 25. d : 520. 65. d :

appaifer douleur d'Apofte. 329. 23. c : 335. 55. b :

Apoftemes derriere les Aureilles, cherche Pa-  
rotides.

Apoftemes bilieufes. 152. 45. d :

Apoftemes de la Bouche. 83. 71. d : 160. 49. e :  
504. 4. 6. i : 519. 63. c : 532. 75. a :

Apoftemes au Cerveau. 546. 92. d :

Apoftemes chaudes. 71. 61. f : 121. f : 127. 39. c :  
306. 92. b : 343. 40. a : 388. 12. g : 410. 32. e :

Apoftemes du Col. 55. 48. a :

Apoftemes dures. 150. 42. c :

Apoftemes en l'Estomach. 342. 39. c : 388. 12. d :  
389. 13. d :

Apoftemes froides. 52. 45. b :

Apoftemes des Genitoires. 147. 39. d : 439. 64. f :  
443. 80. e :

Apoftemes du Gozier. 54. 47. b : 176. 61. k : 83. 71.  
d : 160. 49. c : 504. 4. 6. i : 532. 75. a :

Apoftemes interieures. 178. 68. b :

Apoftemes des Mammelles. 403. 25. d : 439.  
64. c : 443. 80. e :

Apoftemes de la matrice. 337. 34. d : 403. 25. e :

Apoftemes nouvelles. 443. 80. e :

Apoftemes aux racines des Ongles. 143. 34. m :  
524. 69. c :

Apoftemes de la Poitrine. 15. 12. b, c : 83. 71. a :

Apoftemes du Siege. 143. 34. n :

receiller l'Appetit. 210. 95. i : 345. 43. a : 395. 18. b :  
398. 20. m : 413. 33. a : 416. 37. b : 419. 40. a : 420. 41. a :  
425. 50. a : 430. 35. a : 443. 70. a : 446. 73. a : 477. 18. h :  
477. 19. c : 479. 21. a : 493. 36. c : 494. 46. g : 514. 57. g :  
519. 63. f : 548. 94. c :

Araignes. 4. 2. f : 167. 88. a : 211. 4. 2. c : 145. 71. e :  
Arrierefais, cherche Secondine.

Asperité, & Rudesse. 168. 58. h : 185. 71. o : 235. 24  
b : 238. 26. h : 240. 28. d : 243. 19. d : 338. 35. a : 504. 4. 6.  
f : 526. 70. f :

Asthmatique, cherche difficulté de Respire.

Aureilles coulantes. 491. 33. c : 547. 93. f :

deffluxion és Aureilles. 79. 68. e :

douleur d'Aureilles. 39. 33. d : 41. 34. c : 156. 49. c :  
67. 59. c : 71. 61. h : 75. 65. c : 152. 45. d : 168. 58. g : 173.

62.

# Table

62.1181.69.e184.71.1209.94.h117.6.e1154.40  
 h1293.8.f1301.88.e1306.92.1342.19.d1370.75.b1  
 3773.c1384.g.h1401.a.f1413.80.k1459.l.e1464.3  
 g1527.71.b1  
 estouppement d' Aureilles.182.69.e:  
 inflammation des Aureilles.301.88.b1389.33.c  
 nettoyer les Aureilles de bouë & d'ordure.  
 67.59.c:75.65.e1264.49.e1272.39.d:447.73.f1  
 414.80.g:481.23.e1485.17.b159.69.e:  
 playes des Aureilles.191.78.l:  
 rongne des Aureilles.264.49.e:  
 son & bourdonnement des Aureilles.184.71.l:  
 235.41.d:265.50.c1377.5.c1380.6.f1430.55.h1447  
 73.f:483.24.c1504.46.o:1588.83.c:  
 tuer & faire sortir les vermineux des Aureil  
 les.56.49.c:79.68.e190.76.l:477.18.g1338.83.c  
 vlceres des Aureilles.264.49.e:127.71.b:

## B.

faire sortir & croistre la Barbe.22.e:  
 engresser Bestail.5.2.p:129.24.f157.61.b:  
 Bestail ayant mal aux Poulmons.238.26.n:  
 que la Biere ne deuienne aigre.13.9.c:  
 Blessures,cherche Playes.  
 Boilles.87.75.h199.86.a194.82.e139.85.e:  
 Boilles des synes.28.24.a:29.24.d:  
 faire bonne Bouche.207.92.c:  
 Bouche punaise.37.31.e:65.57.b1107.97.c:191  
 78.d:346.46.b:  
 inflammations de Bouche.1744.d:478.20.b:  
 59.63.c:  
 mal de Bouche.8.5.b,c:  
 phlegmes de la Bouche.478.20.b1502.44.d:  
 vlceres de la Bouche.8.5.b,c17.14.d137.31.e:  
 64.55.a:64.56.e:65.57.b:66.58.c171.61.190.78.  
 297.84.a.h201.88.c.g:106.95.d:107.97.c113.4.c  
 128.20.a:137.29.f156.46.f167.58.e196.6.83.g1229  
 17.e1234.25.d:239.27.k:345.43.b1351.53.a:369.73.  
 b:421.42.b:462.4.a.g:483.25.a:495.38.h1502.44  
 d:513.56.f.g:519.63.c:530.73.a:  
 Boyau culier tombant.29.24.b:548.94.a:  
 creueures du Boyau culier.113.3.b:484.26.e:  
 Bras rompus.528.72.b:  
 Brulures & Eichaudures.63.a:12.8.g19.33.a:  
 49.42.b:51.43.d:87.75.e:92.79.k1103.90.b:103.  
 91.c147.39.g:148.40.c:150.42.b:264.49.b.g:  
 352.54.a:363.66.b:371.76.a:377.5.f:395.18.d:396  
 19.c1403.15.g:410.33.g:414.80.k:502.44.e:504  
 46.f:531.74.b:542.87.b:  
 Bubons.28.24.a:514.69.a:539.85.e:  
**C**antharides.193.79.c:  
 Carboncles.110.95.1243.29.d:329.24.c:496  
 39.h:539.58.h:  
 rompre Carboncles pestilentieux.84.72.c:  
 110.95.1329.23.f:  
 Catarhes.71.61.a:176.64.b196.83.f1217.6.a  
 216.35.b1280.70.d:293.80.b:306.92.c:365.68.f:  
 460.a.c:355.58.b:336.82.g1548.94.d:

bon au Cerueau.536.82.g:  
 cõforter le Cerueau.270.60.a:286.72.b:187.  
 73.b:87.74.d:315.9.a:548.94.d:  
 eschauffer le Cerueau.176.64.b:135.24.e:  
 froideur & humidité de Cerueau.164.54.h:  
 230.19.a:  
 humecter le Cerueau.133.1.e:  
 mondifier le Cerueau.25.20.g:165.56.f:167.  
 58.f:123.n.h:252.39.d:29.40.b:239.46.a:264.  
 49.d:377.5.b1380.6.e:443.70.e:447.73.g:  
 obstrucons du Cerueau.276.64.b:  
 purger le Cerueau de phlegmes.25.20.f:43.  
 36.b:202.88.f:120.95.d:123.n.h:230.19.b:231.20.  
 2235.24.e:250.36.b:259.46.a:264.49.d:423.46.  
 2:430.55.c:  
 secher le Cerueau.176.64.b:196.83.f:314.f:  
 235.9.a:260.a.c:336.82.g:548.94.d:  
 troubler le Cerueau.122.14.a:230.15.g:231.26.b  
 reioindre la Chair hachée bië menu.110.108.b:  
 Chaleur exterieure.103.91.b:  
 Chaleur interieure.79.68. a:103.91.b:477.19.  
 c:479.21.a:  
 Champignons.415.36.i:  
 Champignons venimeux.4.2.e184.71.c:  
 Chancre.353.0.b:71.61.f:99.85.g:127.6.f:327.  
 22.c:439.64.c:  
 Chardons,cherche Espines.  
 Chassieufete.5.2.g:42.35.b:127.19.e:133.26.c:  
 162.51.d:129.27.g:367.71.h:394.17.d:495.38.i:  
 farcin de Cheueux.16.13.c:  
 iaulnir Cheueux.92.79.h:479.21.d:490.32.b  
 noircir Cheueux.258.45.e:480.22.d:481.23.  
 d:485.27.b:524.68.k:539.85.i:  
 que les Cheueux ne tombent.139.27.i:434.  
 39.e:461.3.f:481.23.d:  
 Cheutes.66.58.b:175.63.c:178.66.a:210.95.  
 m:222.20.e:224.12.c:270.57.b:274.61.a:370.74  
 c:476.18.b:536.82.b:546.92.e:  
 purger la Cholere.209.94.a:256.43.a.b:437.  
 62.a:  
 Cholere noire.15.n.a:256.43.a.b:  
 maladie Cholericque,cherche Felonnie.  
 Cicatrices.175.63.g185.71.f:235.24.b:338.a.6.  
 h:354.40.h:359.46.i:361.47.b.k:366.51.d:280  
 70.c:286.72.b:300.87.l:309.1.d:329.24.c:435.36  
 n:461.3.f:539.84.b:  
 Cicatrices noires.432.57.d:449.76.e:  
 Cicatrices prouenas de pustules & rougeors  
 les.213.11.i:  
 Cigue.4.2.f:167.58.a:  
 douleur & inflammation de Col.218.10.a:  
 Colique.26.22.a:102.89.c:137.29.b:139.30.b:  
 173.62.d:201.87.b:202.88.c:240.28.b:247.34.a:  
 255.41.b:274.62.a:300.87.b:357.19.b:413.36.i  
 491.34.a:  
 Collections.257.44.d:460.2.a:539.63.b:  
 Collections froides.145.37.c:



# Des Vertus.

**C**ollections vieilles. 503. 45. c:  
 bon en Collyres. 190. 76. a. 210. 95. h. 217. 6. d:  
 220. 9. k. 297. 83. b. 369. 75. c. 1474. 15. g:  
**C**ontusions. 48. 40. e. 160. 49. e. 168. 58. i. 175. 63. c  
 278. 66. a. 185. 71. r. 190. 76. g. e. 210. 95. m. 222. 30. e:  
 270. 57. b. 274. 61. a. 415. 53. 6. n. 449. 76. e. 483. 24. e:  
 effacer Contusions noires. (483. 27. d. 527. 71. d  
 78. 67. b. 165. 56. c. 168. 58. i. 175. 63. g. 193. 79. d. 239  
 27. f. 247. 34. c. 259. 46. k. 261. 47. b. c. 430. 55. i:  
 440. 67. a. 445. 71. m. 483. 24. e. 485. 27. d. 513. 16. e  
**C**onuulsion. cherche Spasme.  
 eschauffer le Corps. 175. 63. b:  
 restabilir le Corps sec & effloré. 156. 46. a. 159.  
 48. a. 157. 59. h. 1418. 53. c  
 douleur & poicteure de Costé. 92. 79. f. 125. 17. a  
 161. 51. c. 177. 65. e. 181. 69. a. 284. 71. h. 312. a. c. 224.  
 n. c. 229. 17. a. 247. 34. a. 259. 46. e. 315. 8. c. 343. 4.  
 3365. 68. a. 348. 1. 6. e. 417. 18. e. 419. 39. b. 422. 45. b:  
 433. 80. b. 526. 70. a. h. 551. 81. a:  
 inflation de Costé. 161. 51. c. 422. 44. b:  
 ventosités de Costé. 161. 51. c. 422. 44. b:  
 faire auoir les pailles Couleurs. 194. 81. f:  
 oster la mauuaise Couleur. 327. 2. a. 1. 329. 24. b:  
 pour endurcir aux Coups. 432. 57. e. (546. 92. g  
**C**rachemens de matiere purulente. 12. 8. e. 92.  
 faire Cracher. 310. 1. o. (79. f:  
**C**reuures. 143. 34. a. 145. 79. h. 186. 82. h. 154. 4. 90. e  
 conforter le cueur. 117. 7. a. 133. 26. a. 170. 60. a:  
 377. 65. a. 183. 70. a. 493. 36. b. (a. 371. 77. b:  
 effouyr le Cueur. 7. 3. d. 9. 6. a. 105. 9. 4. d. 170. 60  
 torsions ou trenchées qui viennent autour du  
 Cueur. 167. 58. b:  
 tremblement de Cueur. 105. 9. 4. d. 121. 12. d. 1187  
 73. b. 88. 12. d. 459. 1. b. 462. 4. d. 514. 57. f:  
 embellir le Cuir & Peau. 110. 95. e. 223. 11. j. 224.  
 22. e. 329. 23. d. 338. 35. a. 384. 9. f. 385. 10. b. 413. 35. b:  
 519. 72. e:  
**D**artres. 254. 40. h. 280. 70. c. 337. 34. g. 355. 58.  
 e. f. 482. 23. k. 504. 46. f. 529. 72. e. (131. 68. d:  
**D**efluxions. 70. 61. a. 176. 64. b. 398. 20. b. 481. 23. i  
 Defluxion tombant sur les Nerfs. 309. 1. c:  
 Defluxion tombant fur les poulmôs. 56. 4. 8. b  
**D**emangeon. 63. a. 83. 71. b. 164. 54. a. 168. 58. h.  
 232. 39. b. 254. 40. h. 299. 24. e. 384. 9. g:  
 affermir les Dés. 17. 14. d. 97. 84. b. 186. 72. c. 112  
 1. f. 398. 20. i. 462. 4. b. 495. 58. e. 599. 63. i. 548. 9. 4. e  
 agassement de Dens. 398. 10. i:  
 douleur de Dens. 25. 20. d. 26. 21. c. 433. 6. b. 63.  
 55. a. 71. 61. 192. 79. c. 97. 84. b. 160. 49. d. 396. 83. g  
 202. 88. f. 209. 94. h. 210. 95. d. 230. 19. c. 231. 20. a. 233  
 22. d. 235. 24. f. 238. 16. f. 243. 29. c. 252. 39. c. 254. 40.  
 f. 264. 49. a. 300. 87. c. 304. 92. c. 306. 92. k. 355. 58. g  
 361. 61. d. 365. 68. d. 384. 9. h. 403. 25. c. 413. 46. a:  
 430. 55. c. 445. 71. a. 454. 80. h. 468. 10. c. 484. 15. c:  
 477. 18. f. 502. 44. g. 504. 46. k. f. 531. 74. c. 533. 78. b.  
 538. 83. a. 541. 87. c:  
 embellir les Dés. 186. 72. c. 212. a. f. 548. 9. 4. e:

nettoyer les Dens. 426. 51. e:  
 faire bône Digestiõ. 108. 89. b. 152. 45. a. 167. 58.  
 h. 173. 62. a. 193. 80. a. 194. 82. a. 199. 85. a. 202. 88. e:  
 205. 91. h. 207. 92. c. 210. 95. i. 224. 12. b. 226. 14. d:  
 392. 16. e. 416. 37. b. 420. 41. a. 430. 55. a. 432. 57. b:  
 442. 69. a. 443. 70. a. 449. 43. 6. e. 514. 57. g. 546. 92. i  
**D**ysenterie. 17. 14. a. 22. 6. a. 145. 38. c. 358. 50. a. 62.  
 54. a. 64. 55. b. 64. 55. b. 66. 58. a. 68. 60. c. 71. 61. b:  
 73. 65. d. 77. 66. a. 79. 68. b. 81. 69. b. 84. 73. c. 87.  
 75. a. 89. 77. a. 92. 79. a. 104. 94. a. 106. 95. b. 110. 100  
 a. 115. 18. a. 115. 28. a. 144. 35. a. 149. 41. b. 176. 64. a:  
 177. 65. e. 191. 78. b. 194. 82. b. 211. 10. a. 222. 10. f. 233  
 22. a. 264. 49. h. 276. 64. a. 318. 12. a. 333. 30. b. c. 344  
 42. a. 384. 9. c. 398. 20. e. 403. 25. a. 404. 26. a. 410  
 32. h. 455. 81. a. 461. 3. c. 462. 4. f. 478. 20. c. 485.  
 27. b. c. 491. 33. a. 495. 38. b. 496. 39. a. 502. 44. a:  
 509. 51. a. 511. 54. a. 512. 55. d. 514. 57. e. 519. 63. d. 523.  
 68. a. 529. 85. a. 547. 93. a. 548. 94. a. b:  
**D**ilocation de membres. 48. 40. e. 91. 79. i. 147.  
 39. c. 150. 42. b. 165. 56. e. 168. 58. i. 223. 11. m. 255. 41.  
 b. 120. 57. b. 264. 41. a. 333. 55. a. 365. 66. b. 429. 54. c  
 449. 76. b. 455. 81. d. 480. 22. e. 481. 23. h:  
 faire Dormir. 121. e. 135. 28. d. 191. 83. h. 193. 80. a  
 b. c. e. h. 1295. 81. a. 1297. 83. c. f. g. 306. 92. f. h. 395. 18  
**D**ouleurs. 55. 4. 8. a. 125. 17. a. 133. 29. c. 396. 19. b:  
 1139. 30. c. 190. 77. f. 207. 92. a. 209. 94. e. 239. 80. e:  
 294. 18. o. 1297. 83. f. 300. 82. a. 330. 91. b. 360. 92. c  
 e. h. 315. 9. a. 324. 29. e. 396. 19. b. 483. 24. d. 519. 63. k  
 amollir Duretes. 137. 29. i. 139. 30. c. 196. 83. h:  
 220. 9. m. 334. 30. h. 424. 48. b. 439. 62. c. 440. 67.  
**E**auë iniecte, quelle (a. 139. 63. k. 344. 90. b:  
 ne nuise point. 164. 54. f. 445. 71. f:  
**E**nchitemens. 2. 1. i. 81. 70. c. 349. 90. b. 451. 79. i:  
**E**ndormisson. cherche Letharge. (496. 39. b  
 pour auoir Enfans de bon esprit & entendus.  
 que les Enfans demeurent petis. 308. 93. a:  
 ayder à l'Enfitemet. 173. 62. e. 182. 69. d. 199. 85  
 e. 109. 94. b. 223. 11. o. 265. 51. b. 300. 87. e. 473. 14. d  
 fortifier l'Enfant au vêtre de la mere. 177. 65. b  
 pouffer hors l'Enfant mort. 23. 18. f. 28. 23. a. 235.  
 3. d. 121. 2. b. 137. 19. a. 143. 34. g. 161. 51. a. 163. 54. a:  
 166. 57. b. 175. 63. d. 181. 69. d. h. 184. 71. f. 187. 73. a:  
 189. 75. a. 199. 85. b. 202. 87. a. 202. 88. b. 209. 94. b:  
 210. 95. a. g. 212. 1. b. 220. 9. b. 223. 11. d. 224. 12. f. 235  
 24. d. 238. 26. c. 31. 40. c. 39. 46. f. 169. 56. d. 197.  
 83. b. 319. 23. c. 370. 74. f. 727. 53. a. 434. 59. b. 519. 84  
**E**nflures. 12. 8. 197. 84. i. 180. 68. b. 403. 25. d. (a:  
 420. 41. e. 527. 71. d:  
**E**nroueure. 180. 6. h. 504. 46. f. 508. 50. e:  
**E**ntrailles. cherche Intestins.  
 blessure des Entrailles. 55. 48. f. 77. 66. b:  
**I**nflammation des Entrailles. 79. 68. a:  
**E**nyurer. 122. 14. a. 179. 67. b. 320. 15. g. 321. 16. b:  
 garder d'enyurer. 4. 2. c. 152. 45. a. 380. 6. m. 481  
 23. f. 499. 41. e:  
**E**pilepsie. 28. 23. c. 29. 24. c. 32. 28. c. 34. 29. b. 64.  
 55. e. 162. 51. a. 164. 54. e. 198. 84. b. 199. 85. c. 205. 92.

# Table

- g:209.94.c.122.1.c:224.13.a:227.16.c:230.19.a:  
 234.24.a:255.41.b.c:236.43.c:259.46.b:260.46.  
 0:43.41.a:357.59.f:430.55.g:468.10.b:504.46.g  
 Epilepsie de petis en .(524.69.c:546.92.d:  
 fans.u.a.d:2:191.78.g:217.16.c:335.32.c:  
 Erysipeles.cherche Feu volage.  
 Eschardes.cherche Espines.  
 Eschaudures.cherche Brulures. (87.b:  
 Escorcheures.101.88.d:447.73.h:484.26.i:542.  
 Escrouelles,Strumes au Col.182.69.f:279.68.  
 e:35.8.b:370.75.c:384.9.l:444.17.c:  
 Estrouer la Copaigne.9.6.2:397.84.k:173.62.k:  
 Espines & Eschardes.43.36.c:155.48.b:117.7.d:  
 145.6.b:2145.37.b:1150.42.c:280.68.b:189.75.f:212  
 1.d:232.21.b:159.46.k:310.2.k:314.7.b:353.55.a:  
 402.24.h:432.57.f:443.70.g:449.76.b:  
 aiguiler l'Esprit.415.36.e:  
 pesanteur d'Esprit.112.1.e.  
 troublement d'Esprit.161.51.c:  
 Esquinance.29.24.c:122.1.d:191.78.h:213.2.a:253  
 40.d:415.36.g:443.70.f:447.74.d:466.7.c:155.  
 pour faire Esterner.143.34. (58.d:544.90.b:  
 f:165.56.f:170.60.d:110.95.d:235.24.c:250.36.b:  
 286.72.c:430.55.g:447.73.g:  
 chaleur d'Estomach.18.24.a:30.25.a:65.57.d:  
 75.65.g:201.88.b:388.12.a:395.18.b:398.20.a:405.  
 28.a:407.29.a:410.32.b:470.10.a:477.19.c:478.  
 20.a:486.12.c:492.35.a:495.38.a:509.35.a:  
 conforter l'Estomach.4.2.a:71.61.a:102.89.b:152  
 45.a:170.60.a:173.62.a:399.85.a:202.88.c:205.91  
 100.95.122.624.d:239.27.a:235.31.a.b:245.43.2  
 350.51.a:392.16.c:398.20.c:m:400.32.a:419.40.a  
 420.41.a:425.50.a:426.51.a:427.52.a:494.36.g:  
 495.38.a:496.39.c:508.0.b.c:515.57.a:515.59.a:  
 519.61.f:390.85.b:546.92.i:548.94.c:  
 debilité d'Estomach.221.10.a:245.43.a:350.51.a:  
 361.61.a:388.12.a:380.20.c:456.82.e:465.5.c:481  
 23.c:509.51.a:546.92.i:  
 douleur d'Estomach.12.9.a:84.73.c:135.28.c:  
 164.54.d:167.58.b:173.62.a:190.76.d:221.10.a:  
 224.12.b:239.27.b:311.c:342.39.c:389.13.a:394.  
 17.a:222.44.b:449.76.d:462.4.d:403.45.b:514  
 eschauffer l'Esto.173.62.a:199.9.(57.g:548.94.c:  
 85.a:201.88.c:207.92.c.d:239.27.b:398.20.m:  
 416.37.b:430.55.a:442.69.a:494.36.e:513.57.a:  
 fluctuation d'Estomach.168.19.b:221.10.a:279  
 68.c:384.9.c:395.18.b:456.82.f:493.36.b:495.  
 38.a:514.57.g:518.62.b:546.92.i:  
 humecter l'Esto.410.32.b:486.28.c:495.38.a:  
 inflammation d'Estomach.51.a.m:135.28.c:388.12  
 d:398.20.c:456.82.e:459.51.d:491.35.a:  
 inflamé d'Estom.32.18.b:99.85.b:191.78.a:207  
 92.d:109.94.a:222.10.a:226.15.a:424.48.c:484.  
 modifier l'Estomach.377.51.a: (26.b:  
 mordicatio d'Esto.164.54.d:389.13.a:459.4.d  
 conforter l'orifice de l'Estomach.58.57.a:  
 fermer l'orifice de l'Estomach.194.82.a:224.
- 12.b:493.58.b:496.39.c,d:500.42.b:  
 purger l'Estomach chargé d'humours chaudes  
 & bilieuses.4.2.a:239.27.a:247.34.a:294.17.a:  
 purger l'Estom.de toutes humeurs superflues  
 173.62.a:239.27.a:267.71.c:477.18.h:494.36.e:  
 relachement d'Estom. (495.38.d:533.78.a:  
 221.10.b:334.30.c:456.82.c:462.4.d:  
 roucés & ebullitions d'Estom.4.a.d:168.59.b:  
 191.78.a:205.91.b:159.79.b:245.62.c:478.26.d:  
 secher l'Estomach.207.92.d:222.1.(546.92.1:  
 10.b:339.27.a.b:332.28.a:334.30.d:350.51.a:426.51  
 a:461.3.a:481.23.c:  
 subuersion d'Estomach.34.30.c:456.82.f:  
 ventosités d'Estomach.99.85.b:170.60.a:394.  
 81.a:207.92.a,d:209.94.a:226.15.a:424.48.c:  
 vlceres de l'Estomach.455.81.b: (484.26.b:  
 Estonnement.256.43.c:  
 Etique.cherche Phthisique.  
 Euauissement.cherche Paimoisson.  
 Expressions.cherche Tenasme.  
 creures en la Face.457.93.c:  
 embreller la Face.185.71.0:102.88.g:223.n:319.  
 23.d:407.29.c:413.35.b:529.72.e:  
 effacer Lentilles de la Face.78.67.b:90.78.b,  
 c:143.14.d:150.42.c:196.83.h:202.88.g:207.92.g:  
 247.34.d:254.40.h:259.46.i:261.47.b:310.1.d:  
 314.35.b:329.23.d:329.24.c:337.34.g:415.36.n:430  
 55.2:432.57.d:435.60.b:442.69.b:449.76.c:  
 465.6.h:499.41.h:504.46.1:  
 Lentilles du visage.529.72.e: (92.g:  
 rougeur de Face.35.30.c:65.57.c:143.34.1:207.  
 taches blanches & noires de la Face.403.25.i:  
 430.55.i:  
 Felonnie,ou maladie Cholérique.64.56.d:173  
 bon aux Femmes enceintes.177.65.b: (62.b:  
 Femmes enceintes qui ont mauuair estomach.  
 offer aux Femmes grosses,l'appetit de (455.81.a:  
 fordonné.456.82.g (427.53.a:473.14.d:  
 purger les Femmes apres l'enfantement.184.71  
 rendre les Femmes fertiles.177.65.c:417.38.g:  
 Fendasses.cherche Creures.  
 Feu,maladie des porceus.225.13.d:  
 Feu sacré.cherche Feu volage.  
 Feu volage.64.a.8.f:215.11.c:15.12.a:30.25.a:39.  
 33.a:75.65.g:79.68.c:81.69.c:87.75.e:97.84.e:  
 103.91.c:109.99.c:147.39.g:152.45.d:190.76.g:  
 195.82.f:195.51.4:20.28.c:280.70.c:293.80.d.g:  
 295.81.b:301.88.a:303.90.a:304.91.d:308.93.b:310  
 35.b:334.30.i:335.55.b:355.58.e:367.71.b:374.1.c:  
 377.51.f:388.12.c:395.18.d:398.20.h:410.32.g:445  
 71.a:459.4.c,d:463.5.b:477.19.b:480.22.b:481.  
 23.k:488.29.a:519.63.a:539.81.h:  
 Fiellée.101.88.a:107.97.b:217.18.a:  
 Fieures.14.10.c:87.75.g:112.1.b:2.b:227.19.a:  
 221.10.a:247.79.c:479.21.a:495.38.a:  
 Fieures chaudes.47.39.d:79.68.a:103.91.b:111.  
 L.112.1.h:117.35.28.d:221.10.d:269.56.a:388.12.  
 c:398.

# Des Vertus.

c398.20.d:459.1.a:470.11.a,d:478.20.a, d:492.35.a:493.36.a,d:506.48.a:510.65.b:  
 Fleures de longue durée.101.83. b:107.97.b:102.83.d:110.95.k:121.158.b:546.92.k: (139.30.c: frisson des Fleures.184.71.h:199.85.a:210.95.k: 212.1.c:265.51.c:439.55.f:443.70.c:  
 Fleures froides.202.88.d:  
 Fleures causées d'obstruction du cuir.137.29.h:  
 Fleures pestilenciales.16.13.a:367.71.i:  
 Fleures quartes.9.6.c:34.29.a:48.40. c:50.43.b:64.55.e:71.61.e:97.84.i:274.62.a:278.67.a:345.41.d:359.61.b:367.71.c:  
 retour des Fleures.2.1.h:424.48.f:  
 Fleures tierces.9.6.c:47.59.a:48.40. c:50.43.b:64.55.e:71.61.e:75.65.c:197.84.i:159.48.b:164.54.o:280.70.a:2343.41.d:388.12.c:498.40.c:  
 garder Figues long téps en leur bôit.92.79.d:  
 engendrer Filles.156.46.c:  
 engendrer Filz.156.46.c:347.47.a:  
 Fistules.54.4.7.a:64.55.f:71.61.f:103.90.a:109.99.d:143.34.1356.46.c:119.8.1220.9. m:123.16.d:132.16.a:1445.71.o: (d:245.29.d:  
 emporter callosité de Fistules.235.24. c:173.26.  
 arrester le Flux.75.65.d:177.66.d:187.75.d:205.94.a:215.28.h:227.16.d:283.71.c:336.33.c:346.45.a:355.57.b:384.9.k:462.4.c:474.15.d.f:482.23.a.g:489.31.a:495.58.b:496.39.c.k:506.47.e:511.54.a:514.57.c:519.63.d:524.68.h:547.92.a:  
 Les Fleurs qui coulent en trop grand abondance.17.14.b:126.21.a:158.50.b:162.14.a:164.56.b:65.57.a:166.58.a:168.60.c:71.61.b:75.65.e:77.66.a:83.76.a:144.35.b:170.60.e:171.62.d:194.81.d:234.32.f:283.71.a:293.80.c:301.88.c:306.41.c:333.30.b:336.33.c:336.58.f:384.9.k:455.81.i:461.3.c:465.9.a:474.15.f:479.a:164.80.a:22.a:481.23.a.g:486.27.a:491.33.b:522.67.a:536.82.f:548.64.b:  
 prouoquer les Fleurs.2.1.a:20.16.b.22.18.b:28.23.a:50.43.a:84.73.a:99.85.e.k:113.3.a,d:114.4.b:121.12.a:137.29.a:143.34.c.g:147.39.b:161.51.a:163.53.a:163.54.a:164.55.a:165.56.b:166.57.b:167.58.b:168.59.d:171.61.b:175.63.d:179.67.a:182.69.d:184.4.71.a:187.73.a:187.74.a:189.75.a:190.76.b:202.79.b:196.83.a:198.84.a:199.85.b.200.86.a:201.87.a:202.88.b:205.91.c:207.92.b.c:209.94.b:210.95.a.g:211.1.b:215.5.d:220.9.b.j:223.11.d:224.12.f:225.14.a:226.15.c:227.16.a:229.17.a:232.21.a:234.32.a:235.14.d:238.26.c:239.40.c:259.46.f:260.46.a:269.56.d:279.68.b:319.23.c:343.41.a:357.59.c:367.71.b:370.74.a.f:380.6.g.i:384.9.c:398.21.a:400.23.b:415.36.k:417.18.d:421.41.a:422.44.a:424.45.a:424.48.c:427.53.a:430.51.f:434.39.b:443.77.62.a:445.71.p:447.73.h:452.80.a:472.15.b:473.14.d:476.18.c:483.24.g:484.26.d:511.66.a:538.83.f:539.84.a:548.94.a:  
 arrester le Flux blanc des femmes.66.58.a:135.28.h:191.78.b:338.36.b:459.1.f:485.27.c:  
 arrester le Flux rouge.110.100.b:351.52.a:

Fondement.cherche Siege.  
 Forcenerie & Rage.234.24.a:237.26.a:  
 Forcenerie & Rage prouenant de morsure de chien enragé.81.70.b:  
 garder Formage de pourrir.17.6.h:  
 Foulure.87.291.89.30.c:419.39.b:476.18.b:536.82.b:543.89.b:  
 dissolution de Foye.107.97.b:  
 dureté de Foye.484.26.c: (4.a.b:  
 purger humeurs bilieuses contenues au Foye  
 inflammation de Foye.52.m:47.39.d:103.91.b:111.a:212.1.h:127.19.a:221.20.d:280.70.a:301.88.b:374.1.b:388.12.c:470.11.a:477.19.c:478.20.a:486.28.c:495.38.a:500.65.b:  
 mal de Foye.45.38.a:64.55.d:137.29.c:152.45.a:211.10.a:224.12.b:235.55.a:296.82.a:357.59.c:372.79.a:415.36.h:  
 obstruction de Foye.12.18.b:15.20.c:26.22.c:43.36.a:45.38.a:47.39.a:56.49.b:61.53.a:64.56.c:71.61.d:84.73.a:101.88.b:102.89.b:107.97.b:130.24.a:177.65.c:182.69.a:187.74.a:190.76.c:191.78.b:205.91.c:210.95.a:220.9.g:221.10.d:223.11.c:227.16.b:235.55.a:256.43.c:265.50.a:268.54.a:270.57.a:271.58.a:272.59.a,b:278.67.b:279.68.b:80.70.a:296.82.a:302.89.b:327.22.d:329.23.b:335.31.a,b:370.74.a:374.1.b:377.54:399.21.b:417.38.c:420.41.b.c:427.52.b:429.54.b:455.81.g:459.1.a:465.6.g:477.18.h:483.24.g:484.26.c:498.40.c.f:499.41.b:502.44.f:513.57.b:515.59.a:526.70.a:515.42.87.c:546.92.g:547.93.c:  
 playes & blessures du Foye.64.56.c:  
 renforcer le Foye.45.38.a:64.55.g:182.69.a:171.76.b:455.81.g:459.1.a:515.59.a:518.62.c:526.70.a: Fraieur.161.51.c:  
 Frenesie.163.8.c:209.94.c:254.24.a:269.56.a:  
 Frissons & tremblemens.18.23.f:175.63.b:230.19.d:403.25.a:422.45.d:  
 Froissure.476.18.b:504.46.g:527.71.d:546.92.e  
 Fronses.cherche Rides.  
 Fruict contre nature.cherche Secondine.  
**G**alle.156.43.c:169.56.b:286.72.b:315.8.c:365  
 Galles aux mains.522.67.c: (68.c:368.72.b:  
 Galles aux pieds.522.67.c:  
 Galles chaudes.39.33.b. (94.c:  
 conforter les Gencives.65.57.b:64.54.a:548.  
 humidité de Gencives.465.38.c:519.63.i:524.  
 inflammation des Genc.491.33.c:519.63.c: (68.h  
 mal de Gencives.459.1.e:  
 Gencives relachées.548.94.c:  
 Gencives saigneuses.71.61.i:  
 tumeur des Gencives.524.68.h:  
 vlcères des Gencives.97.84.a:101.88.c:106.95  
 d:107.97.c:129.27.k:369.95.b:599.63.c:  
 demangeon des Genitoires.178.65.g: (70.g:  
 augmenter la semée Genitale.494.37.b.526.  
 secher la semence Genitale.56.49.a:155.28.c.  
 d:190.77.g:265.51.b:395.18.e:484.26.a:  
 \* i j inflam-

# Table

inflammatio des Genitoires.342.39.a: 389.13.c  
 inflatio des Genitoires.161.51.c:184.71.a: 194.  
 81.c:258.45.b:306.92.d:331.18.c: 327.22.b: 484.  
 26.1:339.85.e:

Phlegmons des Genitoires.394.17.b:  
 tumeur des Genitoires.147.39.d:184.71.a:194  
 81.c:258.45.b:323.18.c:

ulceres des Genit.410.32.i:456.82.d:495.38.d:  
 Gens amortis & enuieillis.425.50.c:  
 Glandules.cherche Amigdales.  
 pour faire Glux à prédre les oyseaux.491.34.b

Goute.48.40.e:56.49.d:64.55.b:71.61.g: 133.  
 24.a:162.51.e:64.54.k:139.84.g:110.95.o:121.c:  
 223.11.m:216.15.b:234.24.a:237.2.6.a: 247.34.a:  
 249.25.a:254.40.f:257.44.d:293.80.g:306.92.d:  
 309.a.b:315.8.f:320.15.e:334.30.f:363.66.b:374.c:  
 380.6.c:411.33.b:449.76.c:465.6.c:520.65.e:527  
 71.c: 545.91.a: (32.c:504.46.v:

Goute chaude.87.75.e:1283.71.g:88.12.d: 410.  
 Goute aux pieds.14.10.e:39.33.c:63.66.b:504  
 tumeurs de Goute.210.95.o: (46.v:527.71.c

douleur de Gozier.20.65.d:  
 enflure de Gozier.53.00.d:369.73.b:462.4.g  
 473.14.a:504.4.6.i:506.47.b:513.56.f.g:520.65.d

inflammation du Gozier.17.14.d:54.47.b:92.  
 79.c:112.a:118.20.a:229.17.c:502.44.d:  
 faire alpre le Gozier.198.84.b:243.19.f:  
 rudesse & asperité du Gozier.9.6.b:95.82.a.b:  
 112.a:1229.c:130.a.f.o:311.2.b:486.28.a:494.37.b  
 504.46.i:507.49.a.508.50.e:

tumeur du Gozier.112.1.d:160.49.c: 167.58.e:  
 213.2.a:220.55.d.e:244.68.h:32.75.a:  
 ulceres du Gozier.92.79.c:106.95.d:107.97.c:  
 229.27.k:241.42.b:462.4.a:472.14.a:302.44.d:  
 Gravelle.63.a:119.15.b.c:121.17.b:64.(513.56.f.g:  
 55.c:71.61.f:81.71.b:147.79.c:160. (49.f:68.58.h:  
 185.71.o:196.83.h:210.95.e:223.a.i:235.24.b: 238.  
 26.h:240.18.d:243.29.d:252.39.b:254.40.h:256.  
 43.e:259.46.i:269.56.b:272.59.a.b:286.72.b:310  
 1.h.m:315.8.e:320.15.b:327.22.e:337.34.g:355.58.e:  
 365.68.c:368.72.b:370.74.g:384.9.i.g:385.50.b:  
 430.55.m:434.59.e:445.71.a:447.73.k:504.46.f  
 z:528.72.c:530.73.c:532.76.b:537.8.b.56.82.e:  
 544.90.d:547.93.e:

Gratelle blanche.221.10.c:310.a.m:311.2.c: 377.  
 5.d:445.71.a:526.70.f:530.73.c:  
 Gratelle feche.460.2.a:  
 Gravelle.11.8.h:39.33.e:72.62.a:137.39.e:139.30  
 bu:2.45.f:163.33.a:173.62.a:201.87.a: 302.89.b:  
 317.22.d:341.44.a:357.59.d:358.60.a: 367.71.b:  
 369.73.d:384.9.e:399.22.b: 402.24.g:403.25.a:  
 423.33.d:427.38.c:430.00.41.422.44.a: 426.51.b:  
 429.54.b:435.60.a: 436.61.c: 459.11.i: 465.6.e:  
 468.10.d:472.13.a:477.19.d:483.24.f:488.29.b  
 489.31.b:499.41.d:501.43.b:503.46.d:506.47.c:  
 508.50.d:513.57.d:520.65.c: 542.87.e: 545.91.a:  
 546.92.b:547.93.c:

**H**Alle ou brulure du Soleil.355.58.f:  
 douleur de Hanches.cherche Sciatique.  
 Hemorrhoides.85.d:15.20.e:35.30.d:92.79.e:  
 198.84.c:210.95.p:213.a.c:239.27.e:300.87.g:398  
 20.e:462.4.e:485.27.e: (46.f:

ouvrir Hemorrhoides.139.27.e:446.75.c:504  
 Hergnes.64.15.f:79.68.d:104.93.b: 209.94.i:  
 495.38.f:539.85.c:

Herpetes.cherche Feu volage.  
 arreter le Hoquet.81.70.a:173.62.b.m:190.77  
 c:191.78.a:121.c:221.10.a: 278.67.b: 419.40.e:  
 493.6.b:496.39.i:513.57.a:

purger les Humeurs.19.15.b.c:60.51.a.b:  
 Humeurs adustes.79.68.a:143.4.a:167.7.58.b:  
 238.26.i:256.43.a.b:274.62.a:

Humeurs aigueues.2.6.22.a:148.40.a:222.11.a:  
 240.28.a.c:244.30.a:245.31.a:246.32.a: 247.33.a:  
 249.36.a:251.37.a.b: 252.38.a.b:253.40.a.e: 257.  
 44.4.b:260.66.o:261.47.a: 268.54.a: 269.19.a:  
 Humeurs bilieuses.47.40.a:260.51. (466.7.b:  
 2.b:79.68.a:112.1.a:119.9.b:143.34.a:161.51.b:168  
 59.a:143.220.9.f:121.10.d:137.26.a:138.26.m:  
 239.27.a:240.28.a.c:242.29.a:244.30.a: 245.31.a:  
 246.32.a:247.34.a:251.37.a.b:252.38.a.b: 253.40.  
 a.e:254.41.a:255.42.a:262.48.a:269.56.a: 271.58.  
 272.59.c:439.1.a:488.30.a:520.65.a:545.91.a:23

Humeurs glieuses.20.16.a:143.34.f:144.3.a:120  
 9.f:154.41.a:245.71.b:446.73.a:451.79.a: 466.  
 7.b:546.92.c:

coupper Humeurs grosses.130.24.a: 143.34. d:  
 175.63.b:210.95.c:213.2.a:217.6. a:229.24.a:445.  
 71.b:446.73.a:447.74.b:520.65.a: (res:315.8.f:

garder que les Humeurs ne tōbent es joints  
 Humeurs melancholiques.163.54.c: 167.58.b:  
 Humeurs vieieuses.21.17.b:205.91. (49.f:83.a:  
 1237.26.h:238.26.i:265.91.a:337.34.a:

Hydropisie.52.h:20.16.a:26.22.a:30.25.b:60.  
 91.a:73.64.a:107.97.b:143.34.c:164.55.a:165.56.a:  
 167.58.c:170.60.a:184.71.i:185.71.p: 190.76.b:  
 191.78.b:205.91.e:210.95.k:215.5.c:234.31.a: 234.  
 24.a:238.26.g:240.28.c:243.29.a:247.33.a: 249.  
 36.a:251.37.a.b:252.40.a.e:257.44.c:258.45.c:261  
 47.a:268.54.a:304.91.a:313.41.a:335.55.d:355.58  
 b:415.36.h:417.58.h:424.48.f:430.55.k: 445.71.  
 g:449.76.c:514.51.79.b:465.6.a: 483.24.g: 484.  
 26.c:504.46.i:512.67.0.h:51:

**I**Autulle.4.2.b:22.18.a:25.20.c:16.22.c:28.23.b  
 31.27.c:56.49.b:61.53.a:64.55.g:64.56.c: 71.61.  
 d:97.84.g:101.88.b:107.97.b:141.32.b:142.33.a:  
 b:149.41.b:164.55.a:168.58.h:170.60.a: 175.63.c:  
 181.72.a:187.73.b:198.84.b:200.95.a:220.9.g:224  
 10.d:223.n.e:238.26.m:239.27.c:240.28.c:265.50.  
 2269.56.a:270.57.a:271.58.b:278.67.b:279.68.  
 b:302.89.b:370.74.a:374.1.b:384.9.c: 388.12.c:  
 389.13.a:398.21.a:417.58.c:429.54.b:429.64.b:  
 451.79.b:459.1.a:472.13.b: 483.24.g: 520.65.b:  
 546.92.g:

# Des Vertus.

faulxneur du corps qui demeure apres la faulx-  
nulle. 134. 17. b. 137. 29. c. 139. 30. g. 141. 31. b. 142. 33.  
1213. 11. c.

Incube. 22. 7. 16. e.

Inflammation. 8. 5. b. 15. 12. a. 16. 23. b. 30. 25. a. 171.  
61. f. 79. 68. e. 197. 75. e. 110. 101. d. 112. 1. f. 152. 45. d.  
193. 80. g. 101. 88. a. 106. 92. h. 130. 8. 99. b. 137. 71. i.  
369. 73. b. 374. 1. c. 388. 12. g. 395. 18. d. 398. 20. h. 477  
19. b. 478. 20. b. 518. 62. d. 519. 63. h. 527. 71. d. 532. 75

Inflamations interieures. 112. 2. b. 470. 11. a. d. (b  
chaleur des Intestins. 398. 20. a. 405. 28. a.

douleur des Intestins. 79. 68. a. 175. 63. c. 185. 71.

1315. 8. c. 338. 36. a.

enfleure des Intest. 185. 71. f. 191. 78. a. 484. 26. b.

lubricité des Intestins. 350. 51. a.

ventosités des Intestins. 185. 71. f. 194. 81. a. 246.

32. b. c. 135. 8. c. 484. 26. b.

vicerés des Intestins. 398. 20. g.

douleur de loins cures. 11. 8. f. 181. 69. c. 85. 73. f.

150. 42. b. 185. 71. p. 226. 15. b. 247. 34. a. 249. 35. a.

449. 76. b.

douleur, chaude de loins cures. 79. 68. c.

Iufquisme. 415. 36. i.

**L**ait caillé aux Mamelles. 173. 62. g. 1420. 41. e.

cailler le Lait. 26. 22. b. 504. 4. 6. y.

faire avoir abondance de Lait. 38. 32. a. b. 4437

c. 190. 77. a. 191. 78. c. 196. 83. a. 295. 18. c. 398. 20. a.

401. 24. g. 415. 36. k. 517. 61. c.

dissoudre Lait grumelé. 334. 19. k. 504. 4. 6. y.

dôner au Lait vertu de lacher le vêtre. 26. 22. b.

asperité de la Langue. 173. 62. i.

Langue exulcerée. 502. 44. d.

inflammation de la Langue. 502. 44. d.

inflation de la Langue. 462. 4. g. 504. 4. 6. i.

mal de Langue dict Bruyne en flam. 101. 88. g.

Lafitude. 13. 9. d. 371. 76. c. 483. 24. d. 484. 26. e. i.

Lendes. cherche Poids.

Lepre. 175. 63. e. 235. 2. 4. b. 241. 29. d. 256. 43. c.

Lecharge. 185. 71. q. 209. 94. d. 415. 36. h. 430. 55. k.

Leures croüées. 49. 33. c.

inflammation de la Luette. 99. 85. f.

inflation de la Luette. 462. 4. a. 473. 14. a.

Luette relachée. 99. 85. f. 473. 14. b.

tumeurs de la Luette. 213. 2. b. 430. 55. d.

vicerés de la Luette. 473. 14. a.

**M**al caduc. cherche Epilepsie

Maladies froides & enuieillies. 166. 57. d.

209. 94. f. 234. 24. a. 255. 41. b. 430. 55. k. 434. 59. f.

Maladies froides interieures. 224. 22. b.

haut Mal. cherche Epilepsie.

Mal s. Main. 198. 84. h. 1263. 48. b.

affermir & endurcir les Mamelles. 107. 96. b.

amoindrir les Mamelles. 173. 62. g. 306. 92. d.

310. 1. i.

douleur de Mamelles. 221. 10. a. 321. 2. c.

dureffes de Mamelles. 22. 18. d. 310. 1. i. 329. 24. c.

enfleure des Mamelles. 455. 81. k. 521. 55. c.

inflammation de Mamelles. 496. 39. g.

emplir les Mamelles de lait. 7. 4. c. 138. 32. a.

190. 76. a. 235. 20. a. 389. 13. b.

fecher le Lait des Mamelles. 56. 49. a. 73. 62.

g. 184. 71. g. 215. f. 334. 30. k.

que les Mamelles demeurent petites. 308. 93. a.

vicerés de Mamelles. 37. 31. d. 148. 40. b. 214. 4.

b. 32. 18. c. 402. 24. k. 420. 41. e.

abîces de Matrice. 300. 87. f.

dureffes de Matrice. 15. n. d. 143. 34. h. 247. 39. b.

148. 39. i. 164. 54. m. 258. 45. d. 337. 34. e. 448. 74. e.

461. 3. e. 484. 26. g. 544. 90. c.

enfleure de Matrice. 15. n. d. 173. 31. a. 164. 54. m.

484. 26. b.

fermer la Matrice. 177. 65. b.

inflammation de Matrice. 342. 39. a. 398. 20. g.

mal de Matrice. 10. 7. b. 62. 21. b. 128. 23. d. 55. 48. f.

84. 71. d. 97. 84. d. 1205. 91. b. 1211. 10. a. 216. 15. b. 300

87. e. 306. 92. a. 337. 34. e. 1473. 14. c.

mondifier la Matrice. 192. 79. b. 210. 95. a. 212. a.

b. 215. f. d. 217. 16. a. 219. 46. g.

obstruâio de Matrice. 2. 1. a. 84. 73. a. 1433. 4. h.

164. 54. m. 182. 69. d. 187. 74. a. 213. 4. 23. c. 258. 45. d.

337. 34. d. 349. 50. a. 370. 74. a. 448. 74. e. 484. 26. g.

playes de la Matrice. 55. 4. 8. f. 300. 87. f.

relaxation de Matrice. 139. 30. d. 480. 22. a. 496.

39. f. 124. 68. i.

refroidemens de Matrice. 234. 23. c.

feirrhés de la Matrice. 13. 3. a.

uffocation ou strangulation de Matrice. 15. n.

c. 16. 13. a. 239. 30. e. 183. 70. d. 190. 77. c. 199. 85. b.

209. 94. d. 217. 16. e. 234. 23. c. 343. 41. a. 376. 4. a.

403. 25. e. 1417. 38. d. 1430. 55. g. 473. 14. c.

tumeurs de Matrice. 401. 24. e.

ventosités de Matrice. 37. 31. a. 164. 54. m. 194. 81.

214. 6. 32. b. c. 184. 26. b.

vicerés de Matrice. 214. 4. b. 300. 87. f. 373. 4. d.

398. 20. g. 401. 24. f. 403. 25. e. 484. 26. g.

Melancholie. 9. 6. c. 15. n. a. 161. 51. c. 170. 60. a.

183. 70. a. 237. 26. a. 256. 43. c.

toute sorte de mal des Membres. 71. 61. g.

Membres engourdis & enroydis. 484. 26. e.

douleur de Mêmes hôteux. 190. 76. h. 249. 1. e.

inflammation des Membres hôteux. 75. 65. f.

389. 13. c.

vicerés des Mêmes hôteux. 37. 31. d. 141. 34. b. 75.

65. f. 101. 88. e. 190. 77. e. 212. 1. e. 234. 23. d. 239. 27. d.

conforter la Memoire. 31. a. 7. b. 233. 26. b. 186. 72.

b. 187. 74. d. 367. 71. a.

Meurtriffures. cherche Contusions.

Morfondure & Refroidemens. 2. 1. h. 32. 18. b.

143. 34. b. 185. 71. f. 194. 81. b. 199. 85. d. 230. 19. d.

421. 45. a.

Morenes, Morrués, cherche Hemorrhoides.

Morfure de beste sauvage. 319. 24. d.

Morfure de toute sorte de beste sauvage & en

ragée. 214. 22. a.

- Morsure de bestes venimeuses. 4. 2. f. : 73. b. :  
 11. 8. b. 12. 8. c. 112. 2. 18. e. 12. 6. 21. c. 128. 23. e. : 43. 36. a. :  
 45. 3. b. 168. 60. a. 175. 65. b. 184. 73. b. : 85. 7. 4. b. : 97. 8. 4. f. 117. 7. c. : 137. 29. d. 143. 34. b. 149. 42. a. : 163. 33. c. : 164. 5. 4. c. 164. 55. b. 167. 58. a. : 175. 65. a. : 178. 65. f. :  
 182. 69. d. 185. 70. a. 184. 71. b. 189. 75. b. d. 190. 76. c. 191. 78. f. 193. 79. c. 194. 81. b. : 196. 83. c. 198. 84. a. :  
 201. 87. c. 202. 88. d. 207. 91. a. 210. 95. b. 212. 2. a. 214. 4. a. 215. 5. b. 212. 10. a. : 222. m. b. : 226. 14. e. 233. 22. a. :  
 235. 25. a. 239. 46. c. 247. 9. 68. c. d. : 297. 83. e. : 310. 1. e. :  
 343. 4. 1. b. 353. 56. a. 357. 59. e. g. : 361. 63. e. : 367. 71. a. :  
 370. 74. d. 370. 75. a. 373. 8. 149. 39. c. : 424. 48. a. :  
 427. 53. b. 429. 54. d. 432. 57. c. : 434. 59. c. : 443. 70. b. :  
 445. 71. e. : 447. 74. c. : 452. 79. g. 453. 80. c. d. 468. 9. b. 474. 15. f. 475. 16. b. 484. 2. 6. f. 494. 36. f. : 516. 39. c. : 523. 68. e. :
- Morsure de chiev. 403. 25. g. : 405. 28. c. : 449. 76. c.
- Morsure de chien enragé. 173. 62. h. : 182. 69. g. :  
 184. 71. d. 190. 76. f. : 208. 93. d. : 210. 95. n. : 214. 4. a. :  
 279. 68. d. 309. 1. a. 329. 2. 4. d. : 445. 71. e. : 447. 73. b. :  
 499. 41. g. : 504. 46. x. : 513. 56. d.
- Morsure de Grenouille. 357. 59. g.
- Morsure d'home. 329. 2. 4. d. : 403. 25. g.
- Morsure & piqure de Phalanges. 87. 75. a. 201. 87. c. 396. 19. b. 427. 53. b. 481. 23. c. 547. 93. b. :
- Morsure de serpens. 73. b. : 74. a. : 11. 8. c. 122. 18. e. :  
 23. 19. a. 84. 73. b. 97. 84. f. 137. 29. d. 146. 38. a. : 147. 39. g. 148. 39. k. 163. 33. c. 166. 57. a. 182. 69. d. 184. 71. b. :  
 189. 75. b. 198. 84. a. 210. 95. 91. d. : 207. 92. a. 210. 8. 93. d. :  
 210. 95. a. 215. 5. b. 217. 64. a. 247. 48. c. 261. 63. e. :  
 367. 71. a. : 382. 6. b. 391. 16. b. : 419. 39. c. 430. 35. m. :  
 434. 39. c. : 452. 79. g. 453. 81. d. 468. 9. b. 474. 15. 6. b. :  
 484. 2. 6. f. 503. 45. b. 516. 39. c. 526. 70. d. : 531. 74. a. :  
 536. 82. c. 544. 90. d.
- Morsure de viperes. 73. b. : 22. 18. e. : 208. 93. d. :  
 526. 70. d. 56. 82. c. 544. 90. d. :
- assembler Mouches à miel en vn, & en faire venir d'autres. 183. 70. c. :
- de chasser Mouches & Moucheron. 5. 2. i. :
- piques de Mouches à miel, Guepse, frelons &c. 173. 62. 01184. 71. d. 1402. 14. h. 403. 15. g. k. :
- tuer Mouches & Moucheron. 58. 90. d. 96. 83.
- Mules aux talons. 30. 25. a. 223. 11. m. (d. 235. 29. g. :  
 1129. 24. c. 577. 5. g. : 411. 33. c. 452. 79. h. 454. 80. k. :  
 e. j. viceces des Narilles. 264. 49. e. :
- secher la Nature. 56. 49. a. 135. 28. c. d. : 184. 71. g. :
- amollir Nerfs. 14. 8. 39. i. :
- conforter les Nerfs. 522. 67. b. : (39. 4. 17. c. :
- consolider Nerfs couppés. 147. 39. c. : 150. 42. b. :
- douleur de Nerfs. 13. 9. b. 14. 10. b. 255. 41. b. : 315. 9. a. 512. 67. b. :
- ensueur de Nerfs. 14. 10. b. :
- Nerfs retirés. 2. 1. a. 13. 9. b. 56. 49. d. 163. 33. b. : 163. 54. c. 199. 94. f. 212. 10. e. : 453. 80. b. 481. 24. d. : 519. :
- tremblement de Nerfs. 403. 25. a. d. : (63. k. :
- vices des Nerfs. 13. 9. b. 210. 9. h. : (377. 5. b. :
- conduits du Nez estouppés. 25. 20. g. : 43. 36. b. :
- consumer Polype ou chair vicieuse croissant au Nez. 117. 6. f. 127. 62. c. : 99. 85. d. :
- punaise du Nez. 34. 6. 4. 6. a. :
- faire saigner par le Nez. 99. 85. 14. 60. 2. b. :
- estancher le sang coulant par le Nez. 2. 6. 11. d. :  
 58. 90. c. 75. 65. e. : 77. 66. d. 99. 85. 14. 60. 2. b. : 1194. 81. c. : 283. 61. a. : 371. 76. b. : 448. 74. f. : (49. i. :
- Nôbril par trop efflué. 66. d. 104. 93. c. 109. :
- Obstruptions. 20. 16. a. 30. 24. a. 113. 7. 19. 14. 45. 71. c. : 483. 24. g. : 499. 41. b. :
- donner bonne Odeur ou Senteur. 171. 61. d. :
- Odeur ou sentment de gâsté. 165. 16. f. 196. 83. f. :
- Odemes, cherche Tumeurs froides.
- mauuaix Ongles. 25. 20. e. : 55. 4. 8. c. : 64. 55. c. : 182. 69. f. : 186. 72. a. 24. 81. 23. j. :
- faire reuenir Ongles tombés. 25. 20. e. :
- Opium. 167. 58. a. :
- recourir de chair Os desnués. 143. 34. j. :
- oster les esquilles des Os rûpus. 117. 7. d. : 143. 34. m. 145. 37. b. : 209. 94. 1122. 2. d. 1219. 4. 6. k. : 432. 57. d. :
- engresser Ouailles. 517. 61. a. b. :
- faire auoir beaucoup de lait aux Ouailles. 517. dure Ouye. cherche Sourdeille. (61. a. :
- P**aralytie. 13. 26. a. 187. 73. b. c. d. 2109. 94. f. 230. 19. d. : 476. 18. b. :
- Parotides. 35. 48. a. : 71. 61. k. : 79. 68. c. 199. 85. g. : 321. 88. c. 327. 22. e. 384. 9. 1403. 25. d. : 439. 64. c. : 504. :
- Parties hôteuses. cherc. Mèbres hôteux. (46. l. :
- excoriation des Parties hôteuses. 339. 85. b. 545. 91. b. :
- exulceratiõ des Parties interieures. 4. 87. 28. e. :
- inflammation des Parties interieures. 111. 1. a. :
- Pasmoyson. 264. 54. h. 70. 60. d. : (127. 19. a. :
- asperité & rudesse des Paupieres. 430. 55. i. :
- demageison & grattelle des Paupieres. 491. 33. d. :
- que le poil des Paupieres ne reuienne plus. 19. :
- faire tomber le poil reueriffé des Pau- (15. a. :
- piers & Pamender. 392. 16. e. :
- esleuer la Peau pleine de cloches & la trouer.
- Pelade. 2. 2. d. : (87. 71. a. : 186. 72. a. :
- Pedie des poules. 445. 71. q. :
- Peste. 16. 13. a. : 64. 56. a. : 84. 72. a. 117. 7. a. c. : 121. m. d. 133. 26. d. : 184. 71. b. 202. 88. c. : 208. 93. a. b. 210. 95. f. : 225. 3. b. : 335. 32. d. : 365. 68. e. : 367. 71. f. : 428. 53. d. :
- preseruant contre la Peste. 202. 88. (493. 56. a. :  
 e. 1418. 53. d. 493. 36. a. :
- preseruer le bestail de Peste. 238. 26. o. :
- meuir Phlegmes. 130. 24. b. : 216. 64. a. b. 217. 68. a. 342. 39. f. 415. 36. g. 547. 93. d. :
- purger Phlegmes. 15. 11. a. 16. 22. a. 147. 40. a. : 60. 91. 210. 24. b. 150. 43. a. 160. 49. b. 161. 51. b. 209. 94. 212. 11. a. 213. 7. a. 215. 9. 27. a. 240. 28. a. 243. 29. a. :  
 244. 30. a. : 245. 31. a. 246. 32. a. 247. 33. a. : 249. 35. a. :  
 249. 36. a. 251. 37. a. b. 252. 38. a. b. 253. 39. a. : 254. 40. a. :  
 254. 41. a. 255. 42. a. 256. 43. a. : 257. 44. a. b. 258. 45. a. 259. 46. a. 262. 48. a. 274. 62. a. 279. 68. a. b. : 297. 83. a. 367. 71. d. 415. 36. e. 418. 30. a. : 528. 72. d. 536. 82. f. :

# Des Verrus.

54.6.92.c:  
 faire cracher les Phlegmes.25.20. fi: 162.51. fi 182  
 69. b. c. 200. 86. c. 202. 88. fi. 205. 91. fi. 212. 6. 14. b. 279  
 68. 23. 42. 39. fi. 415. 36. g. 438. 64. a. 447. 74. d. 486  
 28. a. 504. 46. fi. 542. 87. d. 547. 93. d:  
 Phlegmes. 15. 11. e. 39. 53. a. 75. 65. g. 79. 68. c. 81.  
 69. c. 97. 84. fi. 103. 91. c. 105. 94. b. 107. 9. 6. a. 109. 99  
 c. 110. 101. d. 112. 1. fi. 70. 60. b. 243. 29. d. 257. 44. d:  
 283. 71. g. 293. 80. d. 297. 83. d. 306. 92. b. 310. 1. h. 31  
 315. 8. a. 338. 26. c. 342. 29. a. 353. 55. b. 369. 73. a. 374. 1.  
 c. 380. 6. m. 382. 8. b. 388. 12. c. 389. 13. d. 398. 20. h. 1  
 470. 32. e. 1424. 48. b. 1480. 22. b. 1492. 35. d: 500. 42. c  
 504. 46. fi. 533. 68. fi. 531. 74. d. 532. 75. b. 532. 76. a:  
 Phtisique. 35. 48. g. 71. 61. a. 356. 46. a. 182. 69. a:  
 205. 91. a. 183. 61. e. 363. 66. a. 367. 71. e. 483. 24. b:  
 542. 87. d. 546. 92. f:  
 cloches eleuees des Pieds. 447. 73. l:  
 Pieds enflés. 96. 73. b: Pieds engelés. 223. 21. n:  
 Pierre. 12. 8. h. 15. a. b. 30. 25. b. 32. 2. 8. a. 37. 31. a. 39.  
 33. e. 50. 41. a. 72. 62. a. 108. 58. b. 117. 7. b. 137. 29. a. 1  
 140. 31. a. 143. 34. c. 163. 53. a. 163. 54. a. 173. 62. n. 177.  
 65. a. 190. 76. b. 191. 78. a. 201. 87. a. 202. 88. a. 203.  
 89. a. 205. 90. a. 205. 91. a. 210. 95. b. 132. 21. a. 234. 23. a  
 278. 67. b. 279. 68. b. 302. 89. b. 317. 22. d. 342. 39. fi  
 350. 51. b. 357. 59. d. 384. 9. e. 389. 13. a. 401. 24. c. 403.  
 25. a. 415. 36. fi. 420. 41. b. 442. 44. a. 442. 45. b. 426.  
 51. b. 439. 54. b. 435. 60. a. 448. 74. g. 459. 1. 1462. 4  
 1465. 6. b. e. 468. 10. a. 472. 3. a. 477. 29. d. 483. 24  
 1488. 29. b. 489. 31. b. 499. 41. d. 501. 41. b. 506. 47  
 c. 508. 50. d. 510. 65. c. 542. 87. e. 545. 91. a. 546. 92. b  
 Pisse chaude. 1c. 7. a. 128. 23. b. 129. 79. a. 199. 85. b:  
 278. 67. b. 327. 71. a:  
 Pisser goutte à goutte, cherche Strangurie.  
 Playes. 63. a. 85. a. b. 10. 7. c. 122. 18. c. 128. 23. e. 37.  
 31. b. 47. 39. b. c. 49. 42. c. 91. 43. d. 54. 47. a. 58. 50. c.  
 64. 55. fi. 64. 56. c. 67. 59. a. b. 77. 66. c. 178. 67. 2. 100  
 87. a. 101. 88. a. d. fi. 102. 89. a. 103. 90. a. b. 105. 91. a:  
 104. 92. a. 104. 93. a. 105. 94. c. 106. 95. a. 107. 97. a. 1  
 108. 89. a. 109. 99. d. 117. 7. d. 1165. 55. d. 1189. 75. d. 1205  
 91. fi. 123. 11. 1225. 13. c. 1239. 27. d. 1247. 33. c. 1264. 49.  
 a. 1266. 51. d. 1270. 57. b. 274. 61. a. 283. 71. d. 300. 87.  
 d. 310. 1. n. 371. 77. a. 372. 78. a. 380. 6. k. 394. 17. c:  
 424. 48. b. 436. 61. b. 465. 6. g. 485. 27. d. 503. 45. c:  
 - Playes difficiles à curer. 45: 38. d: (546. 92. a:  
 66. 58. c. 124. 12. d. 465. 6. f:  
 - preferuer Playes d'inflammation & aposteme.  
 77. 66. e. 92. 79. g. a. 101. 87. a. 105. 94. b. c. 107. 96.  
 a. 109. 99. b. 110. 100. c. 127. 39. d. 133. 26. e. 277.  
 66. b. 280. 70. b. 398. 20. k. 411. 68. a. 485. 27. d:  
 492. 35. d:  
 Playes interieures. 47. 39. b. 64. 56. c. 67. 59. a:  
 101. 88. a. 102. 89. a. 103. 90. a. 105. 91. a. 106. 95. a. 1  
 107. 97. a. 109. 99. a. 110. 101. a. 1178. 66. a. 205. 91. fi  
 212. 1. c. 122. 10. e. 300. 87. b. 372. 78. a. 404. 26. a:  
 Playes legeres. 461. 3. b:  
 Playes nouvelles. 21. 7. b. 71. 61. fi. 75. 65. g. 77.  
 66. e. 84. 75. c. 97. 84. e. 109. 99. b. 110. 101. b. 113. 26

e. 148. 39. h. 181. 70. d. 1217. 6. g. 220. 9. c. 1255. 42. b:  
 339. 37. c. 345. 44. b. 350. 51. c. 381. 7. b. 386. a. b. 403.  
 25. d. 451. 78. b. 463. 6. fi. 498. 40. e. 500. 42. c. d. 509  
 51. b. 523. 68. b. 528. 72. a. 529. 72. fi. 539. 85. g. 541. 87.  
 c. 543. 89. a. 545. 91. c:  
 Playes & parties dures & nerueuses. 52. 45. a:  
 Playes vieilles. 21. 17. b. 145. 38. d. 54. 47. a. 71. 61. fi  
 84. 73. e. 197. 84. c. 197. 29. g. 255. 42. b:  
 Pleuretie. 95. 82. a. b. 199. 85. a. 112. 1. b. 167. 58. d. 169  
 Podagre. cherche Goutte (56. a. 120. 65. b:  
 Poitrine. cherche Thorax,  
 meurir grosses humeurs dond la Poitrine, &  
 Poulmons. font chargés. 143. 34. d. 171. 61. a. 200.  
 86. c. 105. 91. a. 415. 36. g. 420. 55. b. 434. 59. d. 438  
 64. a. 451. 79. d. 483. 24. b:  
 faire recroistre le Poil. 247. 34. b. 279. 68. d. 415.  
 36. a. 445. 71. l:  
 faire tóber le Poil. 243. 29. b. 264. 49. k. 276. 63. a  
 faire venir le Poil aux lieux brulés & eschaudés  
 Poison. 64. 55. d. 64. 56. a. 84. 73. b. (147. 39. fi:  
 87. 75. g. 117. 7. c. 113. 26. d. 163. 53. c. 201. 87. e. 202.  
 88. d. 205. 91. d. 208. 95. a. b. 210. 95. d. 212. 1. a. 212. 11  
 b. 214. 11. a. 215. 5. b. b. 234. 24. a. 269. 55. a. 289. 76. a. 1  
 335. 31. a. 355. 58. c. 367. 71. g. 401. 24. d. 439. 64. b:  
 443. 70. b. 445. 71. d. 428. 24. a. 494. 36. fi. 523. 68.  
 preferuatiu contre Poison. 134. (e. 546. 92. k:  
 27. a. 184. 71. e. 1208. 93. c. 1269. 55. a. b:  
 faire mourir le Poison. 243. 29. e:  
 Polype. cherc. Nez. Porreaux. cherc. Verrues,  
 Portée non naturelle. cherche Secondine.  
 Poids. 68. 60. b. 252. 39. b. e. 264. 49. k. 337. 34. fi  
 377. 5. e. 433. 60. c. 445. 71. h. 474. 15. e. 538. 83. e:  
 pour engraisser Poules. 319. 14. c. 517. 61. b:  
 blessures & playes des Poulmons. 61. 52. a. 64.  
 56. c. 106. 95. d. 110. 101. c. 1283. 71. e. (1123. 71. b:  
 inflammation des Poulmons. 21. 17. c. 199. 85. a. 112. 1  
 mondifier les Poulmons. 83. 71. a. 112. 2. b. 163.  
 54. b. 486. 28. a. 547. 93. d:  
 mondifier les Poulmons de phlegmes & ma-  
 tiere purulente. 205. 91. a:  
 obstruction des Poulmons. 64. 56. c. 167. 58. d:  
 184. 71. h. 187. 74. a. 190. 76. e. 419. 39. a. 455. 81. fi  
 486. 28. a. 498. 40. f. 499. 41. b. 515. 59. b:  
 pafion des Poulmons. 64. 55. d. 192. 79. fi. 152. 45.  
 a. 187. 74. b. 283. 71. b. e. 1443. 70. d. 1487. 28. fi:  
 rudesse des Poulmons. 307. 49. a. 308. 50. e:  
 vlceres des Poulmons. 21. 17. c. 182. 69. a. 283. 71:  
 Pulces. 28. 23. g. 79. 68. fi. 164. 54. n. (1499. 41. b  
 Punaises. 145. 37. d. 1273. 60. d:  
 Pustules de la bouche. 229. 17. c. 139. 27. k. 480.  
 22. b. 483. 25. b. 1724. 68. h. 301. 75. a:  
 exciter Pustules. 247. 34.  
 Pustules inflammées. 332. 76. a:  
 Pustules saigneuses. 377. 5. fi:  
**R**Age. cherche Forcenerie. (59. b. 514. 69. d:  
 diminuer la Ratelle. 209. 94. a. 215. 36. p. 434.  
 durelle Ratelle. 20. 16. c. 135. 45. d. 199. 85. h. 133. 3. fi

# Table

143.37.a.1210.95.b: 121.a.c.1220.9.g.123.11.k.233.22.  
 c: 126.32.b, c.1259.4.6.d.1262.4.8.c.1264.4.9.c.2265.  
 9.a.1273.60.b.1274.62.a.1277.65.a.1277.66.a.1278.  
 67.a.1277.34.c: 1370.4.1278.4.g.1415.32.l, p.1430.  
 55.k: 1434.59.e: 1474.15.a, b: 1476.18.a: 1483.24.g:  
 1484.26.c.1505.45.b: 1524.69.d.1546.92.h:  
 enfleure de Ratelle. 85.74.a.1189.75.e.1260.4.6.  
 1277.66.a.1337.34.c.1370.74.e:  
 inflammation de Ratelle. 101.88.b: 1455.81.d:  
 mal de Ratelle. 135.28.b.1423.34.b.1564.54.l: 164  
 55.c.1168.59.a.1182.69.a.1189.75.e: 1221.10.a, b.133.  
 22.c.1277.65.a.1279.68.b.1377.5.i: 1400.13.a: 518.  
 62.c:  
 obstructions de Ratelle. 1.a.1190.16.c.147.39.a:  
 52.45.d.61.53.a: 84.73.a.85.74.a.1130.24.a.145.37.  
 1182.69.a.1185.71.1187.74.a.1205.91.e: 121.11.k:  
 123.12.c.1236.43.c.1159.4.6.d.1260.4.6.1262.61.4.8.c:  
 1264.49.c.1265.50.a.1265.51.a.1271.58.a.1272.59.a, b:  
 1275.60.b.1274.62.a.1277.65.a.1277.66.a.1278.67.  
 1279.63.b.1277.22.d.1319.23.b.1355.31.a, b.1370.74.  
 1377.5.i.1399.21.b.1400.23.b, c.1417.35.c: 1420.41.  
 b, c.144.4.8.c.1465.6.a.1474.15.a, b: 1476.18.a, h:  
 1483.24.g.1484.26.c.1499.4.7.1502.44.f.1513.57.b:  
 1516.70.a.1542.87.e.1546.91.h.1557.93.c:  
 tumeur de Ratelle. 185.71.f.1189.75.e:  
 Rats & souris. 52.k: 125.24.g:  
 Refroidemens. cherche Morfondure.  
 douleur de Reins. 7.4.b.110.7.2.1296.82.a: 302.  
 89.b.1355.55.d.1400.23.b.1415.36.h.1417.38.c, e.1419.  
 39.a: 1212.45.b.1487.28.f.1507.49.b:  
 difficulté de Respirer. 1.a.1185.11.a: 77.66.c: 114  
 4.1132.45.b.171.61.a.184.71.1189.85.a.1210.95.c  
 115.5.a.1217.6.a.1220.9.g.123.11.k.1236.43.c.1159.4.6.  
 1260.4.6.1262.61.4.8.c.1264.49.c.1265.50.a.1265.51.a.  
 1271.58.a.1272.59.a, b.1275.60.b.1274.62.a.1277.65.a.  
 1277.66.a.1278.67.1279.63.b.1277.22.d.1319.23.b.1355.31.a, b.  
 1370.74.1377.5.i.1399.21.b.1400.23.b, c.1417.35.c: 1420.41.  
 b, c.144.4.8.c.1465.6.a.1474.15.a, b: 1476.18.a, h:  
 1483.24.g.1484.26.c.1499.4.7.1502.44.f.1513.57.b:  
 1516.70.a.1542.87.e.1546.91.h.1557.93.c:  
 Refuerie. cherche Frenchie. (546.92.e):  
 Rides. 143.34.a.1259.4.6:  
 Rompreus. 64.55.f: 67.59.a.177.66.b, c: 84.73.  
 b.91.79.b.1103.91.a.1104.93.b.1106.95.c.1110.101.a  
 1166.57.a.1175.63.c.1110.95.m: 1121.c.1220.9.g.123.  
 11.k.1236.43.c.1237.14.a.1239.17.f.1259.4.6.e.1270.57  
 b.1274.62.a.1277.65.a.1277.66.a.1278.67.1279.63.b.1277.  
 22.d.1319.23.b.1355.31.a, b.1370.74.1377.5.i.1399.21.b.  
 1400.23.b, c.1417.35.c: 1420.41.b, c.144.4.8.c.1465.6.a.  
 1474.15.a, b.1476.18.a, h.1483.24.g.1484.26.c.1499.4.7.  
 1502.44.f.1513.57.b.1516.70.a.1542.87.e.1546.91.h.1557.93.c:  
 1558.72.c.1570.75.c.1571.76.b: 533.78. b: 536.82.c:  
 544.90.d.547.93.e:  
 douleur & mal de Rongnons. 21.17.a: 41.36.a:  
 190.7.6.b.1200.86.b: 103.89.a.1209.94.b.1212.10.a:  
 1342.59.f.1377.59.d.1398.20.b.1400.24.b: 1422.44.b:  
 1487.28.f.1503.46.d:  
 inflammatio des Rongnons. 506.48.c.1507.49.b  
 modifier les Rongnons. 205.89.a: 210.95.a:  
 545.91.a.547.93.c

obstructions de Rongnons. 1.a.121.71.a: 61.53.  
 b: 71.61.d.84.73.a.190.76.e.1202.88.a: 1205.91.e:  
 126.15.a.1277.16.b.1278.15.a.1279.49.a.1302.89.b:  
 1327.22.d.1399.21.b.1400.23.b, c: 1402.41.b  
 1415.36.h.1417.38.c: 1420.41.b, c.1424.48.c.1427.52.  
 b.1429.54.b.1435.60.a.1435.81.f.1465.6.a, e: 1499.41  
 Places des Rongnons. 109.99.a: (1154.6.92.g:  
 vicees des Rongnons. 71.61.d: 77.66.b: 106.  
 65.b: 109.99.a.1486.28.d.1507.49.b:  
 Rougeoles. 21.17.b.1254.40.h.1337.34.g: 1465.6.  
 h: 1504.46.e, f:  
 Ruelle. cherche Asperité.  
 Sang caillé. 21.18.f.66.58.b.184.72.b: 101.88.a:  
 102.89.a.1260.49.e.1161.51.a.1265.56.c: 175.63.c:  
 178.66.a.1185.71.1189.79.d: 1210.95.m: 1244.12.c:  
 139.27.f.1427.34.c.1259.4.6.e.1262.61.47.b: 1270.57.  
 b.1370.74.c.1440.67.a.1504.46.g:  
 Sang coulant par le Nez. cherche Nez.  
 cracher Sang. 12.8.e.126.11.a.61.54.a: 64.56.b:  
 71.61.b: 75.65.a, d.105.94.a.1210.6.95.b: 110.101.a:  
 144.35.b.163.53.d.1177.61.d: 182.69.a: 105.96.f:  
 120.9.a.1221.10.a.1239.17.f.1279.68.c: 283.71.c.1310  
 1.f.03.10.2.a.1361.63.a.1372.79.a.1398.20.c.1435.81.a  
 1474.15.f.1481.23.a.1491.33.a: 1496.39.a, k: 1499.41.c:  
 152.55.b: 152.77.a: 523.68.a.139.85.a: 546.92.f.1547  
 95.a: 548.94.a, b:  
 flux de Sang. 17.14.b.126.12.a: 34.19.a: 58.50.a:  
 62.54.a: 64.55.b.164.56.b.166.58.a.171.61.b, c.175.  
 65.a, d: 177.66.a: 39.77.a.1305.94.a.1109.99.d.1104.  
 82.b.1222.10.e.1239.17.g.1279.68.c.1306.92.c: 336.  
 33.c.134.6.45.b.1355.37.b.1365.68.f.1398.20.c.1401.25  
 h: 1448.74.h.1456.82.b.1459.1.f.1464.61.3.2.c: 1462.  
 4.c.1474.35.h.1477.19.a.1479.21.b.1481.13.a.1485  
 27.a: 1495.38.b.1496.39.a, b.1506.47.e: 522.55.d:  
 519.63.d.522.67.a.1523.68.a, d: 524.68.g: 539.85.  
 a: 542.87.a.548.94.a, b:  
 arresler flux de Sang de playes fresches. 37.31.c:  
 58.40.c.100.87.a.105.94.c.1100.100.c.1135.28.g: 177  
 65.d.1239.27.d.1280.70.b.1283.71.d.1336.33.d: 1345.  
 44.b.1350.1.c.1370.75.c.1371.76.b.1495.38.c.1509.51  
 b: 1521.68.b.1539.85.g:  
 inflammation de Sang. 280.70.a: 1470.11.d.1478  
 20.a: 1495.38.a:  
 contre piffier Sang. 45.38.b: 62.54.a.164.56.b.171  
 61.b: 72.61.a: 75.65.a.105.94.a.1109.99.a: 144.35.  
 b.1283.71.c.1369.73.d.1481.23.a.1523.98.a: 548.94.a:  
 purger le Sang. 147.39.a: 148.40.a.1161.51.b: 172  
 59.a, b.1368.71.a:  
 vomir Sang. 163.53.d: 173.62.c: 177.65.d: 1222.  
 10.e.1481.23.a.152.67.a.154.6.92.f:  
 Sanglout. cherche Hoquet.  
 Sangfues. 445.71.e.143.79.g:  
 Seisigue. 21.18.f.66.58.b.184.72.b.182.69.a: 50.43.c:  
 64.55.b.195.82.a, b: 161.51.c: 162.51.1164.54. k:  
 184.71.1109.94.f.1115.51.c.1220.9.f.1221.10.a: 1226.  
 14.e.1233.21.b.1234.24.a.1237.26.a: 1240.18. b: 1249.  
 35.a: 1265.50.b.1296.82.a.1320.15.e.1329.23.f.1365.68.



# Des Vertus.

a:403.25.a:424.48.d:429.54.c:430.55.k:434.59.  
 f:437.62. b:439.64. b:439.65. a:440.66. b: 466.  
 Scirrhe. 514. 49. a: (7. c:476. 18. b:527. 71. a:)  
 faire perdre la force au Scorpion. 289. 77. a:  
 piqures de Scorpions. 23. 19. a:47. 40. b: 49. 41.  
 a: 112. 1. g: 118. 8. a: 119. 9. a: 123. 15. a. b: 143. 34. b: 165.  
 56. d: 167. 58. a: 184. 71. d: 190. 76. c: 191. 78. f: 233. 22.  
 e: 234. 23. b: 230. 2. a: 366. 70. a: 384. 9. d: 389. 33. e: 395.  
 18. f: 396. 19. b: 432. 57. c: 445. 71. e: 453. 80. d: 481.  
 23. c: 482. 24. a: 504. 46. a: 1  
 Secondine & Arrierefais. 113. 3. d: 121. 2. b: 161. 51.  
 a: 163. 54. a: 179. 67. a: 282. 69. d: 1184. 71. f: 187. 73.  
 a: 189. 75. a: 101. 87. a: 202. 88. b: 209. 94. b: 210. 95. a:  
 g: 212. 1. b: 215. 5. d: 219. 4. f: 229. 56. d: 279. 68. b: 297.  
 83. b: 370. 74. f: 400. 23. b: 424. 48. c: 427. 33. a: 434.  
 59. b: 445. 71. p: 447. 73. h: 461. 3. e: 473. 14. d: 521.  
 66. a: 539. 84. a: 1  
 Sens naturel. 186. 72. b: 187. 74. d: 1  
 Senteur. cherche Odeur.  
 creueures du Siege. 113. 3. b: 190. 77. e: 219. 27. e: 339.  
 61. a: 403. 25. d: 484. 26. e: 491. 33. c: 544. 90. e: 1  
 douleur au Siege. 459. 1. e: 1  
 dureffes du Siege. 544. 90. c: 1  
 excrescences du Siege. 290. 77. e: 239. 27. e: 455.  
 fistules du Siege. 359. 61. a: (81. c: 1  
 inflammation du Siege. 64. 55. c: 110. 101. d: 198.  
 48. c: 334. 30. 3: 42. 39. 2. 389. 17. c: 1  
 phlegmons du Siege. 394. 13. b: 1  
 repouffer le siege tombant. 29. 24. b: 43. 36. f: 81.  
 69. c: 112. 1. f: 223. 11. f: 496. 39. f: 1  
 faire tomber le Siege. 43. 36. f: (455. 81. c: 1  
 tumeur au Siege. 182. 69. g: 190. 77. e: 198. 84. c: 1  
 vlceres du Siege. 219. 27. d: 401. 24. f: 451. 38. h: 1  
 estancher la Soif. 65. 57. d: 79. 68. a: 191. 78. b: 395.  
 18. b: 410. 32. b: 470. 11. d: 486. 28. c: 492. 35. a: 491.  
 36. c: 503. 46. b: 508. 50. b: (20. b: d: 1  
 Soif en fieures chaudes. 456. 82. f: 470. 11. c: 478  
 estancher la Soif au Hydropiques. 452. 79. f: 1  
 engarder de Songer. 191. 78. ii: (19. b: 1  
 Songes melancholiques. 209. 94. e: 217. 16. e: 232  
 Songes veneriques, quand on se pollue en son  
 geant. 135. 28. d: 398. 20. c: 1  
 Sorcellerie. cherche Enchantemens. (221. 10. a: 1  
 Soupirer continuellement. 15. 12. b. c: 210. 95. c: 1  
 Sourdeffe. 238. 26. e: 265. 50. c: 367. 71. a: 380. 6. f: 430.  
 55. h: 447. 73. f: 482. 24. c: 504. 46. 60. 938. 83. c: 1  
 Souris. cherche Rats.  
 Spasme. 56. 49. d: 97. 39. 3: 39. 30. c: 143. 14. b: 163.  
 53. b: 163. 54. c: 166. 57. a: 167. 58. c: 198. 84. f: 202. 88.  
 d: 205. 91. b: 209. 94. f: 212. 1. c: 215. 5. a: 217. 6. a: 220.  
 9. a. h: 221. 10. a: 221. 10. e: 225. 14. a: 247. 34. a: 300.  
 87. d: 357. 59. f: 361. 63. e: 362. 65. a: 363. 66. a: 365. 68.  
 b: 398. 20. n: 403. 25. a: 455. 80. b: 459. 63. k: 1  
 splenetiques. 5. 2. h: 380. 6. 3: 474. 35. a: 1  
 Strangurie. 10. 7. a: 14. 10. d: 28. 23. b: 32. 28. a: 61. 53.  
 b: 74. 65. h: 84. 73. a: 123. 13. a: 152. 45. f: 165. 56. a: 173.  
 62. n: 192. 79. a: 199. 85. b: 200. 86. a: 215. 5. a: 226. 15.

a: 233. 22. b: 278. 67. b: 353. 55. d: 422. 45. a: 429. 54. b: 435.  
 60. a: 436. 61. c: 473. 14. d: 596. 48. c: 597. 57. d: 598.  
 83. f: 599. 85. f: 545. 91. b: 1  
 Strumes. 194. 82. e: 320. 15. c: 329. 23. f: 334. 30. h: 347.  
 48. b: 369. 73. b: 384. 9. d: 442. 69. b: 443. 70. g: 452.  
 79. k: 504. 46. q: 1  
 Strumes du col. cherche Escrouelles.  
 engarder de Suer. 449. 76. d: 481. 23. li: 1  
 faire Suer. 16. 13. a: 23. 18. g: 64. 56. a: 114. 4. b: 121.  
 13. b: 175. 63. b: 198. 84. f: 209. 94. n: 210. 95. e: 230. 29.  
 d: 367. 71. b: 424. 48. f: 504. 46. e: 1  
 Suggiliatiõs. cherche Cõtuions noires. 380. 6. a: 1  
**T**Aches. 55. 48. c: 78. 67. b: 90. 78. b: c: 135. 28. f: 143.  
 34. 370. 74. c: 184. 71. o: 219. 6. 83. h: 207. 92. g: 238. 26.  
 h: 247. 34. d: 254. 40. h: 259. 46. i: 261. 47. b: 266. 51.  
 d: 300. 87. i: 319. 13. b: 329. 24. c: 407. 29. c: 415. 36.  
 n: 430. 55. l: 432. 57. d: 435. 60. b: 442. 69. b: 449. 76.  
 e: 465. 6. h: 499. 41. h: 504. 46. f: 539. 56. e: 539. 72.  
 e: 539. 84. b: 1  
 Taches blanches. 217. 6. c: 355. 58. f: 447. 73. k: 477  
 Taches escailleuses. 217. 6. c: (18. d: 1  
 Taches lurides & palles. 221. 10. c: 1  
 Taches rouges. 460. 2. a: 1  
 Taindre en isulne. 55. 46. a: 488. 30. b: 1  
 Taindre en noir. 532. 75. a: 1  
 Taindre en purpure. 48. 40. h: 1  
 Taindre en verd. 53. 46. a: 488. 30. b: 1  
 Teignes. 538. 83. e: 1  
 Tenafmes & Expressions. 255. 28. a: 1  
 chaleur de Teste. 111. 1. e: (23. f: 432. 57. a: 1  
 faire douleur de Teste. 122. 14. a: 179. 67. b: 234. 1  
 cõte douleur de Teste. 79. 68. c: 87. 75. b: 97. 84.  
 c: 101. 88. h: 112. 1. e: 117. 7. e: 135. 28. d: 143. 34. e: 163.  
 53. e: 164. 54. g: 173. 62. f: 181. 7. 65. a: 184. 71. m: 187.  
 74. b: 191. 78. k: 196. 83. e: 205. 91. g: 215. 1. f: 230. 18. a:  
 230. 19. a: 234. 24. a: 239. 27. h: 247. 34. f: 253. 40. b: 256.  
 43. c: 264. 49. f: 269. 56. c: 279. 68. g: 293. 80. f: 301. 88.  
 b: 314. 7. a: 320. 15. f: 342. 39. d: 377. 5. b: 388. 11. f: 398.  
 20. h: 434. 59. f: 445. 71. k: 455. 81. b: 456. 82. d: 459. 1.  
 e: 472. 13. b: 473. 14. b: 499. 41. f: 1  
 douleur de Teste par auoir estè trop long tẽps  
 au Soleil. 398. 20. f: (39. d: 1  
 douleur de Teste prouenant de vapeurs. 496. 1  
 douleur de Teste prouenant d'yrongnerie. 380. 6. m: 1  
 euacuer les humeurs de la Teste. 165. 56. f: 450. 55. c: 443.  
 70. e: 596. 82. g: 1  
 mondifier la Teste. 143. 34. f: 180. 6. e: 1  
 playes de la Teste. 145. 37. b: 545. 91. c: 1  
 rõgnes de la Teste. 223. 11. m: 407. 29. e: 445. 71. l: 1  
 Son & fureurs de la Teste. 83. 71. c: 279. 68. f: 337. 34. f: 377.  
 5. g: 449. 76. e: 452. 79. i: 481. 23. d: 1  
 tournoyemens de Teste. 15. 11. a: 164. 54. g: 187. 73. b: 209.  
 94. e: 255. 41. b: 259. 46. c: 260. 40. n: 367. 71. a: 546. 92. d: 1  
 tumeurs de Teste. 142. 33. c: 384. 9. b: 1  
 vlceres de la Teste. 454. 80. i: 481. 23. d: 1

# Table

vicerres coulns de la Teste. 445. 71. n: 449. 76.

e: 452. 79. j:

Thorax chargé de matiere purulente. 95. 82. a, inflammation du Thorax. 112. a. b: (b) 44. 90. a2 mal du Thorax. 92. 79. f: 51. e. 45. a2 84. 71. h: 187. 74. b: 198. 84. b: 112. 10. b: 119. 7. a: 337. 34. b:

maladies froides du Thorax. 179. 68. n: 372. 79. a: 443. 70. d: 476. 17. a:

mondifaire le Thorax. 55. 48. g: 83. 71. a: 84. 73. d: 98. 85. a: 102. 89. b: 110. 101. c: 112. a. b: 130. 14. b: 143. 34. d: 162. 51. f: 163. 54. b: 182. 69. a: 191. 78. e: 210. 95. c: 214. 13. a: 216. 14. b: 259. 4. 6. a: 337. 34. b: 1367. 71. d: 415. 3. 6. g: 419. 39. a: 218. 83. c: 437. 74. d: 542. 87. d: 544. 9. a: 546. 91. b: 547. 93. d:

obstrucons du Thorax. 11. a: 26. a2. a: 160. 49. a: 171. 61. a: 175. 63. c: 194. 81. b: 247. 34. a: 243. 0. 55. b: 315. 19. b2

radelle du Thorax. 310. 1. o: 486. 18. a: 507. 49. a vicerres du Thorax. 300. 87. e: (508. 50. e:

Tigne. 135. 28. f: 160. 49. f: 185. 71. o: 143. 29. d: 247 34. b: 1279. 78. f: 286. 71. b: 327. 22. b: 337. 34. f: 42. 39. b: 355. 55. c: 377. 73. c: 415. 36. m: 430. 55. b: 447. 73. k 513. 36. 513. 38. e:

gens Tombés de haut. cherche Cheute.

Toux. 152. b: 110. 16. a: 117. c: 126. 22. a: 155. 48. g: 61. 52. a: 71. 61. a: 77. 66. c: 92. 79. f: 112. 1. b: 114. 4. a: 167. 58. d: 168. 59. e: 177. 65. e: 184. 71. h: 194. 81. b: 205. 91. a: 209. 94. c: 210. 95. c: 215. 5. a: 216. 14. b: 234. 13. b: 265. 51. b: 279. 68. a: 285. 71. e: 291. 80. b. e: 306. 92. c: 310. 1. f: 311. a. b: 372. 79. a: 380. 6. h: 409. 15. b: 410. 41. d: 443. 70. d: 458. 80. b: 459. 81. f: 461. 51. a: 476. 17. a: 486. 18. a. b: 491. 33. a: 499. 41. b: 504. 46 f: 506. 48. b: 507. 49. a: 508. 50. e: 515. 39. b: 542. 87. d

Toux enueicille. 83. 71. a: 84. 73. d: 92. 79. b: 143. 34. d: 160. 49. a: 161. 51. a: 170. 60. a: 182. 69. a: c: 191. 78. e: 199. 85. a: 201. 87. b: 217. 6. a: 220. 9. a: 229. 46. e: 431. 36. g: 424. 48. a: 243. 8. 64. a: 445. 71. g: 447. 74. d: 486. 28. b: 515. 58. b: 536. 82. a: 546. 92. e

Toux seche & difficile de petits enfans. 61. 52. a 99. 85. a:

Trenchées. 28. 33. b: 443. 7. b: 55. 42. f: 433. 34. a: 161. 5. b: 165. 56. a: 173. 62. d. m: 176. 64. a: 184. 71. h 190. 77. b: 194. 81. a: 198. 84. a: 199. 85. a: 201. 88. c: 207. 82. d: 214. 4. a: 220. 9. a: 238. 11. a: 237. 79. b: 267. 71. b: 398. 10. m: 415. 36. h: 419. 40. c: 451. 79. b: 536. Tristesse. 73. d: 9. 6. a: 55. n: 2170. 60. a. (812. a: 183. 70. a: 234. 14. a: 236. 43. c:

Tumeurs. 35. 30. a: 60. 55. c: 187. 75. h: 99. 85. g: 99. 86. a: 111. 13. a: 114. 31. a: 143. 34. k. 145. 36. b: 145. 37. e: 152. 45. e: 156. 46. e: 168. 39. d: 173. 62. f: 185. 71. o: 190. 77. f: 198. 84. e: 210. 95. a: 217. 34. e: 259. 46. k: 268. 51. b: 297. 83. d: 310. 1. g. 314. 7. b: 315. 8. a: 320. 15. c: 433. 18. c: 437. 34. c: 481. 7. b: 403. 25. d: 445. 71 0: 450. 77. a: 455. 81. k: 504. 46. m. q: 519. 63. b. h. k: 510. 65. d: 543. 89. b: 544. 90. b:

Tumeurs chaudes. 30. 35. a: 290. 76. g: 394. 82. e: 397. 83. e: 398. 83. 6. c: 388. n. g: 420. 24. i: 519. 63. a: .

Tumeurs froides. 2. 1. g: 12. 8. i: 18. 23. e: 55. 48. a: 64. 55. c: 141. 32. a: 152. 45. c: 162. 51. g: 165. 56. e: 196. 83. h: 198. 84. c: 201. 87. d: 210. 95. f: 214. 40. g: 269. 56. b: 315. 8. a: 337. 34. e: 339. 37. a: 361. 63. c: 365. 67. a: 402. 14. i: 403. 15. d: 424. 48. b: 434. 19. e: 439. 64. c: 440. 67. a: 442. 69. b: 443. 70. g: 447. 73. d: 460. 2. a: 512. 66. b: 524. 69. a:

Tumeurs interieures. 178. 66. b:

pour faire sortir la matiere des Tumeurs & Apoplexies interieures, par les vrines. 178. 66. b:

Vaches, qu'elles donnent beaucoup de lait 517. 61. b: 534. 78. e:

Vaches, qu'elles donnent bon lait. 435. 60. d: engreffer Vaches & Beufs. 319. 24. f: 529. 71. g:

Varices, ce font veines relachées & emplies de gros sang. 391. 12. a: 534. 78. e: (nes. 4. 2. b:

purger humeurs bilieuses contenues aux Veihumeurs vieilles contenues aux Veines. 459. obstrucons des Veines. 171. 58. a: (1. b:

Venin. 2. a. b: 4. 2. f: 13. 19. a: 64. 56. a: 84. 72. d: 97. 84. f: 102. 89. c: 164. 55. b: 184. 71. b: 189. 75. b: 196. 83 c: 201. 87. e: 208. 93. c: 215. 5. b: 215. 13. b: 219. 55. a: 233 32. a: 235. 58. c: 267. 71. g: 401. 24. d: 421. 39. e: 442. 34 b: 447. 38. f: 449. 39. c: 430. 41. b. c: 430. 55. n: 459. 64. b: 445. 71. d: 482. 24. a: 494. 36. d: 504. 46. h: 513 56. c: 523. 68. e: 526. 70. d: 536. 82. e: 546. 92. k: 1

son à ges qui font deuenus fols & infensés par auoir prins du Venin ou poison. 289. 76. a:

que le Venin prins par dedens ne nuise à la persone. 314. 27. a: 235. 25. a: 269. 55. a:

faire fouir bestes Venimeuses. 2. 1. c: 18. 23. g. 58. 50. d: 63. 53. f: 64. 55. b: 175. 63. a: 189. 75. c: 196. 83. d: 209. 94. g: 218. 45. f: 430. 55. m: 434. 39. c: 445. 74. d: 484. 26. f: 496. 82. d:

preferuatif contre bestes Venimeuses. 7. 4. a: 13 9. d: 75. 63. a: 184. 71. e: 205. 91. d: 217. 6. i:

Ventosités. 56. 49. a: 137. 29. b: 191. 87. a: 194. 81. a 196. 83. a: 201. 87. b: 207. 92. a: 209. 94. a: 357. 39. b: 422. 44. b: 422. 45. a: 443. 70. b: 445. 71. c:

arreller flux de Vêtre. 17. 14. a: 26. a: 234. 19. a: 44. 37. b: 145. 38. c: 190. 43. a: 262. 54. a: 264. 55. b: 264. 56 b: 65. 57. a: 266. 58. a: 268. 60. c: 171. 61. b: 175. 65. a. d: 77 66. a: 61. 69. b: 87. 7. a: 188. 76. a: 189. 77. a: 190. 79. a: 110. 100. a: 115. 80. a: 115. 82. a: 144. 35. a: 149. 42. a. b: 156. 46. d: 163. 53. b: 166. 57. b: 170. 60. e: 184. 71. a: 190. 77. b: 191. 78. a: 194. 82. b: 201. 87. e: 221. 10. a: 222. 10. f: 227. 16. b: 234. 23. f: 276. 64. a: 279. 68. c: 283. 71. c: 295. 80. c: 295. 82. d: 318. 22. a: 319. 13. c: 322. 14. b: 322. 28. a: 333. 30. b: 336. 33. a. b: 344. 42. a: 346. 45. a: 350. 51. a: 351. 52. a: 361. 63. a: 363. 66. a: 369. 73. e: 377. 54. k: 384. 9. c: 398. 10. h: 403. 25. h: 419. 40. b: 424. 48. a. e: 435. 81. g: 436. 82. b: 439. 1. g: 446. 3. a. c. d: 462. 4. c: 468. 9. a: 470. 11. b: 474. 15. f: 474. 19. a: 479. 21. b: 480. 22. a: 481. 23. b: 485. 27. a. b. c: 489 31. a: 491. 33. a: 495. 38. g: 496. 39. a. d. e. k: 498. 40. a: 498. 41. a: 500. 42. b: 501. 43. a: 502. 44. a: 506. 47. d. e: 508. 50. c: 509. 51. a: 510. 52. a: 511. 54. a. b: 512. 55. a

# Des Vertus.

d. 53. 57. c. 514. 57. c. 518. 62. b. 59. 63. d. 520. 64. b. 53. 68. a. c. 524. 63. g. 539. 89. a. b. 542. 87. a. 548. 94  
 flux de Ventre provenant de matiere (a, b)  
 chaude. 388. n. b. 392. 16. a. 478. 20. c.  
 flux de Ventre provenant de medecine trop forte. 79. 68. b.  
 flux de Ventre provenant de refroidemens d'Estomach &c. 72. 62. b.  
 inflations & ventosités de Ventre. 4. 2. d. 56. 49  
 a. 37. 29. b. 61. 51. c. 190. 77. b. 193. 80. a. 210. 95. l. 22. 6. 14. c. 258. 45. d. 419. 39. b. 419. 40. c. 420. 41. c. 484. 26. b. 515. 57. b. 56. 82. a.  
 lacher le Ventre. 26. 22. a. 34. 29. c. 60. 51. a. b. c. 99. 85. d. m. x. h. 117. 19. b. 167. 58. b. 168. 59. a. 205. 91. g. 23. n. e. 137. 26. a. b. 238. 26. k. l. 239. 27. a. 224. 0. 28. 212. 44. 30. a. 214. 53. 1. 214. 63. 2. 214. 7. 34. 215. 4. 1. 215. 42. 2. 215. 43. 2. 215. 44. 2. 215. 45. 2. 215. 46. 2. 215. 47. 2. 215. 48. 2. 215. 49. 2. 215. 50. 2. 215. 51. 2. 215. 52. 2. 215. 53. 2. 215. 54. 2. 215. 55. 2. 215. 56. 2. 215. 57. 2. 215. 58. 2. 215. 59. 2. 215. 60. 2. 215. 61. 2. 215. 62. 2. 215. 63. 2. 215. 64. 2. 215. 65. 2. 215. 66. 2. 215. 67. 2. 215. 68. 2. 215. 69. 2. 215. 70. 2. 215. 71. 2. 215. 72. 2. 215. 73. 2. 215. 74. 2. 215. 75. 2. 215. 76. 2. 215. 77. 2. 215. 78. 2. 215. 79. 2. 215. 80. 2. 215. 81. 2. 215. 82. 2. 215. 83. 2. 215. 84. 2. 215. 85. 2. 215. 86. 2. 215. 87. 2. 215. 88. 2. 215. 89. 2. 215. 90. 2. 215. 91. 2. 215. 92. 2. 215. 93. 2. 215. 94. 2. 215. 95. 2. 215. 96. 2. 215. 97. 2. 215. 98. 2. 215. 99. 2. 215. 100. 2.  
 offer les rides & fronces du Ventre des femmes apres avoir enfanté. 279. 68. h.  
 tortions & douleur de Ventre. 97. 84. b. 265. 56  
 a. 191. 78. a. 192. 79. a. 193. 81. a. 198. 84. a. 198. 85. a. 201. 87. b. 202. 9. 94. a. 211. 10. a. 212. 15. b. 217. 16. a. 315  
 9. 254. 2. 39. 534. 5. 44. a. 417. 38. e. 422. 44. b. 422. 45  
 a. 439. 64. b. 443. 70. b. 515. 57. b.  
 Vermouliflure. 53. 83. e.  
 grosse Verolle. 19. 15. b. c.  
 petite Verolle, ou Piquette. 21. 17. b. 504. 46. e. 7  
 Verrues. 4. 8. 4. 0. d. 51. 62. 51. g. 166. 67. b. 109. 6. 83. d  
 243. 19. d. 286. 72. a. 452. 79. h. 504. 46. f. 522. 67. e.  
 Verrues qui viennent sur le membre viril, & autres parties honteuses. 59. 84. c.  
 tuer & pousser hors les Vers. 2. 1. b. 5. 2. 0. 14. 10.  
 216. 15. a. 153. 0. d. 68. 60. a. 87. 75. a. 160. 49. b. 175.  
 63. f. 194. 82. b. 196. 83. b. 210. 9. h. 232. 21. c. 273. 60.  
 a. 283. 71. h. 318. 23. a. 335. 32. a. b. 380. 6. p. 398. 20. d.  
 411. 33. f. 415. 36. 0. 434. 59. b. 445. 71. c. 494. 36. f.  
 495. 38. d. 498. 40. d. 502. 44. f. 513. 68. c. 516. 82. f.  
 516. 92. k.  
 Vers larges. 5. 2. n. 73. c. 48. 40. f. 73. 60. c. 135.  
 Vers longs. 5. 2. n. 452. 79. c. (58. a)  
 Vers ronds. 4. 8. 4. 0. d. 51. 62. 51. g. 166. 67. b. 109. 6. 83. d  
 douleur de Vessie. n. 8. 214. 10. d. 32. 2. 8. a. 35. 28  
 b. e. 137. 29. e. 152. 45. a. 209. 94. b. 221. 10. a. 302. 89.  
 b. 317. 11. a. 341. 39. f. 338. 35. d. 388. 20. b. 400. 23. a.  
 401. 24. b. 402. 24. g. 422. 44. b. 426. 41. b. 439. 1. e.  
 487. 18. f.  
 escouemens de la Vessie. 59. 85. f

gratelle interieure de la Vessie. 399. 22. a. 486.  
 inflammation de la Vessie. 352. 18. e. (38. d.)  
 301. 88. b. 506. 48. c. 507. 49. b.  
 modifier la Vessie. 203. 89. a. 210. 95. a. 202. 89. b.  
 obstructions de la Vessie. 1. 1. n. 61. g. b. 84. 73. a  
 187. 74. a. 202. 88. a. 226. 15. a. 217. 58. a. 400. 23. b. c.  
 405. 28. b. 410. 32. k. 424. 48. c. 427. 52. b. 435. 60. a.  
 455. 81. f. 465. 6. a.  
 playes de la Vessie. 77. 66. b.  
 rudesse & aspreté de la Vessie. 401. 24. f.  
 vlceres de la Vessie. 71. 61. d. 77. 66. b. 402. 24. b.  
 405. 28. b. 410. 32. k. 424. 48. c. 427. 52. b. 435. 60. a.  
 contregarder Veltemens de Vernine. 5. 2. 3.  
 68. 60. b. 71. 61. d.  
 debilité de Veue. 19. 15. d. 350. 51. d. 355. 57. a.  
 esclarcir la Veue & yeux. 19. 15. a. 215. 20. a. 31. 27. a.  
 b. 55. 48. e. 167. 59. d. 180. 68. a. 182. 69. e. 184. 71. k.  
 185. 71. v. 198. 84. d. 202. 88. l. 207. 92. g. 210. 95. h.  
 220. 9. k. 223. n. g. 235. 24. f. 339. 37. b. 342. 39. g. 350.  
 51. d. 355. 57. a. 390. 14. b. 396. 19. d. 413. 35. c. 430. 55. j.  
 443. 70. h. 447. 73. c. 453. 80. f. 475. 16. a. 488. 83. b.  
 donner couleur isulne aux Viandes. 26. 22. c.  
 442. 69. a.  
 donner bonne faueur aux Viandes. 425. 50. a.  
 443. 70. a.  
 empescher la Vigne de croistre. 416. 37. c.  
 Vifage, cherche Face.  
 Vlceres. 37. 31. b. 39. 33. a. 103. 90. b. 105. 94. b. 107.  
 96. a. 107. 97. a. 109. 99. d. 1147. 39. g. 264. 49. a. 297  
 82. d. 481. 23. e. 518. 62. d. 519. 63. b. c. 521. 75. b. 532.  
 Vlceres cauernes. 142. 34. 122. 1. e. 220. (76. a.)  
 9. 1128. 26. d. 310. 1. n. 544. 90. f.  
 menger la chair superflue es Vlceres. 84. 73. e.  
 436. 61. b. 514. 68. k.  
 Vlceres charus. 41. 34. b. 21. a. f. 79. c. 293.  
 80. d. 295. 81. b. 297. 81. c. 304. 91. d. 369. 71. a. 480.  
 22. b. 519. 61. h. 539. 85. h.  
 Vlceres coullans. 52. 45. c. 71. 61. f. 81. 69. a. 259.  
 46. h. 317. 22. b.  
 Vlceres difficiles à curer. 209. 94. 1117. 6. c. 220  
 9. d. 477. 18. d.  
 emporter la dureté & callosité des Vlceres.  
 238. 26. d. 243. 29. d.  
 incarner Vlceres. 212. 1. e. 34. 30. g. 544. 90. f.  
 Vlceres malings. 16. 13. b. 19. 15. b. c. 21. 18. c. 51. 43  
 d. 54. 47. a. 84. 73. e. 92. 79. g. 97. 84. e. 99. 85. g. 103  
 90. a. 113. 3. c. 1182. 69. 1. 211. 1. e. 217. 6. c. f. 220. 9. d. 225  
 13. c. 139. 4. 6. h. 219. 81. b. 230. 10. 15. a. 327. 2.  
 c. 421. 42. b. 465. 6. f. 483. 25. b. 499. 14. g. 519. 63. a.  
 524. 68. f. 524. 69. b. 539. 84. b.  
 vlceres moictes. 52. 45. c. 290. 77. e. 266. 51. d. 311.  
 2. c. 424. 48. b. 450. 77. b. 481. 23. i. (46. k.)  
 Vlceres suruenans aux racines des Ongles. 259  
 Vlceres pourris. 22. 18. c. 35. 30. e. 43. 36. c. 51. 43.  
 d. 52. 45. a. c. 71. 61. f. 81. 69. a. 84. 73. e. 92. 79. g. 97.  
 84. e. 99. 85. g. 143. 34. m. 50. 42. c. 516. 46. e. 182.  
 69. g. 198. 84. e. 202. 88. h. 209. 94. 122. 1. e. 251. 37.  
 c. 259.

# Table

ca39.46.hi266.3i.d:296.8i.c331.2.c:320.15.a:1  
 334.30.g.380.6.d:0:417.38.h:436.6i.b:450.77.  
 b:453.80.e:465.6.g:477.28.d:491.33.c:499.41.  
 g:519.89.i:  
 engarder Vlceres de pourrir & røger.55.48.d:  
 Vlceres rongez & phagedeniques.16.33.b:25.  
 20.b35.30.b.e39.33.b:433.6.c:51.45.a:64.55.c:f:  
 71.61.f:81.69.a:87.75.e:156.46.c:166.57.d:182.  
 69.f:127.6.c:159.46.h:164.49.a:161.88.a:104.91  
 d:120.15.g:127.22.c:129.24.c:351.33.a:377.5.e:  
 380.6.o:415.36.m:417.38.h:449.46.c:450.77.b  
 453.83.e:462.4.e:482.23.k:483.25.b:488.29.a:  
 491.33.e:499.41.g:509.63.a:524.68.f:539.84.b:  
 539.85.h:542.87.b:544.90.d:  
 Vlceres vieux.6.3.a.8.5.b:11.8.g:89.77.b:109.  
 99.d:113.3.b.c:117.29.g:143.34.h:148.39.h:182.69  
 f:123.n.11:139.27.d:196.82.c:336.33.d:380.6.d:  
 386.n.b:453.80.e:477.18.d:514.69.b:  
 Vers engendrés és Vlceres.386.n.b:  
 esclarcir la Voix.445.71.g:  
 arrester Vomiffemens.4.2.d:1714.c:64.56.d:  
 71.61.c:75.65.a:164.54.d:170.60.a:163.62.b:m:  
 190.76.d:160.77.b:194.82.a:105.91.h:350.52.a:  
 456.82.f:470.11.b:478.20.d:493.6.b:496.39.  
 g:502.44.a:503.57.a:514.57.g:515.62.b:539.85.b  
 548.94.c:  
 contre enuie de Vomir qu'on a sur la mer.168  
 inciter à Vomir.26.12.d:87.75.g:99.85.c:150.  
 42.a:159.48.b:163.33.a:114.3.a:115.5.c:134.24.a:  
 240.28.a:152.39.a:1407.19.d:415.36.c:50.1:466.  
 7.a:488.30.a:521.66.c:533.78.a:  
 purger par Vomiffemens le phlegme & la cho  
 lere.214.4.a:215.5.e: (59.b)  
 acrimonie & ardeur d'Vrine.302.89.b:486.28  
 d:506.48.c:542.87.c:  
 difficulté d'Vrine.2.1.110.7.a:110.16.a:121.18.b:  
 39.33.e:165.56.a:166.57.a:202.87.a:202.88.a:203.  
 89.a:232.11.a:243.41.2:245.44.a:255.58.b:357.59.  
 d:358.60.a:379.13.a:399.22.a.b:417.38.c:424.48  
 a:435.50.b:439.54.a.b:459.11:472.13.a:499.41.  
 flux d'Vrine.346.45.a: (d)  
 Vrine grosse & espesse.196.82.a:  
 prouoquer l'Vrine.11.8.a:10.25.b:12.28.a:137.31  
 a:150.43.a:161.53.b:175.65.h:84.73.a:99.85.d:113.3.  
 a:114.4.b:117.7.b:111.13.a:135.29.a.e:139.30.b:143  
 34.c:145.37.a:149.41.a:152.45.f:161.52.a:165.54.a  
 164.55.a:168.59.d:170.60.a:171.61.b:175.63.d:  
 177.65.a:184.71.a:187.51.f:187.75.a:190.76.b:190  
 77.b:193.80.a:196.83.a:198.84.a:199.85.b:200.  
 86.a:202.87.a:202.88.a:203.89.a:205.90.a:205.  
 91.a:207.92.a.b:209.94.b:210.95.a:211.1.b:215.  
 5.a:225.14.a:226.15.a:229.17.a:232.21.a:233.22.b:  
 234.23.a:239.46.a:239.46.m:260.46.n:265.51.a:  
 279.68.b:296.82.a:302.89.b:304.91.a:319.14.a:  
 323.19.b:327.22.a.d:329.24.b:336.33.b:342.39.f:  
 344.41.a:345.44.a:349.50.a:350.51.b:351.52.a:353.  
 55.d:357.59.d:358.60.a:361.63.b:363.66.a:367.71

b:170.74.b:180.6.l:384.9.e:1389.13.a:398.20.m  
 398.21.a:400.23.a.b.c:411.33.d:415.35.a:415.36.f.o  
 r:417.38.b:419.39.b.419.40.a:420.41.a.b.c:421  
 43.a.b:422.44.a.c:422.45.b:425.49.a:426.51.b:  
 427.33.b:429.54.a:430.55.f:432.57.b:435.60.a:  
 436.61.c:443.70.b:445.71.c:446.73.b:447.74  
 b:451.79.b:453.80.a:459.a.i:461.3.d:462.4.h:  
 465.6.b.c:468.10.a.d:472.13.a:473.14.d:476.  
 18.c:477.19.d:483.24.f:494.37.b:499.41.d:50  
 64.b:523.68.e:526.70.g:527.71.a:536.62.a:538.  
 83.f:538.84.a:542.87.a:545.91.a:546.92.b:547.  
 93.b.c:  
 prouoquer l'Vrine aux petis enfans.226.15.d:  
 Vrine purulente.486.28.d:  
 Y.

cataractes és Yeux.25.10.a:  
 catarrhes tōbans sur les Yeux.170.60.c:310.1.n  
 cicatrices des Yeux.25.20.a:113.3.c:139.27.g:  
 338.83.b:  
 couleur laulne demourée és Yeux apres auoir  
 eu la Jaunisse.167.58.f:182.69.e:193.40.b:  
 defluxion des Yeux.44.37.a:66.58.c:120.11.a:  
 152.45.c:198.84.i:301.88.d:306.92.a:407.29.b:  
 51.74.d:  
 demangeon des Yeux.139.27.g:491.33.d:  
 enflure des Yeux.480.22.c:  
 fistules aux coings des Yeux.42.35.a:321.6.a:  
 froissures noires des Yeux.52.g:  
 inflammation des Yeux.2.1.f:128.24.b:4134.a:  
 43.36.d:44.37.a:71.61.h:87.75.c:112.1.f:110.11.a:  
 121.12.c:127.29.c:133.16.c:135.5.f:124.13.c:139.27.  
 g:140.28.e:301.88.b.d:306.92.a:388.22.d:398.20  
 h:407.29.b:410.32.e:459.1.c:463.5.b:480.22.c:  
 482.21.c:99.63.e:  
 maille és Yeux.185.71.v.17.6.d:123.n.g:339.37  
 b:342.39.g:447.73.e:538.83.b:  
 mal des Yeux.52.g:71.61.h:112.1.f:110.11.b:162  
 51.d:170.60.c:184.61.k:124.n.e:106.92.a:459.1.  
 e:147.16.a:  
 obscuration des Yeux.5.2.g:120.16.d:127.a.b:43  
 36.e:113.g:170.60.c:180.68.a:184.71.k:198.84.  
 d:202.88.i:210.9.k:123.n.g:139.27.g:390.14.b:  
 396.19.d:  
 phlegmons és Yeux.34.30.i:42.39.a:  
 prominence des Yeux.480.22.c:  
 rougeoles & petite verolle és Yeux.152.45.c:  
 rougeur des Yeux.67.59.g:120.11.a.b:121.12.c:  
 301.88.d:367.71.h:410.32.c:420.41.e:475.16.a:  
 519.63.e:  
 suffusions des Yeux.196.83.e:  
 tache és Yeux.5.20.a:113.3.e:185.71.v:17.6.d:  
 123.n.g:142.39.g:447.73.e:  
 tumeur és Yeux.12.79.g:148.40.b:  
 vlcere és Yeux.41.34.a:123.5.a:92.79.g:17.29.  
 g:120.28.e:199.63.e.

LA PREMIERE PARTIE  
DE L'HISTOIRE DES PLANTES, CON-  
TENANT LES ESPECES, DIFFERENCES, FORME,  
Noms, Vertus & Operations des Herbes,  
PAR D. REMBERT DODOENS.

De l'Auronne.

Chap. I.

LES ESPECES ET DIFFERENCES.

L'Auronne comme dit Dioscoride est de deux sortes: L'une, appellée Auronne femelle, ou grande: L'autre, Auronne male, ou petite, & sont toutes deux asses communes par ce pais.

*Abrotanum femina.*  
La grande Auronne.

*Abrotanum mas.*  
La petite Auronne.



LA FORME.

- 1 La grande Auronne surmonte souuent (principalement quand elle est bien menée) la hauteur d'un bien grand homme, tellement qu'elle ressemble à vn arbrisseau. Elle a les branches dures, au tour desquelles croissent plusieurs suailles, petites, gristres, fort incisées, lesquelles perissent en hyuer comme sont les suailles de plusieurs arbres, & se renouellent en Auril. Les fleurs sont petis boutons iaulnes comme or croissans le long des branches comme à l'Aloyne.
- 2 La petite ne croist iamais fort haut: Elle a les branchettes ou reins faux petis, tendres, gresles, le plus souuent prouenans de la racine. Les suailles plus verdes, plus longues, plus tendres, & plus incisées que celles de la grande Auronne, lesquelles perissent en hyuer & resortent en May, hors des mesmes branches & hors d'autres plus nouuelles. Elle ne porte pas souuent fleur en ce pais. Elle est d'odeur plus forte que la grande. La racine tendre & se trainant par terre, tout autour

de laquelle sortent plusieurs nouveaux surcetz & tendrons.

Outre ces deux, il s'en trouue vne Troisieme espeece laquelle ressemble à la petite Auronne de branches & de croiffon, mais de fueilles à la grande Auronne, combien qu'elles soient plus tendres, & non pas si blanches. Elle est d'odeur fort amiable, non pas trop differente à l'odeur du Cypres de Iardin, duquel nous escrirons en son lieu.

## LE LIEU.

Les deux premières ne croiffent point en ce pais, sinon aux Iardins, ou elles sont plantées. Ny pareillement la tierce Espeece, laquelle ne se trouue guere, & est encore moins cogneue.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en Aoult, la semence se peut cueillir en Septembre.

## LES NÔMS.

L'Auronne est appellée en Grec ἀβροτῶν; en Latin, & aux boutiques *Abrotanum*; en haut Aleman *Strawurtz*, *Sertwartz*, *Sarrhagen*, *Schesswartz*, *Kartelshant*, *Affrisch*; en bas Aleman *Thuroone*.

La grande Auronne se nomme en Grec ἀβροτῶν θῆλυον; en Latin *Abrotanum femina*, c'est à dire Auronne femelle; en haut Aleman *Strawurtz weiblich*; en bas Aleman *Thuroone weiblich*.

La petite Auronne s'appelle en Grec ἀβροτῶν ἀρῆλυον; en Latin *Abrotanum mar*; en François *Auronne mâle*; en haut Aleman *Strawurtz menslich*; en bas Aleman *Thuroone mamschen* & s'écrit *Thuroone*.

La Troisieme espeece est sans faute, celle que Dioscoride appelle en Grec ἀβροτῶν σκευάκιον; en Latin *Abrotanum scyalius*, qui est vne espeece de l'Auronne femelle; les hauts Alemans l'appellent *Wolrichende Strawurtz*, c'est à dire Auronne odoriferante.

## LE TEMPERAMENT.

Toutes les Auronnes sont chaudes & seches au tiers degre & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** La graine de l'Auronne seche & mise en poudre, ou boullie en eau ou vin & beuë est fort bonne, & ayde grandemēt ceux qui ont la respiration empeschée, & le thorax estouppé, ceux qui ont les nerfs tēdus & retirés. Elle est bōne contre la sciatique, contre la difficulte d'vrine, & aux femmes qui ne peuvent facilement auoir leurs fleurs: Car par sa subtilité, elle a vertu de dechasser, consumer, & resoudre ou digerer toute humidité froide, & flegme glueux & visceux estouppant la ratelle, les rongnons, la vesie, & la matrice.
- B** Auronne beue avec vin est vtile contre tous venins nuisables à l'homme, & tue les vers.
- C** Le parfum d'icelle dechasse toutes bestes venimeuses: Aussi fait elle bien par tout ou elle est mise & esparse.
- D** Les cendres d'Auronne meslées avec huile de palma Christi, ou de raifort, ou avec huile d'oline vieille, repare les cheueux qui tombent de la teste, quand on en frotte la teste deux foys le iour au soleil, ou apres du feu.
- B** Si on la mesle avec quelque vne des huiles susdictes, & on en frotte le menton, elle fait soudain venir la barbe qui ne sauance point de croistre.
- F** Auronne broyée avec vn coyn cuit & mise sur les yeux en forme d'emplastre, est fort bonne & vtile contre toute inflammation des yeux.
- G** Icelle pilée avec farine d'orge & boullie ensemble, dissout & digere toutes tumeurs froides si on l'applique dessus.
- H** D'Auronne destrempee en huile est prouffitable frotter le corps, contre morsondures & frifsons qui retournent par certain temps, comme les sieures.
- I** Plin eſcrit que si elle est mise sous le liēt ou cheuet du liēt, elle incite à copulation charnelle, & elle chasse tous enchantemens qui pourroient empeschier lesdictes œures & incitations.

## LES NVISANCES.

Elle est du tout ennemie à l'estomach: pourtant Galien prince des Medecins, ne la bailla iamais à prendre par dedans le corps.

## De l'Aluyne.

## Chap. II.

## LES ESPECES.

Il y a trois sortes d'Aluyne en ce pais. La premiere est celle qu'on appelle Aluyne Romaine. La seconde est l'Aluyne marine. La tierce est nostre Aluyne vulgaire; & ne sont pas seulement differentes quant à la diuersité du lieu de leur naissance, mais aussi quant à la forme.

L'Aluy-



## LA FORME.

- 1 L'Aluyne Romaine reſemble aſſez à l'Aluyne marine, ſi non qu'elle eſt plus baſſe, plus petite, les fueilles plus petites, plus molles, moins blanches que la Vulgaire, tirans ſur le verd, jaſſort qu'el les tirent auſſi ſur le griſatre & cendreux. Auant qu'elle fleuriffe, elle a des petis boutons iaunes leſquelz produiſent puis apres fleurs & ſemence. La racine eſt fibreuſe & ſe traîne çà & là iettant de tous coſtez beaucoup de ſurcretz.
- 2 La ſeconde eſpece, qui eſt Aluyne marine eſt auſſi blanchatre ou griſatre, & a pluſieurs fueilles blâches aſſez ſemblables à l'Aluyne commune, mais beaucoup plus petites, plus tédres, plus blanches, & inciſées plus menu. Elle a pluſieurs fleurs ſemblables à petis boutons, & la ſemée ioignât les branches ainſi que l'Aluyne vulgaire. Elle croiſt à la hauteur de pied & demy ou plus. Elle eſt d'odeur forte, elle eſt ſalée, de ſauueur eſtrange & amere, quand elle eſt priſe en ſon lieu naturel: Car quand on la tranſplante aux iardins, ou en terre d'eau douce, elle change fort ſa ſauueur & nature, comme pluſieurs autres herbes, & principalement celles qui prouiennent en terre ſalée & ſont tranſférées de leur lieu naturel en vn autre.
- 3 L'Aluyne vulgaire à les fueilles cendreuſes ou griſatres, fort inciſées, ameres. La tige ligneuſe de la hauteur de deux coudées ou dauantage, fort branchues: & le long des brâchettes croiſſent petis boutons iaunes, dedis leſquelz (quand ilz ſont meurs & periffent) ſe trouue vne petite grain ſemblable à celle de la Tanefie, mais beaucoup pl<sup>u</sup> petite. Sa racine eſt ligneuſe & fort fibreuſe.
- Il ſe trouue és iardins d'aucuns Amateurs des herbes en ce païs encore vne forte de ceſte eſpece d'Aluyne, laquelle aucuns appellent Abſinthium Ponticum, fort ſemblable à la noſtre vulgaire, ſi non que les fueilles ſont plus fort dechiquetées, & nō ſi ameres, que celle pour le moins qui eſt plantée & ſemée en ce païs.

LE LIEU.

- 1 L'Aluyne Romaine croiſt en abondance en Hongrie & lieux circonuoifins de Conſtantinoble,

ble, & en aucuns lieux d'Alemagne, pareillemēt en lieux montaigneux & pres des chemins sablonneux. Elle ne croist toutesfois en ce pais si elle n'y est plantée.

L'Aluyme marine prouient en terre salée, & lieux ioignans à la mer. Elle croist abondamment par toute Zelande, & en Flandre du long la plage de la mer, & en aucuns lieux de Brabat comme pres Bergues.

L'Aluyme vulgaire croist voluntiers en lieux pierreux, montaigneux, apres, secs & mal culti ués. On la trouue en ce pais en plusieurs lieux.

#### LE TEMPS.

Toutes les especes d'Aluyme fleurissent en Iuillet & en Aouist. Incontinent apres la semēce est preste à cueillir. LES NOMS.

Galien en l'onsiesme de sa Methode appelle la premiere espece en Grec ἀλυσιον ποτικόν, en Latin *Abysinium Ponticum* : es Boutiques de Brabat *Abysinium Romane* : en François Aluyme Romaine ou Pontique : en bas Alemā *Röschel Alse* : pour ce q' c'est vne herbe estrāgere & nō cōmune en leur pais. Car ilz appellent cōmūnement toutes herbes estrāgeres & incognues au cōmū peuple, herbes Romaines, voire qu' id elles seroi ent apportées de Norwege q' est loig de Rome.

La seconde espece s'appelle en Grec ἀλυσιον θαλασσιον καὶ σιριφιον : en Latin *Scirpium* & *Abysinium maritimum* : cognue des Apothicaires, cōbōe qu'ilz en vendēt la semēce tous les iours sous le nom de la Mort aux vers, laquelle es Boutiques est appellēe *Semen sancti*, *Semen ians bricorum* & *Semen contrain* : en François *Scirphe*, ou Aluyme marine : en bas Aleman *see Alse*.

La tierce est appellēe en Grec ἀλυσιον σαρδόνικον : en Latin *Abysinium Sardonium* : es Boutiques *Abysinium* : & en François Aluyme simplement. Apulcie la nomme *Abysinium rusticum* : les hauts Alemans *wetmut* & *wetommut*, ou *āchet wetommut*, c'est à dire Aluyme des champs : les bas Alemans *Alse*. LE TEMPERAMENT.

L'Aluyme Romaine est chaude au premier degré & seche au tiers, amere, acre & adstringente : parquoy elle nettoye, purge, conforte, eschauffe & desefche.

La Scirphie est chaude au second degré, & seche au tiers, & de parties subtiles.

La Vulgaire est de mesme temperament que la Romaine, toutesfois non tant adstringente, & plus amere, & fort ingrāte.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

A L'Aluyme est vne medecine fort vile & excellēte contre la douleur d'estomach chargē d'humours bilieuses & chaudes. Car elle les pouffe par bas & les fait sortir par l'vrine, outre ce elle cō forte l'estomach. Toutesfois elle ne sert en rien à purger l'estomach qui est chargē d'humours froids & de flegme, ny pareillemēt à nettoyer les poulmons & la poiētrine estouppés par les dites humeurs, comme dit Galien.

B Pareillemēt elle purge par le conduēt d'en bas, & par l'vrine, les humeurs cholériques assemblés & contenues aux veines & au foye : parquoy la trempe, ou decoction d'icelle prise par chacun iour, guerit la jaunisse.

C Si elle est prise à ieun du matin, elle garde d'ennyurer.

D Elle est vile contre ventosités & inflations du ventre, & contre douleurs, appetit de vomir & rotz de l'estomach, si on la boit avec graine de scēdi ou anis.

E Icelle beue avec vinaigre, est bōne à ceux qui sont malades d'auoir mēgé chāpignōs venimeux.

F La mesme prise avec vin est contraire à tout venin, & principalemēt à celui de la Cigue, & aux morsures & piqures d'araignes, & autres bestes venimeuses.





Aluync dessechée avec myel est vtilement appliquée sur les yeux obscurcis, & qui ont froissu G  
res noirs. Et d'icelle cuicte avec vin bastard, ou quelque autre vin doux, on frotte les yeux chaf  
sieux & douloureux.

Icelle broyée avec figues, salpêtre, & farine d'yrsaie, & appliquée sur le ventre, ou sur les costés H  
ou flans, donne allegeance aux hydropiques & splenetiques.

Icelle mise aux coffres & garderobes, contrégarde les vestemens de vermine. D'icelle avec chui I  
le on en peut engresser ce qu'on veut, pour en chasser les mouches & mouchérons.

Ancre faicte avec la decoctiō ou trempē d'Aluync, engarde q̄ les souris ne mégent les lettres. K  
On en suit du vin lequel on appelle Vin d'aluync, fort bon pour toutes les choses susdictes. L

En somme l'Aluync Romaine est singuliere contre toute inflammation d'estomach & du foye, M  
surmontant en cela toutes les autres especes d'Aluync comme dit Galien.

2 L'Aluync marine cuicte à part foy ou avec ris, ou quelque autre viande, & prise avec miel, tue N  
les vers longs, platz, & quelz qu'ilz soyent, en l'aschant le ventre tout doucement. Elle est de pa  
reille efficace appliquée par dehors sur le vêtre, ou le nombril, & en cest endroit elle a beaucoup  
plus de force & vertu que nulle autre especē d'Aluync: mais elle est plus ennemie de l'estomach.

La semence de l'Aluync marine, que lon appelle Semen contra, comme dessus est dict, est fort O  
excellente contre toute sorte de vers engendrés dedans le corps.

Dioscoride escrit que les beufz, brebis & autre bestail qui mangent l'Aluync marine, en deuie P  
nent fort gras.

## De la Buglosse ou Langue de beuf vulgaire.

## Chap. III.

## LES ESPECES.

ON trouue en ce país trois sortes de Buglosse, ou de Langue de beuf commune. Les deux pre  
mieres sont appellées Buglosses satiuēs. La tierce Buglosse sauuage, ou Langue de brebis.

*Lycopsis.*

La grande Buglosse cultiuée.

*Anchuse genus.*

La petite Buglosse cultiuée.



# 6 De la Buglosse ou Langue de beuf. Chap. III.

## LA FORME.

La premiere espece que nous appellons grande Buglosse fatiue, a les feuilles longues, aspres, verdâtres, houlfues & piquantes, pres semblables à celles de la Laitue, mais plus longues, & plus agues par le bout. La tige aspre, houlfue, haulte de deux ou trois pieds, sur laquelle croissent plusieurs belles fleurètes, chacune diuisée en cinq, semblables à petites roues, de couleur de pourpre clere au commencement, puis apres azurées. Quand elles sont tombées, on void aux gosies houlfues trois ou quatre grains longs & gris & pleins de rides & frôles. La racine longue, noire & par dehors.

La petite Buglosse fatiue est semblable à la premiere quant à la tige & feuilles ainsi houlfues & aspres, & quit à la racine, mais en toutes choses beaucoup moindre, car elle a les brèches plus courtes & les feuilles plus petites & plus estroites. Les fleurs semblables à l'autre, mais plus petites & de couleur plus perle. La graine semblable à l'autre, sinon qu'elle est plus petite & plus noire.

La Tierce espece sauvage, est semblable à la seconde, excepté les feuilles plus aspres, plus petites & estroites. Les fleurs comme celles de dessus beaucoup toutesfoys plus petites, bleutés. La semence petite & brune. La racine longue & menue.

## LE LIEU.

La grande Buglosse fatiue, croist d'elle mesme en aucuns lieux, comme en Lorraine pres Nancy es lieux champêtres & gras, entre le blé. En ce pais elle ne croist qu'aux jardins.

La seconde espece croist en assez grand abondance en aucuns lieux d'Allemagne par les champs. Elle n'est icy guere cogneue, & se trouue seulement en aucuns jardins.

La sauvage croist par tout ce pais en terre maigre & sablonneuse.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en Iuin, Juillet, & Aoust, & produisent leur semence quant & quant.

## LES NOMS.

Ces trois herbes sont appellées aux boutiques toutes d'un nom Buglossa, ou Lingua bovis: en François Buglosse ou Langue de beuf: en haut Aleman *Wichsenzang*: en bas Aleman Buglosse & *Wissentonghe*: combien toutesfoys qu'elle ne soit point la vraye Buglosse. Car la vraye est nostre Bourrache tesmoing Leoniceus, Marardus, & plusieurs autres gens sçauans de nostre temps, comme nous dirons cy apres.

La premiere espece se nomme en Grec *Αίχισσα*: en Latin *Lycopsis*: aux Boutiques de ce pays Buglossa & Buglossa domestica maior, c'est à dire Buglosse domestique la grande.

La seconde est vne espece d'Anchusa & semble à voir la seconde espece appellée en Grec *Αρχισσα ἀκκιβιάσσορ ηὐα ὀρχανέτις*: en Latin *Anchusa Albidiana* & *Onochetes*. Ce semble la seconde espece d'Anchuse ou Orchanette.

La troisieme est sauvage, laquelle on pourra appeller *Lycopsis sylvestris*. Les Apoteichaires la nomment Buglossa sylvestris. Les François Buglosse ou Langue de beuf sauvage. Les bas Allemans wilde *Wissentonghe* & aucuns *Scarpsonghe*, c'est à dire Langue de brebis.

## LE TEMPERAMENT.

La racine de la grande est quelque peu froide & seche, tirant sur le temperé.

La seconde & tierce sont de pareil temperament, mais vn peu plus chaud.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A La racine de la grande pilée & meslée avec huile & cire, est vile contre eschaudures, playes, & viceres vielles. Avec fine farine de froment, elle guerit le feu sacré, ou le feu S. Anthoine qu'on appelle. Et avec vin aigre, les demangeaisons & gratelles chaudes.

*Lycopsis sylvestris.* Buglosse sauvage.



# De Echium ou l'herbe aux viperes. Cha. IIII. 7

La seconde espece a grand efficace contre tout venin de bestes sauvages, principalement contre B  
tre celuy des serpens & viperes, en quelle sorte que vous la prenez, soit en boue, soit en menger,  
ou portee sur soy.

La racine de la sauvaige beue avec hyssope & creillon tue & iette hors les vers platz engendrés C  
au corps humain.

Les Medecins modernes dient qu'elles confortent & allegent le cœur dechallans toute fache D  
rie, la fatigue principalement. Et que les fleurs iettées au vin, ou reduittes en confesue resiouissent  
fort ceux qui sont tristes, fachés, angoisieux, & melancholiques.

## De Echium ou l'herbe aux viperes.

## Chap. IIII.

Echium, sive Aleibicum.

L'Herbe aux viperes.

### LA FORME

Echium a les fueilles longues, aspres & houl-  
sues, asses semblables à celles de la Buglosse,  
mais plus petites que celles de la premiere Bu-  
glosse. La tige aspre, pleine de petites branchet-  
tes chargées à chacun costé de plusieurs fueillet-  
tes estroittes, verdattes & aigues, esparées cōme  
petites plumes, & fort petites vers le sommet de  
la tige: entre lesquelles sont fleurs perses du com-  
mancement, puis quand elles fouurent, azurées,  
longues & creuses, ayans quatre ou cinq filetz  
bleus: en rié semblables aux fleurs des autres Bu-  
glosses, sinon de couleur. Apres que la fleur est  
tombée. La semence est noire & petite, resem-  
blant à la teste d'une vipere. La racine longue  
& droicte, rouge par dehors.

### LE LIEV.

Elle vient en lieux gras & pres des voyes, &  
en pais fertile comme autour de Brusselle, Lou-  
vain, & autres lieux de Brabant.

### LE TEMPS.

Elle fleurist bien pres tout le long de l'esté, &  
porte fouvent sa semence, comme les autres Bu-  
glosses.

### LES NOMS.

Elle se nomme en Grec *ἔχιον* & *ἀλιβιάριον*  
en Latin *Aleibicum*. Apuleius l'appelle *ἔχιδνιον*  
*ἰχθυόεν* en Grec: *Viperina* & *Serpentaria* en  
Latin, cest à dire en François l'Herbe aux vipe-  
res & l'Herbe aux serpens: incognue aux Boutiqs.

### L'OCCASION DV NOM.

Ceste herbe a prins son nom *Aleibici* & *Alci-  
biadion*, du *bō Aleibius*, lequel a trouué premier  
en icelle, remede contre toutes morsures de ser-  
pens. Car ce mme dit Nicander l'ancié, *Aleibius* dormant fut frappé d'un serpens: parquoy s'eueil-  
lant & voyant ceste herbe, il la print en sa bouche & macha, auallant le jus d'icelle, puis mit l'her-  
be ainsi machée sur la playe, & fut gueri. Les autres noms comme *Echion*, *Echidnion*, *Viperina*  
&c. qui vallent autant à dire en François que l'herbe aux viperes, luy ont esté donnees pour ce  
qu'elle est tresutile contre morsures de serpens ou viperes, & que sa graine ressemble à la teste  
d'une vipere.

### LE TEMPERAMENT.

Elle est de mesme substance que la Buglosse: vn peu plus chaude & plus subtile.

### LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine boulie en vin & beue, non seulement donne ayde à ceux qui sont frappés de serpens, A  
mais aussy apres en auoir vsé en ceste sorte, elle engarde, qu'on n'en soit frappé. Parcille vertu ont  
aussy les fueilles & la semence.

Elle apaise la douleur des reins.

Item, si on la prend avec du vin ou autrement, elle fait venir force lait aux femmes.



Cynoglossos altera Plinij.  
Langue de chien vulgaire.

## LA FORME

LA Langue de chien vulgaire, a la tige aspre & rude, rōde, brune, haute de deux ou trois pieds: Les feuilles longues, asses semblables à la grande Buglosse fatiue, plus estroites, plus petites, & point afpres, mais chennues & velues. Au bout des branches elle produit beaucoup de fleurs, de couleur de pourpre obscure. La fetnece platte, aspre, trois ou quatre grains près l'un de l'autre, lesquels s'attachent aux vestemens quand ilz font meurs, comme la graine d'Agri-moine, & autres semences afpres. La racine longue, grosse, & noire par dehors.

## LE LIEV.

Elle croist quasi par tout es lieux non cultivés & sablonneux, pres des voyes & grans chemins.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Juin, & la semence est meure en Juillet.

## LES NOMS.

Elle se nomme en Grec κυνγλωσσος ητοι κυνός γλωσσος: en Latin & es Boutiques Cynoglossum, Cynoglossa & Lingua canis: en François Langue de chien: en haut Aleman Hundszung: en bas Aleman Hondstonghe. C'est la seconde espece de Cynoglossa, de laquelle Pline fait mention au cha. 8. du lib. 25. Il semble aussi q̄ ce soit vne espece de Isatis syluestris que lon trouue descrite en aucuns exemplaires de Dioscoride, au chapitre de Isatis.

## LE TEMPERAMENT.

La Langue de chien, principalement sa racine, est froide & seche, plus froide que la grande Buglosse fatiue.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de la Langue de chien est fort bonne à guérir playes: on l'applique vtilemet sur le feu volage, quand elle est broyée avec farine d'orge.
- B L'eau, ou le vin auquel elle a esté boulie guerit vieilles viceres, playes, & inflammations, & est singuliere aux vlcères & mal de la bouche.
- C Pour les mesmes, on en fait vn vnguent en ceste sorte. on boulit le jus d'icelle avec miel rosat, puis quand il est asses bouli, on y melle de la terbenthine la remuant bien fort, puis on l'applique sur les playes.
- D La racine cuictē, & mise au fondement guerit les hemorrhoides interieures.



## De la Bourrache Chap. VI.

## LA FORME.

LA Bourrache a les feuilles afpres, espin euses ou piquantes, larges, noiratres, se baiffans vers terre, & ressemblans à la langue d'un beuf ou d'une vache. La tige aspre, rude, de la hauteur de pied & demy, elle se fend au sommet en plusieurs branchettes portans la fleur belle & plaisante, faite en maniere d'estoille bleuë ou azurée, aucunesfoys blanche. La graine noire deux ou trois en chacune gosse comme la Buglosse vulgaire, plus petite & plus noire.

Il se trouue encor vne espece de Bourrache qui dure tout l'hyuer, comme la Buglosse commune: au reste, semblable à la Bourrache deuant dictē, de forme, odeur, saveur, & de vertus.

## LE LIEV.

Elle croist par tous les iardins, & en lieux sablonneux & champêtres.

## LE TEMPS.

Elle commence à fleurir en Juin & demeure florissant tout l'été.

## LES NOMS.

Les Anciens l'ont appelée en Grec *Βούραχος* ou *βουραχισ* en Latin *Lingua bubala*, *Libanum*, ou *Lingua bouis*, c'est à dire Langue de bœuf ou de vache. Plin la nomme *ιουφρασιου* pourtât qu'elle faict les gens ioyeux. Les Apothicaires *Borago*: en haut Aleman *Burretsef*: en bas Aleman *Berttagie* ou *Bonnagie*.

## LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & humide.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

On trouve par escript que si on jette la Bourrache, ou ses fleurs au vin, puis on le boyue, elle faict les gens gaillars & ioyeux, & chasse toute tristesse, jacherie & melancholie.

Bourrache cuicte en eau miellée est fort vile contre l'apreté du gozier.

Dioscoride escrit avoïr ouy dire, que si on broye la Bourrache ayant trois tiges ou branches, avec sa racine & semence, puis on la balle à boyre, qu'elle est de grand efficace contre la fièvre tierce. Pareillement celle qui a quatre branches a couffré comme celle de dessus, contre la fièvre quarte.

## D'Anthyllis Chap. VII.

## LES ESPECES.

Anthyllis est de deux sortes selon Dioscoride. L'une peut estre appelée Anthyllis la grande. L'autre, Anthyllis la petite.

## LA FORME.

- 1 La premiere n'est guere differente à la Lentille, de tige & sucilles, sinon qu'elle est plus blanche, plus molle, & plus petite. La tige haute d'un pied, blanche & douce, ayant sucilles estendues, blanches & molles, plus petites & plus espesses que les sucilles de la Lentille. Les fleurs amassées ensemble au sommet de la tige, de couleur jaune ou palle. La semence est contenue en petites gosses. La racine menue & ligneuse.
- 2 La seconde n'est guere differente de l'hye musquée. Elle a cinq ou six rameaux ou davantage, gressés, se trainans par terre, reuestus de sucilles estroites, petites, espesses, d'entre lesquelles & les rameaux sortent fleurettes purpurées avec la semence. La racine gresse, l'ongue d'un doit. Toute l'herbe est plaine de seue & toute salée comme *Tragus*, duquel nous parlerons cy apres.

## LE LIEU.

Elle croist en lieux salés & sablonneux, comme en Zelande du long la plage, là ou elle est frequente.

## LE TEMPS.

Elle fleurist en Juin. La semence est meure en Juillet.

## LES NOMS.

- 1 La premiere espece est appelée de Dioscoride en Grec *ανθυλλίς*. Nous l'avons appelée Anthyllis premiere à la difference d'Anthyllis la petite. Plin l'appelle en Latin *Anthyllon*, *Anthyllon* & *Anthycellon*. Inconnue aux Apothicaires. Aucuns Arboristes la nomment *Glaudiola*, lequel mot est tiré de ce nom *Glaux*, & le tiennent pour *Glaux*, combien toutesfoys que ce ne soyt le vray *Glaux*.



*Anthyllis prior.*  
La grande Anthyllis.

*Anthyllis altera.*  
La petite Anthyllis.



La seconde s'appelle en Grec *Ανθύλλη ἄτερη* en Latin *Anthyllis altera*, à la différence de la première. Aucuns modernes l'appellent Borda. C'est vne espèce de Kali ou Alkali comme nous dirons plus amplement au Chap. LXXVI.

#### LE TEMPERAMENT.

Elle est sèche & propre à rejoindre playes.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Si on en boyt vne demy once: elle est de grande efficace contre la pissé chaude, strangurie ou difficulté d'vriner, & douleur de reins.
- B Desinée avec lait & huile rosé, est vtile à la matrice chargée d'humeurs froides.
- C Pareillement elle guerit playes mise dessus simplement, ou mêlée avec vnguet ou huile.

#### Du Glouteron.

#### Chap. VIII.

#### LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Glouteron en ce pais: L'une, est le grand Glouteron ou Gletteron: L'autre, le petit Glouteron, lesquels Dioscoride a décrit à part. Nous les auôs toutesfoys compris sous vn meisme chapitre, tant pour la similitude du nom, que de la forme.

#### LA FORME.

Le grand Glouteron a les feuilles fort larges & longues, plus grandes que celles de la Courge, & de couleur brunverde, & grisâtres du costé qui regarde la terre. La tige ronde, creuse, blanchissante en rouge, ayant plusieurs rameaux & branches collaterales ornées de petites feuilles: sur les branches croissent petites pelotes rondes garnies de petitz crochets, dequelz elles s'attachent aux robbes & s'ouurent en la fin & iettent vne fleur rougeâtre, velue. La racine simple, longue, noire par dehors, blanche par dedens, & amere.

Le petit Glouteron a les feuilles grisâtres semblables à Arroches, crenées tout à pentour. La tige haute de pied & demy, pleine de taches noires, se diuisent en plusieurs nœuds. Entre les feuilles & icelles sont trois ou quatre petitz gletterons amassés ensemble, longuetz comme vne petite olive, ou

*Arcium sine Persona.*  
Le grand Glouteron.

*Xanthium.*  
Le petit Glouteron.



ue, ou cornille, espineux, s'attachans aux vestemens. Au milieu d'iceux fort vne petite couronne, vn petit plus haute que les gletterés, sur laquelle croissent petites fleurs, lesquelles perissent apres estre ouuertes, & tombent avec leur couronne: puis apres sortent les petits Gloutérons ayans la graine longue: lesquels tontefois ne s'ouurent & ne fleurissent autrement que nous auons dict. La racine est rouge pleine de filez ou fibres.

## LE LIÈV.

Les Gloutérons croissent volontiers pres des voyes, & au bord des champs es lieux non cultivés, & fosses dessechées.

## LE TEMPS.

Leur s'ayson est en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

- 1 Le grand Glouteron s'appelle en Grec ἀρκίον ἢ ἀρκίον πρὸς ἀνθρώπων Latin *Personata*, *Personata* & *Arcium*: d'Apulie *Dardana*: es boutiques *Bardana maior*, & *Lappa maior*, c'est à dire Bardane la grande, & *Lappa grande*: en haut Aleman *Grosßletten*: en bas Aleman *groote Lissen*.
- 2 Le petit se nomme en Grec ξάνθιον ἢ φάρμακον Latin *Xanthium*: es Boutiques *Lappa minor* & *Lappa inuersa*, c'est à dire *Lappe petite* & *renuersée*: en haut Aleman *Bettlere krusz* & *spitz letten*, c'est à dire *Poux de belitres* & *glouteron aigu*: en bas Aleman *cleys Lissen*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Gloutérons ont la vertu de dessecher & consumer ou dissoudre: mais le petit est plus chaud.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- 1 Le ius du grand Glouteron beu avec miel pronoque l'vrine, & appaise les douleurs de la vessie. A  
Le mesme beu avec vin viel guérit toutes morsures & piqures de bestes venimeuses. B

On ap-

On applique vtillement les feuilles pilées avec vn peu de sel sur morsures & piqures de serpens, de chiens enragés, & d'autres bestes venimeuses.

La semence mise en poudre & prise avec le meilleur vin qui se puisse trouuer, par l'espace de quarante iours est fort prouffitabile à ceux qui ont la Sciatique.

Vne drachme (qui est la huictiesme partie d'vne once) de la racine pilée avec noyaux de pomme de pin, puis beuc, est medecine souveraine pour ceux qui crachent sang, & matiere purulente.

Elle ayde grandement ceux qui ont douleur aux ioinctures, prouenant de ce q̄ lesdictes ioinctures, & os ont esté autrefoys rompus ou blessés.

Les feuilles verdes broyées avec œufz, puis appliquées, guerissent brulures & vices gros enuieillis.

Leius du petit Glousteron beu avec vin blanc est fort prisé contre morsures de bestes venimeuses, & pareillement contre la pierre & gravelle.

Le fruit pilé & mis sur enflures ou œdemes est fort vtile car il consume & disipe toutes humeurs froides.

## De l'Armoise.

## Chap. IX.

## LA FORME.

*Artemisia communis.* Armoise commune.

L'Armoise a les feuilles larges fort dechiquetées, assez semblables à celles de l'Aluïne, plus petites, principalement celles qui sont au tour de la tige, brunverdes par haut & grisâtres par dessous. La tige longue & droicte fort branchue. Les fleurs sont petis boutons ronds, croissans le long des branches comme à l'Aluïne, ayans l'odeur, quand ilz commencent à meuir, aucunement semblable à la Marioleine. La racine ligneuse & fibreuse. Il y a deux sortes de ceste herbe différentes seulement en couleur. L'vne a les branches & fleurs rouges, & se nomme Armoise rouge. L'autre a les branches verdâtres tirantes sur le blanc, & s'appelle Armoise blanche au reste du tout semblables l'vne à l'autre.

## LE LIEV.

L'Armoise croist aux bords des chéps, pres des voyes, & souuent aux riuages des eaux coyes.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Juillet, Aoust, aucunesfois plus tard.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appellée en Bontiques *Artemisia*, & d'aucuns *Mater Herbarum*: en François Armoise, L'herbe S. Ian: en haut Aleman *Beyfuss*, *Buchen*, & *Joßhans gurte*: en bas Aleman *Bynnet* & *Sint Jans eruyt*, Laquelle est ceste espece d'Armoise qui se nomme en Grec *Αρτεμισια*: en Latin *Artemisia tenuifolia*, qui est la quatriesme espece en Dioscoride, & la troisieme en Apuleie.

## LA CAUSE DV NOM.

L'Armoise comme dit Pline, a pris son nom d'Artemisia Royne de Halicarnassus femme de Mausolus Roy de Carie, qui choisit ceste herbe & luy imposâ son nom, car au parauant elle s'appelloit Parthenis, c'est à dire Virginal: Aucuns disent qu'Artemisia a esté ainsi nommée de la Deesse Diane qui s'appelle aussi Artemis, & ce à cause que ceste herbe est fort singuliere aux maladies des femmes, lesquelles selon les Payens sont sous la tutelle de Diane.

## LE TEMPERAMENT.

L'Armoise est aucunement adstringente, & non pas par trop chaude.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

L'Armoise pilée avec huile d'amandes douces, & mise en forme d'emplastre sur bestomach, le gue-





le guerit de toute peine & douleur.

Pareillemēt si on oynt les ioinctures, du ius d'icelle meslé avec huile rosat, elle guerit douleur, B  
tremblement, & contraction des nerfs.

Si on la pend ou iette dedans les tonneaux de biere, elle engarde que la biere ne deuiene C  
aigre.

Qui porte l'Armoise sur soy (comme dit Pline,) nulle beste venimeuse, ou chose semblable ne D  
luy peut nuire, & sil va par chemin il ne se peut lasser.

## De l'Athanasie.

## Chap. X.

## LES ESPECES.

L'Athanasie est de deux sortes. L'une grande, & isulne; L'autre petite, & blanche.

*Tanacetum maius.*  
Athanasie grande.

*Tanacetum minus.*  
Athanasie blanche.



- 1 La grāde ou vulgaire Athanasie a la tige noiratre, haute de trois ou quatre piedz, se partissant au sommet en plusieurs branchettes, au bout desquelles sont esmouchettes rondes, produisantes petites fleurs boutonnées, semblables à la fleur du milieu de la Camomille, mais plus grandes, & d'odeur plus forte. Les fueilles longues, composées de plusieurs fueillettes situées l'une à l'opposite de l'autre, & espandues comme ailes, lesquelles sont aussi déchiquetées, principalement au tour des bors. La racine gresse, se jettant çà & là.
- 2 La petite Athanasie a les fueilles larges, fort incisées, asses semblables aux fueilles de l'Espargoutte, mais plus petites & plus decoupées. La tige menue, de la hauteur d'un pied ou davantage, sur laquelle croissent petites esmouchettes, produisans fleurettes blanches, fort semblables aux

fleurs & éfmouchettes de la millefeuille vulgaire. La racine dure, & aucunesfois partie en deux ou trois. Toute l'herbe est fort semblable d'odeur & de saveur à l'autre Athanasie, sinon qu'elle est moins forte.

## LE LIEV.

La premiere croist pres les chemins, hayes, & aux bors des champs. Elle est fort commune en ce pays.

La seconde croist en aucuns lieux d'Italie: en ce pays on la trouue plantée és jardins des Amateurs des herbes.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes deux en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

La premiere espece se nomme maintenant és Boutiques *Tanacetum* & *Athanasia*: en François Athanasie, en haut Aleman *Reisfarw*: en bas Aleman *Reisfarw* & *wormeneyt*. Aucuns personnages sçauans la tiennent pour la tierce espece d'Armoise, appellée en Grec *ἀρtemisia monodon*: et en Latin *Artemisia uincalis*, d'Apuleie *Artemisia Tragantes*, ou *Tigettes*.

La seconde est sans doute aussi vne Athanasie, laquelle aucuns sçauans, & principalement le tresfameux Matthiolas de Siene, estiment que soit la vraie Achillea, appellée en Grec *ἄχιλλαιον*. Mais si ceste herbe est la vraie Achillea, la vulgaire Athanasie sera aussi sans doute vne espece d'Achillea, car elles se ressemblent fort toutes deux, soit d'odeur, soit de saveur, soit de vertus & operations.

## LE TEMPERAMENT.

L'Athanasie est chaude au deuxiesme degré & seche au tiers degré, comme bien demontre la forte odeur, & saveur amere d'icelle.

La petite Athanasie est de mesme faculté.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La graine de l'Athanasie est medecine singuliere, & experimentée contre les vers. Car en quel le forte que vous la prenes, elle tue & chasse hors les vers.
- B Icelle pilée puis bien meslée avec huile, est fort proufitable contre douleurs & enflures des nerfs.
- C Si du jus d'icelle meslé avec huile rosat, on oint le corps auant l'acces des fieures, elle les fait perdre.
- D Le mesme beu avec vin, est fort vtile cõtre douleur de la vessie, & quand on ne peut passer que goutte à goutte.
- E La racine cõfite en miel & prise, aide fort ceux qui ont les gouttes aux pieds.

Parthenium. Espargoutte.



## De l'Espargoutte. Chap. XI.

## LA FORME.

l'Espargoutte a beaucoup de fucilles, tendres, fort incilées, de couleur de cendre ou grisâtres, semblables en forme & couleur aux premières & plus basses fucilles de Coriandre. Les tiges hautes de deux ou trois pieds, sur lesquelles croissent plusieurs fleurettes, isulnes au milieu, & blanches à l'entour, semblables aux fleurs de la Camomille, d'odeur forte, & saveur amere: quâd les fleurs se passent, elles sont pleines de semence comme celles de la Camomille. La racine ligneuse, aiant plusieurs filandres pendues.

## LE LIEV.

Elle croist volontiers en lieux secs, pres vieilles murailles, & lieux semblables, rudes.

## LE TEMPS.

l'Espargoutte fleurit en Juillet & Aoust & bien pres le long de l'été.

## LES NOMS.

Elle se nomme en Grec *παραθήριον*, de Galien & Pau

& Paulus *apocryphus*: en Latin *Paribenium* & *Amarœus*: és Boutiques, & en Scrípio chap. 13. *Marris caris*, d'aucuns *Amarœlla*: en François Espargoutte ou Matricaire: en haut Aleman *Wetterkraut* & *Weid* *Stumen*: en bas Aleman *Weter* & *Wordercruyt*.

## LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude iusques au tiers, & seche iusques au deuxiesme degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

L'Espargoutte seche & mise en poudre, puis en prédre deux drachmes avec miel ou autre chose, purge par bas la melancholie, & phlegme: parquoy elle est fort vtile à ceux qui ont tournoyemens de teste, & aux astmatiqs, & melicholiques, & à ceux qui sont tristes & pefans sans mot dire.

Icelle sans ses fleurs bousie en eau & beue est profitable aux pierreux.

Elle est aussi fort bonne contre suffocations de matrice, cuite en vin, puis mise sur le nombril, sur le cœur, ou sur le costé.

Pareillement la decoctiõ est fort vtile aux femmes qui ont la matrice endurcie, chargée ou enflée, si elles se baignent ou demeurent assises dedans.

On applique vtilement l'Espargoutte verde estampée avec ses fleurs sur le feu volage, & autres phlegmons.

## Du Pas de cheual.

## LA FORME.

LE Pas de cheual a les fueilles grandes, larges, aiens plusieurs coings, & mout de veines semblables au pied d'un cheual, six ou sept fortans d'une mesme racine, blâchâtres, & grisâtres du costé qui regard de la terre, & verdes de l'autre costé. La tige blanche & lanugineuse, ou velue, d'une paume de haut, au bout desquelles sont belles fleurs iaulnes, pleines, qui perissent soudain, & se tournent en papillotes. Lesquelles comme le Pissenlit sepuellent au vent. La racine blanche, longue, se trainant ça & là.

## LE LIEV.

Le Pas de cheual croist volutiers en lieux aquatiques, & champs humides.

## LE TEMPS.

Elle produit au commencement de Mars & d'Auril, la tige lanugineuse, sans aucunes fueilles, sur laquelle est la fleur iaulne: incontinent apres, fortent les fueilles de la racine: alors perissent la tige & les fleurs, tellement que peu souuët on trouue les fueilles & fleurs tout ensemble.

## LES NOMS.

Elle se nomme en Grec *Styxus*: en Latin *Tusilago*: és Boutiques *Farsara* & *Vingula Capellina*: en François Pas de cheual, d'aucuns Pas d'asne: en haut Aleman *Kofshub* ou *Brandfattich*: en bas Aleman *Hoefblader*: en Peerdic *chanta*, *Viene fat toute*, & *S. Carjino cruye*.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles verdes & fresches, sont humides, mais quand elles sont seches, elles deussent acres, & à ceste cause desechantes.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les fueilles de Pas de cheual encores verdes broyées avec miel, puis induictes guerissent le feu sacré, & toute sorte d'inflammations.

Le parfum dicelles seches mises sur charbons visz, receu en la bouche par le trou d'un entonnoir, guerit la toux seche, & ayde à ceux qui soupirent continuellement, &rompt sans aucune difficulté les apostemes ou absces de la poitrine.

Pareille vertu a aussi la racine brulée, si on en recoit la fumée en la bouche.

## • Chap. XII.

*Brechion, Tusilago.* Pas de cheual,



## LA FORME.

Petalées. L'Herbe aux tigneux.

L'Herbe aux tigneux a les fueilles grandes, rondes, du commencement semblables aux fueilles du Pas de cheual, lesquelles puis apres deviennēt si grādes q̄ d'vne fueille on pourroit couvrir vne petite table ronde, biē verdes d'vn costé, blanchatres de l'autre. La tige creusē enuiron vne paume de haut, pleine au sommet de petites fleurettes incarnées, fort amassées ensemble, lesquelles sans produire aucun fruit̄ perissent avec leur tige. La racine grosse, blanche par dedēs & creusē, de forte odeur, & de goust amer.

## LE LIEV.

Elle croist voluntiers en lieux frais & humides, pres des riuieres & ruisseaux.

## LE TEMPS.

Les fleurs se monstrent au commencement de Mars, & perissent en Auiil: puis apres fortent les fueilles, qui durent tout l'esté.

## LES NOMS.

On l'appelle en Grec πινωρίσις: en Latin Petasites, incognue & Bontiques: en François Herbe aux tigneux: en haut Alemā Pessilērys maury: en bas Aleman Wochebladeren & Pessilēntie mostel.

## LE TEMPERAMENT.

L'Herbe aux tigneux est seche au tiers degré

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A L'Herbe aux tigneux, seche & mise en poudre, puis beue en vin, est souveraine medecine contre la peste, & feures pestilēntiales, pour ce quelle faict suer, & à ceste cause elle chassē ariere du cœur tout venin, & mauuaise chaleur. Elle tue les vers, & est de grande efficace contre suffocations de matrice prise en la mesme sorte.
- B Elle guerit aussi tous viceris malings, & rongeurs ou phagedeniques, & inflammations, si on met la poudre dedans.
- C La mesme guerit le farcin des cheuaux, en quelle maniere qu'elle soit mise en œuvre, soit qu'elle soit donnée par dedens, ou quelle soit induite par dehors.



## De la Bistorte.

## Chap. XIII.

## LES ESPECES.

LA Bistorte est de deux sortes, comme Leonard Fuchs & Hieromme Bock hommes tresçaus de nostre temps escriuent: L'vne appellēe Bistorte la grande, & l'autre Bistorte la petite.

## LA FORME.

La grande a les fueilles longues semblables à la Parelle, plus petites & non pas si vnies, mais vn peu ridées, & retirées, d'vn costé de couleur verd obscure, du costé de deuers la terre bleu verd. La tige longue, polie, & tendre, ayant au sommet vn espi de petites fleurettes incarnées, amassées ensemble. La semence anguleuse & brune. La racine longue, grande, tortue, & recoquillée en vn, noire par dehors & fibreuse, rougeatre par dedens, ayant le goust d'vn gland.

La petite est semblable à la premiere de fueilles, espi, fleurs, semence & tige, mais plus petite, & ayant les fueilles plus polies & vnies. La racine plus courte, plus recoquillée en vn, sans aucunes fibres, brunes par dehors, d'vn rouge obscur par dedens, semblable en faueur à la premiere.

## LE LIEV.

Elles croissent voluntiers en lieux humides & aqueux, en prairies & bocages fort ombrageux.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en May & Iuin.

## LES NOMS.

Les gens doctes appellent ces herbes *Bistorta*, & *Serpentaria*: en François Bistorte: en haut Aleman

*Bistorta maior.*  
Grande Bistorte.

*Bistorta minor.*  
Petite Bistorte.



Aleman *Qatertourty* : en Brabançon *Sertstonghen*. Il semble que ce soit le *Dracunculus Latinorum* Plinij.

- 1 La premiere est appellée d'aucuns en Latin *Colabrisa*, & de Leonard Fuchs *Qatertourty* ou *Colin*, c'est à dire Serpentaire femelle: en bas Aleman *groote Sertstonghe*.
- 2 La seconde & petite Bistorte, se nomme par le mesme Fuchs *Qatertourty* menle, c'est à dire Serpentaire male.

#### LE TEMPERAMENT.

La Bistorte refroidie & seche au troisieme degré.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

La racine de Bistorte bouillie en eau ou vin & beue, arreste le flux de ventre & est bonne à A ceux qui ont la dysenterie.

Elle arreste aussi les fleurs aux femmes qui coulent par trop, & en trop grande abondance, & B tout autre flux de sang.

Pareillement si on la prend comme dessus, ou si on la met en poudre & boit en vin rouge elle C oste l'appetit de vomir.

La decoction des fueilles, est fort vtile contre toutes vlcères & inflammations de la bouche & D du gozier, & affermit les dens, si on la tient souuent en la bouche.

#### De la Fumeterre.


#### Chap. XV.

#### LES ESPECES.

LA Fumeterre est de deux sortes comme Plin e scrit au 13. chap. du 25. liure de son histoire: La premiere est la Fumeterre vulgaire qui seule est cognue & vtiurpée en medecine par Galien, Paulus, & autres mdecins Grecs: La seconde est vne autre herbe seulement cognue de Plin: lesquelles deux se trouvent en ce pais,

*Capnos fumaria.*  
Fumeterre.

*Capnos* { *Plinij.*  
          { *Phragmites.*  
Pied de geline.



#### LA FORME.

La Fumeterre vulgaire a la tige quarrée, reuectue de petites fueilles, tédres, molles, fort decou pées, & de couleur de cendre. La fleur petite, amassée ensembble, purpurée, laquelle se tourne en petis boutons, dans lesquels est fort petite semée. La racine seule, ayât bien peu de petites fibres.

Le pied de geline, a aussi beaucoup de branchettes tédres, sur lesquelles croissent petites fueil les incisées, de couleur, faueur, & aussi aucunement de forme semblables à la Fumeterre deuant dicté: Elle a aussi aucuns filetz & clauicules par lesquelles elle s'attache fermement par tout aux hayes & autres herbes. Les fleurs petites & amassées en vn, blanches, ayans quelque peu de pers entremelé, apres lesquelles prouiennent petites gosses, dans lesquelles est contenue la graine. La racine vniqye, de la longueur d'vn doigt.

#### LE LIEV.

La Fumeterre croist volontiers és bleds & orges, aux iardins à la porée, és vignobles, & sem- blables lieux à l'abry.

Le pied de geline croist sous les hayes, aux bors des champs & pres des vieilles murailles.

#### LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes deux en May & Iuin.

#### LES NOMS.

La premiere de ces herbes, se nomme en Grec *καπνός, καπνός, καὶ καπνίτης*: en Latin *Fumaria* & *Capnos*: és Boutiques *Fumaria terre*: en François *Fumeterre*: en haut Aleman *Erdtraach*, *Tau* *benecroff*, *Harsenohsel*: en bas Aleman *Gryscorn*, *Duyucherael*, & *Erdtrooch*.

La seconde est appellée de Plin *Capnos*, & *Pes gallinaceus*: pour ceste cause nous l'auons ap- pellée *Capnos Plinij*: & est celle q' Hermodas appelle *καπνός φραγμίτης*: aux Boutiques incognue. Nous la pourrons appeller en François *Pied de geline à l'imitatiō de Plin*: en bas Aleman *clays* *Erdtrooch*.

## LE TEMPERAMENT.

La Fumeterre est chaude & sèche, bien pres du deuxiesme degre: Aussi est le Pied de geline comme on peut cognoistre par son acrimonie & amertume.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 Le ius de la Fumeterre mis aux yeux, aiguise la veue & la rend plus claire, iceluy meslé avec A  
gomme & induict sur les paupieres, cause que le poil vne fois arraché ne reuient plus.  
La decoction beue chasse par les vrines & par la chambre toutes humeurs chaudes choléri- B  
ques, adustes, & pernicieuses: outre ce elle est fort prouffitabile contre la gratelle, & contre vice-  
res malings, & la grosse verolle.  
Le mesme fait le ius d'icelle beu, & est en cest endroit de plus grande efficace que la deco- C  
ction de Fumeterre.  
2 Le Pied de geline (comme dit Pline) est de mesme faculté & vertu que l'autre Fumeterre: & D  
est singuliere medecine contre debilité de veue, quand il semble qu'on voye des festus, si on met  
le ius dedens les yeux.

## De la Germandrée.

*Chamædrys.*  
Germandrée.

## Chap. XVI.

*Chamædrys femina quibusdam.*



## LA FORME.

1 Germandrée est vne herbe basse, enuiron vne paulme ou vn pied de haut, produisant de sa ra-  
cine plusieurs branchettes tendres, les feuilles petites & tendres, crenées à l'entour, fort sem-  
blables aux feuilles d'aucuns chesnes, mais beaucoup plus petites. Les fleurs sont petites, de cou-  
leur perse obscure, enuironnans le sommet de la tige. La semence est petite, noire, & ronde. La  
racine tendre & gresse, se traînant sous la terre ça & là.

2 Outre ceste se trouue encore vne autre herbe, laquelle a aussi esté tenue d'aucuns pour vne  
espece de Chamædrys. C'est aussi vne herbe basse, ayant plusieurs branchettes veues. Les fueil

les velues, fort incisées & bien pres decoupées en forme de croix. Les fleurs perses, croissans autour de la tige en forme de couronne, lesquelles apres estre cheutes, produisent en petites rondes gouffettes, la semence noire & ronde. La racine est epessee & fort fibreuse.

## LE LIEU.

La Germandrée croist volontiers es montaignes pierreuses, & lieux semblables, & aux bois. On la trouue en aucuns bois de Brabant, & plantée es iardins des amateurs des herbes.

L'autre se trouue aussi en lieux pierreux & semée aux iardins.

## LE TEMPS.

La Germandrée fleurist en Juin & Juillet.

L'autre herbe pareillement.

## LES NOMS.

La premiere s'appelle en Grec *χρυσάινος* Latin *Chamaedrys*, *Trinago*, & d'aucuns *Qereale minor* & *Serratalis* es Boutiques *Chamaedrys* en François Germandrée ou Chefnette: en haut Aleman *Gamanderlein* & *lilepn* *Bathengel*: en bas Aleman *Gamanderlejn*.

L'autre s'appelle d'aucuns *Chamaedrys femina*, c'est à dire Germandrée femelle, combien que toutesfois il ne se trouue es Anciens rien escrit de *Chamaedrys femina*. Aucuns autres en font *oxymorhge*: en Latin *Oximasitum*, avec laquelle elle semble auoir quelque similitude. Aucuns aussi en font la seconde espece de *Chamaedrys*, ce que pourroit estre vray, sil se lisoit ainsi en Dioscoride. *Alterum est Aiuiga genus cubitalibus ramis, folijs in ancora speciem incuruatis*, c'est à dire, il y a vne autre espece d'Aiuiga, aiant les rameaux d'vne coudée, les feuilles courbées en façon d'ancre, comme aucuns disent qu'il se doit lire. En aucuns lieux de France on l'appelle Iua moçhata.

## LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche au troisieme degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Germandrée avec ses fleurs boullie en eau & beué, oste les obstructions du corps humain, & incise les humeurs glueuses: pour ceste cause, ainsi vsurpée, elle est singulierement bõne à ceux qui ont la toux & courte haleine, & ont difficulté d'vrine, & comencent à deuenir hydropiques.
- B Elle esmeut & fait venir les fleurs aux femmes.
- C Si on la boit en vinaigre, elle est fort bonne contre duretés & obstructions de la ratelle.
- D Le ius des feuilles meslé avec huile, & induit sur les yeux, chasse les broquillas & obscurité d'iceux.

## De la Veronique. Chap. XVII.

## LES ESPECES.

LA Veronique est de deux sortes. L'vne est la vraye Veronique, laquelle se nomme Veronique masle: L'autre est vne herbe fort semblable à la Veronique, & est appelée Veronique femelle.

## LA FORME.

La Veronique masle est vne petite herbe se trainant par terre, ayant les branchettes rouges: tres velues. La feuille longueue, verdastre, vn peu velue, crenée tout au tour. Les fleurs tout au sommet des branchettes, petites, d'vn leger bleu meslé en pourpre. La graine contenue en tassettes larges. La racine menue & fibreuse.

Veronique femelle ressemble à l'autre, de feuilles, branches, & croisson, excepté que les feuilles sont plus verdes, non velues, & non crenelées. Les fleurs semblables à l'autre, se formans aussi en tassettes larges qui contiennent la semence.

## LE LIEU.

Veronique masle croist en lieux rudes & sablonneux, aux bors des champs & des bois.

La femelle croist en lieux humides, es prés & marés.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en Juin & Juillet.

## LES NOMS.

La premiere Veronique, est appelée de Paul Aegineta lib. 7. en Grec *Βερονικη*, c'est à dire en Latin *Betonica*: en apres le Docteur Guillaume Torner & moy l'auons appelée *Betonica Pauli*: Les communs Herboristes la nomment en Latin *Veronica*: en haut Aleman *Veronzeiß menslein* & *Grundhyrl*: en bas Aleman *Veronpysje manschen*.

La seconde est appelée *Veronica femina* des Latins: en François Veronique femelle: en haut Aleman *Veronzeiß welslin*: en bas Aleman *Veronpysje wiffhen*.



*Betonica Pauli.*  
*Veronica mas.*  
Veronique malle.

*Veronica faxina.*  
Veronique femelle



## LE TEMPERAMENT.

La Veronique est seche & vn peu chaude.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La Veronique (tesmoing Paul) est fort vile contre les opilations & douleurs des roignons. **A**

La decoctio de Veronique beue, reioinct toutes playes tant vieilles que nouvelles, & nettoie **B**  
le sang de toutes mauuaises corruptions, & humeurs pourries & adustes: Pour ceste mesme cause si on la boit elle est fort bonne aux rogneux, & ceux qui ont quelque mauuaise gratelle, la petite verolle ou picotte & rougeoles.

L'eau de Veronique distillee avec vin, & reiterée tant de fois iusques à ce quelle deuienne **C**  
rougeatre, est fort prisee contre la toux enuieillie, & secheresse & bleffures des poulmons: car on dit quelle peut guerir tous vlcères, inflammations & bleffures des poulmons.

2 La femelle est de mesme vertu, mais beaucoup plus debile, & moins propre que le malle. **D**

## De l'Yue musquée.

## Chap. XVIII.

## LES ESPECES.

1 IL y a trois sortes de l'herbe appellée en Latin *Chaussepitys*, semblables l'vne à l'autre en odeur & forme, comme dit Dioscoride.

## LA FORME.

1 La premiere espee de ces herbes, est vne herbe petite se trainant: les brâchettes courbées: les feuilles petites, estroictes, velues, d'odeur de pin ou sapin. Les fleurs petites, palles, iaunes ou blâches. La racine simple & ligneuse.

2 La seconde a ausi les branchettes brunes, velues & tendres, courbées comme vne ancre, enuis ron de pied & demy, se trainans par terre. Les fleurs de couleur blanche. La semence brune & ronds:

*Chamaepitys prima.*  
Yue musquée femelle.

*Chamaepitys tertia.*  
Yue musquée mâle.



ronde: toute l'herbe ressemble en odeur à la première.

La troisième est toute la plus petite, & a les feuilles petites, blanches, rudes, les fleurs inulnes; semblable aux autres en odeur.

#### LE LIEU.

Ces herbes croissent volontiers en lieux moutaigneux & pierreux: en ce pays, on les sème aux jardins.

#### LE TEMPS.

Elles fleurissent en Juillet & Aoust.

#### LES NOMS.

Ces trois herbes sont appellées toutes d'un nom en Grec *χαμαίπυτος*: en Latin *Aiuga*, *Abiga*, & *ibiga*: aux Boutiques *lva* & *lva Artetina*, ou *lva iosefata*: en haut Aleman *ye lenger ye licher*: en bas Aleman *Bett Lypaco*, & d'aucuns *Hoer langher Hoer steuer*.

#### LE TEMPERAMENT.

Elles sont chaudes au second degré, & seches au tiers.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Les feuilles de l'Yue musquée beuës en vin par sept iours, guerissent la jaunisse &, beuës par quarante iours en melicrat, elles guerissent la sciatique, cest à dire douleur de hanche.
- B Elle est aussi fort bonne contre obstructions de foye, & difficultés d'vrine, & fait venir aux femmes le flux menstrual.
- C La Chamaepitys verte pilée & meslée avec miel, puis mise sur grandes plaies & vlcères malings & pourris, les guerit.
- D Pareillement icelle verte pilée & mise sur les mamelles, dissout les durtés d'icelles.
- E Et ainsi acoustree comme dit est, & appliquée sur les morsures, ou piqures de serpens, viperes, & semblables bestes venimeuses, elle est grandement prouffitabile.
- F La decoction d'icelle beue dissout le sang espessy & grumelé. Et icelle boulie en vinaigre & puis

puis beuë fait icter hors l'enfant mort.

Si on frotte le corps de quelcun avec le ius d'icelle, elle fait fort suer.

Pareille vertu ont aussi les deux autres, mais elles ne font pas de si grãde efficace q̄ la premiere. G H

Du Cypres de iardin. Chap. XIX.

LES ESPECES.

ON trouue és iardins de ce pais deux sortes de Cypres, fort semblables l'vn à l'autre en figure.

LA FORME.

*Chanecyperissus.* Cypres de iardin.

1 Le premier & plus commun Cypres est vn arbrisseau ligneux aiant les branches droictes, sur lesquelles produisent fueilles petites, longues & rondes & decoupées. Au sommet des branches croissent fleurs belles, orangées, semblables à l'Athanasie beaucoup plus grandes toutefois. La racine ligneuse aiant plusieurs filletz pendans.

2 L'autre Cypres est fort semblable au premier, de tige, fueilles, fleurs, & figure, sinon que les branchettes sostenans les fueilles sont plus menues, couuertes de longues fueillettes: les fleurs plus pales & plus petites, & toute l'herbe n'est pas d'odeur si forte, mais pl<sup>us</sup> douce & amiable. LE LIEU.

Elles ne croissent en ce pais, sinon aux iardins ou elles sont plantées.

LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes deux en Juillet & Aoust.

LES NOMS.

1 Pline appelle ceste herbe en Grec *χαμαίαι παρίαριον*: & en Latin *Chanecyperissus*: Aucuns Modernes la nommēt *Santolina*: incognue aux Bouriques: en Aleman *Cypres*.

2 L'autre est aussi sans doute vn Cypres, & non pas Cedre comme aucuns l'appellent.

LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude, & fort seche.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

Pline escrit que le Cypres beu en vin, est fort vtile contre serpens, scorpions & autre forte de venins.



De l'Esclaire, & de Dotterbloemen.

Chap. XX.

LES ESPECES.

IL y a deux especes de l'herbe appellée en Grec *Chelidonium*, dont l'une est la grande Esclaire. L'autre, la petite Esclaire, ou Scrophulaire.

LA FORME.

1 La grande Esclaire a la tige tendre, ronde, velue, branchue, chacune branche aiant plusieurs articulations & nœuds. Les fueilles asses semblables à l'Ancholie, plus tendres, & plus incisées, d'vn costé grisâtres, & verdes de l'autre, tirant sur le bleu. La fleur au sommet des branches, belle, iaulne, comme la giroflée iaulne, se tournant en siliques longues, esquelles est cōtenue la semence petite, pale. Toute l'herbe est d'odeur forte: & le suc dont les fleurs, fueilles, tige, & la racine sont pleines, qui en fort quand elles sont cassées, est iaulne comme safran, acre & amer, mais celuy de la racine principalement, lequel est iaulne cōme or. La racine aiant plusieurs filandres depēdantes.

2 La petite Esclaire est vne herbe se trainant par terre, aiant la tige petite, menue, & brane: les fueilles petites, rondes, semblables à la violette de Mars, mais beaucoup plus petites, plus tendres plus molles & plus vnies. La fleur iaulne, semblable au Bassinet. La racine fibreuse aiant plusieurs racinettes noucuses, semblables à grains de blé ou d'orge.

*Chelidonium majus.*  
La grande Esclaire.



*Chelidonium minus.*  
La petite Esclaire.



L'herbe que les Brabançons appellent  
Dotterbloemen.

Il se trouve vne herbe asses semblable à la petite Esclaire, tant de feuilles, que de fleurs, laquelle les Brabançons appellent Dotterbloemen, aiant les feuilles bien verdes, rondes, semblables aux violettes de Mars ou au Peuplier, plus grandes, & vn peu crenées tout au tour. La tige ronde se partissant en plusieurs branchettes, sur lesquelles est la fleur belle, jaune, semblable au Baisinet, mais plus grande & plus plaissante à voir. Les fleurs tombées on void trois ou quatre petites siliques, l'vne pres de l'autre comme à l'Anchole, ausquelles est contenue petite semence jaune. La racine grosse & espesse, aiant plusieurs filets.

**LE LIEV.**

La grande croist en lieux secs, pres vieilles murailles, pres des chemins & sous les hayes, & seps.

La petite, & Dotterbloemen croissent es pres humides, & aux bors des fossés.

**LE TEMPS.**

La grande Esclaire cōmence à fleurir en Aueil, & dure tout l'esté.

La petite commence de fort bonne heure à for tir, enuiron le retour des arondelles en la fin de Feurier. Elle fleurit tout le long de Mars, iusques en Aueil,



Auril, puis perit, tellement qu'on ne la trouue guere plus en May.

3 La Dotterbloemen fleurist en Mars & Auril.

LES NOMS.

1 La grande Esclaire se nomme en Grec *χελιδονια* & en Latin *Chelidonium maius* & *Hirundinaria maior*; aux Boutiques *Chelidonia*; en François *Chelidoine* ou *Esclaire*; en haut Aleman *groß Schelwurz*, *groß Schwalbenkraut*, & *Schellkraut*; en bas Aleman *Goutboitel* & *grote Souwe*.

2 La petite s'appelle en Grec *χελιδονια μικρον* Latin *Chelidonium minus*, & *Hirundinaria minor*; Es Boutiques *scrofularia minor*, & en François *Scrofulaire*, ou *petite Esclaire*; en haut Aleman *klein Schelwurz*, *klein Schwalbenkraut*, *freigwurz*, ou *Blaterkraut*, *Psaffenkrodlin*, & *Abendkraut*; en bas Aleman *kleyn Souwe*, & *kleyn Speer kraut*.

3 Dotterbloemen s'appelle en haut Aleman *Dotterblumen*, *Dotterblumen*, *See weißblumen*, & *Martenblumen*; en bas Aleman *groote Booterbloemen* & *Dotterbloemen*; nous la pourrons appeller en François *grand Bassinet de prés* ou *de marés*.

LA CAUSE DV NOM.

1 La grande Chelidoine s'appelle en Grec *χελιδονια* *Chelidonia*, c'est à dire l'herbe aux aronnelles, pour ce que (comme dit Pline) premierement sont trouuée les aronnelles, & ont guery les yeux, ou restitué la veue à leurs petits ayans quelque mal aux yeux, ou estans auuegles.

2 La petite s'appelle ainsi, pour ce qu'elle commence à naistre & fleurir à l'aduenement des aronnelles, & betrit quand les aronnelles s'en retournent.

LE TEMPERAMENT.

1.2 Les deux Chelidoines ou Esclaires sont chaudes & seches au tiers de degré: & la petite plus chaude que la grande.

3 Le Bassinet des prés est aussi de nature chaude, mais non pas fort.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Le ius de Chelidoine meslé avec miel, & bouli en vn vaisseau de cuyture ou d'airain, esclaircit la veue, & intilid souuent aux yeux, en oste les taches, cataractes & cicatrices.

Si du mesme avec vin on laue les vlcères rongens & phagedeniques, il les reioint & guerit.

La racine avec anis boullie en vin blanc, ouure les obstructions du foye, & guerit la iaulnissé.

La mesme racine machée en la bouche, oste la douleur des dens.

2 La petite Esclaire pilée, & appliquée sur les ongles scabreux, ou corrompus les fait tomber, & reuenir d'autres meilleurs: Et si on la broye en vrine ou vin, principalement la racine, puis on l'applique sur hemorrhoides, elle les resoult & guerit: le mesme fait le ius meslé avec vin ou vrine, si on en laue les hemorrhoides.

La decoction de ceste herbe en vin gargarisée purge la teste des phlegmes visceufes, & les fait cracher hors aysément.

Le ius de la racine meslé avec miel & tiré par le nez, purge le cerueau de plusieurs humidités, & oste les estouppemens du nez.

3 Le Bassinet des marés n'est d'aucun vsage en Medecine.

*Clematis Daphnoidea.*

Venche,

H

De la Peruenche. Chap. XXI.

LA FORME.

LA Peruenche a plusieurs branchemes tendres, noneufes, par lesquelles elle s'estend sur terre, & se traîne deça delà: les suelles plus grâdes q'celles du bouys, asses seblables à celles de Laurier, de couleur & figure, sinõ quel les sont beaucou plus petites. La fleur bleue le plus souuent, aucunesfois blanche & tannée, mais peu souuent, partie en cinq, quelque peu semblable à la fleur de la grande Buglossie vulgaire, mais plus grande & plus delectable, sans odeur toutefois. La racine fibreuse & iaulne.

LE LIEV.

La Peruenche prouent volütiers en lieux vmbreux & humides, aux bords des boys, & faulxayes, & hayes.

Elle fleurit pour la plus part en Mars &

Auril



C

Auril, mais demeure verte toute l'année. LES NOMS.

Elle s'appelle en Grec *κλαμαρίς δαφνοειδής*; en Latin *Clematis Daphnoidea*; Pline la nomme en quelque lieu *Clematis Aegyptia*; & en vn autre lieu *Chamaedaphne*: és Boutiques *Peruena*, & *Vinca per uinea*; en haut Aleman *Yngruen*, & *Syngruen*: en bas Aleman *Wincsoode*, *Jngroen* & *Syachden* pafin.

LE TEMPERAMENT.

La Peruena est seche & astringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoction de ceste herbe beue en vin, arreste le flux de ventre, & guerit la dysenterie: Elle met fin & arreste le cours des fleurs immoderé, le cracher sang, & tout flux de sang. (d'icelle.)  
 B Icelle demelée avec huile rosat, & appliquée en l'amary en forme de pessaire, oste les douleurs  
 C Icelle machée guerit douleur de dens, & aussi toutes piqures de bestes venimeuses, si on l'applique dessus.  
 D Icelle broyée puis mise dedans le nez fait arrester le sang qui en coule.

### Du Saffran sauvage.

LA FORME.

LE Saffran sauvage a la tige ronde, de trois coudées de haut, ou daultage, reuestne de feuilles longues, estroictes, crenées & piquantes: au sommet des branches sont petites boules rondes, espineuses, lesquelles ouuertes produisent fleur belle, orangée, & de bone odeur, de couleur semblable aux filetz du vray Saffran: apres la fleur fletrie, se trouue dedans ces boules espineuses vne semence blanche, longue, anguleuse, encluse entre papillotes velues.

LE LIEU.

On le plante és jardins & vergers.

LE TEMPS.

Il fleurit en Juillet & Aoust.

LES NOMS.

On l'appelle en Grec *κνικου*: en Latin *Cnecus*: és Boutiques, & de Melue & Serapio *Carthamus*; d'aucuns *Crocus hortensis* & *Crocus Saracenicus*: en François Saffran sauvage ou bastard: en haut Aleman *wildes garten Saffran*: en bas Aleman *wildes Saffran*.

LE TEMPERAMENT.

La graine du Saffra bastard come e scrit Mesue est chaude au premier degré, & seche au deuxiesme. LES VERTVS ET OPERATIONS

Le ius tiré hors de la semence d'iceluy cassée & pilée, beu avec eau miellée, ou la decoction d'une pouille, fait aller à chambre, & purge les phlegmes visceus & humeurs aigueles: outre ce est bon cõtre la Colique, c'est à dire douleur & obstruction des boyaux, & pareillement cõtre difficulté d'aleine, toux, & oppilation de la poëtrine, & est singulier cõtre hydropisie.

B Pareillement le ius d'icelle graine mis dedans le lait, le fait cailler: luy donne grande efficace de lacher le ventre.

C Les fleurs beues avec eau miellée, ouurent le foye, & sont fort vtils contre la iaunisse. Pareillement sont fort bonnes à vser en viandes pour leur donner couleur iaunle.

LES NVISANCES.

La semence du Saffran bastard nuist fort à l'estomach, faisant appetit de vomir, & est de fort difficile operation, demourant long temps en l'estomach & s'entrailles.

AMENDEMENT.

Il faut adiouter à ladite semence, aucunes choses confortites l'estomach, come semence d'Anis du Ga-

### Chap. XXII.

Cnecus. Saffran bastard.



du Galanga, ou mastic, ou quelque autre chose qui puisse avancer son operatiõ, comme gingem bré, sel gemma, sel commun, &c. Et si on en vñe en telle sorte, il ne nuira point à l'estomach, & son operation sera plus soudaine.

## De Conyza.

## Chap. XXIII.

## LES ESPECES.

IL y a de deux sortes de Conyza, selon Dioscoride & Theophraste : L'une appellée Conyza la grande & malle: L'autre Conyza la petite & femelle. Outre celles y en a encores vne tierce, laquelle se nomme Conyza la moyenne.

*Conyza maior.*

Conyza la grande.

*Conyza media.*

Conyza la moyenne.



## LA FORME.

- 1 La grande Conyza a les feuilles assez larges, pres semblables au petit Bouillon blanc, sinon qu'elles sont plus noirâtres, & plus douces. La tige ronde, couverte d'une laine douce, haute de pied & demy, ou davantage, se partissant vers le sommet en plusieurs branchettes, sur lesquelles sont longs boutons, se convertissant en fleurs jaunes, lesquelles puis apres se tournent en papilottes, voltantes au vent. La racine est assez grosse.
- 2 Conyza la petite ne croist point plus haut d'une paume, ou d'un pied, & n'est trop differente de la premiere, sinon qu'elle est beaucoup plus petite. Les fleurs de couleur obscure, pres semblables aux fleurs de l'Athanasie, ou au milieu de la fleur de la Camomille. Elles sont toutes de forte odeur, la grande toutesfois plus que la petite.
- 3 La Tierce & moyenne espece de Conyza a la tige ronde, blanche, lanugineuse, haute de pied & demy, les feuilles, longues & lanugineuses, ou velues. Les fleurs au sommet de la tige semblables à la Camomille, plus grandes, & non seulement jaunes au milieu, mais aussi tout au tour.

## LE LIEV.

Conyza la grande prouient le plus du temps en lieux secs. Les deux autres croissent es vallées humides & herbues, & sur le bord des caües. LE TEMPS. Elles fleurissent en la fin de Juillet, & en Aoust.

## LES NOMS.

Ces herbes se nommēt en Grec καρίϑου: Plin les appelle en Latin en quelque lieu *Conyza*; Gaza les appelle *Policaria*, & *Policaria*: incognües es Boutiques: aucuns les appellēt en haut Ale man *Durtwary* & *Donnerwary*.

Theophraste appelle la grande, Conyza male; & la petite, Conyza femelle.

## LE TEMPERAMENT.

La grande & la petite sont chaudes & seches au tiers degré. La tierce est de semblable substance aux autres, non pas toutesfoys si chaude.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les sucilles & fleurs de Conyza cüites en vin & beues, ont grande efficace de prouoquer les fleurs aux femmes, & jetter hors les enfans morts.  
 B Elles ont aussi grande vertu contre pissē chaude, & quand on ne pissē que goutte à goutte, contre la iaulnissē, & torsions & douleurs de ventre.  
 C Les mesmes prinſes en vinaigre sont bonnes contre l'epilepsie, ou mal caduc.  
 D La decoctiō de Conyza est fort prouffitāble aux femmes qui ont douleurs de matrice, si elles faissent dessus en vne cuue.  
 E Les sucilles eschachées, & appliquées sur morsures ou piqures de bestes venimeuses sont fort cōuenables: Pareillement si elles sont appliquées sur playes, & œdemes, c'est à dire tumeurs froides.  
 F Icelle meslée avec huile, & induite par tout le corps oste toutes frissons.  
 G Icelle mise, jettée, ou bruslée en quelq lieu, en chasse toutes bestes venimeuses, & tue les pulces

## De Aster Atticus.

## LA FORME.

Aster atticus a la tige noiratre, houlſue, ligneuse: Les sucilles longues, espesses, houlſues, verdâtres. Au sommet des branches croissent trois ou quatre fleurs belles, semblables en figure à la Camomille, jaunes au malieu, & tout autour sucillettes purpurées, disposées & cornées en façon d'estoille, qui en la fin se tournēt en papillottes, & s'en volent au vent. La racine fibreule.

## LE LIEV.

Aster Atticus croist es tertres, montaignes, & lieux hauts, aucunefois es bois, & quelques prés situés aupres du Rhin.

## LE TEMPS.

Il fleurit la plus part en Aoust.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *Αστὴ ἀττικὸς καὶ βουβάνιον*: en Latin *Aster Atticus*, & *Ingenalis*: de Vergilius *Flos Amellus*: incognue es Boutiques: en Frçois *Aspergoutte menue*, ou *Estoillée*: en haut Aleman *Aspergoutte*, *Sparrkraut* & *Stentkraut*; en bas Aleman *Stentkraut*.

## LE TEMPERAMENT.

Elle rafraeschit & est bien pres de semblable temperament comme la Rose.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Elle est fort bonne à l'estomach par trop chaleureux & eschauffé appliquée par dehors sur iceluy: Et icelle verte estampée, puis mise sur bubons & bosses des aines est de grande efficace.  
 B Elle donne allegeance aux rougeurs & inflammations

## Chap. XXIII.

## Aster Atticus.

## Estoillée.





tions des yeux, & au siege, ou boyau culier relasché & tombant.

La fleur bleue beue en eauë prouffite grandement aux enfans qui ont l'esquinance, & sont C tourmentés du haut mal.

On dict aussi que ceste herbe chasse toutes tumeurs des aines, voire quand fans plus on la por- D teroit liée dessus.

Du Nombriil de Venus. Chap. XXV.

LES ESPECES.


Nous descrirés en ce Chapitre trois sortes de Nombriil de Venus: deux cogneus des Anciens, & maintenant aussi en plusieurs pais: & le troisieme, lequel, pour quelque similitude, qu'il a avec le premier, nous auons appellé Nombriil de Venus croissant es eaux.

*Cotyledon vers.*

Le vray Nombriil de Venus.

*Cotyledon altera.*

Le petit Nombriil de Venus.



LA FORME.

1 La feuille du premier est ronde, espesse, assez semblable aux Violiers de quaresme, plus ronde, vn peu crenée tout à bentour, & creuse par le dessus, & par dessous a sa queue au milieu. La tige menue & creuse, enuiró d'vne paulme de haut, aist plusieurs fleurettes, longues, blanchatres. La racine blanche, & ronde comme vne oliue.

2 La secóde espece a les feuilles larges, espesses, assez rondes, espandues en large tout au tour de la tige, comme à la grande ioubarbe, du milieu desquelles prouient la tige tendre, portant petites fleurs.

3 Le Nombriil d'eauë a les feuillettes petites deliées, & rondes, creuses aussi par le dessus, mais fort peu come vn petit plat, la queue par dessous au milieu de la feuille, aucunement

*Cotyledon aquatics.*  
Nombriil de Venus aquatique.



retirant à la feuille de la premiere espece du Nombriil, mais plus petites, plus delicates & plus noirâtres. Les fleurs sont petites, blanches, lesquelles croissent sous les feuilles en bas. Les racines menues, fibreuse, se trainans, & iettans de tout costé plusieurs facultes nouvelles.

## LE LIEU.

Le Nombriil de Venus comme dict Pline croist en lieux pierreux & maritimes: Il ne croist icy au pais de soymefine, si on ne le plante aux iardins.

Le Nombriil d'eau vient abondamment en ce pais, es prés bas & humides & vallées qui en hyuer sont pleines d'eau.

## LE TEMPS.

Jay veu le vray Nombriil fleurir aussi en Juin, mais le Nombriil des eaux fleurit en Juillet.

## LES NOMS.

C'este herbe s'appelle en Grec *κορυδαύριον*: en Latin *Cotyledon*, & *Vmbilicus Veneris*, & *Aetabulum*, & de Pline *Herba Coxendicam*. Jacques de Manlijs en son *Luminare maius* l'appelle *Searam caeli*, & *Searam celstis*: en François Nombriil de Venus. Nous l'auons appellée en bas Aleman *Dauerscrup*.

La seconde s'appelle en Grec *κυμβάδιον* & *κορυδαύριον* *τριπέδιον*: en Latin *Cymbidium*, *Aetabulum alteram*, & *Vmbilicus Veneris alter*: en bas Aleman *dat andet* ou *dat tuerde* *Dauerscrup*.

Le Nombriil d'eau, s'appelle es Boutiques de pardeça *Vmbilicus Veneris*, & *Searam caeli*, combien que ce ne soit le vray Nombriil, comme nous auons dict: les bas Alemans se nomment *Pren-nin-scrup*.

## LE TEMPERAMENT.

Le vray *Vmbilicus* est froid & humide: Le Nombriil d'eau n'est pas sans chaleur, comme le fauteur le demonstre.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Le ius du Nombriil de Venus est singulier remede contre toute eschauffure, tumeurs chaudes, feu volage, & aussi contre les mules aux talons si on l'induit dessus: & appliqué sur l'estomach il le rafraichit.

B Les feuilles mengées avec la racine, ôtent la pierre, sont vriner, & sont bones aux hydropiques.

C La seconde espece est de vertu semblable à la grand Ioubarbe.

D La vertu du Nombriil aquatique n'est pas encores connue: combien que les ignorans Apothicaires en vient journellement au lieu du vray *Cotyledon*, non sans grande & lourde erreur.

Cassula maior.

Orpin.

## Du Chicotrin, ou Orpin. Cha. XXVI

## LA FORME.

LE Chicotrin a la tige ronde, & espesse, fragile, reuestue de feuilles espesses, charnues, pleines de sève & vn peu crenées par les bors. Au sommet des tiges prouiennent plusieurs fleurs belles, purpurées, de figure semblables au Milpertuis appellé en Grec *κορυδαύριον*. La racine est blanche & fort noueue.

Il se trouue vne espece de ceste herbe qui a les fleurs blanches: & vne troisieme qui a les fleurs iaulnes, au reste semblables à la premiere.

## LE LIEU.

Le Chicotrin croist volontiers en lieux humides & umbrageux. Les vilageois le placent volontiers la nuit S. Ian dedans esuelles, ou sur trechioirs de bois avec argille, & le pendent en leurs maisons, là ou il demeure long temps verd, & y croist, quand par fois on l'arrouse d'eau.

## LE TEMPS.

Le Chicotrin fleurit le plus souuent en Aoult.

## LES NOMS.

On appelle maintenant ceste herbe *Cassula maior*, au cuns *Fabaria* & *Faba crassa*: en François Orpin: en haut Aleman *wunderkraut*, *Knaubenhaut*, *fortzwang*, & *foizmet*: en bas Aleman *wonden scrup* & *Smertwostel*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Orpin refroidit iusques au tiers degré.

Les ver



Il a semblable vertu que la Toubarbe.

De l'Euphrase.

Chap. XXVII.

LA FORME.

Euphrasia.

Euphrase.

1 Euphrase est vne belle petite & basse herbe, nō pas plus haute d'une paulme, fort branchue, couuerte de fueilles petites, noires, crenées tout au tour. Les fleurs petites & blanches, semées de iaulne & purpurée par dedās. La racine petite, menue & fibreale.

2 Il se trouue encores vne herbe laquelle aucuns appellent Euphrase, combiē toutesois que ce ne soit la vraye Euphrase: Icele croist de la hauteur d'un pied, ou dauantage, les tiges rondes, parties en plusieurs branches collaterales, sur lesquelles sont fueilles petites, longues & estroictes, le plus souvent pendantes en bas. Les fleurs rouges. La racine petite comme en l'autre Euphrase. Ce que nous auons bien voulu icy escrire & declarer, afin qu'on apprenne à cognoistre la difference de toutes deux, & qu'on ne prenne, & mette en ceure l'une pour l'autre: car la seconde Euphrase n'a point la vertu que la vraye Euphrase.

LE LIEV.

L'Euphrase croist es prés secs, chemins verds, & pasturages exposés au soleil.

LE TEMPS.

L'Euphrase commence à fleurir en Aoust, & de meure fleurissant iusques en Septembre, & es années auancées se trouue fleurissant en Iuillet. Il la faut cueillir quand elle est en fleur, & secher.

LES NOMS.

Aucuns appellent ceste herbe en Latin *Euphrasia*: Aucuns *ὀφθαλμια* Ophthalmia & *ὀcularis*: Aucuns *εὐφροσύνη* Euphrosyne: en François Euphrase: en haut Aleman *Zugentrost*: en bas Aleman *Doghentrost*.

LE TEMPERAMENT.

Euphrase est chaude & seche bien pres iusques au deuxiesme degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Euphrase pilée & mise sur les yeux: ou le ius d'icelle avec vin instillé aux yeux, oste les obscurités d'iceux, & esclarcit la veue. A

Le semblable fait ainsi la poudre de trois pars d'Euphrase seche, & d'une part de macis, si on en prend tous les matins vn culier plein à part soy, ou avec sucre, ou avec vin. Prinsé aussi en la meisme sorte, elle conforte fort la memoire.

Euphrase boulie en vin & beuë, est fort vtile contre la iaulnissē.

2 L'autre Euphrase est inutile, pourtant n'en vse on point en medecine. C

D

De la Filipendule.

Chap. XXVIII.

LA FORME.

Filipendule a les fueilles longues, espandues, amassées de plusieurs fueillettes crenées tout au tour, & croissantes au tour d'une longue queue, non trop differentes aux fueilles de la Tanasie sinuage, ou de Pimpinelle, mais plus longues. La tige ronde, haute de deux ou trois pieds, au sommet de laquelle sont ensemble plusieurs belles fleurs blanches, chacune partie en six fleurettes comme vne petite estoille. La semence est petite, & amassée ensemble comme vn bouton. Les racines menues & noires, desquelles pendent petites boules noires, comme en la racine de la Pivoine femelle, sinon que celles sont beaucoup plus petites.

LE LIEU.

Filipendula.

Filipendule.

La Filipendule croist en Alemaigne és hautes montaignes & pierreuses, & lieux scabreux, En ce pais on la plante és jardins.

LE TEMPS.

Elle fleurit en Juin & Juillet.

LES NOMS.

Aucuns appellent ceste herbe en Latin *Saxifraga rubra*. És Boutiques *Filipendula* ou *Philipendula*; en François *Filipende* ou *Filipendule*: en haut Alemá *Rotsteinbaech* & *wilde garben*: en bas Aleman *Koo de steenbaech*.

LE TEMPERAMENT.

La Filipende est chaude & seche, mais non pas jusques au tiers degré, & astringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine boulie en vin & bouë, est fort vtile à ceux qui pissent goutte à goutte, & cõtre toutes dou leurs de vessie, elle fait vriner, & rompt la pierre.
- B La mesme (comme dit Mattheus Syluaticus & Simon Genuensis) est fort prouffitabile contre douleurs proucnantes de froisidure, ventosités, & inflations de Pestomach, mise en poudre, & prinse avec fenail en vin.
- D Et si on vse souaët de la poudre de la racine aux viandes, elle garde du haut mal.



## De la Barbe de cheure. Cha. XXIX.

LES ESPECES ET DIFFERENCES.

IL y a deux fortes de Barbe de cheure: L'une est la grande Barbe de cheure, laquelle nous appellons Roynette. L'autre est la petite, laquelle nous appellons Rheubarbe bastard.

LA FORME.

LA grande Barbe de cheure a les fueilles grandes, longues, larges, semblables à l'Aigremoine, plus grandes toutesfois, & plus longues, rudes, dures, fort fronsées & ridées, comme les fueilles d'un petit bouleau. La tige creule, quarrée, rougeatre, aucunesfois de la hauteur d'un homme, portant au sommet plusieurs belles fleurettes, blanches, bien fleurantes, bien amassées ensemble, comme en la Filipendule, lesquelles passent en petites semences tortues, trois ou quatre amassées ensemble en forme d'une petite verrue. La racine longue, noire par dehors, incarnée par dedans ou purpurée, de forte odeur, astringente en sueur comme les glands.

La petite Barbe de cheure ou Rheubarbe bastard a les fueilles fort incisées, & parties en plusieurs autres fueillettes crendes tout au tour. La tige quarrée, rougeatre, de la hauteur de pied & demy, ou de deux piedz, sur laquelle croissent plusieurs petites fleurs velues, amassées & ressemblantes à vne barbe cheue, desquelles sortent petites tallettes, comme petites gosses quatre ou cinq ensemble. La racine noire & ligneuse.

Il se trouue aussi vne herbe pres semblable de fueilles au Pigamum, d'odeur forte, & ingrante; assez semblable à la Rue de couleur, & de fueilles en partie. Elle a trois ou quatre tiges menues & gressles, enuiron de la hauteur d'une paulme, ausquelles sont fueilles estendues, diuisées en plusieurs autres pres semblables au Pigamum, mais beaucoup plus petites. Les fleurs qui croissent au bout des branches, ne sont autre chose que plusieurs poils ou cheueux menus & gluans, pendans en bas comme vne barbette. Lesquelles passent deux ou trois petites gosses, lesquelles est contenue la semence. La racine longue se trainant & iettant nouveaux tendrons ça & là.

Le lieu.

Barba capri: Barbe de cheure.

Pigamon. Rheubarbe bastard.



LE LIEV.

1.2 Les deux premieres croissent en ce pais es prés humides, entre les buissons, & hayes, & aux bors des fossés & ruisseaux.

3 La tierce croist aux champs & terre salée située pres la mer, comme en plusieurs lieux de Zelande. LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent la plus part en Juillet, aucunefois encores en Aoust.

## LES NOMS.

1 La grande Barbe de cheure se nomme pour le iour d'huy *Barba capri* & *Regina prati*: en François Barbe de cheure: en Aleman *Reynutte* & geoten *Scheynsaert*.

2 La seconde s'appelle es Boutiques *Pigamon*, pour laquelle cause les Apothicaires ignorans & indoctes en vident pour Rue sauvage nō sans grande erreur. Les femmes de ce pais la tiennent pour Rheubarbe, pourtant Fauons nous appellée Rheubarbe bastard. Aucuns personages sçauans la tiennent pour *Radix-py Thalietrum*: toutesfois leur opinion ne semble approcher de la verité: car pour le *Thalietrum* nous prenons la vulgaire *Sophia*, de laquelle nous passerons au chap. LXXVII. de ce liure.

3 La Tierce semble à voir enfoisy *Hypecom*, duquel



Hypecom forte



duquel Dioscoride escrit, le quel aussi se nomme en Grec *Hyphocam.*

LE TEMPERAMENT.

La Roynette sans aucune doute seche fort, & est astringente, parquoy elle referre, comme le goust d'icelle demontre clerelement.

Le Pigamum seche aussi, mais il n'est point astringent.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les racines de Roynette boulies ou mises en poudre, puis prinées, guerissent le flux de ventre, & tout flux de sang. Les fleurs boulies en vin blanc & beues guerissent les fleurs quartes.
- B La flaireur ou senteur du Pigamum, comme aucuns doctes escriuent, est singuliere contre le haut mal, & si on le tient quelque espace deuant le nez du patient, le guerit incontinent.
- C Aucuns disent aussi, que en quelque sorte que lon prenne les fueilles ou la racine, qu'il lache le ventre, & fait aller à chambre.
- D Si la tierce est Hypecoum, elle est froide au troisieme degre, & a la mesme faculté & vertu que le Pauot, selon Dioscoride & Galien.

De la grande Scrofulaire.

Chap. XXX.

LA FORME.

*Galeopsis.*  
Grande Scrofulaire.

La grande Scrofulaire a la tige quarrée, noiratre, creuse, Les fueil les larges, crenées tout au tour, fort semblables à l'Ortie, mais plus vnies, & non pas piquantes, ne brulantes. Les fleurs sur le sommet des tiges, petites, comme perles, creusées comme vn petit heaulme ou la coquille d'vn limaçon. La semence petite, en petis boutons ou petites boules. La racine blanche, garnie de plusieurs boules & nœuds, comme l'Orpin, duquel auons parlé au Chapitre XXXVI.



On trouue encores vne espeece de ceste herbe semblable à la premiere, de tige, fueilles, fleurs & gosses, mais non de racine : car sa racine n'est pas noueuse, mais fibreuse : au resste il n'y a point de difference entre celle icy, & la premiere & grande Scrofulaire : car la tige est aussi quarrée : les fueilles semblables à l'Ortie, & crenées tout au tour : les fleurs semblables à heaulmes ouuers, &c. tellement que soluent ceux qui ne prennent garde à la difference de la racine, tirent l'vne pour l'autre.

Encores y a il vne tierce espeece, laquelle n'a aucune similitude avec les deux autres, sinon aux fleurs & à la graine, lesquelles sont fort semblables aux autres Scrofulaires : pourtant en auons nous fait mention en cest endroit. Elle a la tige droite, ronde. Les fueilles semblables à la Roquette, plus petites & plus noiratres. La fleur perse, semée de petis traits blancs. La racine est fibreuse comme la racine de la seconde espeece de Scrofulaire, & est perpetuelle, jettée de nouveau tous les ans, comme aussi les racines des deux autres Scrofulaires.

LE LIEV.

Les deux premieres croissent abondamment en ce pais, aux bords des champs, sous les hayes, & pres des fosses, & ruisseaux. La tierce on la trouue seulement plantée es jardins.

LE TEMPS.

Elles fleurissent en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.

La grande Scrofulaire s'appelle en Grec *γαστρις* ou *γαστρίδαλον* : en Latin *Galeopsis*, *Vrtica labros* : Boutiques *Scrofularia maior*, & d'aucuns *Castroalia*, *vicaria*, *Millemorbis*, *Ferraria* : en haut Aleman *Braunmuetz*, *Braunmuetz* & *grosz ffeigwartzenhaent* : en bas Aleman *groot Spencruyt*, & *Schmuckst*.

La seconde n'a pas de certain nom ny des Latins, ny es Boutiques : elle se nomme en bas Aleman *Weechscuyem* & *Sintre Ansguenis cruyt*.

# Du Bec de grue, ou de cicogne. Cha. XXXI. 35

La tierce est incogne & sans nom, toutes fois on la pourra prendre pour vne espece de Galeoplis, car sa fleur semble à vn heaulme ouuert.

## LE TEMPERAMENT.

La Scrofulaire est chaude & seche au tiers degré, & de parties fort subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Les fueilles, tige, semence, racine, & ius de la grande Scrofulaire consument & dissoluent, toute forte de tumeurs, & durillons, si on les pile avec vinaigre & applique dessus deux fois le iour.

Les fueilles estâpées & appliquées guerissent vlcères ambulatiz & phagedeniques, & broyées avec sel & appliquées, les chancres.

Si du ius de ceste herbe on laue la face, il oste la rougeur d'icelle.

La racine méege desefche & guerit les hemorrhoides: pareille vertu a elle broyée & appliquée par dehors. La graine beuë tue les vers.

2 La seconde espece est aussi fort bonne contre tous vlcères pourris, & rongeurs, appliquée en la mesme sorte que la premiere.

3 La tierce n'est seulement incogne de nom, mais aussi de vertus.

## Du Bec de grue, ou de cicogne. Chap. XXXI.

### LES ESPECES ET DIFFERENCES.

ON trouue en ce pais six fortes d'herbes portans longue semence, & aigue comme vn bec de cicogne, lesquelles pour ceste cause sont comprises sous le nom & gendre de Bec de cicogne. Les deux premieres sont descrites par Dioscoride & autres Anciens. Les quatre autres par gens sçauans modernes.

*Geranium primum.* Bec de grue.



*Geranium alterum.* Pied de pigeon.



### LA FORME.

1 Le premier Bec de grue, a les tiges tendres, rougeâtres, & velues, les fueilles petites, fort incisées & coupées, lesquelles sont espanduës sur la terre auant que la tige forte. Les fleurs belles, rouges comme bresil, qui se conuertissent en petites boules sans long bec, & esguilles semblables au

36 Du Bec de grue, ou de cicogne. Cha. XXXI.

*Sideritis tertia*, aut *Geranium Robertianum*.  
Herbe Robert.



*Geranium gruinale*.  
Quatriesme Bec de grue.



*Geranium hematodes*. Le 5. Bec de grue



*Geranium batrachoides* Le 6. Bec de grue.





bles au bec de la cicogne ou de grue, trois ou quatre l'vne pres de l'autre, auxquelles est contenue la semence. La racine est ronde, blanche, d'un doigt de long, de saveur douce, semblable au Responces.

2 Le Second, lequel on nomme Pied de pigeon, a pareillement les tiges tendres, menues, velues, & noires: les feuilles semblables à la plus petite Malue, crenées tout à l'entour. Les fleurs petites, tirantes sur le pers, se convertissent aussi en petites testellettes avec bec, non pas si grandes toutesfois ne si longues qu'au Premier.

3 La Tierce espece, a aussi les tiges velues comme les autres, mais toutes rouges, aians plusieurs articulations & noeuds. Les feuilles fort incisées, semblables aux feuilles de Cherueil, ou de Coriandre, plus rouges, & d'odeur plus ingrate. Les fleurs rouges, portans petites boules comme testellettes avec becs aigus. La racine verdâtre.

4 Le Quart est fort semblable au precedent tant en tiges velues, comme en fleurs rouges, & becs aigus, sinon que les feuilles sont plus fort & profond incisées, & les fleurs sont plus grandes.

5 Le Cinquieme est semblable au Quatrieme te tiges grosses, tendres, velues, de feuilles profond incisées, de fleurs & branches, sinon que les tiges du Cinquieme croissent plus haut & sont plus longues, les feuilles plus grandes, & les fleurs semblables à petites roses, & la racine longue, le plus souvent toute rouge & sanguine par dedens.

6 Le Sixieme a pareillement les tiges longues, rouges, & velues. Les feuilles grandes, semblables aux Bassinetz ou Grenouilles, & plus grandes. Les fleurs bleues, apres lesquelles sortent petits becs comme aux autres. La racine est epaisse & longue aiant plusieurs fibres.

LE LIEU.

Ces herbes croissent d'elles mesmes, en terre sablonneuse & maigre, le long des chemins & des bords des champs. L'herbe Robert croist aussi pres des vieilles murailles, & sur vieux toits. Les deux dernieres ne se trouvent en ce pais, sinon aux jardins ou elles sont plantées.

LE TEMPS.

Elles fleurissent la plus part en May, & en Juin, aucunesfois en Aueil, principalement le Premier.

LES NOMS.

Toutes ces herbes, se nomment d'un nom en Grec γεράνιον c'est à dire en Latin *Geranium*, *Grainia*, ou *Grainalis*.

1 La premiere espece s'appelle es Boutiques *Rostrum ciconie*, *Acus pastoris*, & *Acus moschata*; en haut Aleman *Stoichenstabel*; en bas Aleman *Spraechtobech*, ou *Crantenbech*.

2 La seconde se nomme *Geranium alterum*, *Geranium columbinum*, & *Pes columbe*: en haut Aleman *Taubensfuß*; en bas Aleman *Dupurenboert*.

3 La Tierce espece de ces herbes, est vne espece de *Sideritis* des Anciens, & est appellée de Dioscoride *Sideritis terria*, & *Sideritis heraclea*; maintenant on l'appelle *Ruberta*, *Herba Roberti*, & *Rosberriana*, & *Geranium Robertianum*: en haut Aleman *Rubrechtshaut*, *Schartenstaut*, & d'aucuns lieux *Scholsmurtz*; en bas Aleman *Kobrechtstaut*.

4 La Quatrieme, se nomme *Grainalis*, & *Geranium grainale*: en haut Aleman *Krautshalo*; en bas Aleman *Tranhsalo*.

5 La Cinquieme, s'appelle en haut Aleman *Blutwurtz*; en bas Aleman *Blort wurtze*, c'est à dire Racine sanguine, & *Geranium hamatores* pour la mesme cause.

6 La Sixieme s'appelle *Gratia dei*: en haut Aleman *Gottes gnad*, c'est à dire Grace de Dieu: en bas Aleman *Gobro ghemade*, & *Blauw Boeterbloemen*, & à l'imitation *Geranium barrachiodes*.

LE TEMPERAMENT.

La plus part de ces herbes est deséchante, aucunes aussi nettoyanes, & aians vertu de resouder, toutesfois on n'en vse guere.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

1 La racine du premier prise en vin chaste & guerit toutes inflations & ventosités de la matrice A & fait uriner, & est fort bonne à ceux qui ont la pierre.

2 La seconde (comme les Anciens disent) est inutile en Medecine. Toutesfois pour le iourd'uy elle est fort prisee contre toutes playes & vlcers, l'appliquant dessus.

3 L'Herbe Robert, arreste le sang des plaies fresches, si on la broie & met dessus comme dit Dioscoride.

La mesme herbe, comme on a experimenté depuis, est singuliere contre vlcers des mamelles D & parties honteuses, principalement des homes, si on la pile & met dessus, ou si on y instille le jus.

La decoction de l'Herbe Robert guerit les vlcers pourris de la bouche, & de la bouche punaise. E

Les trois autres ne sont en grand vsage. F

## LES ESPECES.

L'Herbe au lait de laquelle nous parlés icy, est de deux sortes, differétes de nom & de figure. La premiere appellée Glaux, La seconde Polygala.



Glaux.



LA FORME.

La premiere Herbe au lait a plusieurs tiges sortans d'une mesme racine, petites, tendres, de my pied de haut, sur lesquelles viennent feuilles petites & languettes, comme les plus petites feuilles de la Lentille, plus blâches par dessous que par dessus. Les fleurs entre les feuilles semblables aux giroflées, plus petites, purpurées & incarnées. La racine gresse fibreuse, & se coulant par terre.

La seconde appellée Polygala, est vne petite herbe, aiant tiges gresses, sechiles, & ligneuses, longues d'environ vne poulme, se trainans par terre, les feuilles petites & estroictes, comme feuilles de Lentille ou petite Hyssope. Les fleurs sur les tiges amassées, non trop differentes aux fleurs de la Fumeterre, de figure & grandeur, aucunes fois tannées, aucunes fois bleues, aucunes fois blanches comme neige, sans aucune odeur, apres lesquelles sortent petites tassettes, comme à la Bourse aux bergers, plus petites, couuertes à chacun costé de petites feuillettes comme de petites ailes. La racine gresse & ligneuse.

## LE LIEU.

La premiere Herbe au lait vient en lieux salés, bas, & aquatiques pres la mer, par toute Zelande.

La seconde, croist es seches bruyeres & garigues, & pres les voyes.

## LE TEMPS.

Le Glaux fleurit en Juin & Juillet. Le Polygala fleurit en May environ les Rogations que les Alemans appellent *Crucsdaghen*, pourtant l'appellent ilz *Crucsdienken*, come Tragus escrit.

## LES NOMS.

La premiere s'appelle en Grec *γαλιό, καὶ γάλαξ, ἢ γλαξ*: en Latin *Glaux*, & *Glax*, c'est à dire en François Herbe au lait: en Aleman *Milchkraut*, & *Milchkraut*. La seconde s'appelle *πολύγαλον Polygala*, c'est à dire herbe ayât beaucoup de lait, sous lequel nom elle est incogneue, car les Alemans la nomment *Crucsdienken*.

## LE TEMPERAMENT.

Toutes les deux sont chaudes & humides comme dit Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La Premiere prise es viandes, breuuages, potages fait abôder le lait: pourtant est elle fort bon à B ne aux nourrices, qui ont peu de lait. Pareille vertu a le Polygala printe avec ses feuilles & fleurs.

## De la Parietaire.

## Chap. XXXIII.

## LA FORME.

LA Parietaire a les tiges rondes, tendres, transparentes, rougeâtres. Les feuilles rudes, larges, semblables à la Mercuriale, non crenées tout à l'entour. Les fleurs petites, jointes à la tige entre les feuilles. La semence noire, fort petite, couuerte d'une petite tunique rude, qui s'attache aux verticils. La racine est rougeâtre.

## LE LIEU.

Elle croist volontiers pres des hayes, des murailles, & pres des voyes.

## LE TEMPS.

Elle fleurit le plus souvent en Juillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *ἄλφινη ἡγοί παραίτια* en Latin *Perdicium* & *Vreolaris*, & des aucuns *Parietaria*, *Maralis*, & *Perdicalis*: es Boutiques *Parietaria*: en haut Ale ma *Tag Und narst*, *S. Petero* haut, *Blashtant*, *Mheur* haut: en bas Aleman *Paritarié* & *Blashtent*.

## LE TEMPERAMENT.

Parietaire est aucunement froide & humide, tirant fort sur le temperé.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Parietaire est singuliere, contre feu volage, bruslures, & toutes vlcères & phlegmons, estampée & mise dessus.
- B Vnguent fait du ius de ceste herbe & cerusse, est fort bon contre tous vlcères chauds, & rongeurs, & contre galles chaudes & bruslantes, & semblables vices.
- C Le mesme ius meslé avec suif de bouc prouffite cõtre la podagre, principalement si on en engraisse les pieds.
- D Le mesme ius meslé avec huile rosat, & mis dedans les aureilles, appaise la douleur d'icelles.
- E La decoction d'icelle beue, ayde ceux qui ont vieille toux, grauelle, la pierre, & vaut contre difficulté & obstruction d'vrine, & ce non seulement prinse par dedens, mais aussi appliquée chaude par dehors sur la vessie en forme de fomentation.



## De la Morgeline. Chap. XXXIII.

## LES ESPECES.

Combien que Dioscoride & Pline, n'ayent escrit qued'une forte de ceste herbe: toutesfois on trouue par tout ce pais trois sortes d'herbes comprises sous le nom d'Alfine ou de Morgeline, sans la Quatriesme qui se trouue es terres salées: d'esquelles la premiere & vraye Alfine est descrite de Dioscoride & des Anciens.

## LA FORME.

- 1 La grande Morgeline a plusieurs tiges rudes, droictes, & noueuses. Les fueilles croissent à chascune ioincture & neud de la tige, tousiours deux l'une contre l'autre, assez grandes, aucunesfois pres de la largeur de deux doigts, non par trop differentes aux fueilles de Parietaire, plus longues, & moins velues: Au sommet des branches, entre les fueilles croissent petites queues avec petites pitules, lesquelles se conuertissent en petites fleurs blanches & dechiquetées, apres lesquelles trouueras filiques languettes & rondes, ou la graine est contenue. Toute l'herbe, n'est guere differente de la Parietaire de figure, car les tiges sont aussi transparentes, rougeatres au tour des neuds, & les fueilles pres d'une grandeur: tellement que Dioscoride dit que ceste herbe seroit la Parietaire, ne fut qu'elle est plus petite ou plus basse, & qu'elle a les fueilles plus longues, & moins velues.
- 2 La seconde & moyenne Morgeline est semblable à la premiere, toutesfois plus petite & non droicte, mais se couchant & estendant par terre. Les fueilles beaucoup plus petites, deux aussi l'une contre l'autre à chascune ioincture. Les fleurs, filiques & semence comme en la grande. La racine a beaucoup de menus filets.
- 3 La Tierce & plus petite, n'est trop differente de la seconde, mais beaucoup plus petite en toutes sortes, tellement que ses tiges sont comme petus filets, & les fueilles comme celles du Thym, au reste semblable à la seconde.
- 4 On trouue encore vne quatriesme espeece croissant seulement en terre salée, semblable, aux autres, de tiges noueuses & fueilles, mais principalement à la moyenne, si nõ que les tiges sont plus espesses, plus courtes, & les neuds plus pres l'un de l'autre. Les fueilles plus espesses: les filiques ne

*Alfina maior.*  
La grande Morgeline.

*Alfina media.*  
La moyenne Morgeline.



*Alfina minor.* La petite Morgeline.

sont pas longues, mais plates, rondes, aucunement anguleuses, comme vn gros pois, contenant chacune trois ou quatre grains noirâtres, pres de la grosseur d'une vesle.

LE LIEU.

La grande Morgeline croist en lieux ombrageux & humides, es hayes & buissons entre les autres herbes: Aux memes lieux croissent les deux autres: mais la quatriesme ne croist sinon en terre salée pres de la mer. LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent le plus souuât au milieu de l'esté.


LES NOMS.

La grande Morgeline s'appelle en Grec *αλοϊνη* en Latin *Alfina*, & d'aucuns Modernes *Hippiamas ior*: incognue es Boutiques.

La seconde & la tierce, s'appellent es Boutiques *Morsus gallinae*, & *Hippi minor*: en haut Aleman *Vo g elraut*, & *Spunerbis*: en bas Aleman *Dogelcruyt* *Hoenderbeet*, & *clapen* *Aduer*.

La quatriesme croissant en terre salée, nous l'auons appellée *Alfina marina*, cest à dire Morgeline marine. LE TEMPERAMENT.

La Morgeline est froide & humide, de subtilité fort



fort semblable à la Parietaire, comme Galien escrit.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 La grande Morgeline pilée & appliquée sur les yeux, ou le jus d'icelle induict dessus, est conuenable contre les inflammations, & chaudes vlcères des yeux.
- La mesme vsurpée en pareille sorte & appliquée, est bonne contre toutes playes chaudes, diffi- ciles à curer, principalement des parties honteuses.
- Le jus d'icelle mis dedans les oreilles vaut contre la douleur d'icelles.
- 2.3 La petite Morgeline, & principalement la Moyenne, cuiète avec sel & eau, est souveraine contre les roignes des mains, si on les baigne souuent dedans.
- 4 La Morgeline de mer n'est en nul vsage.

De l'Aureille de souris.

Chap. XXXV.

*Auricula muris.*  
Aureille de souris.



*Auricula muris quibusdam.*  
Aureille de souris vulgaire.



LA FORME.

- 1 L'Aureille de souris, comme dit Dioscoride, a plusieurs tiges rougeâtres par bas, au tour desquelles croissent les feuilles tousiours deux l'une contre l'autre, petites, noires, & blâquettes, sigues par le bout, pres semblables aux oreilles de souris: entre les feuilles croissent petites brâches sur lesquelles sont les fleurs, bleuës, côme celles du Mourô. La racine est de la grosseur d'un doigt.
- 2 Encore trouue on vne autre herbe, laquelle est tenue d'aucuns pour Aureille de souris: c'est vne herbe basse, le plus souuent s'estendant par terre, toute enuironée de poil delié & mol, au reste asses semblable à la Morgeline moyenne, car elle a plusieurs tiges velues, venans d'une racine, rougeâtres par bas. Les feuilles longues, rudes, velues, fort semblables aux oreilles de souris. Les fleurettes blanches. Les filiques languettes comme en la Morgeline. La racine fort fibreuse.
- 3 Outre ces deux y a encores vne Aureille de souris laquelle ne s'estêd pas par terre, mais se tiêt droiète

droicte croissant entre les autres herbes, semblables aux autres de tige & feuilles, plus grande, & de couleur blanche, couverte d'une laine gluete au toucher, come si elle estoit arrousee de miel, tenant aux doigts. Les fleurs sortent de petits boutons, comme en la Seconde. Les filiques de quel les est contenue la graine, sont pres semblables à celles des Ocillez sauvages.

## LE LIEU.

L'Aureille de souris ( comme le tresçavant Matthiolius escrit ) croist aux prés, & est frequen- te en Italie.

Les deux autres especes, croissent en ce pais, sous les hayes, aux bors des champs, & pres des chemins, comme les Morgelines.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en Juin & Juillet.

## LES NOMS.

L'Aureille de souris s'appelle en Grec *μυρς αρα*: en Latin *Auricula muris*, c'est à dire Aureille de souris: en Aleman *Murssoulin*: en Brabant *Murssouzen*.

Les deux autres sont tenues par aucuns pour Aureilles de souris, toutesfois elles semblent mi- eux à voir especes de Morgeline.

## LE TEMPERAMENT.

L'Aureille de souris de seche sans aucune chaleur.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A L'Aureille de souris pilée ayde fort aux fistules, & vlcères qui sont aux coings des yeux, si on la met dessus.

B On trouue aussi en escript par les Ancieus Égyptiens, que si à l'entrée du mois d'Aoust quelcun du matin auant parler estoit froité de ceste herbe, qu'il n'auroit d'icelle année les yeux chafieux.

## Du Mouron.

## Chap. XXXVI.

## LES ESPECES.

IL y a deux fortes de Mouron: l'un a les fleurs rouges, & est appellé Mouron masse: L'autre a les fleurs bleues & est appellé Mouron femelle, au reste il ny a entre eux deux autre difference.

*Anagallis mar.* Mouron masse.

*Anagallis femina.* Mouron femelle.



## LA FORME.

Les deux Mourons ont les tiges quarrées, petites, tendres, aians plusieurs ioinctures estées dues par la terre. Les faucilles petites, comme celles de la Morgeline moyenne, plus rondes, par dessus verdes,

verdes, & semées de petis pointz noirs. Les fleurs du male sont rouges, celles de la femelle de bel azur, la semence est en petis boutons ronds, qui viennent apres la fleur cheute.

## LE LIÈV.

Le Mouron croist aux bors des champs, aux vergers, & pres des voyes.

## LE TEMPS.

Il fleurit tout l'été, mais pareillement en Aoust.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec & en Latin *ἀργυράμις*, *Argallis*, & d'aueuns, comme dit Pline, *Corchorus*; en haut Aleman *Sauchsheyl*; en bas Aleman *Synscheysel*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Mouron est chaud & sec, sans aucune acrimonie.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Mouron bouli en vin & beu, est singulier contre morsures de bestes venimeuses, & contre obstructions de foye, & douleurs de rognons. A

Le ius du Mouron mis dedans les narilles tire hors de la teste les humeurs phlegmatiques & visceuses, & ouure les conduits du nez; Pareillement il guerit le mal de dens, quand on le met dedans le nez de l'autre costé du mal. B

Mouron mis sur vlcères pourris & rongeurs, les nettoye & guerit. Il tire hors aussi les espines & eschardes, si on le frotte & met dessus le lieu. C

Il est aussi fort bon contre inflammations des yeux. D

Le ius d'iceluy meslé avec miel, puis mis souuent dedans les yeux, oste l'obscurité d'iceux. E

On trouue par escrit de ces herbes que le Mouron à fleurs bleues repousse le siege quád il tombeau contraire que celuy à fleurs rouges l'attire hors. F

## De Elatine.

## Chap. XXXVII.

## LES ESPECES.

ON trouue par tout deux especes de ceste herbe rude & velue, differentes de nom; car l'une s'appelle en bas Aleman *Hoenderbert*, & l'autre *Hoenderveue*.

*Elatine.*

*Elatine altera.*



## LA FORME.

Elatine a plusieurs tiges velues, comme l'Auraille de souris. Les feuilles rondatres, rudes & velues, & le plus souvent vn peu decoupées, au reste non par trop differentes de la Morgeline. Les fleurs bleues ou purpurées, se tournans en petis boutons esquelz la graine est contenue.

L'autre a les tiges semblables à la premiere, mais les feuilles plus longues, plus estroictes, crenées tout à l'entour. Les fleurs bleues. La semence est contenue en deux larges calicules, joinctz ensemble comme vne petite bourse, ainsi qu'à la Veronique. La racine est fibreuse.

On pourra aussi non sans cause reduire sous les especes d'Elatine, l'herbe appellée en bas Aleman Spuerie: car les poules en mangent volontiers la semence, pourtât l'auons nous voulu comprendre sous ce Chapitre.

Spuerie a les tiges rondes ayât trois ou quatre neuds, au tour desquelz plusieurs feuilletes fort estroictes croissent en forme d'estoilles: au sommet des tiges elle produit plusieurs fleurs rettes blanches, apres lesquelles viennent petites pilules, comme au lin, esquelles est cōtenue semence noire. La racine est gresse, de la longueur d'vn doigt. **LE LIÈV.**

Les deux premieres croissent en lieux ombraeux & incultiués, pres les voyes, & aux bors des champs.

La tierce croist aussi en lieux semblables, & aux champs là ou on la seme.

**LE TEMPS.**

Elles fleurissent le plus souuēt en May & Iuin.

**LES NOMS.**

Les deux premieres se nōment en Grec *ελατινη*: & en Latin *Elatine*, d'aucuns aussi *Morsus galline*, pourtant appellent les hautz Alemans la premiere *Spuerie*: les bas Alemans *Spüenderstert*, c'est à dire, Mors de geline.

La secōde s'appelle en haut Aleman *Spüerfret*: en bas Aleman *Spüendertraue*, c'est à dire, heritaige de geline.

La tierce s'appelle en ce pais Spuerie, à l'imitation de quoy on l'appelle en Latin *Spergula*, incognue es Boutiques, & des Ancieis meimes, si se n'est que soit le petit Sesamoides, à l'histoire duquel elle conuient assez. Nous n'en voulons toutesfois iuger, mais auons bien voulu mouuoir ce doute au diligent Lecteur, à fin de luy donner occasion de s'en enquerir plus auant.

**LE TEMPERAMENT.**

Elatine rastrofchit au cunement, & est astringente.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

- A Elatine pilée, & mēlée avec fine farine de froment, ayde aux inflammations, & decoulemens des yeux, misē sus en forme d'emplastre.
- B La decoction d'icelle beuë, arreste le flux de ventre, & appaise trenchées.
- C Spuerie est bon fourage pour beufz & vaches, & leur faict donner beaucoup de lait. Il ne se trouue autre chose des vertus d'icelle.

## De l'Aigremoine.

## Chap. XXXVIII.

## LA FORME.

Les feuilles de l'Aigremoine sont longues, velues, grisätres, parties en plusieurs autres petites feuilles crenées tout à l'entour, & sont pres semblables aux feuilles de Chanure. La tige de deux piedz de haut ou dauantage, rude, velue, sur laquelle croissent plusieurs fleurettes iulnes l'vne sur l'autre, apres lesquelles vient la semence, longue, rude comme petis Glouterons, pendant en bas, laquelle estant meure s'attache aux vestemens, quand on ne la seroit que toucher. La racine est assez grande, longue & noire.





LE LIEV.

Eupatorium.

Aigremoine.

L'Aigremoine croist és lieux incultiués, és montagnes rudes & pierreuses, és hayes, en aucús tailis, & pres des chemins.

LE TEMPS.

Aigremoine fleurit en Juin & Juillet. La semence est meure en Aoust. L'Aigremoine de laquelle on veut user en medecine, se doit cueillir & secher en May. LES NOMS.

Aigremoine se nomme en Grec *ἰσπαρίσιον* καὶ *ἠπαρίσιον*: en Latin *Eupatorium* & *Hepatorium*: és Boutiques *Agrimonia*, d'aucuns *Ferraria minor*, *Concordia*, & *Marmorella*: en François *Eupatoire*, ou *Aigremoine*: en haut Aleman *Idermentich*, *Bruchwurz*: en bas Aleman *Agrimonia*, & d'aucuns *Seuercruyt*, cest à dire l'Herbe au foye.

LE TEMPERAMENT.

Aigremoine est de parties subtiles sans chaleur manifeste, elle a puillance d'inciser, & a quelque peu d'adstriction.

LES VERTVS ET OPERATIONS

- A La decoction d'Aigremoine beue, nettoye & ouure les obstructions du foye, & le renforcist, & est singulierement bone cõtre la debilité d'iceluy.
- B Aigremoine boulie en vin & beue, donne secours aux morsures de bestes venimeuses: icelle boulie en eau arreste le pissier sang.
- C La semence d'icelle beue en vin, est singuliere contre dysenterie & flux de ventre.
- D Les fueilles d'Aigremoine pilées avec greisse de pourceau, & appliquées toutes chaudes guerissent, & consolident vieilles playes & malaisées à cicatrizer.



De l'Eupatoire bastard.

Chap. XXXIX.

LES ESPECES.

IL y'a beaucoup de sortes des herbes qu'on appelle Hepatiques, & qui sont louées contre maladies de foye, desquelles nous en descrirons trois en ce Chapitre incognues aux Anciens. Les deux premieres sont Eupatoires bastards. La tierce est l'Hepatique.

LA FORME.

- 1 L'Eupatoire bastard masse a la tige ronde, longue, pleine de moëlle blanche par dedens, à laquelle croissent fueilles longues, noirâtres, vn peu rudes & velues, crenées & incisées tout au tour, bien pres semblables aux fueilles du Chanure, ameres. Au sommet des tiges croissent plusieurs petites fleurs amassées ensemble, de couleur incarnée, lesquelles sietries & tournées en semence, se volent au vent. La racine est fort fibreuse.
- 2 L'Eupatoire bastard femelle a aussi la tige ronde purpurée, d'environ trois pieds de haut, fort branchue. Les fueilles longues, crenées tout au tour, semblables au Chanure & à l'autre Eupatoire, sinon quelles sont vn peu plus larges. Au sommet des briches & au tour de la tige prouient trois ou quatre fueillettes pres vn de l'autre, en forme d'estoille, entre lesquelles y a vn neud produisant fleur iaulne entremeslé de noir, dedens lesquelles sietries, est la semence longue, plate, & alpre, s'attachât aux vestemens qu'el est meure. La racine est fibreuse, & sepsdue deça delà.
- 3 Les fueilles de l'Hepatique sont larges, parties en trois, nõ trop differetes aux fueilles du Pain de cocu, mais plus grandes. Entre les fueilles croissent belles fleurs azurées, chacune asise sur vne simple queue, lesquelles se tournent en petites bouilles, dedens lesquelles est contenue la graine. La racine est noire & fibreuse. LE LIEV.

Les Eupatoires prouiennent en lieux humides, pres les fosses & estangs. L'Hepatique ne croist en ce pais de soymesme, mais on la plante aux vergers. LE TEMPS.

Les Eupatoires fleurissent en Juillet & Aoust, mais l'Hepatiq croist fort tost, à scauoir en Mars.

LES

*Pseudobepatorium mas.*  
Eupatoire bastard malle.



## LES NOMS.

L'Eupatoire bastard malle, se nôme és Bou-  
tiques *Eupatorium*, & est vsurpé non sans gran-  
de erreur pour le vray Eupatoire qui est l'Ai-  
gremoine descrite au chap. precedent. Les gés  
sçavans Modernes l'appellent *Pseudobepatori-  
um* & *Eupatorium aquaticum*, ou *Adulterinum*: en  
haut Aleman *Kunigundkraut*, *wasserdest*, &  
*Hirsschlee*: en bas Aleman *Coninghinnecruyt*,  
*Hertsclaueten*, & *Boethenocruyt manchen*.

Nous auons appellé le second *Pseudobepa-  
rium femina*: & en bas Aleman *Boethenocruyt  
tsifhen*. Icele est estimée l'*Eupatorium* duquel  
Auicenne escrit au chap. 244. Pourtant aucuns  
l'appellent aussi *Eupatorium Auicenne*.

La tierce s'appelle pour le iour d'huy en La-  
tin *Hepatica*, & d'aucuns *Herba Trinitatis*: en  
haut Aleman *Leberkraut*, *Edelbeherkraut*, &  
*Guldenschlee*: en bas Aleman *Edel Leuercruyt*.

## LE TEMPERAMENT.

Les deux Eupatoires bastards sont chauds,  
& secs, comme leur amertume clerelement le de-  
môstre. L'Hepaticq refroidit, sèche & renforce.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A L'Eupatoire bastard malle bouli en vin ou  
eau

*Pseudobepatorium femina.*  
Eupatoire bastard femelle.



*Hepatica.* Hepatique.



eau est fingulierement bon contre vieilles opilations de foye & de la ratelle, & guerit les fieures tierces enuicillies si on le boit.

La decoction d'iceluy beue, guerit toutes bleffures & playes, à quoy elle est fort propre, & E pour guerir aussi toutes playes intrinseques & extrinseques.

- 2 L'Eupatoire barbard semelle est de mefine efficace, & est prisé par dessus le premier, en breu- C uage contre playes.
- 3 L'Hepatique est me decine souveraine contre eschauffemens & inflammations du foye, & tou D tes fieures chaudes.

Du Tournefol.

Chap. XL.

LES ESPECES.

Ily a deux especes d'Heliotropium ou Tournefol: L'une appellée le grand Tournefol: & l'autre, le petit Tournefol.

LA FORME.

Heliotropium magnum. Le grand Tournefol.

- 1 Le grand Tournefol a les tiges droictes, rondes, couuertes d'une laine blanche principalement au sommet. Les fueilles blanchatres, douces, velues, semblables en figure à celles du Basilic. Les fleurs blanches au sommet de la tige, amassées ensemble le long de la tige, les sçilles au bout se flechissent en forme de queue de scorpion, ou d'une escrueille ou langouste de riviere. La racine gresse & dure.
- 2 Le petit Tournefol porte vne seule tige, haute d'un pied, ou d'auantage, laquelle se fend en plusieurs brâches. Les fueilles blanchatres pres semblables au premier, mais aucunement retirans à celles du petit Glouterô. La fleur est inulne, petite, amassée ensemble, & perit sans porter fruit côme la fleur de Palma Christi. La graine est grisâtre, en close en siliques triangles comme celles des Tithymalles, pendans sous les fueilles à vne simple queue, & viennét sans fleur, car la fleur est inutile comme auons dict.

LE LIEV.

- 1 Le grad Tournefol (côme dict Ruelle) croist en France es champs gras & labourés: En ce pais on le seme es vergers.
- 2 Le petit Tournefol croist en lieux bas, sablonneux, & aquatiques, & s'en trouue grande quantité autour de Montpellier.

LE TEMPS.

Les Tournefols fleurissent à la may asté, & en Juillet.

LES NOMS.

- 1 Le grand Tournefol s'appelle en Grec ἡλιότροπον μέγα, καὶ σκαρπίουρον: en Latin Heliotropium magnum: des Modernes Verrucaria maior, & Herba cauari, & pourtant les bas Alemans l'appellent Cere sterupt, & groot Cere steruyt.
- 2 Le petit Tournefol s'appelle ἡλιότροπον μικρόν, Heliotropium parvum: en bas Aleman cleyn Cere steruyt, & cleyn Bometwende.

LE TEMPERAMENT.

Les Tournefols sont chauds & secs au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 Boullir vne poignée du grand Tournefol & la boire, pousse hors en lachant doucement le ven A tre, les humeurs bilieuses, & phlegmes lentes & gluueuses. Icelle boulie en vin, & beue proufite contre piqures de scorpions, & mise aussi dessus par B dehors.



48 De l'Herbe au scorpion. Chap. XLI.

- C On dict, que si on boit quatre grains de la semence de ceste herbe vne heure deuant l'access des fleurs, qu'ilz guerissent la sieure quarte: & trois grains pareillement la sieure tierce.
- D La semence de ceste herbe pilée & mise sur les verrues, & semblables excrescences, les fait tober.
- E Les feuilles d'icelles pilées & appliquées guerissent la goutte, contusions, & rompure ou dislocation des membres.
- F Le petit Tournesol bouli avec sa graine, & avec Hyslope, nasitort, ou creffon, & sel nitre, puis a beu, jette hors les vers ronds & plats.
- G Le mesme broié avec sel & mis sus les verrues, les enchasse.
- H De la graine du petit Tournesol encores verde on tainct des drappeaux de linge en couleur purpurée ( comme aussi Pline tesmoigne en son 21. liure, chap. 8. ) deiquez en ce pais on donne couleur aux gellées & confitures.

De l'Herbe au scorpion.

*Scorpioides.*

L'Herbe aux scorpions. 1.



Chap. XLI.

*Scorpioides Matthioli*

L'Herbe aux scorpions. 2.



LA FORME.

L'Herbe aux scorpions est vne petite herbe basse, n'excedant point la hauteur d'une paulme, & les tiges menues, sur lesquelles croissent cinq ou six feuilles estroictes. Les fleurs sont petites & isulnes, apres lesquelles sort la semence, rude & houeue, trois ou quatre tenans ensemble, distinguée par ioinctures, & courbe comme la queue d'un scorpion.

Matthiolus escrit d'une autre Herbe au scorpion, auant tiges gresles, les feuilles rondes, aucunes fois trois ensemble. Au sommet des tiges croissent deux ou trois cornicules ensemble, longs, & separés par ioinctures.

LE LIEV.

L'Herbe au scorpion ne croist point en ce pais de soy mesme, mais les Herboristes la sement en leurs jardins.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Juin & Juillet.

## LES NOMS.

- 1 La premiere se nomme en Grec *σχορπιόειδης*; en Latin aussi *Scorpioides*; en bas Aleman *Schorpienwey*, & d'aucuns *Schpenose*: c'est à dire Aureille de lieure.
- 2 Matthiolus tient l'autre pour vne espece de l'Herbe aux scorpions.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

L'Herbe aux scorpions, comme escrit Dioscoride, est fort prouffitabile contre piqures de scorpions, mise dessus.

## De Millepertuis.

## LA FORME.

- 1 Millepertuis à la tige purpurée, fort branchue. Les feuilles longues & estroictes, non trop differentes aux feuilles de la Rue, lesquelles si on regarde contre la lumiere semblent estre percées de pointes d'aiguilles. Les fleurs au sommet des branches, belles, & iaulnes, parties en cinq feuillettes, lesquelles escachées rendent vne liqueur rougeatre: apres icelles fleurs sortent petites siliques longuettes & aiguës, semblables à grain d'orge, lesquelles est contenue la semence petite, noire, & sentant la resine. La racine est ligneuse, longue & iaulne.

- 2 Il se trouue vne herbe fort semblable au Millepertuis precedent, fort petite & basse, ne croissant point plus haut d'vne poulme, ayant les tiges fort tées, & les feuilles petites & estroictes, plus petites que la Rue, au reste, semblable à la precedente.

## LE LIEV.

Millepertuis croist pres des voyes, aux bors des champs. L'autre petite herbe croist és champs entre les esteules, & pres des voyes.

## LE TEMPS.

Millepertuis fleurit le plus souuent en Juillet & Aouit.

## LES NOMS.

Millepertuis se nomme en Grec *Σχορπύ*: en Latin *Ascram*: és Boutiques *Hypericum*, & d'aucuns *Perforata*, & *Faga demonum*: en haut Aleman *S. Jo sans herat*, & d'aucuns *Sarthaw*: en bas Aleman *Sint Jans crypt*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Millepertuis est chaud & sec au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La semence de Millepertuis, beuë à la pesanteur de deux drachmes avec eauë miellée par lon- A  
gue espace, guerit la fistique, c'est à dire douleur de hanches.

Icelle pilée, est vilement appliquée sur brulures.

Le vin auquel les feuilles d'iceluy ont este bouliës, a vertu de consolider playes, si on les laue C  
souuent dudit vin.

## Du Foin dur.

## Chap. XLIII.

## LA FORME.

- 1 LE Foin dur n'est de feuilles & tiges trop different au Millepertuis, sinon qu'il est plus grand. La tige longue sans branches ou bourgeons, les feuilles semblables au Millepertuis, plus longues, plus noiratres, & plus verdes, couuertes le plus souuent au dessous d'vn petit poil mollet, & doux à taster, & ne semblent point percées. Les fleurs pareilles au Millepertuis, plus pales & longues de feuilles. Les boutons auant que la fleur fouure, sont semés de petites taches noires. La graine est contenue en siliques comme celle du Millepertuis, & sent aussi pres la resine.

E

Dfe



*Hypericum.*

Foin dur.

*Hypericum alterum.*

Autre espece de Foin dur.



Il se trouve encore une autre espece de ceste herbe, laquelle les bas Alemans appellent *Con-  
wert*, fort pareille à la precedente, sinon que les feuilles sont plus grandes, plus blanchâtres & non  
velues ou douces, plus semblables au Millepertuis, combien qu'elles ne semblent pertuisées. Les  
fleurs sont pareilles à la precedente, par dehors aussi semées aux neuds de petites taches noires.  
La racine ligneuse comme celle des autres.

## LE LIEU.

Ces herbes prouiennent en lieux rudes & incultivés, és hayes & taillis.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

Elles s'appellent toutes deux en Grec *υπερικον*; en Latin *Hypericum*; és Boutiques incognues:  
en haut Aleman *Spartshew*, & *wasche Hoff*; & la seconde d'aucuns Kurmtzen en bas Aleman *Spartshew*  
& *Loenrurt*.

## LE TEMPERAMENT.

Elles sont chaudes & seches, pareilles au Millepertuis.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le Foin dur bouli avec ses fleurs & semence, puis beu, prouoque l'vrine, & fait pisser, & est  
fort bon contre la pierre en la vessie: Il fait venir le flux menstrual, & arreste le flux de  
ventre.
- B Le mesme bouli en vin & beu, deliure des fieures tierces & quartes.
- C La semence beue par quarante iours suyans, guerit la douleur des hances que nous appel-  
lons sciaticque.

Les feuilles pilées sont vilement mises sur brûlures: Les mêmes seches & mises en poudre, & éparfées sur playes, & vlcères mauuaisés, enuicillies & pourries, les guerit.

D'Androsomon.

Chap. XLIII.

LA FORME.

Androsomon.

Androsomon ressemble au Millepertuis, & Foin dur, il a plusieurs tiges rondes, fortans d'vne mefine racine, lesquelles produisent fueilles beaucoup plus grandes que celles de Millepertuis, lesquelles au commencement sont verdes, puis quand la semence est meure deuiennét rouges, & adonc rendent vn ius rouge estans escachées entre les doigts. Au sommet des tiges, croissent petis neuds ou boutôs ronds, lequelz fouurent en fleurs semblables au Millepertuis, plus grandes, lesquelles peries sortent petites pilules bien rouges au commencement, mais noiratres quant elles sont meures, & de couleur de sang caillé & seché, lesquelles est contenue semence petite & brune. La racine est dure & ligneuse, & se renouuelle d'an en an.



LE LIEV.

Ceste herbe ne croist point en ce país, sinon és vergers ou elle est semée & plantée.

LE TEMPS.

Elle fleurit en Iuillet & sa semence est meure en Aouft.

LES NOMS.

Elle s'appelle en Grec *ἀνδρόσωμος*: en Latin *Androsomon*: incôgne és Botiques. Elle n'a au tre nom vulgaire que ie sache.

LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche comme le Foin dur, & Millepertuis.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Elle a semblable vertu que le Foin dur, & Millepertuis, se dict Galien.

A

Du Guesde, ou Pastel.

Chap. XLV.

LES ESPECES.

Il y a deux fortes de Guesde: l'vne Domestique laquelle prouient de semence, & de laquelle on vic pour taindre en bleu: l'autre Sauvage, laquelle prouient de foy mefine.

LA FORME.

1 La Guesde cultivée a les fueilles longues, larges, & de couleur verde tirant sur le noir, espanduës sur la terre, pres semblables aux fueilles de Plantain, mais plus charnues, & plus noires: La tige fort du milieu drcelles, de deux coudées de haut, reuectue de fueilles plus aigues, & plus petites, laquelle au sommet se fend en plusieurs branchettes, sur lesquelles croissent plusieurs fleurettes fort petites & iaulnes, en apros liliquules longues, & larges comme petites langues, au commencement verdes, puis apres noiratres, lesquelles est contenue la semence. La racine blanche, simple & droicte, sans beaucoup de fibres.

2 La Sauvage est fort pareille à la Domestique, de fueilles, tige, & figure, sinon que la tige est plus tendre, plus petite, & plus noire, & les siliques plus estroictes, Il n'y a autre difference entre ces deux herbes.

LE LIEV.

La Guesde cultivée se seme en plusieurs lieux de Flandres & d'Alcmaigne és champs gras. La Sauvage prouient de foy mefine és lieux incultivés.

*Ysaie sativa.*  
Guesde cultivée.

*Ysaie foliostris.*  
Guesde sauvage.



## LE TEMPS.

Toutes deux fleurissent en May & Juin.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *Isaëris* ; en Latin aussi *Ysaie* & *Glastum*, des Modernes *Gueden*, d'aucuns *Lusean herbe* ; en François *Guesde* ; en haut Aleman *weidt* & *waydt* ; en bas Aleman *wæcht*.

## LE TEMPERAMENT.

La Guesde cultivée est sèche sans aucune acrimonie.

La sauvage desèche plus, & est plus acre & mordante.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La Guesde sativée broyée est vilement appliquée sur les playes des parties dures & nerveuses, acoustumées de travailler tous les jours, & sur parties sanglantes, & vlcres rongentes & pourries.
- B Elle dissout aussi toutes apostemes froides, appliquée dessus.
- C La Guesde sauvage résiste aux vlcres par trop moictes, pourries & empiries, mise dessus ; mais contre autres maladies, auxquelles la sativée est bonne, elle est de moindre efficace, & ne sert de rien pour sa trop grande acrimonie.
- D La decoction d'icelle beue, est tresbonne à ceux qui ont quelque obstruction, ou dureté en la ratelle.

De l'herbe appelée Lutea.

Chap. XLVI.

## LA FORME.

Les feuilles d'icelle sont longues, estroictes, noirâtres, non trop différentes aux feuilles de la Guesde, plus petites, plus estroictes & plus courtes, du milieu desquelles prouient la tige, longue



longue d'environ trois pieds, par bas couverte de fueillettes estroites, & par haut de fleurs tes palles amassées vne dessus l'autre autour de la tige, lesquelles se tournent en petits boutons coupés en forme de croix, esquelz est cōtenue la graine petite & noire. La racine est longue & simple. **LE LIEV.**

On la sème en plusieurs lieux de Brabât pres de Louvain & de Brusselle; Elle croist aussi de soy-même en lieux incultués & pres des voyes

**LE TEMPS.**

Elle fleurit en May, & tost apres en est la sēme meure.

**LES NOMS.**

Cette herbe se nomme en Latin (comme dit Ruelle) *Herba Lutea*, & d'aucuns *Flos tinctorius*; en bas Aleman *woutte*, & d'aucuns *Diané*, mais non sans erreur, car Orant est vne autre herbe, n'ayāt aucune similitude avec ceste herbe, comme plus à plain fera de claré en la poursuite de ce liure.

**LE TEMPERAMENT.**

Elle est chaude & seche.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

- A Veu que l'herbe Lutea n'est receuë en aucun vŕage de Medecine & est incognuë des Anciens, nous ne pouuons aussi écrire autre chose des vertus d'icelle, sinon que les Tincturiers en vsent pour teindre les draps en verd & iaulne.

Herba Lutea.



De l'Herbe S. Iaques. Chap. XLVII.

**LES ESPECES.**

L'Herbe Saint Iaques, ou la fleur Saint Iaques (comme aussi aucuns l'appellent) est de deux fortes.

**LA FORME.**

- 1 La premiere espece de l'Herbe Saint Iaques a les branches longues, rouges, royées, hautes de deux ou trois piedz. Les fueilles grandes, brunes, fort fendues & incisées, non trop dissemblables à celles de l'Aluŕne, mais plus longues, plus larges, plus espesses, & non blanches. Les fleurs iaulnes, croissātes au sommet des tiges, semblables à la Camomille, au milieu desquelles est la graine, grise, lanugineuse, laquelle sennolle avec le vent. La racine est blanche ayant plusieurs fibres.
- 2 La Deuxiesme espece appellée Herbe ou fleur Saint Iaques marine, est fort semblable à la premiere, mais la tige n'est pas rouge. Les fueilles plus petites, plus blanches, plus profond & menu incisées. Les fleurs semblables à la premiere, plus palles toutesfois. La racine longue, fibreuse, se traīnant, & produisant d'autour de soy beaucoup de nouveaux germes.

**LE LIEV.**

- 1 L'Herbe Saint Iaques croist presque partout le long des voyes, & lieux aquatiques, & aucunesfois aussi aux bors des champs.
- 2 L'Herbe Saint Iaques marine, croist aux digues, & lieux semblables pres la mer, & se trouue en plusieurs lieux de Zelande.

**LE TEMPS.**

Elles fleurissent toutes deux en Iuillet & Aouŕt.

**LES NOMS.**

- 1 La premiere se nomme maintenant en Latin *Iacoba*, *Herba S. Iacobi*, & *Sancti Iacobi flos*: en

*Jacobea.*  
L'Herbe Saint Jaques.

*Jacobea marina.*  
L'Herbe Saint Jaques marine.



François l'Herbe ou fleur S. Jaques: en haut Aleman *S. Jacobe blum*: en bas Aleman *Sint Jacobe crupt*, & *Sint Jacobe blumen*.

La seconde, est sans doute vne espece de l'Herbe Saint Jaques.

LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche, laquelle faculté Dioscoride & Galien attribuent à l'Armoise.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A L'Herbe S. Jaques a la vertu propre à guérir playes, parquoy elle est fort vtile à toutes playes enuicliées, fistules & autres vlcères malings.
- B Aucuns disent que le jus de ceste herbe gargarisé guerist toutes inflammations & apostemes du gosier.

Du Lin.

Chap. XLVIII.

LA FORME.

**L**in a la tige tendre, couverte de feuilles estroictes & aigues, se partissant au sommet en branches petites & courtes, lesquelles produisent fleurs belles & bleues, au lieu desquelles ia tombées, suruisent boutons ronds, esquelz est contenue la semence noiratre, large, grasse, & glissante.

LE LIEV.

Le Lin est semé en ce país en terre grasse & deliée, es champs bas & humides.

LE TEMPS.

Il fleurit en May & Juin.

LES NOMS.

Le Lin s'appelle en Grec *λινον*: en Latin *Linum*, cognu es Boutiques sous le mesme nom: voi-la dequoy les bas Alemans vsurpent ce mot Lin en tout ce qui est fait de Lin come *Lijnendorck* & *Lijnen*

& *Sijne sahen*, c'est à dire touaille de lin: en haut Alemā *flachs*: en bas Aleman *blas*.

Linn. Lin.

### LE TEMPERAMENT.

La semence de Lin de laquelle on use en Medecine, est chaude au premier degré, & temperée en humidité & secheresse.

### LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La semence de Lin boullie en eau & appliquée en maniere de boullie, ou d'emplastre, apaise toutes douleurs. Elle amollit toutes tumeurs froides, apoitemes des oreilles & du col, & des autres parties du corps.
- B Semence de Lin pilée avec figues, meurit & rompi toutes apostemes, mise dessus: Et tire hors espines & toutes choses fichées dedans le corps, si on la mesle avec la racine de Concombre sauvage.
- C La mesme meslée avec quelque peu de cresson, & de miel, & mise sur les ongles scabreux & mauuais tant des mains que des pieds, les fait tomber & guerit. Icellé crue pilée & induicte sur la face, oste & efface toutes taches d'icelle.
- D Le vin auquel la semence du Lin aura boullie, engarde que les vlcères qui en seront laués, ne pourrissent, & ne se rongent par dedans.
- E L'eau en laquelle la semence d'iceluy aura boullie, aiguise & eclarcit la veue si on en instille souuent dedans les yeux.
- F La mesme prise en clysteres, adoncit douleur de trenchées & de l'amarry, & guerit & consolide les playes des entrailles & amarry, si aucunes y en a.
- G La semence du Lin meslée avec miel & prise, nettoye le thorax, & apaise la toux, & mengée avec raisins est tresbonne aux Etiques.

### LES NVISANCES.

La semence de Lin prise par dedans est fort contraire à l'estomach, elle empesche la concoction des viandes, & engendre beau coup de ventosités.



## Du Chanure.

## Chap. XLIX.

### LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Chanure: l'une appellée Masse: l'autre Femelle.

### LA FORME.

- 1 La premiere espece de Chanure appellé Masse a la tige rōde & creuse de quatre ou cinq pieds de haut, fort branchue & ressemblant à vn arbrisseau: au sommet des branches croissent petites boursettes rondes, esquelles est contenue la semence ronde. Les fueilles grandes, rudes, & noires, parties en sept, neuf, dix fueilles, ou dauantage, longues, estroictes, crenées & detelées tout au tour à la façon d'une sie, & semblables à vne main estendue.
- 2 La Femelle ressemble à la deuant d'icte en fueilles, mais la tige est plus gresse, plus simple, sans aucunes branches colaterales, ne portant fruit, ne semence, sinon petites fleurs blāches, qui comme poudre se volent au vent.

### LE LIEV.

Ces deux especes de Chanure sont semées aux champs, & prouiennent toutes deux (qui est à esmeruciller) d'une mesme semence. On trouue aussi le Masse aux bors des champs & pres des voyes.

### LE TEMPS.

La semence du Masse est meure à la fin d'Aoust, & en Septembre. La Femelle est meure en Juillet.

### LES NOMS.

Le Chanure s'appelle en Grec *κάνναβις ἐρίσιου, καὶ χονιοστρίφυον*: en Latin & aux Boutiques

tiques *Cannabis*: en François Chanure, Chenneuis, ou Cheneue: en haut Aleman *Samershanff*: en bas Aleman *Kemp*.

## LE TEMPERAMENT.

La semence de Chanure est chaude & seche au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La semence du Chenneuis, asopit & chasse hors du corps les vents, & si on en prend vn peu trop, elle desèche la nature, estait la semence genitale, & le lait aux mammelles des femmes.
- B La mesme estampée & prise en vin blanc est fort louée au iourd'huy contre la iaunisse, & opilations de foye.
- C Le ius tiré d'iceluy vers, appaise la douleur des aureilles, & en fait sortir toute sorte de vermisses.
- D La racine d'iceluy boulie en eau ayde & guerit les nerfs & membres retirez, & les gouttes pareillement si on la met dessus.

## LES NVISANCES.

La semence du Chanure est de difficile digestion, & contraire à l'estomach, faisant douleurs, troubles & esourdissens de teste, & engendre grosses & mauuaisés humeurs par tout le corps.

## Du Soucy d'eauë, ou Pellebosse. Chap. L.

## LES ESPECES.

Il y a pour le iourd'huy plusieurs sortes d'herbes comprises sous celle qu'on appelle en Latin *Lysimachia*, & principalement quatre, sous lesquelles toutes seront comprises. La premiere est iaune, & est la vraye *Lysimachia*. La seconde est la rouge Pellebosse ayant siliques. La Tierce est la seconde espece de Pellebosse rouge sans siliques. La quatriesme espece est la Pellebosse bleue.

## LA FORME.

La premiere *Lysimachia* iaune, a la tige røde bié peu anguleuse, haute d'vne coudée ou deux. Les fueilles longues & estroictes, come les fueilles de Saulx, point crenées, trois ou quatre côte l'vne l'autre autour de la tige. Les fleurs iaunes sans odeur, & croissent au haut des brâches, au lieu de quelles apres estre tombées croissent rôdes semences, come la graine de Coriandre. La racine est longue & gresse, se coulant ça & là, jectant de soy plusieurs tédrons, qui au premier sortir sont rouges.

La seconde *Lysimachia* ressemble à l'autre en fueilles & tiges, sinon que ses fueilles ne sont pas si larges, & sont crenées tout à l'entour, fort semblables aux fueilles de Saulx. Les fleurs ressemblent en couleur & figure aucunement aux fleurs de la Mauue sauuage commune, à sçauoir quelle a quatre fueillettes assemblées asses larges, se couchés l'vne sur l'autre par les bors, sous lesquelles croissent gosses longues, comme aux Giroflées qui apparoissent avant que la fleur s'ouure: Icelles gosses se fendent en trois ou quatre parties, quand la semence est meure, laquelle pource quelle est velue, s'en vole au vent. La racine est gresse & fibreuse.

Il s'en trouue vne autre petite de ceste sorte, pareille à l'autre en tige, fueilles, fleurs, & gosses, sinon quelle est en toutes choses moindre, & que la tige est si tendre, quelle ne se peut soutenir. Les fleurs sont incarnées, semblables aux Giroflées, vn peu plus petites.

Encore y a il vne troisieme *Lysimachia* rouge, fort semblable à la premiere Rouge, en gosses. Les fleurs croissent aussi au bout des gosses, plus pailles toutes fois, non par trop semblables aux autres quant à la figure, mais ressemblent plus tost aux Giroflées, parties en quatre fueillettes estroictes, lesquelles sont disposées en forme de croix.

La seconde



*Lyfimachium verum.*  
Lyfimachie iaulne.

*Lyfimachium purpureum primam.*  
Lyfimachie rouge premiere.



3 La seconde espece de Lyfimachie rouge, est pareille à la deuant dicté en tige & de feuilles : sinon que ses fleurs croissent en façon de couronnés tout au tour de la tige comme au Pouliot: de couleur rouge, sans gouffes, mais la semence croist aux petites couronnées d'ou les fleurs sont tombées. La tige est rougeatre & quarrée. La racine noiratre, ligneuse, jectt tous les ans de nouueaux tendrons.

4 La Lyfimachie bleue est aussi semblable aux autres de tige & de feuilles. Les fleurs bleues ou azurées, croissans en forme d'espiz au bout de la tige, & commencent à fleurir par bas, apres lesquelles croissent petites rondes bourles, esquelles est contenue la semence fort petite. La racine est fibreuse.

#### LE LIEV.

La iaulne & rouge prouiennent en lieux aquatiques & humides, en prairies basses, & aux bords des fossés & ruisseaux. La Bleue ne se trouue icy sinon aux jardins des Amateurs des herbes.

#### LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes le plus souuent en Iuin & Iuillet, & leur semence est meure en Aoult.

#### LES NOMS.

Lyfimachie se nomme en Gree *λυσιμάχιον* & *κλάδιστον* : en Latin *Lyfimachium*, *Lyfimachia*, & d'aucuns *Salicaria*, inçogneue és Boutiques.

1 La premiere s'appelle en François Cornelle, Soucy d'eauë, Pelleboffe, ou Chasseboffe: en haut Aleman *Geßweiderich*: en bas Aleman *Geßweiderich*.

2 La seconde est d'aucuns appellée en Latin *Filius aue patrem*, c'est à dire Le pere deuant le filz, pour ce que les gouffettes esquelles la semence est contenue, sortent & deuiennent grandes auant que la fleur Pouure: En François Lyfimachie rouge: en haut Aleman *Wraun* ou *Rot weiderich*: en bas Aleman *Rost weiderich*.

3 La tierce s'appelle en Brabant *Partsjck*.

4 La Quatrieme tra autre nom que Lyfimachie bleue.

*Lyfimachium parparcum alterum.*  
Autre forte de Lyfimachie rouge.

*Lyfimachium caeruleum.*  
Lyfimachie bleue.



#### OCCASION DV NOM.

Ceste herbe a prins son nom Lyfimachion du vaillant & noble Lyfimachus amy & cousin d'Alexandre le grand Roy de Macedoine, lequel premier a trouué & mis en vsage ceste herbe, & la monstté à ses successeurs.

#### LE TEMPERAMENT.

La Pelleboffe ou Cornelle est froide & seche, & adstringente.

Le temperament de la Rouge & Bleue est encores incognu.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Le jus des fueilles de Pelleboffe, arreste tout flux de sang, & la dyfentere prise par dedans, ou autrement appliquée par dehors.
- B** Le mesme arreste le flux des femmes par trop abundant, appliqué avec laine ou cotton dedans la matrice ou au membre honteux d'icelles.
- C** L'herbe escachée & mise dedans le nez, arreste le flux de sang d'iceluy. Elle consolide aussi toutes playes, si on la met dessus, & en estanche le sang.
- D** Le parfum de l'herbe sechée, dechasse tous serpens & bestes venimeuses, & tue les mouches & mouchérons.

#### LE CHOYS.

Quand vous vserez d'icelle à quelque vne des maladies susdictes, vous n'en prendrez d'autre que celle qui a les fleurs iaulnes, laquelle est la vraye Lyfimachie: Car cōbien que les autres ayent pour le present vn mesme nom, elles n'ont toutesfois la mesme vertu ny operation.

De la Mercurialle.

Chap. L I.

#### LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Mercurialle: La Domestique, & Sauvage, lesquelles sont derechef diuisées en deux, l'une Masle, l'autre Femelle, seulement differentes en semence.

# De la Mercuriale. Chap. LI.

*Mercurialis mat.* Mercuriale mâle.

*Mercurialis femina*

59  
Mercuriale  
le femelle.



Cynocratibe. Chou de chien.

## LA FORME.

- 1 La Mercuriale fatiue mâle a les tiges tendres, fort nouuefés & branchues, sur lesquelles croiffent fueilles noirâtres, longuâtres, pres semblables à cel les de la Parietaire prouenâtes des neudz, d'ou auf si fortét entre les fueilles & la tige deux petites boul les ioinctes enfcmble velues, sur vne mefme queuê, contenant chacune en foy vne petite graine rons d e. La racine est tendre & fibreufe.
- 2 La femelle est semblable au Mafle de tiges, fueil les, & croiffon, differente feulement de fleurs & de femêce, car beaucoup plus de fleurs & femence cro ifsent amalfées enfcmble comme vne petite grappe au commencement blanche, puis apres la graine se pert auant qu'elle foit meure.
- 3-4 La Mercuriale fauage, ou Chou de chien est aucunement semblable à la Mercuriale fatiue, fi non que la tige est plus tendre, plus menue & n'ex codât point la hauteur d'vne paulme, fans aucunes branches. Les fueilles plus grandes, plus feparées l'vne de l'autre. La femence du Mafle est fembla ble à celle de la Mercuriale fatiue mâle, & la femence de la Femelle semblable à la Femelle fatiue. La racine fibreufe cômè aux Mercurialles fatiues.



Il se trouue encores vne autre herbe appellée *Noli me tangere*, laquelle on reduict aussi sous les especes de Mercuriale. Elle a les tiges tendres, rondes, nouueles, ayant plusieurs creus d'aïlles & les suçilles larges, semblables aux Mercuriales en tiges & suçilles, mais beaucoup plus haute & plus grande. Les fleurs pendantes d'une petite queue, jaunes, larges & creuses par deuant, estroites par derriere, & courbées en façon de queue, semblables à la Consouïde royale de figure, après lesquelles sortent petites filiques & rondes, lesquelles faultent qu'elles sont meures & soudain qu'on les touche.

LE LIÈV.

La Mercuriale satue prouient es vignobles & iardins à la porée. La Sauvage es hayes, & taillis. La Cinquiesme es vallées profondes & humides, Et si elles sont plantées vne fois, elles sortent tous les ans de rechef semées d'elles mesmes.

LE TEMPS.

Elles fleurissent en iuin, puis apres tout le long de l'esté.

LES NOMS.

La Satue s'appelle en Grec *ἀνόςωρις*, & d'aucuns *παραθλιω*, *καὶ ἰσὺς βορῶν*; en Latin & es Boutiques *Mercurialis*; en haut Alemā *samen Bingselkraut*, *Kutwurtz*, & *Mercurius kraut*; en bas Aleman *tam Bingselkraut*, & *Mercurial*. Et celle qui a la semence ronde s'appelle *Mar*, *Masse*, *Wemmsin*, *Wamtsche*. L'autre *Famina*, *Femelle*, *weisslin*, *wijfarn*. Le mesme ordre est obseruē en la Mercuriale sauvage.

La Mercuriale sauvage s'appelle en Grec *κινεράουσα*, *κίνα*, *καὶ ἀνόςωρις ἄγρα*; en Latin *Cani na brassica*, & *Mercurialis sylvestris*; en François Mercuriale sauvage, Chou de chien; en haut Alemā *wild Bingselkraut*, & *Wundschol*; en Brabant *wild Bingselkraut*, & *wilden Mercurial*.

Le *Noli me tangere*, est inconnu aux Anciens, pourtant n'a il aucū nom Grec ne Latin. On s'appelle en haut Aleman *Springkraut*; en Brabant *Springkraut*, & *Crydichen* en ruer *my niet*; voila dequoy aucuns Modernes l'appellent *Noli me tangere*, c'est à dire Ne me touche point.

LE TEMPERAMENT.

Les Mercuriales sont chaudes & seches au premier degré, comme dit Auerrois.

LES VERTVS ET OPERATIONS

Numularia. Monnoyere.

- A La Mercuriale boulie en eauē & beuē, lache le ventre, purge, & chasse les phlegmes froids, & humeurs chaudes & cholériques; & pareillement l'eauē qui est amallée entre le cuir & chair des Hydriques.
- B Pour ce mesme on en peut vser en viandes & potages, & elles serōt la mesme opatiō, mais nō pas si forte
- C La mesme pilée avec beurre, ou avec quelque autre gresse, & mise au fondement, incite d'aller à chambre

## De la Monnoyere. Chap. LII.

LA FORME.

Monnoyere a les tiges tendres, menues se trainans par terre, à laquelle croissent de chacū costé, suçilletes rondes & larges, pres semblables à vne maille. Les fleurs sont jaunes, non trop differentes aux *Bassinetz*. La racine est tendre & gresse.

LE LIÈV.

Ceste herbe croist es prés humides, pres des fosses, & ruisseaux, & boscaiges basiers.

LE TEMPS.

Elle commence à fleurir en May & demeure fleurissant tout l'esté.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle à present en Latin *Numularia*, *Centumorbis*, & d'aucuns *Serpentaria*; en François Monnoyere, Herbe à cent maladies; en haut Aleman *pfermingskraut*, *Egelkraut*, & *elchs Watterkraut*; en bas Aleman *Pfermschraut*, & *Egelschraut*.

LE TEMPERAMENT.

La Monnoyere est seche au tiers degré.



LES



## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Les Modernes disent q si on la boulit en vin & boütauec miel, quelle guent & consolide les blessures & plaies des poulmõs, & q elle est bõne cõtre la toux, & dignement cõtre toux difficile des petis enfans, prise en semblable maniere

## De la Linaire. Chap. LIII.

## LA FORME.

1 LA Linaire a les tiges gressles, lentes & noirâtres, d'ou pcedet plusieurs suelles ensemble lögues & estroictes, fort semblables aux suelles de Lin. Les fleurs sont isulnes larges & closes par deuis, semblables à la bouche d'une gre nouille, estroictes par derriere, & courbées cõme à la Con soulde royale. La semence est large & noire, cõtenuë en peti tes gosses rōdes, lesquelles prouennēt apres les fleurs tōbées

2 On trouue encores vne espece de ceste herbe, laquelle n'est pas cõmune, portāt fleurs belles bleues, au reste sem blable à l'autre, sinon qu'elle a les tiges, fleurs & suelles moindres & plus tēdres, plus hautes toutesfois & plus lon gues de croïsson. LE LIEV.

Elle croist en lieux incultiués, pres des hayes, & aux bors des champs. LE TEMPS.

Elle fleurit le plus souuent en Iuillet & en Aoult.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nôme es Boutiques *Lineria*, & d'aucuns *Pseudolinii* & *Vrinaris*: en François Linaire ou Lin sauage: en haut Alema *Synkraut*, *Flaschkraut*, *Sparr kraut*, *Wasser framwē flasch*, *wild flasch*, *Kroottē flasch* en bas Aleman, *wisat* *Blas*. Aucuns pensent que soit celle que les Grecz appellēt *δουρα*. Les Latins *Ofris*.

## LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche au tiers degrē.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La decoction de Linaire beuë, ouure les obstru ctions vieilles & froides du foye & de la rate lle, & est fort bõne à ceux qui ont la isualniss sans fièvre, prin cipallement quand la isualniss est enuieillie.

B La mesme aussi prouoque l'vrine, & est medecine singuliere pour ceux qui ne peuent passer sinõ goutte à goutte, & cõtre obstruētõs des rognõs & de la vessie.

## De la Bourse de bergers. Chap. LIIII.

## LA FORME.

1 Les tiges de la Bourse de bergers sont rondes & sechales d'un pied de lög: aāt suelles longues, pfond incisées, semblables aux suelles de la Mou starde blāche, plus petites toutesfois. Les fleurs blā ches, croissans le long des tiges, au lieu desquelles quād elles perissent, sortēt petites tassettes, ou bour settes larges, esquelles est contenue la graine petite & noire. La racine est longue, simple & blanche.

## LE LIEV.

La Bourse de bergers croist pres des chemins, & es lieux rudes, incultiués & pierreux. LE TEMPS:

Elle fleurit le plus souuent en Iuin & Iuillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe n'a au cõnō Grec ny Latin qui luy scāt dõné des anciens, mais se nôme à present en lat *Pastoria*



Pastoria bursa.

Bourse de bergers



*Bursa, Pera & Bursa pastoris*: en François Tabouret, ou Bourse de bergers: en haut Alemã *Weschet kraut*, & *Hirtens sechel* & *Sechsellkraut*: en bas Aleman *Teslerno* ou *Bosilerno*.

## LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoctiõ de la Bourse de bergers beut, arreste le flux de ventre, la dyfentere, le crachemẽt de sang, le pissier sang, le flux des femmes par trop abondant, & toute sorte de flux de sang, comment qu'elle soit prise, à quoy elle est de tresgrande efficace, tellement qu'aucuns escriuent, quel le estanche le sang seulement tenue en la main, ou portée sur le corps.


## De la Quintefueille. Chap. L V.

## LES ESPECES.

ON trouue quatre sortes de ceste herbe: deux portans la fleur iaulne, l'vne grande & l'autre petite. La Tierce portant fleur blanche. La Quatriesme portant la fleur rouge, semblables les vnes aux autres de fueilles & figure.

*Pentaphylon lucum maius*.  
Grande Quintefueille iaulne.

*Pentaphylon lucum minus*.  
Petite Quintefueille iaulne.



## LA FORME.

La grande Quintefueille iaulne a les tiges tendres & rondes, se coullantes par terre comme celles de la Thanaise sauuage, s'attachãs à la terre en plusieurs endroits, sur lesquelles croissent fueilles longues, crenées tout au tour, tousiours cinq ensemble sur vne queue. Les fleurs sont iaulnes, parties en cinq fueilles, lesquelles apres estre euanouies se tournent en petites mures rondes & dures, comme petites Fraises, esquelles la semence croist. La racine est noiratre, gresse & longue.

La petite Quintefueille iaulne est fort semblable à la premiere de fueilles, de maniere de se traier, tiges, fleurs & semence, sinon qu'elle est beaucoup plus petite, & ne s'attache point facilement à la terre, aiant les fueilles plus petites, lesquelles sont blanchatres par deslous.

*Pentaphylon album.*  
Quintefueille blanche.

*Pentaphylon rubrum.*  
Quintefueille rouge.



- 3 La Quintefueille blanche est semblable à la grande Quintefueille iaulne de rinceaux coulans par terre tendres & gressles, & de fueilles parties en cinq, sinon que ses tiges sont velues. Les fueilles longues & crenées non tout au tour, mais au-deuant seulement. Les fleurs blanches, & la racine non simple, mais aiant plusieurs autres petites racines pendantes.
- 4 La Quintefueille rouge est aussi aucunement semblable aux autres, principalement à la grande iaulne. Les fueilles parties en cinq fueilles crenées tout au tour lesquelles par bas sont blanchâtres, & par dessus noirâtres. La tige est d'vne palme ou d'vne pied de haut, de couleur brunie, ou rougeâtre, noueuse & non velue. Les fleurs croissent au sommet des tiges le plus souvent deux en semble, de couleur rouge obscur, apres lesquelles suruiennent petites meures rondes, rougeâtres comme Fraises, mais plus dures: dedans lesquelles est contenue la semence. La racine est tendre, s'estendant ça & là,

## LE LIEV.

La Quintefueille croist en lieux ombrageux & bas, aucunes fois aussi pres des eaux, principalement la rouge, laquelle se trouue seulement de dans les fossés, ou autour des fosses & eaux coyes.

## LE TEMPS.

La Quintefueille fleurit en May, & principalement en Iuin.

## LES NOMS.

La Quintefueille s'appelle en Grec *πενταφυλλον*; en Latin & es Douctiques *Pentaphylon*, & *Quinquefolium*; en haut Aleman *fünffingelkraut*, & *fünffölaten*; bas Aleman *Disföngerkraut*.

## LE TEMPERAMENT.

La Quintefueille desèche au troisieme degre.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de la Quintefueille bouillie en eau iusques à ce que la tierce partie soit consumée, apaise la douleur des dens. Item si on tient en la bouche la decoction, & on en lue la bouche elle

guérit les vlcères d'icelle.

- B La mesme decoction de la racine de Quintefueille beuë, guérit la dyfentere, & tout flux de ventre, & arreſte tout flux de ſang qui coule en abondance, & eſt bone contre gouttes & ſciatiques.
- C La racine cuiſte en vinaigre, adoucit les vlcères corroſifz, & confume & diſſoult cœdemes & edulrilloens, guérit les mauuix ongles, & inflammations au tour du ſiege, & toute gratelle, ſi on l'induit deſſus.
- D Le ius de la racine encores tendre beu profite contre les paſſions du foye & des poumons, & contre toute poiſon.
- E Les fueilles beuës en eau miellée, ou vin trempé & vn peu de poiure guériſſent les fieures tierces & quartes: Et beuës en meſme forte par quarante iours, guériſſent le haut mal.
- F Les fueilles pilées & appliquées guériſſent les hergnes ou derompures, & meſlées avec ſel & miel ferment les plaies, ſiftules & vlcères ambulatifz.
- G Le ius des fueilles beu guérit la iaulniſſe & conforte le foye.

## De la Tormentille.

## LA FORME.

LA Tormentille eſt fort ſemblable à la Quintefueille: elle a les tiges greſſes, rōdes, cinq ou ſix fortans d'vne racine & ſe trainés par terre. Les fueil les ſont petites, croiſſans cinq ou le plus ſouuent ſept ſur vne queue, fort ſemblables aux fueilles de la Quintefueille, & chacune d'icelles eſt crenée tout au tour. Les fleurs ſont iaulnes, fort ſemblables aux fleurs de la Tanafie ſauage. La racine rougeatre & eſpeſſe.

## LE LIEV.

Tormentille croiſt volontiers és boys vmbra-geux, & bas, & és voyes herbuës.

## LE TEMPS.

Elle fleurit ſouuent tout l'eſté.

## LES NOMS.

Ceſte herbe ſe nomme à preſent aux Boutiques en Latin *Tormentilla*, & d'ancus en Grec *ἰσάριον*: en Latin *Septifolium*: en haut Aleman *Coſmen tiff*, *Birchmuretz*, & *Kot heyl touary*: en bas Aleman *Coſmentille*. Les notes de ceſte herbe ſemblēt à ſes approcher à la deſcription de *Chryſogonum*.

## LE TEMPÉRAMENT.

Elle deſeche au tiers degre.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les fueilles de Tormentille avec leur racine bou lies en vin, ou le ius d'icelles beu, ſaiēt ſuer, & par meſme moyen chaſſe tout venin arriere du cœur, outre ce ſont fort bones contre toute poiſon men- gée ou beuë, & contre la peſte. Pareille vertu a auſſi la racine ſeche pulueriſſée & beuë en vin.
- B Item la racine de Tormentille pulueriſſée, & beuë avec vin quand on eſt ſans fieures, ou avec eau fer- rée, ou dedans laquelle on a amorti acier chaud & brulant, quand on a fieure, guérit la dyſentere, & tout flux de ventre, elle arreſte le craché ſang, peſſe ſang, le flux des femmes par trop abondant, & tout flux de ſang.
- C La decoction des fueilles & racines de la Tormentille ou le ius d'icelles beu proufite à toutes plaies du dens & du dehors, & ouure & guérit les obſtractions & bleſſures des poumons & du foye, & eſt bonne contre la iaulniſſe.
- D La racine d'icelle pulueriſſée & peſtrie avec aubin d'œuf & mengée arreſte le trop grand appo- tit de vomir, & la malaçie appellée cholérique.
- E La meſme boulie en eau, de laquelle puis apres on lue la bouche elle guérit les vlcères ma- lings d'icelle.

## Chap. LVI.

## Tormentilla. Tormentille.



## LA FORME.

LE Fraiser se coule par terre de ses branches gresles & velues, attachans à la terre en plusieurs lieux, comme la Quintefueille. Les fueilles sont aucunement semblables aux fueilles de la Quintefueille, crenées tout à bentour, ne produisant toutesfois que trois fueilles sur chacune queue velue. Les fleurs sont blâches, iaulnes par dedés, de figure semblable à la fleur de la Quintefueille, lesquelles peries produisent vn fruit rond & amiable, verd du commençemet, & rouge quand il est meur, aucunefois aussi blanc, de saueur & odeur amiable.

## LE LIEV.

Les Fraises croissent aux bois vmbreux, & fosses sèches & profondes: on en plante aussi beau coup aux iardins. LE TEMPS.

Le Fraiser fleurit en Aueil, & en Iuin est le fruit meur: LES NOMS.

Le Fraiser s'appelle en Latin *Fragaria*: en haut Aleman *Erdbeeren* en bas Aleman *Erdbeeren* crupt. Le fruit s'appelle en Latin *Fragaria* en haut Aleman *Erdbeer*: en bas Aleman *Erdbeeren*. LE TEMPERAMENT.

Le Fraiser & les fraises verdes & non encores meures sont froides & seches. Les Fraises meures sont froides & humides.

## LES VERTVS ET OPERATIONS

- A La decoctiõ du Fraiser beuë, arreste flux de ventre, & le flux menstrual par trop abundant.  
 B La mesme tenue en la bouche cõforte les gençies, guerit les vicerès malings de la bouche, & oste toute puanteur d'icelle. (face).  
 C Le ius des fueilles guerit toute rougeur de la face.  
 D Les Fraises estanchent la soif, & le continuel vsage d'icelles proufite à ceux qui ont grãde cha leur d'estomach.

## De la Tanafie sauuaage. Cha. LVIII.

## LA FORME.

LA Tanafie sauuaage ressemble fort au Fraiser & à la Quintefueille, quant aux branchettes se couchans & attachãs à la terre: Elle a les tiges tendres & gresles. Les fueilles longues, fort incisées, & crenées tout au tour, fort semblables aux fueilles de l'Aigremoine, blanchâtres du costé de la terre, & toutes verdes de l'autre costé. Les fleurs sont iaulnes, fort pareilles à celles de la Quintefueille. La racine fibreuse.

## LE LIEV.

La Tanafie sauuaage croist en lieux herbus, humides & incultués, & pres des fossés.

## LE TEMPS.

Elle fleurit le plus souuent en Iuin & en Iuillet.

## LES NOMS.

Elle se nomme à present en Latin *Potentilla*, & *Argentia*, & d'aucuns *Agrimonia sylvestris*, ou *Tanacetum*

Fragaria.

Fraiser.



Argentia.

Tanafie sauuaage.



F iij

*nacetam fylucifre* : en François Tanasie sauvage, ou Bec d'oye, & Argentiné : en haut Aleman *Grensfigh*, *Grensfig*, ou *Bēstich*, & à sel en Latin *Anserinac* bas Alemā *Ösferich* & *Irgēthue*

## LE TEMPERAMENT.

Argentine est sèche au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Tanasie sauvage boulie en vin ou eaué, puis beue, arreste le flux de ventre, la dysenterie, & tout flux de sang, & prouffite fort au flux des femmes par trop abondant, & principalement aux fleurs blanches d'icelles.
- B La mesme boulie en eaué & sel, & beue dissout tout sang caillé, & ayde à ceux qui sont tombés de haut.
- C La decoction de la Tanasie sauvage guerit les vicerés de la bouche, fluxions chaudes des yeux, & plaies qui empirent, si on les lave d'icelle.

## De la Piloselle.

## Chap. LIX.

## LES ESPECES.

IL se trouue pour le present deux especes de l'herbe appellée en Latin *Pilosella* : L'une appellée grande *Piloselle* : L'autre petite *Piloselle*, lesquelles aucuns appellent Aureilles de souris, cōbien qu'elles ne soient point la vraye Aureille de souris.

*Pilosella maior.*

Grande *Piloselle.*

*Pilosella minor.*

Petite *Piloselle.*



## LA FORME.

Les feuilles de la grande *Piloselle* sont estendues par terre, blanches, houeues, fort semblables à l'aureille d'une grande souris. La tige est velue, d'environ vne paulme de haut, portant fleurs doubles, iulnes, lesquelles se tournent en semence velue, qui s'en volle au vent. La racine est de la longueur d'un doigt, alant plusieurs fibres.

La petite *Piloselle* est semblable à l'autre, mais beaucoup plus petite. Les feuilles petites, blanches du costé de la terre, velues. Les fleurs croissent au sommet des tiges plusieurs ensemble, & font

font de couleur aucunes fois iaulne, aucunes fois rouge, aucunes fois brune, aucunes fois griuolée. La racine est petite, & fibreuse.

## LE LIEU.

La grande Piloselle croist sur petites montaignes sablonneuses, & sur les bors herbus des châps. La petite aux garrigues seches, & semblables lieux incultiués.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en May & en Juin.

## LES NOMS.

- 1 La grande se nomme maintenant en Latin *Pilosella maior*: en haut Aleman *Tagelkraut*, & d'aucuns aussi *Deuszor*: en bas Aleman *groote Piloselle* & *Taghelcrayt*.
- 2 La petite s'appelle *Pilosella minor*, & des hauts Alemans *Deuszorlin* & *Hasenpfatlin*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Piloselles sont chaudes & seches.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

La decoction des feuilles & racine de ceste herbe beuë consolide & guerit toutes plaies intérieures & extérieures, & rompures.

Les feuilles de la mesme sechées, puis mises en poudre, & esparées dedans toutes plaies, les peuvent guerir.

- 1 Le jus de la grande Piloselle instillé dedans les oreilles, guerit la douleur d'icelles, & les nettoye de boue & d'ordure.

La mesme Piloselle méagée ou prinse avec viüdes, esclaircit la veüe, & guerit la rougeur des yeux D.

## De l'Herbe à cotton.

## Chap. LX.

## LES ESPECES.

Il y a deux principales especes des herbes qui portent feuilles blanches, douces & velues, lesquelles aucuns appellent *Piloselle* ou *Filagines*. L'une à belles fleurs iaulnes & bien flairantes. L'autre les a pales & sans aucune odeur, & est de trois sortes, comme il apparoitra cy apres.

*Ageratum Aurelia.*

*Stichas citrina.*

*Filago.*

Herbe à cotton.



## LA FORME.

La premiere de ces herbes que les Alemans appellent *Wheisslummen* a les tiges gressées, dures & blanchâtres ou griffâtres, hautes d'environ vne paulme, aiant les fueilles petites, estroictes, velues & fort douces, semblables en grandeur & figure aux fueilles de *Hyssope* : au sommet des tiges croissent petits bouquets de dix ou douze fleurs ou dauantage, rondes & de la forme de petits bou tons, lesquelles ne perissent pas ou euauissent legerement, mais se peuuent maintenir longuement en leur couleur, & ne font pas d'odeur ingrâte, mais font vn peu ameres. La racine est gressée, courte, & noire.

L'autre espece que l'on appelle Herbe à cotton, est de trois sortes, comme dict est.

La premiere est semblable à la precedente, mais plus grande & plus haute, croissant aucunes fois iusques à la hauteur de deux pieds ou dauantage. Les tiges sont gressées, rondes, griffâtres, couuertes d'vne laine douce, trois ou quatre sortans d'vne racine, droictes, le plus souuent sans aucunes branches. Les fueilles sont longues, estroictes, blanchâtres, douces & velues, semblables aux fueilles de *Stichas citrina*, sinon qu'elles sont plus longues, plus larges, & de couleur vn petit plus verte. Les fleurs sont rondes & boutonneuses croissant au sommet des tiges, plusieurs ensemble, non pas si tresauinues que les fleurs de *Stichas citrina*, & ne font point de longue durée, mais elles s'en volent au vent quand elles sont meures, comme plusieurs autres fleurs.

L'autre espece de l'Herbe à cotton ressemble fort à la precedente de tiges & fueilles. Les fleurs sont aussi pareilles à la precedente: toutesfois elles ne croissent point au sommet des tiges par bouquetz, mais le long de la tige entre les fueilles, voila la plus grande difference qui soit entre celle icy & la precedente.

La Quatriesme espece de ces herbes est semblable aux deux autres Herbes à cotton, de tiges & fueilles blanches & douces, mais elle est du tout plus tendre, plus petite, & plus basse, croissant peu souuent à la hauteur d'vne paulme. Les fleurs croissent à la cyme en rond, de couleur & figure semblables aux autres Herbes à cotton.

## LE LIEU.

La premiere espece croist en lieux raboteux & sablonneux, & aux garrigues seches, & se trouue en grande abondance en plusieurs endroits du Rhin. On la seme en ce pais aux vergers. Les trois autres croissent en ce pais, en terre sablonneuse, pres des fosses seches, & en aucuns lieux humides, & aux boys.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent le plus du temps en Iuin & en Iuillet. L'Herbe au cotton souuent encores en Aoust.

## LES NOMS.

La premiere espece de ces herbes est appellée de Theophraste au lib. 9. chap. 21. en Grec *ελείοχρυσον* : en Latin de Theodore Gaza *Aurelia* & de Dioscoride *ἀγρίανθη* *Agriantidis* Boutiques *Stichas citrina* & *Sticados citrinum* : d'aucuns *Tinearia* & *Amaranthus laeuis* : en haut Aleman *Wheisslummen*, *Wortenslummen*, & *Wortenshaut* : en bas Aleman *Weysslöwen* & *Weysslöwen*.

Il y a encores vne autre herbe descrite de Dioscoride, appellée *ελείοχρυσον* *Elichryson* & *Amaranthus*, laquelle n'a aucune similitude avec la *Stichas citrina*. Car *ελείοχρυσον* *Elichryson* de Theophraste, & *ελείοχρυσον* *Elichryson* de Dioscoride, sont deux herbes differentes. Parquoy ceux qui sent grandement qui pensent que la *Stichas citrina* soit *Elichryson* de Dioscoride.

Les trois autres se nomment à present toutes d'vn nom en Latin *Pilago* en haut Aleman *Wort* & *Wort* : en bas Aleman *Wuertcrut*, ou *Wort melisoen crut*, c'est à dire l'Herbe de la dysenterie.

La premiere de ces trois est appellée de Plin, *Herba impiâ*, pour ce que les dernieres fleurs croissent plus haut que les premieres.

Aucuns veulent faire de ces trois herbes celle que les Grecs appellent *γαφορίον*. Les Latins *Centunculum*, *Centuncularis*, & *Tomentaria*, toutesfois leur opinion n'est gueres vraisemblable.

## LE TEMPERAMENT.

Ces herbes dessechent. La *Stichas citrina* est aussi chaude, comme on peut comprendre par son amertume.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A *Stichas citrina* boullie en vin & beuë, tue & faict sortir les vers, & proufite aux morsures & pointures des bestes venimeuses.
- B La mesme boullie en lexieue nettoye les cheueux de poux & de lendes. La mesme mise es garderobes contregarde les habillemens de la vermine.
- C L'Herbe à cotton boullie en vin & beuë, guerit la dysenterie, & flux de ventre, & arreste le flux menstrual par trop abondant.



## LES ESPECES.

IL se trouve en ce pais trois sortes de Plantain en grâde d'abondance, outre lesquelles s'en trouve encorés vne prouenant en terre salée, lesquelles toutes ressemblent l'une à l'autre de figure.

*Plantago maior.* Grand Plantain.

*Plantago media.* Plantain moien.



## LA FORME.

<sup>1</sup> Le grand Plantain a les feuilles grandes & larges, pres semblables à la Joste, mais sept costes par dehoirs, lesquelles s'assemblent toutes à la fin de la feuille enuers la racine. Les tiges sont rondes, de la hauteur d'un pied ou d'auantage, aucunefois rougeâtres, sortis de la racine au milieu des feuilles, lesquelles depuis le milieu iusqu'à au sommet sont recuertes tout au tour de petits chapiteaux, qui premierement se tournent en petites fleurs, & puis en petites filiques contenant vne graine noiretre semblables à vn espi, ou vne petite torche. La racine est courte, blanche, grosse d'un doigt, aiant plusieurs fibres blanches.

<sup>2</sup> De ceste espee, s'en trouue vne autre, les espis ou torches de laquelle sont fort doubles, tellement qu'à chacun espi au lieu de petits chapiteaux elle produit en abondance autres petites torches, chacune desquelles ressemble à la torche du Plantain.

<sup>3</sup> La seconde espee de Plantain, ressemble à la première, sinon que ses feuilles sont plus estroictes, plus petites, & vn peu velues. Les tiges sont rondes quelque peu velues, produisant au sommet espis, ou torches beaucoup plus courtes que le premier Plantain, & fleurs purpurées en blanc.

<sup>4</sup> La racine blanche & plus longue que la première.

<sup>5</sup> Le troisième Plantain est plus petit que le Second. Les feuilles sont longues & estroictes, ains aussi leurs costes comme les feuilles des autres Plantains de couleur verte obscure, avec petites pointes seules ça & là le long des bords. Les tiges sont anguleuses produisant à la cime beaux espis à fleurs blanches, comme l'espi du Plantain moien. La racine est courte & fort fibreuse.

<sup>6</sup> Le Plantain de mer est le plus estroict, il a les feuilles longues, fort estroictes, & espesses. Les tiges sont d'environ vne palmie de long, pleines de boutons depuis le milieu iusqu'en haut, fort semblables à la torche du grand Plantain. La racine est fibreuse.



## LE LIEU.

Le s trois premiers Plantains croissent par tout ce pais, aux champs herbus pres des voyes, & en aucuns lieux humides.

Le Plantain de mer croist en terre salée sur les digues & bors des eaux salées comme en Zee-lande & à Berges sur le zoom en grande abondance. Il a esté tout le premier cogneu en ce pais & trouué par Iean de Vroede Herboriste fort diligent, le labour & diligence duquel ayont beau coup ferui en ekriuant ce liure.

## LE TEMPS.

Les Plantains fleurissent le plus souuent en ce pais au mois de Iuin & de Iuillet. La semence est meure en Aoust.

## LES NOMS.

Le Plantain se nomme en Grec ἀργύλαιος, cest à dire Langue d'agneau: ἀργίος, προβάτης & πολώνιος, καὶ ἐπὶ ἀπλῶς. en Latin & aux Boutiques *Plantago*: en haut Aleman *wegrich* ou *Schaffjungem*: en bas Aleman *weschsee*.

La premiere espeece s'appelle à present en Latin *Plantago maior* & *Plantago rubra*: en François grand Plantain: en haut Aleman *Koter wegrieh*: en bas Aleman *Rode wechsee*.

La secon de espeece s'appelle en Latin *Plantago media*: en François Plantain moien: en haut Aleman *Wittel* & *Seyter wegrieh*: en bas Aleman *Bret wechsee*.

La tierce est appellée d'aucuns en Gre c πτυρόνιον, cest à dire en Latin *Quinqueneruia*: autre ment elle se nomme à present en Latin *Lanceolata* & *Lanceola*: en François petit Plantain, Lanceole, & Lanceolette: en haut Aleman *Spitzer wegrieh*: en bas Alemā *Cleyn wechsee* & *Schistside*.

Nous auons appellé la quatriesme *Plantago marina*: en François Plantain de mer: en bas Aleman *Zee wechsee*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Plantain est froid & sec au deuxiesme degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Les faucilles de Plantain mengées avec viandes, ou autrement sont fort bonnes contre desfluxions

ons & catarres, confortent l'estomach, & sont viles aux phtisiques, & à ceux qui ont la toux.

La decoction des feuilles arreste le flux dysenterique, & autre flux de ventre, pareillement le B crache sang, pissé sang, & le flux des femmes par trop abondant, & tout autre flux de sang.

Le ius de Plantain beu arreste & apaise le trop grand appetit de vomir, & estanche tout flux C de sang comme les feuilles & se mence.

La racine de Plantain à part soy ou avec sa semence boulie en vin doux, & beuë, outre les con D duits du foye & des rognons estouppés, & est vile contre isulniffe, & vicerés des rognons, & de la vesie.

On trouue aussi par escrit que trois racines de Plantain prinſes avec vin & eauë guerissent des E sieures tierces: & quatre racines, les sieures quartes.

L'usage de Plantain est bon en tous vicerés malings, pourris, & coulans, plaies vieilles & nou- F uelles, toutes apostemes & inflammations chaudes, contre chancres, fistules, mauuaise gratelle, & contre morsures de chiens enragés, si on broie les feuilles & met dessus, ou le ius distillé dedés, ou meslé parmy emplastres & vnguents qu'on y applique.

Les feuilles de Plantain apaisent les douleurs de la goute, & sont fort viles appliquées sur les G membres enflambés & plains de chaleur & douleur.

Le ius de Plâtain distillé aux oreilles est fort vile contre la douleur d'icelles, & aux yeux con- H tre la douleur & inflammation d'iceux.

Le mesme ius ou decoction des feuilles ou racines guerit les vicerés malings de la bouche, I douleur de dens, & genciues saigneuses, quand on sen laue souuent la bouche.

Les feuilles de Plantain broiées avec sel & appliquées sur les apostemes & boïſſes d'autour des K oreilles & de la gorge, les guerissent. La racine aussi portée au col est bonne pour le mesme, com me aucuns ont escrit.

Du Pied de corneille. Chap. LXII.

LES ESPECES.

IL se trouue en ce pais pour le present deux especes d'herbes, qui sont comprises sous le nom de Pied de corneille.

*Pseudocoronopus.* Corne de cerf.



*Coronopus Ruellij.*  
Pied de corneille de Ruell.



## LA FORME.

Le premier Pied de corneille qui se nôme aussi Corne de cerf, a les fueilles longues, estroictes & velues, produifantes à chaque costé trois ou quatre comme petites fueilles pres semblables à vne corne de Cerf branchue, espandues sur la terre en forme d'estoille. Du milieu desquelles font les tiges petites, rondes & velues, produifans espis & torches comme le grand & moien Plantain. La racine est longue & fibreuse.

Le second Pied de corneille, a trois ou quatre tiges se trainis par terre, tousiours couchées par terre, & iamais ne fesseuans, lesquelles sont vestues de fueilles longues estroictes & decoupées, asses semblables aux fueilles de l'autre Pied de corneille, toutesfois plus petites, & non velues. Les fleurs sont petites, blanches, fortans d'entre les fueilles, & la tige, bien serrées à la tige, lesquelles fletries produisent petites bourfes plattes, larges & rudes, contenant la semence. La racine est blanche, longue d'un doigt, asses semblable en siveur au Nastort.

## LE LIEV.

La premiere espeece croist en Brabant & Flandres, es lieux non cultiués, sablonneux & pres des voyes. La deuxiesme croist pareillement pres des voyes, & aux chemins secs & sablonneux, & sur les digues & rempars, principalement en quelques endroits pardessus Anuers, ou elle croist en si grande abondance que bien pres'on n'y void autre herbe.

## LE TEMPS.

Ces deux herbes fleurissent en May & Iuin.

## LES NOMS.

La premiere se nomme en ce pais Corne de cerf, & en aucuns lieux Herbe de la comtesse: en Latin *Cornu ceruini*, ou *Herba stella*, & *Stellaris*: en François Corne de cerf, ou Dent au chien: elle est incognue aux Boutiques. Aucuns Modernes l'appellent en Grec *καρσινισμος*: en Latin *Pes cornu ceruini*: en haut Aleman *Krautris*, pensans que soit la mesme Coronopus, que Dioscoride a descrit au chap. 123. de son second liure, combien qu'à la verité elles ne se ressemblent point. Pourtant l'aues nous appellée *ψευδοκαρσινισμος*, *Pseudocoronopus*, c'est à dire Pied de corneille bastard.

La seconde espeece approche fort à la description de Coronopus faicte par Dioscoride, combien que toutesfois le tresauant Ruel Docteur en son temps de Paris, ne se puisse induire à croire que ce soit le vray Coronopus. Parquoy à cause de Ruel lequel a descrit ceste herbe fort naïuement, nous l'aues appellée Coronopus Ruellij: en bas Aleman *Kraeyenboet*, ou *Rauenboet*.

## LE TEMPERAMENT.

La Corne de cerf est froide & seche, de temperament fort semblable au Plantain.

Le Pied de corneille, comme le goult le manifeste, est chaud & sec semblable au Nastort, sinon qu'il n'est pas si chaud.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La Corne de cerf est de pareille vertu que le Plantain, duquel elle est vne espeece, & peut estre vsurpée en toutes choses ausquelles le Plantain est bon. Elle a aussi esté trouuée tresinguliere contre pisse sang, grauelle & pierre, prise en viandes au autrement. *Myosouron*

B Si le Pied de corneille est le vray Coronopus, la racine d'icelle cuite sous les cédres, ou bien mengée es viandes, est fort utile contre flux de ventre qui prouiet de refroidement de l'estomach, & a esté causé des humeurs ghuanes qui sont aux boyaux: à quoy la siveur de la racine icy descrite, demontre qu'elle soit bonne, veu qu'elle est eschauffante & vn peu atringente.

Queuë de souris.

## De la Queuë de souris. Chap. LXIII.

## LA FORME.

Queuë de souris est vne petite herbe & basse, aiant les fueilles petites & fort estroictes, entre lesquelles prouiennent de la racine petites tiges, garnies de fort petites fleurs blanchastres enapres petites longues torches, fort semblables à la queuë d'une souris, & aux torches du Plantain auant que fleurir, esquelles est enclôse vne semence petite & brune.

## LE LIEV.

La Queuë de souris croist es grasses champagnes, en aucuns prés, & aucunois aussi pres des voyes.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Auiil: les torches sont meures en May, & incontinet après



apres toute l'herbe perit, tellement qu'il ne s'en trouve point de seche en Juin.

## LES NOMS.

Elle se nomme en ce pais Queuë de souris, & là selon en Grec *μύς ούρα*, ή *μύσση* : en Latin *Cauda murina* & *Cauda muris*: en haut Aleman *Tausert houn*: en bas Aleman *Spuffe stertens*. Ce n'est pas *Holoosteum*, ne *Denticula canis* Ruellij, comme aucuns estiment.

## LE TEMPERAMENT.

La Queuë de souris refroidie, & n'est guere differente du Plantain.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les vertus & operatiõs de ceste herbe ne sont point encores cognues, toutesfois autant qu'on A peut comprendre par la saveur d'icelle, elle est fort semblable en facultés au Plantain.

## Du Plantain d'eauë.

## Chap. LXIII.

## LA FORME.

LE Plantain d'eauë est vne belle herbe, à feuilles grandes & verdes, non trop differentes aux feuilles de Plantain, produisant la tige branchue, les fleurs petites & blanches, parties en trois, & apres icelles boutons triangles. La racine est si breuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist aux bors des fosses, & estisgs, aucunesfois aussi pres des riuieres.

## LE TEMPS.

Elle fleurit depuis le mois de Juin iusques en Aoust.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme à present en Latin *Plantago aquatica*: en haut Aleman *wasser twegrich* & *froschloefelmann*: en bas Aleman *water wech*. *etc.*

## LE TEMPERAMENT.

On trouve par escrit que ceste herbe est froide & seche.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Aucuns mont les feuilles de ceste herbe sur les iambes des hydropiques, pensans que l'eauë qui est au ventre soit par icelles attirée aux iambes.

Les gens de sçavoir modernes escriuent quelle a les mesmes vertus & facultés que le Plantain, duquel auons parlé dessus au chap. LXI.

## De la Renoüëe. Chap. L X V.

## LES ESPECES.

IL y a deux especes de ceste herbe comme Dioscoride escrit, Malle & Femelle. Le malle se nomme Renoüëe. La Femelle n'a point de nom particulier.

## LA FORME.

1 Renoüëe a beaucoup de tiges rondes, tendres, & fort renouëes, se trainans par terre, & aians les feuilles longues & estroictes, non trop differentes aux feuilles de Ruë, mais plus longues. Les fleurs sont petites, croissans le long de la tige entre les feuilles & les neuds, de couleur aucunesfois blanche, aucunesfois purpurée ou incarnée, apres lesquelles vient la semence triangle semblable à la graine d'Ozeille. La racine est ronde & rougeatre, aiant plusieurs fibres.

2 La seconde espece qu'on appelle Renoüëe femelle à trois ou quatre tiges droictes, rondes, & vnies, sans branches, sont renouëes, asses semblables aux tiges & neuds de la Queuë de cheual, toutesfois non si rudes, & au tour des neuds croissent plusieurs feuilles petites & estroictes en forme d'estoille, non guere differentes aux feuilles de Romarin. La racine est blanche se coulant par terre, & iettant de soy plusieurs surcrets.

*Plantago aquatica.* Plantain d'eauë.



*Polygonum mas.* Renoüée.



*Polygonum feminæ.*  
Renoüée femelle.



- 3 Entre les especes de Renoüée, peut bien estre nombrée le Polygonon qui fort s'entrelasse, & est fort renoué: Il croist de la hauteur d'une paulme, produisant plusieurs tiges tendres renouées, entre lassées & jointes ensemble. Les feuilles petites, & estroictes, assez semblables au Genouier, sinon qu'elles sont plus petites, & non poignantes: entre lesquelles croissent fleurs rettes estoillées, de couleur semblable à la tige & aux feuilles, qui sont grisâtres. La racine est fibreuse, longue d'un doigt.

#### LE LIEU.

- 1 La Renoüée mâle croist aux châps pres des voyes & sur les rues.  
2 La Renoüée femelle croist aux bords des eaux courantes, & en lieux humides.  
3 La Tierce espece croist aux bords des champaignes, & champs mal labourés, principalement quand l'année est humide.

#### LE TEMPS.

La Renoüée mâle & la Tierce espece fleurissent depuis le mois de Juin jusques à la fin de l'esté. La femelle se trouve le plus souvent en Juillet & Aoust.

#### LES NOMS.

La Renoüée se nomme en Grec *παλίγον*: en Latin *Sanguinaria*, *Sanguinalis* & *Proserpinaca*.

- 1 La premiere espece s'appelle en Grec *παλίγον* ἀρρῶ καλλι.

*Polygonum tertium.*  
Tierce espece de Renoüée.



καλλιγονη, και παλικαρπου: en Latin *Seminalis*: aux Boutiques *Centummodia* & *Corrigiola*: en François *Renouée* & *Corrigiole*: en haut Aleman *weggrafs* & *wegtritt*: en bas Alemā *weggras*, *Weggras* & *Weggras* *Weggras*.

2 La seconde se nomme en Grec *πολυγονον* δίκλων: en Latin *Sanguinalis femina*: en bas Alemā *Weggras* *Weggras*.

3 La tierce espèce s'appelle en bas Aleman *Knatwef*, laquelle sans doute est vne espèce de Renouée, combien que Dioscoride n'en aye décrit que deux: aussi nous ne la tenons point pour vn Polygonon de Dioscoride, mais pour l'une des quatre espèces de Polygonon que Pline décrit au liure 27. de son histoire. **LE TEMPERAMENT.**

Toutes ces herbes sont froides au deuxième degré, & seches au troisième, & astringentes & incraissantes.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

Le ius de Renouée beu est vtile contre crachemens de sang, pissier sang, & tout flux de sang, & A est prouffitabte contre vomissemens & flux de ventre desordonnés.

Le mesme beu avec vin, ayde aux morsures de bestes venimeuses. B

Il est bon aussi contre fieures tierces, beu vne heure deuant l'accès. C

Les feuilles de Renouée boulies en vin ou eau, & beuës, arrestent toute sorte de flux de ventre, dysenterie, flux des femmes, crachemens de sang & tout flux de sang, comme le ius. D

Le ius d'icelle mis avec vn pessaire aux parties honteuses des femmes, arreste les fleurs & flux E desordonnés d'icelles: mis au nez estanche le sang coulât par iceluy: instillé aux oreilles, en oste la douleur, & desèche la bouë engendrée en icelles.

Iceluy bouli en vin & miel guerit les vlcères & inflammations des parties honteuses. F

Les feuilles verdes & appliquées, aydent grandement la trop grand chaleur & ardeur d'estomach, phlegmons, apostemes, feus sacrés & toutes playes nouuelles. G

Dioscoride dict aussi que la Renouée fait vriner, & est bonne à ceux qui pissent gouste à gous: H te: ce que seulement est vray, quand l'vrine est chaleuseuse & acree.

2 La Renouée femelle à les mesmes vertus que le Masle, comme dit Dioscoride, mais nō si fortes. *Maoris Equiseti apparagus.*

Fleurs de la grande Queuë de cheual.

*E quisetau malus.* I  
Grande Queuë de cheual.

3 Pareillemēt aussi la tierce espèce a les vertus fort semblables à la Renouée. K

**De la Queuë de cheual. Chap. LXVI.**

**LES ESPECES.**

Il y a deux sortes de Queuë de cheual selon Dioscoride & Pline. La grande, & la petite.

**LA FORME.**

Quand la grande Queuë de cheual commence à sortir, elle produict les tiges rondes, creules, nues, rudes, fort renouées, les quelles sont si tresrudes que les tourneurs & couteliers en polissent & vnissent leurs ourages, & mances des couteaux: à la cime d'icelles croissent petites masses rondes & noires. En apres les tiges se brunissent ou deuenent rougeâtres produifans tout au tour à chacune loincture plusieurs petis ions tendres, gressles, & nouëux. Elle croist fort haut tellement qu'avec ses ions ainsi pen-



G ij

pendans, elle ne ressemble point trop mal à vne Queuë de cheual. La racine est blanche, noïeuse comme la tige.

*Equiseti minoris flores.*

Les fleurs de la petite Queuë de cheual.

*Equisetum minus.*

Petite Queuë de cheual.



La petite Queuë de cheual, n'est pas trop differente à la Grande. Elle produit, quand elle commence à sortir, tiges nues, rondes, creuses, noïeuses, au bout desquelles est comme vn espi de petites fleurs blanches, qui incontinent perissent: En apres surcroissent de la racine autres brâches fort noïeuses, & pleines de ioinctures, au tour desquelles croissent ioncs ronds & noïeux, comme à la grande Queuë de cheual, mais non si grands ne si rudes, ains plus doux, tellement qu'ilz ne valent rien pour polir. La racine est tendre, gresse & noire.

#### LE LIEV.

La grande Queuë de cheual croist aux fosses, estangs, & lieux fort humides. La petite prouïe en lieux bas, ombrageux, & aussi és champs secs & sablonneux.

#### LE TEMPS.

Les tiges nues de la grande Queuë de cheual sortent hors en May. Les fleurs de la Petite en Aueil, & vn peu apres, les tiges reueftues de petis ioncs.

#### LES NOMS.

Ces herbes s'appellent en Grec *ἰσίδιον*, & d'aucuns *ἰσίδιον ἰσίδιον*: en Latin *Equisetum*, *Equiseta*, *Equinalis*, & *Salix equina*: és Boutiques *Cauda equina*: en haut Aleman *Schaffstern*: en bas Aleman *Pectstern*.

La grande se nomme *Equisetum minus*, & d'aucuns *Asprella*: en haut Aleman grosz *Schaffstern*, *Rosfchwanz*, *Pferdeschwanz*, *Roswadel*, *Kannenkraut*: en bas Aleman groot *Pectstern*, & *Kannenkraut*.



La petite fappelle en Grec ἰσκιόφυλλον ἢ ἰσκιόφυλλον en Latin *Equisetum minus* aut *alterum*, & *Equinum*, & d'aucuns comme escrit Antoine Musa, *Scevolas* en haut Aleman *hleyh Schaffstetw*, *Katsenwedel*, *Katsenfestwants*, *Katsen fageken* en bas Aleman *hleyh Preeststret*, & *Lattenstret*.

LE TEMPERAMENT.

Les deux Queues de cheual sont froides au premier degré, & seches au deuxiesme, astringentes, & deficatives sans acrimonie.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoction de Queue de cheual en vin ou eau beue, estanche tout flux de sang, & tout autre flux desordonné principalement des femmes, guerit aussi la dysenterie, & tout flux de ventre, & est en toutes ces choses souverain remede, comme Galien escrit. Le mesme fait aussi le jus de l'herbe beu à part soy ou avec vin.

La Queue de cheual prise en la mesme sorte que deuant, est tresutile à tous viceres, & blessures B des rognons, vessie, & entrailles, & rompures.

La Queue de cheual boulie avec sa racine, est bonne contre la toux, difficulté de respirer, & C rompures du dedens, comme escriuent Dioscoride & Pline.

Le jus d'icelle mis dedans le nez, estanche le sang qui en coule, & mis avec vn pessaire à la nature des femmes, arreste le flux d'icelles.

Icelle pilée & esparse sur playes nouvelles les recolle & guerit, & les garde d'inflammation. Le E mesme fait aussi la pouldre d'icelle seche espaneue sur les playes, & blessures fresches.

Du Signet de Salomon. Chap. L X V I I.

LES ESPECES.

LE Signet de Salomon est à present de deux sortes. L'un appellé grand ou large Signet de Salomon. L'autre petit ou estroit Signet de Salomon.

*Polygonum latifolium.*

Signet de Salomon à feuilles larges.

*Polygonum angustifolium.*

Signet de Salomon à feuilles estroictes.



## LA FORME.

Le large Signet de Salomon, a les tiges longues, rondes: Les feuilles longues, verdes, plus grandes, plus longues, & plus polyes que les feuilles de Laurier, entre lesquelles pendent à queues courtes, belles fleurs verdastres; longues & creuses, trois ou quatre ensemble, tellement que chaque queue porte communement plus de fleurs que de feuilles: les fleurs peries se tournent en bayes rondes, verdes au commencement, & puis noires, semblables au fruit de Pierre, ou aux Cusines. La racine est longue, de la grosseur d'un doigt, noieuse, blanche, aiant plusieurs fibres, & saveur au commencement qu'on le gousté douce, puis apres un peu acré & amere.

Le Signet estroit, n'est point fort different de l'autre, sinon que ses feuilles sont plus estroictes, & ne viennent point le paréent, mais quatre ou cinq fortans d'une ioincture au tour de la tige, bien pres en forme d'estroille. Les fleurs sont plus verdastres, & le fruit plus noir. La racine plus petite & plus gresle, au reste semblable à la suédice.

## LE LIEV.

Le large Signet de Salomon, croist en ce pais es bois secs & haut esleués. Le second vient aussi aux montaignes & bois, mais principalement en Alemagne. Icy on ne le trouue sinon planté aux jardins des Amateurs des herbes.

## LE TEMPS.

Ils fleurissent tous deux en May & en Juin.

## LES NOMS.

Le Signet de Salomon se nomme en Grec *πυλλιον*: en Latin *Polygonatum*: es Boutiques *Sigillum Salomonis*: en haut Aleman *wess wuets*, c'est à dire Racine blanche; en bas Aleman *Balomon* *sgghel*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Signet de Salomon est de nature chaude & seche, absterfue, & quelque peu astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de Signet de Salomon pilée consolide & guerit les playes sur lesquelles elle est appliquée  
 B La mesme toute nouvelle, pilée & induicte ou le ius d'icelle, efface toutes lentilles, taches, meurtrissures (puenistes par estre bastu, robé, ou hurté) soit en la face, soit en toute autre partie du corps.  
 C Ceste herbe ne la racine d'icelle ne sont point vtilés à prédre par dedens le corps, comme escrit Galien.

## De l'Herbe aux pulces. Cha. LXVIII

## LA FORME.

Les feuilles de l'Herbe aux pulces sont longues, estroictes & velues, entre lesquelles sortent branchettes rondes & tendres, reueftues de feuilles pareilles mais plus petites, garnies au sommet de chapiteaux longs & ronds en forme d'espi, aïs la fleur verdastre, qui se tourne puis apres en petite semence brune & glissante, fort semblable aux pulces de forme, couleur, & grandeur.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist aux champs, comme dict Dioscoride, & lieux ouuers. On la seme en ce pais aux jardins, & là ou elle est vne fois semée, elle fort tous les ans se semant d'elle mesme.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Juillet & Aouit: & aucunes fois aussi la semence est meure.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ψυλλιον*: en Latin *Psyllium* & *Herba pulicaris*: aux Boutiques *Psyllium*: en haut Aleman *flosschaut*; en bas Aleman *lofcrupf*.



LE TEMPERAMENT.

La semence de Pſyllium (de laquelle on vſe principalement en medecine) eſt froide au ſecond degre & temperée en humidité & ſechereſſe comme Galien & Serapio eſcrivent.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La ſemence de Pſyllium bouillie en eauë ou trempée, & beuë, purge par bas les humeurs aduſtes, & bilieufes: outre ce appaiſe la douleur, & adoucit les inflammations & chaleurs des entrailles, elle eſt vtile cõtre ſieures chaudes, & chaleurs interieures, & contre trop grãde ſechereſſe & ſoiſ.

La meſme ſemence vn peu pilée & non du tout rompue, roſtie au feu eſt vtile à la dyſentere, & B flux de ventre deſordonné, ſignamment quand ilz ont eſte cauſés par medecine trop forte.

La ſemence d'icelle meſlée avec huile roſat & vinaigre ou eauë eſt vilement induicte à dou- leurs chaudes des ioinctures, apoſtemes derriere les aureilles, & autres phlegmons, & parcellément à douleur de teſte.

La meſme induicte avec vinaigre eſt bonne cõtre excrescences du nôbril, & hergnes des petis D L'eauë ou la ſemence a eſté trempée, eſt vilement induicte ſur feu volage, & toutes inflamma E tions. Elle eſt bonne auſſi diſtillée aux aureilles trauaillées de fluxion & vermineuſes.

On diët auſſi que ſi on eſpand ceſte herbe encores verde parmy la maiſon, que les pulces n'y F viennent, & ne ſy engendrent point. LES NVISANCES.

La ſemence de l'Herbe aux pulces priſe abondamment, nuit fort à la nature humaine: Elle engendre refroidemens & engourdiſſement de tout le corps, avec peſanteur & triſteſſe de cœur, tel lement que ceux qui en ont beu, perdent ſouuent toute patience,

LES REMEDES.

Quand quelcũ a pris la ſemence de Pſyllium en trop grande abondance, tellement qu'elle aye apporté quelque nuifance, il eſt bon auant toutes choſes, de prouoquer a vomir par medecines à ce propres & diuiſibles, pour pououir leſter hors ce qui a eſté pris, puis donner à boire bon vin doux & vieil à part ſoy, ou auquel ait bouillie aluyne, ou vin meſlé avec miel & vn peu de lexieue, ou bien la decoction d'aneth comme deſcrit Serapio: Et outre ce, tout ce qui eſt vtile contre les nuifances ſaiçtes par Coriandre verd mengé.

Des Herbes nageantes ſur l'eauë.

Chap. LXIX.

LES ESPECES.

IL y a pluſieurs eſpeces des herbes qui croiſſent ſur l'eauë & dedens, deſquelles la plus grande part ſera deſcrite en ce liure: les aucunes és autres chapitres: mais en ce chapitre preſent, ſeulement quatre ou cinq de celles qui croiſſent par deſſus l'eauë.

LA FORME.

1 La premiere & la plus belle des Herbes nageantes, laquelle ſe nomme auſſi Potamogeton, a les branches longues, rondes & nouëuſes. Les ſucilles à queue petite & courte, larges, grandes, & plates, couchées & menées ſur l'eauë, au cunement ſemblables au grand Plantain, plus petites toutesfois. Les fleurs croiſſent au ſommet des branches hors l'eauë ſur eſpis longs & purpurés ſemblables aux eſpis de Biſtorta, apres leſquelles peries ſuruiennét petis chapiteaux ronds, la ou eſt enclouſe ſemence dure.

2 La ſeconde eſpece a les tiges longues menues: les ſucilles longues & decoupees menu, eſtendues au large ſoubs l'eauë, toujours cinq ou ſix à l'oppoſite l'vne de l'autre, comme les ſucilles de Garance, ou de Muguet, chacune ſucille eſt pareille à celles de la Tanaiſie, ou de Milleſucille vulgaire, plus petites toutesfois, & plus incifées que les ſucilles de la Tanaiſie, plus grandes & plus larges que les ſucilles de Milleſucille. Elle produit ſes fleurs ſur tiges croiſſans hors l'eauë, toujours trois ou quatre oppoſées l'vne à l'autre, ſemblables à vne petite roüé partie en cinq, & aux Gyroſſées, ou fleurs de la Bugloſſe vulgaire, blanches, & au milieu iaulnes. Les racines ne ſont que fibres longues, greſſes, & noires, & par le bout qu'elles ſe fichent en terre, blanches & luifantes comme cryſtal.


3 La Tierce herbe menée ſur l'eauë, appellée Mors de grenouille, a les ſucilles rondes, couchées & eſtendues ſur l'eauë, ſemblables aux ſucilles du Cabaret, mais plus petites, attachées ſur courtes queues ſortans de la racine. Les fleurs croiſſent entre les ſucilles, blanches, quelque peu iaulnes au milieu, parties en trois, ſont ſemblables de figure aux fleurs du Plaſtain aquatique & de la Militaire aquatique. La racine eſt eſpeſſe, courte, aiant pluſieurs fibres comme la racine de Militaire aquatique.

4 Par deſſus l'eauë auſſi ſont menées ſucillettes rōdes, verdes, non guere plus grandes q̄ les Lentilles, aians par deſſoubs petites fibres blanches pour racine, & ſont appellées Lentille d'eauë.

# So Des Herbes nageantes sur l'eauë. Cha. LXIX.

*Poranogriton.* Espi d'eauë.

*Gyrofolées d'eauë.*



Hepatique d'eauë.

5 Entre les herbes qui nagent, est aussi nombrée vne herbe qu'aucuns appellent Hepatique d'eauë, laquelle change fort ses fueilles d'en haut selon les lieux ou elle croist. Celle qui croist dedans l'eauë, porte sur tiges greffes les fueilles fort menu incisées, fort semblables aux fueilles de la Camomille vulgaire, aussi auant quel les font soubz l'eauë, & par dessus l'eauë au sommet des tiges, elle porte petites fueilles rondes, yn peu crenées tout au tour. Celle qui croist hors l'eauë aux bors des fosses, n'a autres fueilles que celles menu incisées. Celle qui croist loignant l'eauë, & est aucunes fois inondée de l'eauë, a aussi au sommet des tiges les fueillettes rondes, mais beaucoup plus crenées, que les fueilles de celle qui croist du tout en l'eauë. Les fleurs de ces herbes sont blanches, de bonne odeur, iaulnes au milieu, féblables aux fleurs des Baisinetz ou du Fraisiër, apres lesquelles y a des chapiteaux rudes, côme au Baisinet.

## LE LIEU.

Ces herbes croissent es eauës coyees, & es fosses.

## LE TEMPS.

L'epi d'eauë, & Mors de grenoille fleurissent le plus souuent en Iuin. Les autres en May.

## LES NOMS.

1 La premiere se nomme en Grec *παραμυρίαν* & *σχυρίαν*: en Latin *Fontalis* & *Fontinalis*, & d'aucuns *Spicæ*, Incogne es boutiques: en haut Aleman *Zamhrant*: en bas Alemã *fonteyneruyt*.

La seconde est tenue à present d'aucuns pour vne espece de l'herbe appellée en Grec *μυρίανθη*

*μυρίανθη*



φύλλον: en Latin *Millefolium*, Aucuns l'appellent en ce pais Gyroflée d'eau.

- 3 La tierce se nomme *Morsus ranae*, c'est à dire Mors de grenouille. Elle n'a point de nom Grec, ny Latin, si n'est que ce soit ἐπιμάδιον, *Epimedium*.
- 4 La Lentille d'eau s'appelle en Grec φάουλα, ή α φάουλα ή επι τῆς τριμύρας: en Latin *Lens palustris* ou *Lacusfris*: és Boutiques *Lenticula aqua*: en haut Aleman *Wasserlinsen*: en bas Aleman *Wasserlinsen*, & d'aucuns *Lynce grum*.
- 5 La cinquiesme pareille aux *Balsinetz* de fleur & semence, semble bien à voir vne espeece de *Ranunculus*, ou *Polyanthon*: pourtant elle se peut bien nommer en Latin *Polyanthon palastre*, ou *agusticium*: en bas Aleman *Witte* ou *water* *Booterbloemen*: les Apothicaires modernes l'appellent *Hepatica* & *Hepatica aquatica* ou *palustris*: en bas Aleman *Water Heuterkrayt*.

## LE TEMPERAMENT,

Le Potamogeton refroidit, Pareillement le Mors de grenouille, & la Lentille d'eau.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 Potamogeton est vtilement appliqué sur vlcères rongés & pourris, & sur vlcères coulans qui sont aux iambes avec miel & vinaigre, comme dit Pline.
- La decoction d'iceluy cuicte en vin est vtilement beue contre la dyfentere & tout flux de ventre: & a pareille vertu que la Renoüée, comme Galien escrit.
- 4 La Létille d'eauë meslée avec fine fleur de fromét, & induicte, proufite grédement aux phlegmôs, crispelles & douleurs de ioinctures. La mesme guerit aussi le siege des petis enfans, qui tôte.
- Les trois autres ne sont point vsurpées en medecine.

## D'Alysson.

## Chap. LXX.

## LA FORME.

Alysson.

LA tige de ceste herbe est droicte, se fendant au sommet en trois ou quatre petites branches. Les feuilles sont premierement rondes & puis longues, blanchastres, & rudes au toucher. Elle produit au sommet des branches petites fleurs iulnastres, & puis apres petites filiques rudes, blanchatres, plates, & bien pres rondes en forme de bouclier, esquelles est contenue la graine plate, pres semblable aux Gyroflées, mais plus grande.

## LE LIEV.

Alysson, comme escrit Dioscoride, prouient en lieux mō taigneux & scabreux. Elle ne se trouue en ce pais sinon plantée és iardins des Herboristes.

## LE TEMPS

Elle fleurit en ce pais en Iuin, & la semence est meure en Iuillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec ἀλυσσον: en Latin, aussi *Alyssum*, & d'aucuns Modernes *Lunaria maior*.

## LE TEMPERAMENT.

Alysson de seche comme dit Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Alysson beu, ou tenu deuant le nez & flairé, oste le hoquet.
- B La mesme prise avec autres viandes guerit la rage ou forcenerie causée par morsure de chien enragé.
- C La mesme pendue en la maison ou à la porte, garde les gens & bestes de toute forcelerie.

## De la Scabieuse. Chap. LXXI.

## LES ESPECES.

IL se trouue en ce pais trois especes de Scabieuse, pareilles l'vne à l'autre soit en fleurs, soit en feuilles.



*Scabiosa communis.*  
Scabieufe.

*Scabiosa tertium genus.*  
Scabieufe de brebis.



LA FORME.

- 1 La premiere espece qui est la plus cõmune, & la plus grande, a les feuilles au premier estroictes, grisâtres, velues, espandues sur la terre, d'entre les quelles naissent tiges rondes, velues, produisans les feuilles fort incisées, aussi velues & grisâtres, aucunement semblables aux feuilles de la grande Valeriane. Au sommet des tiges croiséés les fleurs bleûâtres amassées ensemble en forme d'un petit chapeau large & rond. La racine est blanche, longue & simple.
- 2 La Seconde espece, est la plus petite de toutes, non plus haute d'une paulme, fort ressemblant à la grande tant en fleurs qu'en feuilles, sinon qu'elle est plus petite, & a les feuilles plus fort & plus profond incisées.
- 3 La Tierce espece est vne moyenne entre les au tres deux, plus petite que la grande, & plus grande q la petite, de fleurs fort semblables aux deux dessus dictes: Les feuilles lógues, grisâtres, velues, crenées tout à l'entour, non pas toutesfois si fort ne si profond incisées que celles des deux autres. La racine est gresse & longue, comme celle de la premiere & grande Scabieufe.
- 4 Il se trouue encores vne herbe semblable aux Scabieu-



*Lacea nigra.*



Scabieuses croissant enuirō pied & demy, ou deux pieds de haut, aiant les fueilles longues, estroictes, semblables aux fueilles de la grande Scabieuse, ou à celles du Mors de diable, lesquelles sont aucunesfois crenées & couppees par les bors. Les tiges sont rondes, sur le sommet desquelles croissent petites boules rondes & escaillées, semblables aux chapiteaux des Bleuets, plus grandes tousfois, du milieu desquelles sortēt fleurs capillaires purpurées semblables au milieu des Bleuets. La racine est grosse, courte & courbe, aiant plusieurs fibres.

## LE LIEU.

La grande Scabieuse & le *Iacea nigra* croissent es prés & lieux herbus. La plus petite Scabieuse croist es prés bas situés & aquatiques. La Scabieuse de brebis croist aux champs & pres des voyes

## LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes en Iuin & Iuillet.

## LES NOMS.

Ces herbes n'ont pas esté descrites par les Anciens, que ie sçace, & pourtant n'ont elle aucun nom Grec ne Latin qui nous soit cognu.

- 1 La premiere se nomme à present es Boutiques *Scabiosa*, & d'aucuns *Isapa*, *Pfora*; en haut Aleman *Apossemkraut*, *Pessemkraut*, & *Grindkraut*; en bas Aleman *Scabiose*.
- 2 La Seconde s'appelle maintenant *Scabiosa minor*, c'est à dire petite Scabieuse.
- 3 La Tierce se nomme Scabieuse de brebis; en bas Aleman *Schaepe Scabiose*.
- 4 La Quatrieme se nomme à present es Boutiques *Iacea nigra* & *Materfilon*; & n'y a autres noms qui nous soient cognus.

## LE TEMPERAMENT.

Toutes les Scabieuses sont chaudes & seches, & incifiantes les grosses humeurs.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 Scabieuse boulie à part soy ou avec sa racine, en vin ou eauē & beuē nettoye le thorax, & les A poulmons, & est bonne contre toux enuieillie, & apostemes de thorax, & de toutes parties interieures, les nettoyant, meurissant, glutinant & guerissant. Le mesme fait aussi la Conserue faicte des fleurs d'icelle, & de sucre, prise journellement.

La Scabieuse prouffite aussi contre toute grature, & demangeon, pilée & appliquée sur la grature, ou meslée avec huiles & vnguēs à ce propos.

La lexie dedans laquelle Scabieuse a esté boulie ou trempée, nettoie les cheueux des surfures, (ce sont pailletes blanches comme son qui tombent de la teste) quād d'icelle on fen laue la teste & les cheueux.

- 4 La decoctiō de *Iacea nigra* gargarisée, ou quād on fen laue souvent la bouche, chasse & consume les apostemes de la bouche & du gozier qui sont encores fresches, & meurit & fait rompre celles qui sont enuieillies.

- 2.3 On n'vse en medecine ny de la petite Scabieuse, ny de la Scabieuse de brebis.

## Du Mors de diable. Chap. LXXII.

## LA FORME.

Les tiges du Mors de diable sont rondes, hautes de deux ou trois pieds, produisant fueilles larges, non ou bien peu crenées à l'entour. Les fleurs de couleur de pourpre obscur, aucunesfois blanches, amassées ensemble, comme les fleurs du Houblon, apres lesquelles tombées la semēce fen volle au vent. La racine est noire, dure, courte & espesse, aiant plusieurs fibres aux costés, laquelle au milieu ou au cœur de la racine semble estre mordue.

## LE LIEU.

Mors de diable croist es prés secs, es bois, & pres des voyes.

Morsus diaboli.

Mors de diable.



## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit le plus souvent en Aoust, laquelle estant en fleur est plus facile à cognoistre, autrement elle ressemble auçunement à la Scabieuse, ou à laacea nigra.

## LES NOMS.

Elle s'appelle aux Boutiques *Morsus diaboli*: en François Mors de diable: en haut Aleman *Ceuf selo abbiss*: en bas Aleman *Dupurlo Bret*. D'aucuns Modernes *Succisa* en Latin. Elle n'a nulz autres noms qui soient cognez pour le present.

## LE TEMPERAMENT.

Mors de diable est chaud & sec comme la Scabieuse.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoction de Mors de diable avec la racine boulie en vin & beuë, est vtile à toutes les maladies auxquelles la Scabieuse est bonne, & aussi contre la peste.
- B La mesme decoction dissout le sang caillé dedans le corps par contusion, chute, &c.
- C Mors de diable encores verd pilé avec ses fleurs & racine, puis appliqué sur carboncles pestilentiels & apostemes, les fait meurir & guerir.
- D La decoction de la racine en vin beuë, proufite aux douleurs de matrice, & contre tout venin.

## De Scordion.

## Chap. LXXIII.

## LA FORME.

*Scordium.*

Ceste herbe a les tiges quarrées, velues, ou lanugineuses, se coulant par terre, reuestues à chacun costé de fueilles blanchatres, douces, froncées, rondes & dechiquetées à l'entour, entre lesquelles & la tige naissent petites fleurs rouges, semblables aux fleurs de l'Ortie morte, mais plus petites. La racine fibreuse & se trainant par terre.

## LE LIEV.

Ceste herbe prouient en prés humides, & pres des fosses, & se trouue en aucuns endroits de Brabant.

## LE TEMPS.

Scordion fleurit le plus souvent en Iuin & Iuillet, & adonc se doit il cueillir.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *σκόρδιον*: en Latin *Scordium* & *Trixago palustris*, d'aucuns *Miebris darium*: en haut Aleman *wasser Batenig*, & d'aucuns *Sachsen knoblauch*: en bas Aleman *water looch*.

## LE TEMPERAMENT.

Scordion est chaud & sec au tiers de degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Scordion beu avec vin ouure les obstructions du foye, de la ratelle, des rongnons, de la vessie, & de la matrice: il prouoq l'vrine, il proufite aux obstructions d'vrine, & quand on pille goute à goute, & esmeut & prouoque les fleurs aux femmes.
- B Ice luy pris en la mesme sorte est vtile aux morsures de serpens, & de toutes autres bestes venimeuses, & à ceux qui ont pris quelque poison, à ceux pareillemēt qui sont trompus ou blessés par dedans.
- C Scordion sec puluerisé & pris à la quantité de deux drachmes avec eauë miellée, guerist & arreste la dyfenterie, & proufite aux douleurs d'estomach.
- D Le mesme puluerisé & meslé avec miel & mégé, nettoye le thorax de toutes phlegmes & proufite contre vieille toux.
- E Scordion frais & verd pilé & appliqué guerit playes grandes fresches. Le mesme sec & meslé avec miel, ou puluerisé & espars dedans vieilles playes, & vlcères malings & pourris les guerit, & menge & repouë les excréances de la chair





**F** Ceste herbe boullie en cauf, ou vinaigre, & appliquée sur douleurs de ioinctures, elle les allège & fait tant plus tost partir.

## De Teucrion.

## LA FORME.

**T**eucrion a les tiges brunes, produisant feuill les rondes, ridées & crenées tout au tour, fort semblables aux feuilles de la Germandrée descrite cy dessus au Chap. XVII. Les fleurettes sont d'un pourpre obscur, semblables aux fleurs de la Germandrée. La racine blanche & fibreuse.

## LE LIEV

Ceste herbe comme dit Dioscoride se trouue en Cilicie: En ce pais on ne la trouue que semée ou plantée és iardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

Celle qui croist en ce pais, se voit en fleurs au mois de Iuin & de Iuliet.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *τρίκιστος*, καὶ *τρίκιστος*: en Latin *Teucrium*: incognue és Boutiques: en haut Aleman s'appelle d'aucuns gros *batengel*, c'est à dire grande Germandrée.

## LE TEMPERAMENT.

Teucrium cōme dit Paul Aegineta, est chaud au second degré, & sec au tiers.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Teucrion cuit en vin & beu, ouure les obstructions de la ratelle, & guerit les enflures d'is celle, à quoy il a propriété singuliere. Le mesme fait ausi l'herbe pilée avec figues & vinaigre, & appliquée en forme d'emplâtre sur la ratelle.
- B** Teucrium meslé seulement avec vinaigre, est vilement appliqué sur morsures & piqures de bestes venimeuses.

## Chap. LXXIII.

## Teucrion.



## De la Ioubarbe.

## Chap. LXXV.

## LES ESPECES.

**L**A Ioubarbe comme escrit Dioscoride, est de trois sortes, l'une est Grande: l'autre Petite: & la tierce est celle qu'on nomme Pain d'oyseau.

## LA FORME.

- 1 La grande Ioubarbe a les feuilles grandes, charnues & espesses, larges d'un pouce, & par le bout pointues en forme de langue, entre lesquelles prouient vne tige haute, d'un pied ou davan tage, reuestue tout au tour de feuilles pareilles, se fendit puis au sommet en plusieurs autres branches, le long desquelles croissent beaucoup de fleurs de couleur brune.
- 2 La petite Ioubarbe a les feuilles petites, estroictes, espesses & aiguës par le bout. Les tiges tendres enuiron vne paulme de haut, reuestues de semblables feuillettes, lesquelles produisent petites fleurs jaunes formées en façon d'estoille. La racine est tendre & se traîne par terre.
- 3 Sous les deux autres especes de Ioubarbe est ausi maintenant comprise la Vermiculaire, laquelle produit tiges tendres: les feuilles longuettes, toutes rondes, rougeâtres, semblables à petites verrues, chacune verrue comme vn grain de blé. Les fleurs sont blanches, semblables aux fleurs de la petite Ioubarbe, mais plus petites.
- 4 Le Pain d'oyseau est auuncement semblable à la Vermiculaire, tellement que les Apothicaires ignorans la cueillent souuent pour Vermiculaire, non sans grande erreur, ny sans grand danger des malades vsurpée ausi en medecine pour la Vermiculaire. Elle a les tiges tendres, reuestues de feuilles fort petites, fort courtes, espesses & fort amassées ensemble. Les fleurs au sommet des tiges, jaunes, semblables aux fleurs de la petite Ioubarbe, plus grandes toutesfois.

*Sempervivum maius.* La grande Ioubarbe.



*Craffule minor.* Vermiculaire.



*Sempervivum minus.* La petite Ioubarbe.



*Ilecebra.* Pain d'oyseau.



## LE LIEU.

- 1 La grande Ioubarbe croist sur vieilles murailles.  
 2 La petite ne croist en ce pais sinon es iardins li ou elle est plantée.  
 3-4 La Vermiculaire & le Pain d'oyseau croissent en lieux pierreux & sablonneux, & sur vieilles murailles.

## LE TEMPS.

La grande Ioubarbe fleurit en Iuillet & Aouist. Les autres especes fleurissent en May & en Iuin

## LES NOMS.

- La Ioubarbe se nomme en Grec *ἀνίσωρον*: en Latin *Sedum* & *Semperuivum*, & d'Apuleie, *Vitalis*.  
 1 La premiere espece se nomme en Grec *ἀνίσωρον μέγα*: en Latin *Sedum* & *Semperuivum magnum*; d'Apuleie *ἑρικήσρον καὶ ἰωφθαλμωρον*: es Boutiques *Barba Iouis*: en François Ioubarbe, & grande Ioubarbe: en haut Aleman *Schustwurz* & *groß Wondersbart*: en bas Aleman *Wondersbart*.  
 2 La seconde s'appelle en Grec *ἀνίσωρον μικρόν*: en Latin *Semperuivum* ou *Sedum minus*, d'aucuns *ἑρικήσρον*, d'Apuleie *Erichales*, en François Triquemadam: en haut Aleman *klein Wondersbart*: en bas Aleman *klein Wondersbart*.  
 3 La tierce espece s'appelle es Boutiques *Craffulaminor* & *Vermicularis*: en bas Aleman *Bladeboose* & *Papercullchens*.  
 4 La quatriesme se nomme en Grec *ἀνίσωρον ἄγρια καὶ τριλίφιον*: en Latin *Illecebra*: en François Pain d'oyseau: en haut Aleman *Wunderpfeffer* & *Katzenkrautflin*: en bas Aleman *Wunderpfeper*.

## LE TEMPERAMENT.

La grande & petite Ioubarbe & la Vermiculaire sont froides & seches au tiers degré. Le Pain d'oyseau est chaud & sec, bien pres au quatriesme degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 La decoction de la grand Ioubarbe, ou le ius d'icelle beu est vtile cõtre dysentere & tout flux A de ventre, contre les vers, & contre morsures des phalanges.  
 Le ius d'icelle mellé avec farine d'orge rostie & huile rosat est vilement appliqué sur douleurs B de teste.  
 Le mesme instillé à part soy dedans les yeux inflammés, prouffite grandement: pareillement C l'herbe broyée & appliquée par dehors sur iceux.  
 Le ius de la Ioubarbe mis avec vn pessus de cotton ou de laine dedans la matrice, il arreste les D fleurs, & flux des femmes.  
 La Ioubarbe à part soy ou mellée avec farine d'orge rostie, est vtilement appliquée sur feu vo- E lage, sur viceres chaudes & rongeantes, sur brulures, & toutes inflammations: & pareillement sur la goute venant d'humeurs chaudes.  
 2-3 La petite Ioubarbe & la Vermiculaire ont pareille vertu que la grande. F  
 4 Le ius du Pain d'oyseau prins avec vinaigre, fait vomir & fait iccter par vomissemēt flegmes G grosses & visceuses, & humeurs chaudes & bilieuses: outre ce est bon contre sieures & toute poison prinse par dedens le corps: toutesfois il ne le faut donner sinon à gens robustes.  
 Pain d'oyseau mellé avec graisse ou axunge, resout les bosses & tumeurs appliquée dessus. H  
 Le mesme à part soy induict sur la peau la fait rouge & esleuer pleine de cloches & troué la I chair saine.

## De Kali.

## Chap. LXXVI.

## LES ESPECES.


K Ali est de trois sortes, comme Gens sçauans Modernes escriuent. La premiere espece est la seconde Anthyllis. La seconde est le Tragus de Dioscoride. La tierce s'appelle à present Salicot.

## LA FORME.

- 1 La forme de la premiere espece est descrite dessus au Chap. VII.  
 2 La seconde, laquelle s'appelle Tragus a plusieurs tiges espesses, sur lesquelles croissent feuilles espesses, longues, pres semblables aux feuilles de la Vermiculaire, plus longues toutesfois, chacune desquelles a vne poincte aigue tellement que toute l'herbe en est rude & poignante. Entre les feuilles croissent les fleurettes fort petites, iaulnes, apres lesquelles on trouue la semence aussi fort petite.  
 3 La Tierce espece a plusieurs tiges sans feuilles, fendues en plusieurs branches à beaucoup de ioinctures, se separans legeremēt les vnes des autres, chacune desquelles ioinctures est de la grandeur d'un grain de blé. Ceste herbe n'a ne fleur ne semence.  
 Ces trois herbes sont pleines de ius, & sont salées, & vn peu astringentes, desquelles on fait l'Alumen catinum, duquel on vse en faisant les voirres, & le Sal Alkali.

Tragus.

Salicornia



## LE LIEU.

Ces herbes croissent en terre salée, comme au bord de la mer: & s'en trouve grande quantité en Zelande.

Les deux premières croissent souvent en lieux secs & sablonneux.

La Troisième croît en lieux bas & humides, qui sont souvent inondés de la mer.

1.3

3

## LE TEMPS.

Ces herbes se trouvent en été, & périssent en hyver.

## LES NOMS.

La première espèce est vne Anthyllis comme nous auons icy dessus escrit au VII. Chap.

1

La seconde se nomme en Grec *τραγύδι, ακάριον, κλά τραγύδιου*: en Latin *Tragus*, & *Nepa* de Theodore Gaza.

2

2

La tierce est sans doute aussi vne espèce de *Tragus*, laquelle on appelle à present *Salicornia*.

Les medecins Arabes appellent toutes ces herbes *Kali* & *Alkali*. Les cendres de ces herbes brûlées s'appellent *Alumen carinum*, duquel l'estoffe des verres est faite. Le sel qui sort des cendres est nommé *Sal Alkali*. Et ce qui coule de l'estoffe des verres est à present appellé des Boutiques *Axungia viridis* en bas Aleman *Sonout* Sans *ghesfen* en Italié Fior di cristallo, c'est à dire fleur de cristal.

3

3

## LE TEMPERAMENT.

*Tragus* est de nature froide & seche.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Dix ioinctures de *Tragus* beuës en vin prouffitent à ceux qui ont flux de ventre, & aux femmes qui ont leurs fleurs trop abondamment.

## Du Thalictrom.

## Chap. LXXVII

## LA FORME.

**T**halictrom a les feuilles fort decouppées, semblables aux feuilles de Coriandre ou d'Aluynie Romaine. Les tiges rondes, dures, semblables aux tiges de la Rue, produisans au sommet fleurs nettes pailles, puis apres petites siliques longues, tendres, esquelles est enclose vne petite graine rougeatre. La racine est ligneuse, longue & droicte.

LE

## LE LIEV.

Thaliatron croist le long des voies, en lieux incultivés, & là ou il y a eu au paravant quelque bastiment, là ou aussi vne fois il à esté semé, il y croist facilement de soy mesme tous les ans.

## LE TEMPS.

Ceste herbe commence à fleurir en Juin & demeure fleurissant iusques en Septembre, & au cune fois se trouve la semence.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *Θαλιάντρον* en Latin *Thaliatrum* & *Thaliatō*, & à present *Soppia* en haut Aleman *Wessomen*: en bas Aleman *ffye cruyt* & *Koot melisoen cruyt*.

## LE TEMPERAMENT.

Thaliatron desche sans aucune acrimonie, ou chaleur manifeste.

## LES VERTVS ET OPERAT.

- A La semence de Thaliatron beuë avec vin ou caue ferrée arreste la dyssenterie, le flux de ventre, & tout flux de sang.
- B Thaliatron esché ou pillé & appliqué sur vieux vlcères, les ferme & guerit, & ce à cause qu'il seche sans acrimonie.

## De l'Herbe aux cuilliers.

## Cha. LXXVIII.

## LA FORME.

L'Herbe aux cuilliers, a au premier les fueilles larges & espesses, qui s'ot vn peu creusées par haut come vne petite cuilliere, & aucunes fois anguleuses par les bords pres semblables aux fueilles de l'Ozeille Romaine, sinõ qu'elles ne sont point tendres, ny blanches, mais dures, & de couleur brun verte. Les tiges sont aucunement anguleuses, d'enuirõ vne paille ou vn pied de haut. Les fleurettes sont blanches, & croissent au haut des tiges le long des branches: icelles peries ensuyt la graine petite, rougeatre, enclose en petites filiques. La racine est fibreuse.

## LE LIEV.

L'Herbe aux cuilliers croist en plusieurs endroits de Hollande, Frise, & lieux circunuoisins pres des bayes, & es prés. On la seme en Brabant aux iardins

## LE TEMPS.

L'Herbe aux cuilliers fleurit en Aueil, en May & encor apres.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Hollande & en ce pais l'Herbe aux cuilliers, & là selon en Latin *Cochelearia*: en haut Aleman *Leffebrenst*: en bas Aleman *Leffel cruyt*. Il semble bien que ce soit la *Britannica*, de laquelle Plinè escrit. Aucuns en font l'herbe qui s'appelle en Grec *τράχισον*, & en Latin *Telephium*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Herbe aux cuilliers est chaude & seche, & de goust acre, bien pres comme le Cresson.

## Thaliatrum.



Cochelearia. Herbe aux cuilliers.



H ij

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A L'Herbe aux cuillers boulie en eau est singuliere contre vicerés pourris & ordures de la bouche, quand on l'en laie souvent. C'est aussi vne singuliere medecine contre le mal de bouche appelle de Plinè Stomacace, & de Marcellus Ofcedo, & des Holandois & Frizons *Scuerbnyck*, contre lequel mal elle a esté experimentée fort bonne, à ceste cause est elle en grand vsage entre les Holandois & Frizons.
- B Elle a aussi les mesmes vertus que *Telephium*, pourtant icelle induicte avec vinaigre sur le corps, en oste les taches blanches & noires, & les lentilles.
- C Le mesme fait aussi l'herbe pilée, mise seulement dessus par l'espace de six heures, il faut toutesfois emplastrer les taches apres avec farine d'orge.

## Du Bouillon.

## Chap. LXXIX.

## LES ESPECES.

IL y a quatre sortes de Bouillon comme dit Dioscoride: Les deux premieres sont le Bouillon blanc d'ond l'un est masse, l'autre femelle: Le tiers, est le Bouillon noir: & le quart est le Bouillon sauvage.

*Verbascum album mas.*  
Bouillon blanc masse.

*Verbascum album femina albo flore.*  
Bouillon blanc femelle à fleur blanche.



## LA FORME.

Le Bouillon blanc masse a les feuilles grandes, longues, blanches, douces & velues, du milieu desquelles sort vne tige haute, lōgue, reuëstue depuis bas iusques au milieu ou plus haut de feuilles semblables, mais plus petites, & depuis les feuilles iusques au sommet enuironnée de fleurs jaunes bien s'airantes, chacune fleur partie en cinq fucillettes, ressemblant de ses fleurs delectables à vne chandelle bien ornée. La racine est longue, simple, ligneuse, d'vn doigt de long.

L'autre Bouillon blanc, appellé femelle, a les feuilles blanches, couuertes d'vne laine douce, & les tiges & racine semblables à la precedente, sinon que ses fleurs sont blanches & parties en six fucillettes.

*Verbascum albam femina luteo flore.*  
Bouillon blanc femelle à fleurs jaunes

*Verbascum nigrum.*  
Bouillon noir.



*Verbascum filastre.* Bouillon sauvage.



3 Le troisième Bouillon, qui est aussi femelle, est semblable aux dessus dits de tiges, de feuilles, & de fleurs, sinon qu'il a les feuilles plus grandes. Par ceillement les fleurs sont assez pallées en couleur, sans de petits filets rouges au milieu, ressemblans bien près à une petite rose. La racine est lögue & espèce, comme aux autres.

4 Le Bouillon noir a les feuilles grandes, rudes, noires, de forte odeur, & non douces à manier. Les fleurs jaunes, de forme semblable aux autres plus petites toutesfois. Les tiges & racine semblables aux autres.

5 Le Bouillon sauvage ressemble fort à la Saule tant en tiges, qu'en feuilles. Il a plusieurs brüches & rinféaux quarrés & ligneux, croissans tousiours d'une même jointure deux l'un côté, l'autre, les feuilles douces & blüchätres, semblables aux feuilles de la Saule, plus grandes toutesfois & plus douces. Au sommet des branches croissent les fleurs par couronnes rondes, comme au Marrube, de couleur jaune.

## LE LIEV.

Les Bouillons prouiennent aux bords des champs, pres des voyes, & sur les digues.

5 Le Bouillon sauvage n'est pas commun en ce

païs, mais nous l'avons veu au beau jardin de Jaques de Champagne grand amateur des Herbes.

## LE TEMPS.

Les Bouillons fleurissent le plus souvent en Juillet, Aoust, & Septembre, & le Sauvage encores plus tard.

## LES NOMS.

Le Bouillon s'appelle en Grec  $\phi\alpha\lambda\upsilon\sigma$  en Latin *Verbascum*, d'Apuleie *Lychnis* & *Pœnitia*, & d'autres *Candela regis*, *Candelaria* & *Lamariatis* Boutiques *Tafus barbatus* en haut Aleman *Duiffhraut*, *Kertzehraut*, *Berchraut*, *Syluehraut*, *Wisholdcherry* & *Kunigsherry*, en bas Aleman *Doflectraut*, *wollebladeren*, & *Toufscraut*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Bouillons sont fecs sans chaleur manifeste.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La racine de Bouillon blâche boulie en vin rouge, arreste & guerit la disenterie, & flux de ventre.  
 B La mesme boulie en eau & beuë, prouffite à ceux qui sont rompus & bleffés par dedans, & contre la toux enuieillie & de longue durée.  
 C La decoction de la racine appaise douleur de dens, & est vtile aux inflammations & viceres des glandes du gozier, quand on la tient chaude dedans la bouche, & qu'on en laue icelle.  
 D Nous trouuons par escrit que les figes seches mises dedans les fueilles du Bouillon blanc femelle, se gardent long temps bonnes & entieres.  
 E Les fueilles du Bouillon sont aussi vtilement induictes sur hemorrhoides, & est bon de les lauer de la decoction d'icelles.  
 F Le Bouillon noir à belles fleurs iaulnes bouli en eau ou vin, & beu est vtile contre maladies de la poitrine, & des poulmons, & contre la toux & crachemens de matiere purulente. Les fueilles d'iceluy boulies avec de la Rue appaisent la douleur de costé.  
 G Les fueilles du Bouillon noir boulies en eau sont vtilement appliquées sur œdemes & inflammations des yeux. Les mesmes fueilles meslées avec miel & vin, guerissent vlcères malings & mortifiés: & avec vin aigre, les plaies inflammées.  
 H Les fleurs iaulnes des Bouillons mises en lexue, font devenir les cheveux iaulnes, quand on les en laue.  
 I La semence de Bouillon se boit vtilement, comme dit Pline, contre rompures & dislocations de membres, car en osant la tumeur elle appaise la douleur.  
 K Le Bouillon sauuage broyé est bon appliqué aux bruslures par feu ou eau chaude, ou autrement.  
 L Apuleie dict que Mercure donna à Vlyffes le Bouillon, quand il vint aupres de Circe, à fin que par iceluy il fut contregardé contre toutes les enchanteuries de Circe.

## De l'Herbe aux mittes.

## Chap. LXXX.

## LA FORME.

Les fueilles de ceste herbe sont verdes, chaulues, & crenées tout à l'entour, estendues sur la terre, aucunement semblables aux fueilles de la Veruaine, du milieu desquelles prouiennent deux ou trois tiges, sans les fleurs belles, iaulnes, tât semblables à celles du Bouillon de senteur, forme, & grandeur, que souvent, tesmoing Pline, ceste herbe a esté cueillie pour le Bouillon sauuage. Apres les fleurs viennent petites bouilles, ou boutons esquelz la semence est contenue plus petite que celle du Bouillon. La racine est courte & ligneuse.

## LE LIEU.

Ceste herbe croist pres des chemins, és vignes, en aucuns champs, & pres des ruisseaux, & ne se trouue point souvent en ce pais.

Blattaria.

Blattaire.





LE TEMPS.

Elle fleurit en Juin & Juillet.

LES NOMS.

Pline l'appelle *Blattaria* : Elle se nomme en François Herbe aux mittes, Herbe vermineuse, & Blattaire : en haut Aleman *Schäckenkraut*, & *Goldknopffin*, & d'aucuns en bas Aleman *Hot-tencruyt*.

LE TEMPERAMENT.

Selon que la saveur amere demontre elle est chaude & seche iusques bien pres du tiers degre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Quant aux facultés de ceste herbe, nous n'en trouuons autre chose par eserit, sinó que les mittes & blancs se rassemblent à ceste herbe incontinent, là ou quelle soit iettée.

Du petit Bouillon. Chap. LXXXI.

LES ESPECES.

Les petits Bouillons sont de deux fortes, le grand & le petit. Le Grand est de deux fortes, l'un à fleurs iaulnes & bien flairantes, l'autre à fleurs palles.


LA FORME.

*Verbasculum odoratum.*

Petit Bouillon bien flairant.

*Verbasculum albu.*

Petit Bouillon blanc.



- 1 La premiere espece des petits Bouillons a les feuilles blâches & fronsées, semblables à celles de la Betoine, mais plus blanches & plus grandes, & non crenées tout au tour, entre lesquelles fortent les tiges vuides, hautes d'environ vne paulme, produisant à la cime vn bouquet de neuf ou dix fleurs iaulnes, de bonne odeur, pendantes en bas; apres lesquelles croissent petites bouilles contenant la semence. La racine est blanche & fibreuse.
- 2 Le petit Bouillon blanc est fort semblable au precedent, sinon qu'il a les feuilles plus grandes & plus larges, & les fleurs d'vn iaulne fort palle, bien pres blanches, & sans odeur.

- 3 Le plus petit Bouillon a petites fueilles blâches, fort semblables de tous poinctz à celles du petit Bouillon blanc: d'entre lesquelles sortent petites tiges aians chascune vne fleur seule semblable à celles du petit Bouillon blanc, soit en figure, soit en odeur, & couleur.

## LE LIEV.

- Les petits Bouillons croissent és bois bas & humides situés au pendant des môtaines, & en aucuns prés. Le blanc est commun en ce pays. Le Bouillon odoriférant & le plus petit sont plantés aux iardins.

## LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent en Auri; aucunesfois aussi en Mars.

## LES NOMS.

- Les petits Bouillons s'appellent en Grec *φρασις*: en Latin *Verbascula* és Boutiques *Primula veris*, & *Herba paradisi*, & d'aucuns *Artherice*: en haut Aleman *Schlusfblumen*: en Brabançon *Slusfblömen*.

- 1 La premiere espece se nôme à present en Latin *Hers bas*, *Perris*: en François d'aucuns *Coqun*: en haut Aleman *Himelfchlusf*, & *Peters haut*, geel *Schlusfblumē* & *wolreicende Schlusfblumen*: en bas Aleman *Sint Peters cruyt*, & *wolreicende Slusfblömen*.

- 2 La seconde espece se nôme és Boutiques *Primula veris*, & *Herba paradisi*: en haut Aleman *wilt Schlusfblumen*, & *wels Himelfchlusf*: en bas Aleman *witte Slusfblömen*, & d'aucuns *witte Betonie*.

- 3 La tierce espece s'appelle en Latin *Verbasculum minus*: és Boutiques *Primula veris minor*: en bas Aleman *cleyn witte Betonie*, ou en hiel *Slusfblömen*, & *cleyn Slusfblömen*.

## LE TEMPERAMENT.

Les petits Bouillons sont secs au tiers degré, sans chaleur manifeste.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A Les petits Bouillons sont maintenant receus entre plusieurs autres herbes desquelles on vse journellement aux viandes. Quant à la medecine ils n'ont point d'usage ne vertu, de quoy on doive tenir grand conte.

## D'Ethiopsis. Chap. LXXXII.

## LA FORME.

A Ethiopsis a les fueilles grandes, larges lanugineuses, comme celles du Bouillon plus rudes toutesfois & plus velues, & non pas si rondes par les bords, mais plus anguleuses estendues en rôdeur sur la terre, d'entre lesquelles fort la tige quarrée, houlüe, se fendant en plusieurs branches, le long desquelles elle porte plusieurs fleurs blâches, pres semblables aux fleurs de l'Ortie morte, beaucoup toutesfois plus grandes. La racine est longue & espesse, comme la racine des Bouillons.

## LE LIEV.

Ceste herbe estrangere ne croist point en ce pays sinö aux iardins des amateurs des herbes.

LE TEMPS.

Aethiopsis fleurit en May.

LES



Aethiopsis.



LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *Aethiops*, & en Latin aussi *Aethiops*, nous ne sçavons autre nom.

LE TEMPERAMENT.

Aethiops est moiennement chaude & seche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Aethiops prouffite à ceux qui ont la Pleuresie, & qui ont le thorax chargé de matiere purulen A te: & à ceux qui ont quelque asperité au gosier: Pareillement à la Sciatique quand on boit la deco ction de la racine.

Aux mesmes maladies du thorax & des poulmons vaut la racine d'icelle conficte en miel & B leschée souuent.

De l'Herbe aux poulmons.

LA FORME.

**L**A Pulmonaire a les fueilles larges, bouffues, noiratres, semées de plusieurs taches blanches comme gouttes de lait. Entre icelles fortent les tiges hautes d'une paulme, portans à la cime plu sieurs belles fleurs, amassées ensemble, qui au com mancemēt sont de couleur rouge ou de pourpre, puis apres bleuës: apres lesquelles viennent petis boutons, ou est la semence. La racine est noire, jon gue, & espeffe, aiant plusieurs fibres.

LE LIEV.

Ceste herbe croist es lieux humides & ombrageux, & on la plante bien pres par tous les iardins.

LE TEMPS

Elle fleurit de bonne heure en Mars & Avril, & incontinent apres la semence en est meure.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle des Apothicaires & Herboristes de ce pais *Pulmonaria*, & *Pulmonalis* en Latin: cest à dire Herbe aux poulmons. Les Picars l'appellent Herbe de cueur: en bas Aleman elle se nomme *Dußer Brouet* mesch cruyt & *Dußer Brouet spin*, cest à dire Herbe au lait de nostre dame pour ce que ses fueilles pleines de taches blaches, semblent arroulées de lait. Il y a. encor vne autre Herbe aux poulmons, de laquelle nous escriuons au Troisieme liure.

LE TEMPERAMENT VERTVS ET OPERATIONS.

Ceste herbe n'a point d'usage particulier en la medecine, mais on en vse fort es viandes & tout A teaux aux ceufs, comme des petis Bouillons, auquelz elle est aussi de tēperament fort semblable.

De la Veruaine.

Chap. LXXXIII.

LES ESPECES.

**I**L y a deux especes de Veruaine: l'une appellée *Verbena recta*, cest à dire Veruaine à tige droicte: l'autre appellée *Verbena supina*, cest à dire Veruaine couchée & basse, laquelle est de rechef de deux sortes, à sçauoir Masle & Femelle.

LA FORME.

**1** La Veruaine droicte a la tige droicte, haute d'un pied ou plus, fort branchue: les petites fleurs bleuës croiffans sur les branches. Les fueilles sont verdes, crenées tout au tour, & aucunement incisées. La racine est courte aiant plusieurs fibres.

**2** La Veruaine basse masle a les tiges tendres, velues, & anguleuses, se coulans par terre, longues d'un pied, ou de pied & demy, aiant les fueilles rondatres, crenées tout au tour, semblables aux fueilles du Chesne & de la Germandrée descrite au chap. XVII. de ce liure, plus petites toutesfois que les fueilles de Chesne, & plus grandes que celles de la Germandrée. Les fleurs belles, bleuës, assises le long des branches au sommet: apres lesquelles prouiennent petites bourfes larges comme à la Veronique. La racine est fibreuse.

Chap. LXXXIII.

*Pulmonaria.* Herbe aux poulmons.



*Verbena recta.*  
Veruaine droite.

*Hierobotane mas.*  
Veruaine basse male.



La seconde espece de Veruaine basse, appellée femelle, ressemble fort à la precedente, tellement que (comme Pline raconte au chap. 19. de son liure 25.) aucuns n'ont point fait de difference entre le male & la femelle, aussi à la verité y a il petite difference entre ces deux herbes: car la femelle le ressemble fort au male tant en tiges, qu'en feuilles, fleurs, & racines, sinon que la femelle a les tiges plus rondes, les feuilles vn peu plus petites & a plus de branches sortis d'une racine: les fleurs sont aussi plus amassées ensemble, que celles du male.

#### LE LIEU.

La premiere espece de Veruaine croist en lieux mal cultivés, pres des feps, murailles, voies, & fosses. La seconde espece croist es jardins, & lieux ombrageux & bas, Le male est plus commun que la femelle.

#### LE TEMPS.

Les Veruaines fleurissent la plupart en Juillet.

#### LES NOMS.

La premiere espece de Veruaine se nomme en Grec *νεπισσησος*, & d'aucuns *νεπισσησος εβιος* en Latin *Verbena columbina*, *columbaris*, *Herba sanguinalis*, *Crista galinacea*, *Erupera*, & d'aucuns *Ferraria*, ou *Ferraria*, *Triaxo*, *Verbena recta*, & *Columbina recta*: es Boutiques *Verbena*: en haut Aleman *Eisfernhaut*, *Eisfernhart*, & *Eisfernisch*: en bas Aleman *Verbene*, *yferreupt*, & *yferstert*.

La seconde espece s'appelle en Grec *νεπισσησος* & present *νεπισσησος βραχια*, de Pythagoras & *Erythraeum*, & d'aucuns autres *Demerria*: en Latin *Sacra herba*, *Verbena supina*, & *Cincinnati*: d'Apuleie *Licinia*, *Lustrago*, *Columbina supina*, & *Militaria*: es Boutiques non sans grande erreur *Chamaedryos* ou *Chamaedryos*: en haut Aleman *Erdstucklauch*, & d'aucuns fauans Perricur des Apothicaires *Chamaedryse*, & *Blauwendrüse*: en bas Aleman elle se peut bien nommer *Herbe* ou *crampende Verbene*, c'est à dire Veruaine basse, ou se terminant par terre.

#### LE TEMPERAMENT.

Les deux especes de Veruaine sont desiccatives,

LES VERTVS ET OPERATIONS. *Hiera botane femina. Veruaine basse femelle.*

- A Les fueilles de la Veruaine droicte, ou la racine, seules ou ensemble boulies en eauë, sont fort viles aux vicerés de la bouche, & des genciues, quand on s'en lue la bouche.
- B La decoction de l'herbe, ou de la racine, appaise douleur de dens, & les raffermir, quand on la tient souuët en la bouche. La mesme beuë par l'espace de cinq iours guerit torsions de ventre.
- C La Veruaine meslée avec huile Rosat & vinaigre, ou boulie en huile & appliquée en forme d'emplastre sur la teste, guerit la douleur de teste. La mesme vertu a aussi vne cotrone de Veruaine portée sur la teste, comme Archigenes escrit.
- D Les fueilles de Veruaine pilées avec oing de pour ceau, ou avec huile rosat, adoucisset & appaisent dou leurs de matrice appliquées dessus.
- E Les mesmes meslées avec vinaigre, sont vtilemēt induictes sur feu volage, vicerés malings & pourris, & broyées avec miel guerissent plaies fresches & ro ferment les vieilles.
- F La Veruaine basse est bonne contre tous venins, cōtre morsures & piqures de serpens & autres bestes venimeuses beuës en vin, ou appliquées sur le mal.
- G Les fueilles d'icelle beuës en vin vieil au pois d'vs ne drachme & à demy autst d'encens, par quarante iours en ieu, guerissent la iaulnisse.
- H Il est bon de se lauer la bouche de la decoctiō des fueilles & de la racine d'icelle boulies en vin contre vleres rongeurs de la bouche, & contre glandules.
- I Les fueilles verdes pilées & appliquées, ostent les onseures, & appaisent la douleur des phlegmons, & nettoient les vicerés pourris.
- K On trouue par escrit, que l'eauë ou ceste Veruaine a trempé, esparse en la salle ou chambre ou on tient quelque conuiuë, rend toute la compagnie allegre & ioyeuse.
- L Et que vne branche aiant trois ioinctures ou nends est vtilement beuë contre la sieure tierce, & vne branche qui en a quatre contre la sieure quarte.



## De l'Ortie.

## Chap. LXXXV.

LES ESPECES ET DIFFERENCES.

IL y a deux especes d'Ortie. L'une est l'Ortie bruslante & piquante, l'autre est l'Ortie morte, qui ne pique & ne brusle point. Et chacune de ces especes est de plusieurs sortes. Car l'Ortie chaude & bruslante est de trois sortes, à sçauoir l'Ortie Romaine ou Griefche, & la grande, & la petite & chaude: ou elles sont diuisées en deux especes, à sçauoir en Masle & Femelle, tellement que l'Ortie Romaine soit le masle, & les deux autres la femelle. L'Ortie morte sera descrite au prochain chapitre.

## LA FORME.

- 1 L'Ortie Romaine a les tiges rondes, rudes, creues, & houlues. Les fueilles longues, rudes, bruslantes, profond crenées, entre lesquelles & la tige elle produit petites bouilles rondes & rudes, plaines d'une semence brune, platte, & glissante, semblable à la semence de Lin, mais plus ronde & plus petite.
- 2 La seconde espece, appellée la grande Ortie, ressemble à la dessusdicte quant à la hauteur & aspreté des tiges. Les fueilles sont aussi houlues, bruslantes, crenées tout à l'entour, mais non si profond que les autres, de couleur plus noiratre, & des aucunes rougeatre. La semence croit à filets longs pendans en bas, & ressemble aucunement au Millet, sinon qu'elle est plus petite. La racine est longue, gresse & iuulne, s'espannant ça & là sous la terre.
- 3 La petite Ortie ressemble aux precedentes, mais elle est beaucoup plus petite, n'excedit point plus d'un pied ou pied & demy de hauteur. Les tiges sont rudes & houlues, les fueilles sèbles aux autres, si nō qu'elles sont plus petites, & pl<sup>s</sup> verdes: La graine plus grosse: & la racine pl<sup>s</sup> courte.

*Urtica sylvestris.*  
L'Ortie Romaine.



## LE LIÈV.

L'Ortie Romaine se trouve en ce pays en aucuns bois comme au bois de Soignie, toutesfois peu souvent: elle est aussi semée es jardins des Herboristes. Les autres especes croissent par tout pres des hayes, seps, & murailles.

## LE TEMPS.

La semence des Orties est meure en Aoust.

## LES NOMS.

L'Ortie se nomme en Grec ἀκτιόφι, ἡγὴ κνήμι: en Latin & es Boutiques *Urtica*.

- 1 La premiere espece se nomme à present *Urtica Romana*, & *Urtica mas*: en haut Aleman *welschnessel*: en bas Aleman *Roomsche Detelen*.
- 2 La seconde espece s'appelle *Urtica communis*, *Urtica femina*, & *Urtica maior*: en haut Aleman *Heptennessel*: en bas Aleman *grooer Detelen*.
- 3 La plus petite espece est appellée de Pline *Caria*, à present *Urtica minor*: en haut Aleman *Brennessel*, & *Schbrennessel*: en bas Aleman *heete Detelen*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Orties brulantes sont chaudes & seches, & de substance tenue.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La semence de l'Ortie Romaine meslée avec miel, & le chée souuēt nettoie la poëtrine de phlegmes visceufes & autres humeurs pourris: dauantage elle vaut à la courte haleine

*Urtica maior.*

La grande  
Ortie.



*Urtica minor.*

La petit  
Ortie.



halaine toux moleste & difficile de laquelle les enfans sont souvent molestés, inflammations de poulmon, & pleurésies enuicillies.

La mesme beué avec vin doux, esguillone à faire le ieu d'amour, & vaut cõtre inflations & ven B tostifés de l'estomach.

La semence de la mesme Ortie Romaine beué au pois d'vn scrupule avec eauë miellée au soir C apres auoir mengé, fait aysement vomir comme dit Pline.

Les fueilles d'icelle cuiçtes avec muscles & beues, amolissent le ventre, & prouoquent l'vrine. D

La decoction des fueilles de toutes les sortes d'Ortie beué avec myrrhe, prouoque les fleurs E mensruales aux femmes. Le mesme fait aussi la semence beué avec vin doux,

Le ius des fueilles gargarisé ayde fort à la luette relaschée & à l'inflammation d'icelle. F

Les fueilles de l'Ortie pilées avec sel, sont vilement appliquées sur morsures de chiens enragés, sur grands vlcères & malings, comme chancres, & semblables vlcères puans & pourris, & sur tous durillons enflés, absces & apostemes supres des aureilles, & semblables. G

Icelles meilées avec huile & cire & appliquées sur la ratelle en durcie, la guerissent. H

Les mesmes pilées & mises sur le nez & le front, arrestent le flux de sang du nez, & mises de I dans le nez, font saigner.

Les fueilles d'Ortie broiées avec myrrhe, & reduictes en forme de pessus, & mises dedans la K matrice, prouoquent les fleurs aux femmes.

## De l'Ortie morte. Chap. LXXXVI.

## LES ESPECES.

ON trouue deux especes d'Ortie morte. L'vne qui ne sent guere, L'autre qui sent fort & put, au reste non trop differetes l'vne de l'autre: & la premiere de ces herbes est de trois sortes, l'vne à fleurs blanches, la seconde à fleurs iaulnes, & la tierce à fleurs rougeatres. Pareillement la seconde est de deux sortes seulement differentes en couleur de fleurs.

## LA FORME.

Lamium.

Ortie morte.

1 La premiere espece des Orties mortes, ne ressemble pas trop mal aux Orties bruslantes. Ses fueilles sont longues, crenées tout à l'entour, semblables aux fueilles d'Ortie, mais plus blanches & nõ bruslantes. La tige quarrée, au tour de laquelle croissent entre les fueilles, fleurs blanches, iaulnes, ou rouges, semblables à vn coqueluchon, ou vn heulme ouuert. La racine est fibreuse.

2 La seconde espece puante, ressemble à la fuscicte & à l'Ortie, sinon quelle a les fueilles plus petites, & vn peu plus rondes: toute l'herbe est d'vne senteur mal plaisante & forte. Les fleurs de l'vne sont pales, celles de l'autre d'vn rouge obscur, plus petites que les fleurs de la premiere Ortie morte.

## LE LIEV

L'Ortie morte croist par tout pres des seps, hayes & chemins, & aussi es iardins.

## LE TEMPS.

L'Ortie morte fleurit la pl<sup>is</sup> part tout l'esté, depuis May en auant. LES NOMS.

Pline appelle l'Ortie morte en Latin *Lamium* & *Aconium* ou *Aconium*, à present elle se nomme *Urtica iners* ou *Urtica mortua*: en haut Aleman *Cobtnessel* & *Caubnessel*: en bas Aleman *dooue* & *doode* *Wetelen*.

## LE TEMPERAMENT

L'Ortie morte est de semblable temperamēt aux autres Orties.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A L'Ortie morte broyée avec sel, resout & guerit tous durillons, bosses & absces, mise dessus: & est fort semblable aux Orties en sa vertu.



LA FORME.

Cardiaca.

Agripaulme.

**A**gripaulme a les tiges quarrées, noires: les feuilles noires, larges, & profond incisées pres semblables aux feuilles d'Ortie, ou de Marrube, plus larges toutesfois, plus noires & pl<sup>us</sup> profond incisées, assez approchant à la forme des feuilles de Cheine. Les fleurs croissent par couronnes au tour de la tige, cōme au Marrube, de couleur purpurée, nō pas trop differentes des fleurs de l'Ortie morte, mais plus petites: apres lesquelles vient la semence petite & brune en petites gosses poignantes. La racine est courbe & à plusieurs fibres.

LE LIEV.

Elle croist voluntiers en lieux mal cultiués & raboteux, pres des vieilles murailles & pres des voyes.

LE TEMPS

Agripaulme fleurit en Juin, Juillet, & Aoust, & aucunesfois la graine est aussi meure.

LES NOMS.

Ceste herbe se nōme à present en Latin des Amateurs des herbes *Cardiaca*: en haut Alemā *Sperdyg span* & *Sperdygper*: en bas Aleman *Sperdyg espā*.

Ceste est vne espeece des trois herbes qui s'appellent en Grec *σιδερίτις*: en Latin *Sideritis* & d'aucuns *Heraclē*. Et est la premiere espeece de dictes herbes. Parquoy on la peut bien appeller en Latin *Sideritis prima*.

L'herbe que Matthiolus met pour la premiere *Sideritis*, est vne espeece de Marube, & s'appelle en ce pais *Marrabium palustre*, c'est à dire Marube d'eau, ou aquatique.

LE TEMPERAMENT.

L'Agripaulme est temperée en chaleur, non toutesfois sans amertume: parquoy elle est aussi absteriue.

LES VERTVS ET OPERATIONS

**A**gripaulme broyée & appliquée sur playes, les garde d'inflammation & d'apostumer: elle arreste le sang dicelles & les consolide & guerit.

De la Prunelle.

Chap. LXXXVIII.

LES ESPECES.

**I**ly a deux espees de Prunelle. La premiere s'appelle Bugle, La seconde a retenu le nom de Prunelle.

LA FORME.

La Bugle s'estend & traîne par terre comme l'Herbe monnoyere, elle a les feuilles longues, larges par le bout, molles, ridées & noires: les tiges gressies, tendres, se tramans par terre & factachans çà & là: desquelles sortent autres tiges quarrées, droictes, hautes d'environ vne paulme, produisant fleurs belles entre petites feuillettes, environnans la tige, de couleur le plus souuent bleuë, & en aucunes plantes blanche comme neige. Les racines sont tendres & fibreuses.

La Prunelle a les tiges quarrées, velues, longues d'vne paulme ou dauantage. Les feuilles longues, aiguës par le bout, & vn peu aussi velues. Les fleurs croissent au sommet de la tige, amassées ensemble en forme d'espis, de couleur brune le plus souuent entremeslée de bleu, aucunesfois aussi fort blanche. La racine est petite, fort fibreuse.

LE LIEV.

Elles croissent toutes deux en aucuns prés, champs herbus, & aux bois. On plante aussi beaucoup la Bugle es jardins.

LE TEMPS.

La Bugle fleurit en Avril. La Prunelle souuent tout l'esté jusques en Juillet.

LES NOMS.

La premiere espeece de ces herbes s'appelle à present *Consolida*, & *Solidago*, & à la difference des autres herbes qui sont appellées de mesme nom, *Consolida mediana* en François Cōfoulde moyenne, & Bugle





Bagnia.

Bugle.

Bruncella.

Pruncelle.



& Bugle: en haut Aleman *Gunsel* & *gude* *Gunsel*: és Boutiques de ce païs on la nomme *Bagnia* & en bas Aleman *Senegroen*.

- 2 La seconde espece s'appelle aussi *Consolida media*, mais le plus souvent *Pruncella*, ou *Bruncella*: en François aucuns la nomment Herbe au charpentier, aucuns Oingtercule: en haut Aleman *Brunellen*, & *Gottfeyk*: en Brabanton *Bruynelle*.

## LE TEMPERAMENT.

Ces deux herbes sont seches: outre ce la Bugle est chaude & la Prunelle temperée en chaleur & froideur, ou bien peu froide. LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 La decoction de Bugle beue dissout le sang grumelé & caillé dedans le corps, elle consolide & guerit toutes playes tant interieures que exterieures. A  
 La mesme ouvre les oppilations du foye, & de la fiellee, & ayde à la iaulnisse & fieures qui sont de longue durée quand on la boit. B  
 La mesme decoctiō de Bugle guerit les viceres pourris de la bouche & des gencives, si on s'en lave la bouche. C  
 La Bugle pilée & appliquée frefche & nouvelle sur plaies & escorchures, les referme & guerit. Le mesme fait aussi la pouldre d'icelle seche espendue dessus. D  
 Le jus de Bugle guerit les viceres des parties honteuses, souvent instillé dedens, & pareillement l'herbe broyée & appliquée dessus. E  
 2 La decoction de Prunelle faicte en vin ou en esuë, recolle & guerit toutes playes interieures & exterieures, comme la Bugle. F  
 Il est bon de se laver souvent la bouche de la decoction de Prunelle, contre les viceres de la bouche, & est aussi souverain remede contre la maladie que les Brabantons appellent den Bruynen (c'est quand la langue estant enflambee, devient noire, & fort enflée) moietniant toutesfois que les remedies generalz precedent. G  
 Prunelle broyée avec huile rosat & vinaigre, & appliquée dessus la partie anterieure de la teste guerit & appaise la douleur d'icelle. H

## LA FORME.

LA Benoitte a les fueilles rudes, fendues, & noires, aucunement semblables aux fueilles de l'Aigremoine. La tige ronde, velue, l'ogee de pied & demy, se fendant au sommet en autres branches produisant fleurs jaunes semblables aux fleurs des Bassinets, puis apres petits chapiteaux ronds & rudes remplis de semence, lesquels meurs, s'attachent aux vestemens. La racine est courte, rougeatre par dedens, aiant les fibres jaunes, flairantes aucunement au clou de Gyrofle.

## LE LIEU.

Ceste herbe croist au sauuage, pres des bois, hayes, & seps: on la plante aussi aux jardins, mais celle qui croist au sauuage est plus grande & porte les fleurs plus jaunes que l'autre.

## LE TEMPS

Elle fleurit en May & en Juin.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle à present en Latin *Garyophyllata*, pour ce que la racine sent les cloux de Gyrofle, & d'aucuns *Sanonuda*, *Benedicta*, & *Nardus ruffica*: en haut Aleman *Benedictwurty*: en Brabanton *Gariophyllate*.

## LE TEMPERAMENT.

La Benoitte est chaude & seche au second degré

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La decoction de la Benoitte faicte en eauë, ou vin trempé d'eauë & beuë, resoult le sang grumelé & guerit toutes plaies & blessures interieures. La mesme decoction guerit les plaies exterieures quid on les laue d'icelle.
- B La decoction de la racine de Benoitte faicte en vin & beuë, conforte l'estomach & faict faire bonne digestion: elle ouare les oppilations du foye, nettoie la poitrine, & les purge d'humeurs grosses & phlegmatiques.
- C La racine seche & prinse avec vin, est bonne contre venin & contre douleur de boyaux que nous appellons Colique.

## De la Pyrole. Chap. XC.

## LA FORME.

LA Pyrole a neuf ou dix fueilles verdes, tendres, non trop differentes aux fueilles de la Bete, beaucoup toutesfois plus petites, entre lesquelles prouient la tige ornée de belles fleurètes blanches & bien flairantes, asses semblables à celles du grand Muguet. La racine est tendre, gresse, se traissant ça & là.

## LE LIEU.

La Pyrole croist en lieux ombrageux & bois humides.

## LE TEMPS.

La Pyrole se trouue tant en hyuer qu'en zisté, mais elle fleurit en Juin & Juillet.

## LES NOMS.

La Pyrole se nomme és Boutiques *Pyrola* en haut Aleman *mintegruren*, *Hofsmangolst*, *masomangolst*: en bas Aleman *mintegruren*.

## LE TEMPERAMENT.

La Pyrole est seche au tiers degré, & froide au deuxiesme

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Les fueilles de la Pyrole seules, ou avec autres pareilles herbes propres à guerir playes, boullies en vin & beuës, guerissent



Pyrola. Pyrole.



# De la Langue de serpent. Cha. XCI.

Ophloglosson. 10.  
Langue de serpent.

font non seulement les playes interieures, mais aussi les exterieures, fistules, & vlcères malings.

**B** La Pyrole verte est aussi vtilement appliquée sur playes, vlcere res, & brulures : ou la pouldre d'icelle esparée dessus, ou icelle mellée avec vnguens & emplastres à ce propres.

## De la Langue de serpent. Chap. XCI.

### LA FORME.

**L** A Langue de serpent est vne herbe de nature merueilleuse & estrange: elle ne porte qu'vne feuille longue d'vn doigt, dedans laquelle croist vne petite queue soustenant vne languette longue & estroicte, semblable à la langue d'vn serpent.

### LE LIEV.

La Langue de serpent se trouue en ce pais en aucuns prés humides & gras.

### LE TEMPS.

La Langue de serpent se trouue avec sa languette en Aueil & en May: toute l'herbe seuanouyt en Iuin.

### LES NOMS.

Pline appelle ceste herbe, cōme quelques gens sçauans estiment *Lingua*, *Linguace*, & *Lingulace*: elle se nomme maintenant en Grec *ἐπιγλωσσόρον*: en Latin *Lingua serpentis*, & en ce pais le plus souuent *Lancea Christi*: & en aucuns lieux *Lucciola*: en François *Langue de serpent*: en haut Aleman *Quaterzunglin*: en Brabanton *Dno heeren speer cruyt* & *Quaterzunglin*.

### LE TEMPERAMENT.

La Lague de serpent est seche au tiers de degré, de nature fort semblable à la Pyrole. **LES VERTVS ET OPERAT.**

**A** La Langue de serpent est aussi fort vtile & singuliere pour guerir playes tāt interieures qu'exterieures, & aussi rompures, accoustrée & prise en la mesme sorte q̄ la Pyrole.

**B** La decoction d'icelle faicte en eau & beu proufite contre fieures chaudes, inflammations de foye, & contre toutes chaleurs interieures & exterieures.

**C** Icelle incorporée avec oing de pourceau est bōne au feu volage, aux brulures, & tō phlegmōs & apostemes.

## De la moindre Lunaire. Chap. XCII.

### LA FORME.

**L** A moindre Lunaire ne porte aussi qu'vne feuille, de couppee de chacun costé en cinq ou six creus profonds, non pas trop differēte aux feuilles de la vraie sco lopendric, plus longue toutesfois, plus large, & plus verte, sur laquelle croist vne tige d'environ vne paulme de long portant au sommet plusieurs petites graines amassées ensemble à la façon d'vne petite grappe. La racine est fibreuse.

### LE LIEV.

Ceste herbe croist en lieux hauts, secs & herbus, pres des valées & bruyeres.

### LE TEMPS.


La moindre Lunaire se trouue en May & en Iuin, & puis apres seuanouyt.

### LES NOMS.

Ceste herbe se nomme à present en Latin *Lunaria*, & *Lunaria minor*, & d'aucuns en Grec *σινδωρίς*: en haut Aleman *Monbraut* & *hlein Monbraut*: en bas Alem̄ *Muen cruyt* & *kleyn Muen cruyt*.

### LE TEMPERAMENT.

Elle est froide & seche de temperature fort semblable à la Pyrole & à la Langue de serpent.



*Lunaria minor.*

La moindre Lunaire.



## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Ceste herbe est aussi fort singuliere & propre à guérir playes, de veitus & facultés semblables à la Pyrole & à la Langue de serpent, fort propre à toutes les maladies auxquelles celles la sont bonnes: outre ce les Alchimistes bestiment fort bonne pour l'Alchimie.

## De la Perseueille.

## Chap. XCIII.

## LA FORME.

LA Perseueille a la tige ronde, gresse, fort bran chue, les branches passans au trauers des fueil les rondes, nues, & tendres, cōme si on les y auoit tirées: au sommet des brāches croissent les fleurs en forme de couronne entre petites fueillettes, de couleur palle, lesquelles pois se tournent en graine brune. La racine est simple, blanche, & fibreuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en Alemaigne de soy mesme es champs esquelz on seme froment & espeautre: en ce pais on la plante es iardins.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Iuillet & en Aoult.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle pour le present *Perfoliatum* non & *Perfoliata*: en François Perseueille - en haut Aleman *Durchwachss*: en bas Aleman *Duertwas* Il est fort à douter si c'est la *Caecalia* de laquelle Di scoride escrit. LE TEMPERAMENT.

La Perseueille est seche.

## LES VERTVS ET OPERATIONS

- A La decoction de Perseueille cuicte en eaué ou vin guérit playes: & pareillement les fueilles verdes broyées & appliquées dessus.
- B La Perseueille meilée avec cire, ou avec quelq huile ou vnguent propre à guérir playes, & appli quée guérit les rompres ou hergenes des enfans.
- C La mesme encore verde broyée avec farine & vin appliquée sur le nombril des petis enfans, le fait retirer dedans, & le repousse quand il sort par trop dehors, & le desenfle quand il est enflé & esleué. Le mesme fait aussi la semence puluerisée, appliquée en mesme sorte.

## De la Pimpinelle.

## Chap. XCIII.

## LES ESPECES.

LA Pimpinelle est de deux sortes, la Grande & Sauvage: & la Cultiuée & petite.

## LA FORME.

La grande ou sauuage Pimpinelle a les tiges longues, rondes, hautes de deux ou trois pieds, sur lesquelles croissent fueilles longuettes, crenées tout à pentour, attachées à queuez longues, dix ou douze, les vnes contre les autres, & esleuées comme ailles. Au sommet des tiges croissent ronds chapiteaux de plusieurs boutons amassés ensemble, lesquels estant ouuerts produisent fleurettes de couleur brune tiré sur le rouge: & icelles passées, la semēce triagle. La racine longue & epaisse.

La petite Pimpinelle ou cultiuée, ressemble fort à la Sauvage, mais elle est de tous poinctz plus petite, & de saueur & odeur plus amiable. Elle a les tiges tendres & molles d'un pied de haut, ou vn peu dauantage, garnies d'une tendre laine ou poil. Les fueilles ressemblent à celles de l'autre, sinon qu'elles sont beaucoup plus petites, verdes par dessus & bleuätres par dessous. Les fleurs ne sont point si brunes, mais d'un rouge incarné, aians petis filetz iaulnes dependans du milieu. La racine est semblable à l'autre, plus petite toutesfois.

## LE LIEV.

La Sauvage ou grande Pimpinelle, croist es prés secs, il sen trouue grande quantité au tour de Vüor de. La petite ou cultiuée se plante en ce pais aux iardins.





## LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes deux en Juin, & aucunes fois aussi plus tost, souvent iusques en Aoust.

## LES NOMS.

Le Pimpinelle est maintenant appellée en Latin *Pimpinella*, *Bipennata*, *Pampinella*, & d'aucuns Sans guiforbe & Solibrellle: en haut Aleman *Koffle ohant*, *Geigoto Sarelst*, *Blumtant*, & *Wegstraut*; en bas Aleman *Pimpineffe*.

## LE TEMPERAMENT.

Pimpinelle est seche au tiers degré, & froide au second, & astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoction de Pimpinelle beue guerit la dysenterie, arreste le crache sang, le pissier sang, & le flux naturel des femmes, & les fleurs, & tout autre flux de sang. Le mesme faict l'herbe & la graine reduites en poudre, & beues en vin ou eau ferrée, ou tenue verte en la main comme aucuns disent.

Les feuilles verdes broyées & appliquées sur playes les garde d'inflammations & apostemes: B que plus est elles sont vtilement ainsi appliquées sur phlegmons & vicerés.

La Pimpinelle est aussi fort propre à guerir playes, & est vsurpée aux bruuages qui se font con C tre playes, pour oster l'inflammation & arrester le flux de sang par trop vehement.

Les feuilles de Pimpinelle trempées en vin & beués allegent & resouyissent le cueur, & prou- D fissent aux tremblemens & palpitations d'iceluy.

## De la Sanicle.

## Chap. XCV.

## LA FORME.

LA Sanicle a feuilles verdes en brunissant, vnies, glissantes, & rondes, parties en cinq, cōme les feuilles de Vigne, entre lesqelles fortēt deux tiges hautes d'environ vn pied, & d'uisans à la cime plusieurs

plusieurs ronds boutons pleins de petites fleurs blanches, qui se tournent en petits glouterons rudes, & font la semence. La racine est fibreuse, noire par dehors, & blanche par dedans.

## LE LIEV.

Sanicle se trouue en ce país és bois situés bas.

## LE TEMPS.

La Sanicle fleurit en May & Juin.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle maintenant en Latin *Sanicula*, & d'aucuns *Dispensia* en haut Aleman *Sanicliel*. Ce n'est pas vne espèce de *Pentaphylon* come aucuns escriuent. LE TEMPERAMENT.

La Sanicle est seche au tiers degré & astringente. LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Le ius de Sanicle beu, consolide & guerit toutes playes & blessures interieures & exterieures, tellement qu'on dit comunement en France (testmoing Ruelle) C'eluy qui Sanicle a, De mire affaire il n'a.
- B Sanicle boulie en eau ou vin & beuë, arreste les crachemens de sang, la dysentere, & guerit les vlcérations & blessures des rognons.
- C Iceille prise en mesme sorte, ou le ius d'icelle beu guerit les rompures, en mettant aussi & liant dessus l'herbe broyée ou boulie.
- D Les sucilles d'icelle & la racine boulies en eau avec miel, puis beuës, guerissent les poulmons entamés, & tous vlcères malings & pourris de la bouche, des gencives, & du gozier, quand on s'en laue la bouche & s'en la gargarise.



Alchimilla

Pied de lion.

## Du Pied de Lion. Chap. XCVI.

## LA FORME.

Ceste herbe a les sucilles larges & rondes, à cinq ou six angles, crenées tout au tour comme vne sie, lesquelles au sortir de terre sont pliées ensemble. Entre icelles croissent petites tiges rondes, hautes d'un pied, aïs petites sucilles, lesquelles produisent à leur cime petites fleurs amassées, de couleur verte iaulne, & vne petite semence iaulne, non plus grosse que la semence de Pavot encluse en petites gosses verdes. La racine est espesse, d'un doigt de long, brune par dehors, aiant plusieurs fibres.

## LE LIEV.

Le Pied de lion croist en aucuns endroits de ce país, & quelques prés pendans des montagnes, là ou la terre est argilleuse, grasse & rouge.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en May & en Juin.

## LES NOMS.

Le Pied de lion se nôme en Latin *Alchimilla*, *Alchimilla*, *Stellaria*, *Planta leonis*, *Pes leonis*, & d'aucuns en Grec *λεωντανίδιον*, combien toutes fois que ce ne soit le vray *Leontopodium* que Dioscoride décrit en haut Aleman *Synna*, *Leventapen*, *Leventisuss*, *Dusez* *swantzen mantel* & *gross Sanicliel*: en bas Aleman suivant le haut Aleman *Synna*, *onser*



*Soutien mantel & groote Spanfief.*

LE TEMPERAMENT.

Il est sec comme la Sanicle, mais plus froid.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le Pied de lion ressemble fort en facultés à la Sanicle, & duit à toutes les maladies, auxquelles la Sanicle est bonne: Outre ce il appaise la douleur & oste la chaleur de toutes playes inflammées, vlcères & phlegmons appliquée dessus.
- B La mesme pilée & mise sur les mammelles des femmes ou pucelles, les fait dures & fermes.

De la Consoude Sarrasine.

Chap. XCVII.

LA FORME.

LA Consoude Sarrasine a vne tige rougeatre, rōde, vn peu creuse, le lōg de laquelle depuis bas iusques en haut croissent fueilles longues, semblables aux fueilles de la Saulx, crenées tout au tour de petites crenes. Au sommet des tiges croissent fleurs palles, lesquelles meures sen volent. La racine est fort fibreuse.

LE LIEV.

La Consoude Sarrasine croist es bois ombrageux, principalement là ou il fait humide.

LE TEMPS.

Cette herbe se trouue avec ses fleurs le plus souuent en Aoust.

LES NOMS.

Cette herbe s'appelle maintenant en Latin *Solidago Sarracenia*, & *Consolida Sarracenia*, d'aucū Herba fortis: en haut Aleman *Spensisch wundkraut*: en bas Aleman *Spensisch wondkraut*.

LE TEMPERAMENT.

La Consoude Sarrasine est bien pres seche au tiers degré, non sans chaleur, de goust amer & astringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Consoude Sarrasine guerit toutes sortes de playes & vlcères, tant interieures, prise en mesme sorte que les autres herbes consolidatiues, & beuë, que exterieures en l'appliquant dessus avec vnguens, huiles, ou emplastres.
- B La mesme boulie en eauë & beuë, raffermit & referre le foye dissolu, ostant les oppilations d'iceluy, & de la vesie du fiel, & est bonne à la iaulnisse, contre fieures qui durent long temps, & à ceux qui deuenent hydropiques.
- C La decoction d'icelle guerit la bouche puante & vlcérée, & les vlcérations des genchues & du gosier.



De la Verge d'or.

Chap. XCVIII.

LA FORME.

LA Verge d'or a au commencement fueilles longues & larges, estendues sur la terre, d'entre lesquelles sort vne tige rougeatre de pied & demy de haut, à fueilles semblables, mais plus petites, se tendant au sommet en plusieurs petites branches, chargées de fleurettes iaulnes, lesquelles apres estre meures sen volent au vent, comme celles de la Consoude Sarrasine. La racine est brune & fibreuse.

LE LIEV.

Cette herbe croist es bois, lieux montaigneux & terre grasse.

LE TEMPS.

Elle fleurit le plus souvent en Aouſt.

LES NOMS.

A preſent on appelle ceſte herbe en Latin *Virga aurea*, c'eſt à dire Verge d'or: en bas Aleman *Gulde roede*: nous ne ſçavons point ſi elle a autre nom.

LE TEMPERAMENT.

Ceſte herbe eſt d'un gouſt fort ſemblable à la Conſoude de Sarrasine, & pourtant eſt elle de ſemblable nature

LES VERTUS ET OPERATIONS.

A La Verge d'or eſt auſſi herbe propre à guerir playes, & a les memes vertus que la Conſoude de Sarrasine, & peut eſtre uſurpée en toute malades auxquelles la Conſoude de Sarrasine eſt bonne.

B La meſme boullie en vin & beuë, eſt fort bonne contre la pierre des rognons, car elle la rompt & faiſt deſcendre avec l'urine: Pareillement auſſi l'eau de ceſte herbe diſtillée avec vin, & beuë par quelque eſpace de temps.


De l'Herbe militaire. Chap. XCIX.

LES ESPECES.

Dioſcoride deſcrit ſoubs le nom de *Stratiotes*, c'eſt à dire Herbe militaire, deux herbes, toutes deux cogneuës en ce pais. L'une appellée Herbe militaire aquatique. L'autre herbe militaire à mille ſeuilles, ou à fleurs jaunes.

*Stratiotes potanios.*

L'Herbe militaire aquatique.

*Virga aurea.*

Verge d'or.

*Stratiotes millefolia.*

L'Herbe militaire à milleſeuilles.





## LA FORME.

1 La premiere appellée Herbe militaire d'eauë, est vne herbe aquatique croissant par dessus l'eauë non trop differente à la grande Ionbarbe auant qu'elle porte tige, mais plus grande. Les feuilles sont estroictes de demy pied de long, aiant à chascque costé des poinctes aigues & piquantes, asses semblables aux feuilles d'Aloë, ou Perroquet, beaucoup toutesfois plus petites, plus estroictes, & plus courtes. Les fleurs croissent sur courtes queue's sortans à costé des feuilles, blanches, diuisées en trois feuilles, iaulnes au milieu & velues, & sortent d'une gouffe fendue, semblable à la patte d'une escreuille. Elle n'a point d'autre racine, sinon vne petite queue fort eourte, large & elpse par haut, & fort gresse & tendre par bas, d'ou sortent les feuilles: à costé de ceste queue courte fous les feuilles sortent de longs filets cy & là qui ataindent iusques au fond de l'eauë, par lesquels elle s'attache au fond. Ces longs filets prennent les Triacleurs & Cerretans & les mont on phioles de verre pleines d'eauë assises sur leur tables, fuisans à croire au commun populaire que sont vers lesquels ilz ont fait sortir du corps avec leur poudre, sucre, ou vnguens.

2 La seconde espece appellée Herbe militaire à millefeuilles, a les feuilles longues, estroictes, profond incisées de chacun costé, semblables aux plumes des ailles de petis oyseaux. Car comme les plumes des ailles de petis oyseaux ont vne coste au milieu, à chascque costé de laquelle sortent petis poils estroictes ou plumettes: Ainsi ces feuillettes ont aussi au milieu vne coste, à laquelle croissent de chacun costé petites feuilles & estroictes, chascune feuillette semblable à vn poil de ces petites plumes. Entre ces feuilles vient la tige d'enuiron vne paulme de haut, produisant feuilles semblables, & portant au sommet vne belle esmouchette, ainsi que la Millefeuille, de plusieurs fleurettes iaulnes. La racine est tendre & fibreuse. LE LIEU.

La premiere espece croist en ce pais és estangs, & se trouue en plusieurs fossés assis pres de l'Es chaud, ou de la Dele fleuue de Brabant. L'autre croist és prés fort gras, mais on la trouue peu souuent.

## LE TEMPS.

L'Herbe militaire d'eauë fleurit en May: L'autre en Aoult.

## LES NOMS.

1 Ceste herbe se nomme en Grec *σπαρτίωρος*, καὶ *σπαρτίωρος ποτάμιου*. en Latin *Militaris*: en bas Aleman *Trübentraun*, & selonc le Grec *Κρυπερος κρυπ*, ou *Water Krypteros krypt*.

2 La seconde s'appelle en Grec *σπαρτίωρος χιλιφύλλου*. en Latin *Militaris millefolia*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Herbe militaire d'eauë est froide & seche: L'autre à millefeuilles est seche, & vn peu astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La premiere Militaire boulie en eauë & beuë, arreste le pisser sang, & guerit playes & vlcères A des rognons, & v'usage en est bon eontre toutes playes interieures.

Les feuilles d'icelle pilées & appliquées sur playes fresches, les engarde d'inflammation & apo B flemation.

Les mesmes avec vinaigre guerissent le feu volage, herpetes, & phlegmons, induictes dessus. C

2 La seconde Militaire est singulierement bonne à tous vlcères enuieillés & nouveaux: elle guerit D fistules, arreste flux de sang, resferme & guerit playes, pilée & appliquée dessus, ou meslée és huiles, vnguens & emplastres à ce propos.

## De la Millefeuille.

## Chap. C.

## LA FORME.

L Millefeuille a les tiges rondes, creuses, hautes de pied & demy: Les feuilles longues, fort de chiquetées de chacun costé iusques à la coste du milieu, asses semblables aux plus petites feuilles de Coriandre, ou de l'Auronne, dechiquetées bien menu. Les fleurs croissent en esmouchettes belles & rondes au sommet de la tige, & sont pour la pluspart toutes blanches, aucunes fois aussi purpurées en ce pais, & comme Dioscoride escrit aucunes fois toutes iaulnes, lesquelles toutesfois n'ont pas encore esté veuës par deçà. La racine est noire & fibreuse.

## LE LIEU.

La Millefeuille croist par tout ce pais, pres des voyes, chemins, & aux bords des champs.

## LE TEMPS.

Elle fleurit depuis Iuin iusques en Iuillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ἀχιλλεύς*. en Latin *Achillea*, & *Achillea fideiatis*, d'Apuleie *Myriophyllō*, *Myriomorpha*, *Chilophyllō*, *Stratiotico*, *Heracleō*, *Chrysiu*, *Supercilio* *Veneris*, *Aeron* *Syluaticum*, *Militaris*, d'aucuns *Diodelatis*: Boutiques à present *Millefolium*: en haut Aleman *Garben*, *Schaffgras*, *Schaff-*

Schaffripp, & Taufstblatt: en bas Alem. Geruwe  
Aucuns tiennent pour Achillee, l'espece de Tha  
naisie que nous avons appellée petite & blâche Tha  
naisie au cha. X. cy dessus, comme il a esté là declairé

## LA CAUSE DV NOM.

Ceste herbe a prins son nô Achillee du noble &  
vaillant cheualier Achillee, les gestes & histoire duql  
ont esté descrites par Homere, leql a fort vsé de ce  
ste herbe, luy estât premier môstrée par Chirô cen  
taure, & en a guery Telepô, como dit Apu. qui auoit  
de fort mauvais vices. LE TEMPERAM.

La Millefeuille est fort seche, & astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoction de Millefeuille bouë guerit & arre  
ste la dysenterie, & tout flux de ventre.  
B La mesme beue arreste tout flux, mais principale  
ment le flux rouge des femmes. Le mesme fait  
elle quand on l'applique aux parties honteuses, ou  
quand on asied dedans la decoction d'icelle.  
C Icelle broyée & mise sur playes arreste le sang, les  
engarde d'inflammation & enfleure, & les guerit.

## De la Confyre. Chap. Cl.

## LA FORME.

LA Cöfyre a les tiges houlles, les fueilles rudes,  
asses semblables aux fueilles de la Bourrache,  
pl<sup>r</sup> grâdes toutesfois & plus noires. Les fleurs ron  
des, creuses come petites sonnettes, blâches, aucune  
fois rougeâtres. La racine est noire par dehors, blâ  
che par dedés, & gluëte au toucher. LE LIEV.

La Confyre croist le long des fossés & en lieux  
humides. LE TEMPS,

Elle fleurit en Iuin & Juillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nôme en Grec σύμφυτον ηὐαὶ σὺμ  
φυτον μέγα: en Latin *Symphytum magnum*, & *Solidago*: es  
Boutiques *Consolida maior*: en François Confyre: en  
haut Alem *Walswurz*, *Sesmerwurz*, *Schwartz  
wurz*, *Schwanzwurz*, *groß Weinnel*: en bas Alemâ  
*waschwortel*. LE TEMPERAMENT.

La Confyre est chaude & seche au secôd degré.  
LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les racines de Confyre broyées & beues proa  
fissent à ceux qui crachent sang, & guerissent tou  
tes playes interieures, & rompures.  
B Icelles aussi guerissent toutes playes fresches,  
broyées & mises dessus en forme d'emplastre: Et  
font tant glutineuses que caictes avec chair hachée  
bien menu la font reioindre ensemble.  
C Les racines de Cöfyre boullies & beuës, nettoieit la  
poictrine de phlegmes, & guerissent bleffures des pou  
môs. Elles ont pareille vertu meslées avec sucre, sy  
rop, ou miel, & prises souuēt en la bouche & lechées  
D Icelles avec fueilles de Senefon sont vilement  
appliquées sur tous phlegmons & inflammations,  
suyamment aux inflammations du siege.  
E Icelles pareillemēt sont viles pilées & appliqués  
sur rompures.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE.

Achillee.

Millefeuille.



Symphytum magnum.

La Confyre.



111

# LA SECONDE PARTIE

## DE L'HISTOIRE DES PLANTES, TRAITANT DES FLEURS, HERBES ODORIFERANTES, SEMENCES:& de leur Similitude, Difference, Forme, Noms, & Operations.

PAR D. REMBERT DODOENS.

De la Violette de Mars.

Chap. I.

LES ESPECES ET DIFFERENCES.

Il y a deux especes de Violettes: la Cultivée, & la Sauvage. La Cultivée sont fleurs d'une belle couleur perle obscure, d'odeur fort amiable. La Sauvage est sans odeur & palle.

LA FORME.

*Viola nigra.*      *Violette de Mars.*

1 Le Violier de Mars cultivé & bien flairant, se traine le long de la terre comme le Fraiser, se fichant en plusieurs lieux: Il a les feuilles rondes, noires, semblables à celles du Lierre, mais plus petites, plus rondes, & plus tendres: entre lesquelles prouiennent belles fleurs & amiables d'un pers obscur, chacune assise sur vne queue à part, petite, menue & tendre, partie en cinq feuillettes, d'esquelles le milieu &c le plus bas est semé de iaulne. Apres les fleurs suruiennent rondes boules ou gossiettes plaines de semence, lesquelles meures fourré en trois. La racine est tendre & fibreuse.



De ceste sorte il s'en trouue encore vne autre espece plantée en aucuns vergers, laquelle produit les fleurs fort doubles & pleines. Et encore vne tierce qui porte les fleurs blanches comme neige, mais ne se trouue guere, au reste semblables à la Premiere de feuilles, croillon, & de tous poinçs.

2 La Sauvage est semblable à la Cultivée, sinon que les feuilles sont beaucoup plus petites. Les fleurs aucunes fois plus grandes, beaucoup plus palles, voire bien pres blanches aucunes fois, & sans odeur.

LE LIEU.

La Cultivée & bien flairante croist sous les hayes, & au bord des champs, en terre bonne & grasse, & on la plante aux iardins. La sauvage & sans odeur croist aux bords des champs maigres & secs.

LE TEMPS.

Le Violier de Quarefine cultivé fleurit en Mars, & le Sauvage aussi, & en Auri, & aucunes fois plus tard.

LES NOMS.

La Violette de Mars s'appelle en Grec *ἰο παραφύων* en Latin *Viola nigra*, *Viola purpurea*, & de Virgile *Vaccinium*: és Boutiques *Viola* en François Violette de Mars ou de quarefine. Le Violier s'appelle és Boutiques *Violaria*, & *Mater violarum*.

LA CAUSE DV NOM.

Les Violettes, comme dit Constantin l'Empereur, ont prins leur nom en Grec Ion, à cause de la Damoiselle Io, laquelle Iupiter apres l'auoir engrossée mas en vne vache à fin que sa femme Iuno ne se doutast point qu'il paymoit pour l'honneur & paturage de laquelle, la terre par le commandement de Iupiter produisit les Violettes, lesquelles selon le nom de sa bien aymée Io il appella en Grec Ion: pourtant s'appellent elles aussi en Latin, comme aucuns escriuent, *Viola quasi Vitula ex Vaccinia*. Nicander escrit que le nom d'Ion a esté donné aux Violettes à cause des Nymphes d'Ionie, lesquelles toutes premieres en firent present à Iupiter.

LE TEMPERAMENT.

Les Violettes sont froides au premier degré & humides au second.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoction des Violettes prouffite aux fieures chaudes, & inflammations de foye & de tou- A

tes parties interieures, poullant par bas les humeurs chaudes & cholériques. Pareille vertu ont le Jus, Syrop, & Conserue d'icelles.

B Le Syrop de Violettes est bon contre inflammations de poulmons & de la poictrine, & contre la pleuresie, & toux, & contre les fieures, signamment des petis enfans,

C Le meisme Syrop guerit toutes inflammations & rudelles du gozier quand on le tiét souuent en la bouche. Le meisme fait aussi le Succre de Violettes, la Conserue & le Jus.

D Le iaulne qui est au milieu des fleurs bouli en eauë, est vilement gargarisé contre l'esquinance, & enfleure du gozier, & beu, contre le haut mal des petis enfans.

E Les Violettes pillées & appliquées seules ou avec huile sur la teste, en ostent la chaleur, & appaisent douleur de teste, & font dormir, & humectent le cerueau: outre ce elles sont viles contre les chereffes d'iceluy, contre maladie, & pesanteur d'esprit.

F Les Violettes broyées avec farine d'orge, sont vilement appliquées sur phlegmōs & apostemes chaudes, & guerissent inflammation & douleur des yeux, vlcères chaudes, inflammations, & le sonde-mét qui fort. La graine de Violette beuë avec vin ou eauë prouffite aux piqueres de scorpiōn.

H Le Violier prouffite contre fieures chaudes & inflammations de soye, & lasche de ventre.

I Les Violettes sauages sont pres de pareille vertu à la bien flairante, elles sont toutes fois beaucoup plus foibles, pourtant ne sont elles pas vsurpées en medecine.

## De la Pensée.

## Chap. I I.

## LA FORME.

## Viola flamma.

## La Pensée.

LA Pensée a les tiges triangles à plusieurs ioinctures: les fueilles noiratres, crenées tout à l'en tour, entre lesquelles prouiennent de la tige petites queues nues: produisins belles fleurs, diuisées en cinq fueillettes comme les Violettes, chacune fleur de trois couleurs diuerses: celles de haut sōt le plus souuent de couleur violette & perse, les au tres bleüs ou iaulnatres aians des traictz noirs, & iaulnes, & velues au milieu: apres viennent petites boules, ou la semence est enclōse. LE LIEV.

Ces fleurs croissent es iardins, & s'en trouue beaucoup aux champs à blé entre les esteulles.

## LE TEMPS.

Elles commencent à fleurir incontinent apres les Violettes, & demeurent fleurissans tout l'xsté.

## LES NOMS.

Ceste fleur s'appelle en Grec *φλῶξ καὶ φλόγιον* en Latin *Viola flamma, flamma*, & à present *Herba Trinitatis, laca*, & *Herba clauellana*: en François *Pésée* en haut Aleman *freysehā, freysehāraut* & *Wey siltrigheylumen*: en bas Aleman *Weybuldichheit bloem* & *Pensē*. LE TEMPERAM.

Les Pésées sont seches & tēperées en froideur & chaleur. LES VERTVS ET OPER.

A Ces fleurs boulies & beuës, guerissent le commencement du mal caduc ou de la maladie des petis enfans, quand ilz escumēt, pourtant s'appelle elle en haut Aleman *freysehām*.

B Les meismes fleurs boulies avec leur herbe, & beuës, nettoient les poulmons & la poictrine, & prouffit aux fieures, & inflammations interieures.

## De la Gyrosée iaulne.

## Chap. III.

## LA FORME.

LA Gyrosée iaulne est vn arbrisseau durant hyuer & xsté, aiant les tiges ligneuses & dures, fort branchues & les fueilles là dessus longues, estroictes, & verdes. Au sommet des tiges croissent les fleurs bien iaulnes, belles, bien flairantes, chacune partie en quatre fueillettes, lesquelles peries suruiennent siliques longues, contenant vne graine large & iaulne.



## LE LIÈV.

Viola lutea.

Gyroflée iaulne.

La Gyroflée iaulne croist sur vieilles murailles & toits, & se plante és jardins.

## LE TEMPS.

La Gyroflée iaulne fleurit en Avril, & en may.

## LES NOMS.

La Gyroflée iaulne est vne espece des Violettes appellées en Grec *λαιοίαν*, lesquelles se nomment en Latin *Leucoia lutea* & de Serapio avec les Boutiques *Keyri*: de Pline (qui les a séparées de *Leucosion*, c'est à dire Violette blanche) *Viola lutea*: en haut Aleman *gref Wicel*: en Brabant *gref W. fieret*, & *stem Bissieren*.

## LE TEMPERAMENT.

La Gyroflée iaulne est chaude & seche, de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS

- A** La Gyroflée iaulne sechée & boullie en eauë, prouoque l'vrine, & fait auoir aux femmes leurs fleurs, & guerit les scirrhes de l'amarry, c'est à dire apostemes endurees, quand on l'en estuse, ou baigne.
- B** Les mesmes fleurs meslées avec huile & cire en forme d'emplastre, guerissent les creueures du boyau culier & du siege, & scerfermēt vieux vlceres.
- C** La Gyroflée iaulne meslée avec miel guerit vieux vlceres & malings, & ceux de la bouche.
- D** La semence d'icelle beuë à la quantité de deux drachmes en vin, fait venir les fleurs aux femmes & fait sortir l'arrierefais & enfant mort. Aussi fait elle bien quand avec vn pessus elle est mise dedés la matrice.
- E** Le ius de la Gyroflée distillé aux yeux consume & dissipe toutes taches, cicatrices & obscurités d'iceux.
- F** La racine broyée avec vinaigre, guerit la ratelle enduree appliquée dessus.



## Des Gyrofliers, ou Violiers.

## Chap. IIII.

## LES ESPECES.

Il se trouue deux especes de ces Violiers. L'vn qui est Grand, appellé grand Violier, lequel se peut garder hyuer & esté. L'autre Petit, appellé petit Violier, lequel se resème tous les ans, & porte sa fleur la mesme année.

## LA FORME.

Ces deux especes de Violiers ne sont pas trop différentes au Gyroflier iaulne, sinon que leurs feuilles sont plus blanches & plus douces.

- 1** Le grand Violier a les tiges dures, droictes, hautes de deux ou trois pieds, fort branchues, les feuilles longues, estroictes, & douces, comme celles du Brouillon, plus grandes, plus longues, & plus larges que celles du Gyroflier iaulne. Les fleurs bien fleurées, semblables en forme & odeur aux Gyroflées iaulnes, plus grandes toutesfois, de couleur aucunesfois blanche, aucunesfois cendreuse, aucunesfois incarnée, aucunesfois rouge, aucunesfois persé, apres lesquelles viennent longues siliques, contenant vne semence large.
- 2** Le petit Violier est pareil au grand, de tiges, de feuilles blanches, douces, & lamagineuses, de fleurs bien flairantes, de diuersité de couleurs & de siliques & semence, sinon quil est en toutes choses plus petit, ne excédât la hauteur d'vn pied, de petite durée & perissant toutes les années.

## LE LIÈV.

On sème en ce pais ces deux sortes de Violiers és jardins.

## LE TEMPS.

Le grand Violier fleurit en Mars & Avril, vn an apres quil a esté semé. Le petit fleurit en

Juillet & en Aouſt en la meſme année quil a eſté ſeiné.

### LES NOMS.

Ces Violiers, principalement le grand, ſappellent en Grec *Λιχίδια* : en Latin *Viola alba*, & ont trouvé ce nom pour ce que les feuilles ſont blanches, & non pour les fleurs, car elles ſont de diuerſes couleurs, comme auſ diſt. Aucuns modernes les appellét *Viola marronales*, c'eſt à dire Violettes des Dames, toutesfois ce nom appartient plus toſt aux autres Violiers, deſquels nous parlerons au Chapitre enſuyuant, mais ſi on veut appeller ces Violiers par ce nom, il ſeruira principalement au petit Violier.

### LE TEMPERAMENT.

Ces Violiers ſont chauds & ſecs, de temperament aucunemét ſemblable à la Gyroflée iaulne.

### LES VERTUS ET OPERATIONS

- A Les fleurs des Violiers bouliés en eau & beués prouſſittent contre difficulté d'aleine, & contre la toux.
- B Ces Violiers ſont venir auſſi le flux menſtrual, prouoquent l'vrine, & ſont ſuer, quand on ſe ſied en vn bain ou cune pleine de la decoctiō d'iceux.
- C Bref ilz ſont de fort ſemblables vertus au Gyrofler iaulne, mais non pas ſi fortes : pourtant on n'en doit point vſer en medecine ſinon en deſuit de la Gyroflée iaulne, laquelle en toutes ſortes eſt beaucoup meilleure & plus propre.

## Des Violettes de Damas. Chap. V.

### LA FORME.

LA Violette de Damas a les feuilles grandes, larges, noirâtres, vn peu crenées tout à l'entour, d'entre leſquelles ſort la tige reueſtue de petites feuilles, fort branchues, & produiſant au ſommet belles fleurs & bien ſſairantes, de figure ſemblables à la Gyroflée, de couleur blanche le plus ſouuét, aucunesfois incarnée, aucunesfois rougeatre, puis apres viennent longues ſiliques & rondes, eſquelles eſt la ſemence.

### LE LIEV.

Les Violettes de Damas ſe trouuent en ce pais bien pres par tous les iardins.

### LE TEMPS.

Elles fleuriffent en May & ſouuent tout l'xiſté.

### LES NOMS.

Ces fleurs ſ'appellent maintenant en Latin *Viola Marronales* : en François Violettes de Damas : en haut Aleman *Wiltſter Violſen*, & là ſelon d'aucuns *Viola hernalis* : en bas Aleman *Wuſſibloemen*, & ſelon le nom Latin *Jonefrouwen Wiſſien*, c'eſt à dire Gyroflée des Dames.

### LE TEMPERAM. ET OPERAT.

Ces fleurs ne ſont point en vſage en medecine pourtant leur temperament, vertus, & operations nous ſont encores pour le preſent incognues.

Da

Leucoſion.

Gyroflée.



Viola Marronales. Violette de Damas.



## LA FORME.

LE Bolbonac a les tiges dures, rondes, fort brâches: les feuilles grâdes, larges, noires, crenées tout au tour, non trop différentes aux feuilles des Noyfelier. Les fleurs sont semblables aux Violettes de Damas, de couleur palle perse, lesquelles peries, viennent filiques blanches, plates, rondes, fort larges, de la grandeur d'un teston, contenant vne semence brune, formée en façon de Lune, laquelle on voyd au trauers des peaux tenues de la filique. La racine est fibreuse comme celle des autres Violiers.

## LE LIEV.

Ceste herbe se trouue semée aux iardins de ce pais.

## LE TEMPS.

Le Bolbonac fleurit en Avril & en May, vn an apres quil est semé.

## LES NOMS.

Comme ainsi soit que ces fleurs ayent similitu de avec les Violiers, pourtant sont elles à present comprises sous les especes des Violiers, & en Latin nommées *Viola latifolia*, d'aucuns *Viola peregrina*. Car sous le nom d'*ios* en Grec, & *Viola* en Latin, sont le plus souuēt comprises toutes fleurs qui ont quelque similitude de avec les Violiers. Les Amateurs des herbes, & aucuns Apothicaires appellent ceste fleur d'un nom estrangey Bolbonac: les bas Alemans l'appellent *Peminschloemen*, c'est à dire Fleur monoyere, & *Parfeschloemen*. Les Anciens l'ont tenue pour vne espece de *Thlaspi*, principalement pour celle qui a esté descrite par Crateuas, appellée d'aucuns *Sinapi Persicum*, & de Dioscoride *Thlaspi Cratese*.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

La semence de ceste herbe est acre & mordante à la langue, & desechante, & pourtant elle est de pareille vertu à bautre *Thlaspi*.

## De la Violette herbue.

## Chap. VII.

## LES ESPECES.

Sous le nom de Violette herbue ou Gyrossée sont comprises plusieurs sortes de fleurs, qui sont parties en trois ou quatre especes. La premiere espece se nomme Violette herbue, ou Gyrossée, & est de diverses couleurs. La seconde se nomme Herbe tunique. La tierce Armoiries. Entre lesquelles peuent bien aussi estre nombrées pour vne espece les Armoiries sauuages.

## LA FORME.

- 1 La Violette herbue a les feuilles longues, estroictes, pres semblables aux feuilles de Porreau. La tige ronde, haute de pied & demy, pleine de ioinctures ou neuds, produisant deux feuilles à chaque neud. Les fleurs croissent au sommet des tiges hors de longs calyces & vnis, par dessus lesquels sont les feuillettes des fleurs estendues, les vnés de couleur blanche, les autres incarnées, les autres d'un rouge clair, les autres d'un rouge obscur, les autres tachetées & griuolées, & flairent bien pres comme le clou de Gyrosse. Quand les fleurs sont passées, il croist aux ronds calyculés des filiques longues & aigues, esquelles la semence noire est encluse.
- 2 L'Herbe tunique ressemble vn peu à la Violette herbue: elle a les feuilles estroictes, la tige nouëuse. Les fleurs semblables en figure à la Violette herbue, mais beaucoup plus petites, & rouges pour la plus part, aucunes fois semées de petis traictz, croissans au sommet de la tige deux ou trois ensemble, & en aucunes especes d'icelle neus ou dix amassées en vn, cōme vn bouquet de fleurs.
- 3 Les Armoiries ressemblent à la Violette herbue de feuilles, tige, & fleurs, beaucoup toutes fois plus petites. Les feuilles sont longues & estroictes, pres semblables à herbe, les petites tiges sont prestes & nouëuses, sur lesquelles croissent fleurs bien flairantes, semblables à la Violette herbue, chacune fleur simple de cinq ou six feuillettes dechiquetées profond, comme plumettes, blâches





Herbe  
violette

Vetonica diillis minor.

Armoiries.



Vetonica sphaerostria. Armoiries fatiuges.



Herbe  
violette

Herbe  
violette

Herbe  
violette





ou incarnées, apres lesquelles, comme à la Violette herbue, croissent dedans ronds calicules, filiques aigues contenant la semence.

- 4 Les Armoiries sauvages ressemblent quelque peu aux Armoiries: elles ont aussi les petites tiges noieuses, & fauilles estroictes, qui sont toutes fois plus larges, plus courtes, & beaucoup plus blanches que les fauilles de la Violette herbue, ou des Armoiries. Les fleurs sont rouges pour la pluspart, & aucunes fois aussi blanches, profond incisées bien pres comme les Armoiries, mais sans odeur. Les fleurs passées, croist la semence en longues filiques comme aux Armoiries.

## LE LIEV.

La Violette herbue, l'Herbe tunique, & les Armoiries se plantent en ce pais es jardins. Les Armoiries sauvages croissent d'elles mesmes par tout es prés, & lieux humides & herbus.

## LE TEMPS.

Toutes ces fleurs fleurissent le plus souuent depuis le May tout l'esté jusques en Septembre.

## LES NOMS.

- Ces fleurs se nomment en Grec *Stramon*: & en Latin *Veronica*, & de Pline cōme aucuns gens sçauans pensent *Cantabrica*. La premiere espece s'appelle à present *Veronica atris*, & *Veronica rosaria*, & d'aucuns *Ocellus*, & *Barbarica*: en François Violettes herbues, Gyrosées, Oeillets: en haut Aleman *Stassblumen*, *Regeblumen*, & *Reglein*: en Brabant *Sinoffelen*.

- 2 La seconde espece est la vraye *Veronica*, laquelle aucuns appellent maintenant *Herba tunica*: en haut Aleman *Dondermelein*, *Feldmelein*, *Hepdenblumlein*, *Blustropffle*: en Brabant *Kylien*: & en aucuns lieux de Picardie *Cuyderelles*.

- 3 La tierce est aussi vne espece de *Veronica*, & se peut bien appeller *Veronica atris*, ou *Veronica coronaria*: en haut Aleman on la nomme *Murwille*, & d'aucuns *Hochmurt*, & là selon en Latin *Sas perba*, c'est à dire Glorieuse: en Brabant *Plumkens*, & *cléyn Sinoffelkens*.

- 4 La quatriesme est vne espece sauvage de *Veronica*, & pourtant est elle appelée *Veronica filices*: en haut Aleman *Sauchblumlein*, c'est à dire fleur de coqui: en Brabant *Trayelblumkens*, & *Lochkoersblumkens*.

## LE TEMPERAMENT.

Pour la pluspart toutes ces especes de fleurs, avec leurs fauilles & racines sont tēperées en chaleur & secheresse. LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Conserue des fleurs de la premiere espece faicte avec sucre, conforte le cuer, & lvsage en est bon contre fieures chaudes, & contre la peste. *Lycnis fatua.* Des Oeillets.

- B La racine de la seconde & ses fleurs boulies en eau ou vin, prouoquent lvrine & rompent la pierre.

- C La mesme racine puluerisée & prise avec vin est souveraine contre la peste, & toute poison, & contre morsures & piqures de bestes venimeuses.

- D L'Herbe pilée tire hors les espines, chardons, & os rompus, & guerit les playes appliquée dessus.

- E La mesme freschement pilée guerit douleur de teste quand on la met dessus, ou boulie en eau, & que la teste en soit lauée. (incognue.)

- F La vertu des deux autres est pour le present encores De l'Ocillet. Cha. VIII. LA FORME.

L'Ocillet a tiges rōdes, lanugineuses & noieuses, & à chacune ioincture deux lōgues fauilles, & lanugineuses, se blables aux fauilles du Bouillō blanc, mais beaucoup plus petites & plus estroictes. Les fleurs croissent au sommet des tiges, hors de lōgs calicules crenelés, dōd les vnes sont dvn beau rouge, les autres blanches, simples, parties en cinq ou six fauillettes, aians de petites pointes aigues, se iognans ensemble au milieu de la fleur. Quand les fleurs perissent, il croist dedans les calicules, de filiques rondes, longues, où la semence est contenue qui est noire. La racine est longue & menue.

## LE LIEV.

Ces fleurs se plantent en ce pais aux jardins.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent en Iuin, Iuillet, & Aoust.



## LES NOMS.

Ceste sorte de fleurs s'appelle en Grec *λαχρίς σφραγομαρτικόν* en Latin *Lychnis coronaria*, & *Lychnis fatua*, d'aucuns *Athanasos* & *Acydonium*: en François Oeillets, & Oeillets Dieu: en haut Aleman *Margerit ofsin* & *Mariemrosen*, & si selon aussi maintenēt en Latin *Rosa Mariana*: en bas Aleman on les nomme pour la plus part *Chistus ooghren*.

## LE TEMPERAMENT.

Ces fleurs sont chaudes & seches.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

▲ La semence avec la fleur, ou chacune à part soy beue, prouffite contre piqures de scorpions.

## Des Oeillets sauuages.

## Chap. IX.

## LES ESPECES.

IL y a deux sortes de ces fleurs, l'une blanche, l'autre rouge. La Blanche est de plus grande croifion. La rouge est plus petite & plus basse.

*Lychnis sylvestris alba.*  
Oeillets sauuages blancs.

*Lychnis sylvestris purpurea.*  
Oeillets sauuages rouges.



## LA FORME.

Les Oeillets sauuages blancs ont la tige houffue, blanche, les fueilles blanches & lanugineuses, fort pareilles à celles de l'Oeillet cultiué, selon que les tiges sont plus gressies, & les fueilles plus estroictes & non si blanches. Les fleurs sortent d'un calicule rond & veu plus grand que celuy de l'Oeillet cultiué, & de figure semblable à iceluy, plus inciffées, toutesfois & sans poinctes aigues au milieu: icelles passées viennent rondes bouilles, & quelles la semence est contenue. La racine est au cunefois de la longueur d'un pied, & espesse d'un doigt.

Les Rouges ressemblent du tout aux Blancs, sinon qu'ilz ne croissent pas si haut, & leur racine n'est point si longue, mais plus courte pour la plus part, & fibreuse. Les fleurs sont rouges semblables aux autres.

## LE LIEV.

Ces fleurs croissent en lieux incultiués, aux bords des champs & le long des voyes, on les plante aussi aux jardins, & auient aucunesfois que par les souuent replanter, ilz acquierent les fleurs bien doubles.

LE TEMPS.

Ils fleurissent pour la plupart depuis le May iusques à la fin de l'été.

LES NOMS.

Les Oeillets sauvages s'appellent en Grec *Αγριό Ουρίο*: en Latin *Lycnis flustris*, d'aucuns *Tragonum*, *Hieracopodium*, ou *Lampada*: & es Boutiques de ce pais *Saponaria*, combien toutesfois que ce ne soit la vraye *Saponaria*: en haut Aleman *Sydweych*, *wilde Sargenros* *stus*, & en aucuns lieux *widerstoss*: en Brabant *Zennetchem*.

LE TEMPERAMENT.

Iceux avec leur herbe font de mesme temperament que l'Oeillet cultivé.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La semence, fleurs, & toute l'herbe des Oeillets sauvages prouffent contre piqures de scorpiions, & de saictiz ont si grande vertu en cest endroit que l'herbe seule iettée deuant les scorpiions leur oste la vertu de nuire.

La semence prise à la quantité de deux drachmes purge par bas les humeurs chaudes & bilieuses.

De la Nielle vulgaire.

Chap. X.

LA FORME.

Anthemou.

Nielle vulgaire.

LA Nielle vulgaire a tiges droictes, gresses, velues, les feuilles longues, estroictes, velues, & grisâtres. Les fleurs purpurées en rouge, parties en cinq feuilletes, non trop différentes aux Oeillets sauvages, apres lesquelles croissent siliques contenant la semence.

LE LIEV.

Ces fleurs croissent aux champs entre le blé & orge.

LE TEMPS.

Elle fleurit en May Juin & Juillet.

LES NOMS.

Elle se nomme en Grec comme dict Ruelle *Ανθιμου*, *Ανθιμου Φυλλώδης* en Latin *Anthemou* & *Anthemou foliosum* d'aucuns *Githago* ou *Nigellastru*, ou *Pseudomelanthu*: en François Nielle vulgaire: en haut Aleman *Kaden*, *Stofrad* & *Kornros*: en bas Aleman *Kornrosen* & *Regelblumen*.

LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

Les vertus, le temperament, & les operations de ceste herbe, ne font encores cognus pour ce qu'elle n'est point en vsage, sinon aupres d'aucuns ineptes, qui vsent d'icelle au lieu d'Yruse ou de Nielle, au grand dommage des malades.

Des Bleüets.

Chap. XI.

LA FORME.

LE Bleüet a la tige anguleuse, sur laquelle croissent feuilles estroictes, aiguës & grisâtres, qui ont quelques crenes par les bords & angles aiguës comme dens: au sommet des tiges il produit de petites boules rondes, rudes & escailleuses, hors desquelles sortent de belles fleurs, de cinq ou six feuilletes dechiquetées, pour la plupart bleues, principalement les Sauvages, aucunefois aussi ceux qui croissent es vergers portent fleur grisâtre ou purpurée & perse, lesquelles peries croist dedans chapiteaux escailleux la semence longue encloë dedans vne laine velue.

On trouue encores en aucuns iardins vne autre espece de Bleüets aiant les feuilles pareilles au deuant dict. Il a les feuilles grandes & larges, plus grandes que celles de l'Oeillet, lesquelles sont aussi douces & lanugineuses, comme les feuilles du Bouillon. Les fleurs de ceste herbe ressemblent aux autres Bleüets de chapiteaux escailleux, de fleurs dechiquetées, & de semence, comme auons dict: mais beaucoup plus grandes, & de couleur bleüe au milieu, tirant quelque peu sur le rouge, ou pers. La racine est de longue durée, reissant de nouveau tous les ans.



Cyanus.

Bleüets.

Cyanus maior.

Grans Bleüets.



## LE LIEU.

Les Aubifains bleus croissent aux champs entre le froment, & singulierement entre le Seigle. Ceux qui ont la fleur blanche & perse, & les Grands sont semés & plantés es vergers.

## LE TEMPS.

Ces fleurs fleurissent depuis le mois de May iusques en Aoust.

## LES NOMS.

Les Bleüets communs s'appellent de Pline en Latin *Flos Cyanus*, d'aucuns Modernes *Baptisera*, *la*, ou *Blaptisera*: en François Aubifains, Blucts, Bleüets, Perceles, & Blaueoles: en haut Aleman *Kornblumen*: en Brabant *Cosenbloemen* & *Roghbloemen*.

La seconde espece s'appelle *Cyanus maior*, & est tenue d'aucuns Sçauis pour vne espece de *Verbascum*, & pourtant s'appellent *Thryallis* & *Lychnitis*: en haut Aleman elle se nomme *wasst Kornblumen*: & en Brabant *groote Cosenbloemen*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Bleüets sont froids & secs.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A. Les Bleüets communs pilés sont vtilement appliqués sur yeux rouges & coulans, & sur phlegmons qui sont au tour des yeux.  
 B. L'eau de Bleüets distillée, guerit rougeur & douleur des yeux, quand on en distille souuent aux yeux, & qu'on les en laue.

## De la Soucie.

## Chap. XII.

## LA FORME.

LA Soucie a trois ou quatre tiges hautes de pied & demy, reuestues de feuilles longues, larges, & vertes en blâchissant: au bout des tiges croissent belles fleurs iaulnes, d'odeur quelque peu forte, lesquelles se ferment quand le Soleil se couche, & s'ouurent du matin quand il se leue. Chacune fleur à au milieu de soy vne couronne iaulne ou orangée, au tour de laquelle sont assises mout de fucillettes iaulnes. Quand les fleurs sont peries, il croist au lieu d'ou elles sont tombées de

bées de boutons ronds & grossets de plusieurs semences courbées, amassées ensemble en forme d'une petite boulle. Chacune semence est courbée comme un petit demy cercle. La racine est blanche & fibreuse.

## LE LIEV.

Ces fleurs croissent par tout es jardins là où elles sont semées, & croissent tous les ans de nouveau de la semence tombée.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent depuis le May tout l'été jusques en hyuer.

## LES NOMS.

Elles s'appellent à present en Latin *Calendula*, & dans cuns *Caltha* & *Castula*; en haut Alemā *Kingrislum*; en bas Aleman *Goutsloemen*.

## LE TEMPERAMENT.

La Soufie est de complexion chaude & seche.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Les fleurs à part elles ou avec leur herbe cuïches en vin & beuës, prouoquent le flux mēstrual aux femmes

B Les mesmes & leur herbe sechées, & misēs sur char bons vizē, tirent hors l'arrierefais & l'enfant mort quand on en recoit le parfum par bas.

C L'eau d'icelles distillēe & mise dedens les yeux, guerit la rougeur & inflammation d'icieux.

D La conferue faicte des fleurs d'icelles prise du matin à jeun guerit le treblement & batement de cueur, il est aussi bon d'en vser contre la peste, & contre l'air mauuix & corrompu.

Calendula. Soufie.



## De l'Onobrychis. Chap. XIII.

## LA FORME.

L'Onobrychis est vne herbe tendre, haute d'une paulme ou deux, ayant les tiges menuēs & tendres, reuēstues de feuillettes petites, ver des, bien pres semblables aux feuillettes de la Lentille. Les fleurs croissent à costē & au sommet des tiges, de couleur perse, bien pres comme vne Violette, mais sans odeur, bien pres de la forme d'une Cymbale, à cinq angles, & au milieu un petit carillon fendu en trois par le bout: Elles s'ouurent apres soleil leuant, & se referment enuers le soir, & quand elles sont fermēes, elles ont cinq plis, comme les fleurs de Rap onses & autres semblables clochettes auant qu'elles s'ouurent.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en terre fertile entre le froment.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Juin & Iuillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ὄνοβρυχις*, & en Latin *Onobrychis*, c'est à dire Recanement d'asne: incognuē es Boutiques: en Brabant *Djoumen spieghel*.

## LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche, & subtiliante.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Ceste herbe boullie en vin & beuē prouoque l'vrine, & guerit ceux qui pissent goutte à goutte. La mesme broyēe & appliquēe sur durillons, les resout & consume.

B Icele meslēe avec huile faicē fuer, si on s'en frote le corps.

Onobrychis.



Melampyrum.  
Triticum vaccinum. } Bled noir.

## LA FORME.

LE Bled noir a vne tige droicte d'environ vn pied de haut, ayant trois ou quatre branches à costé couuertes de longues fueillettes estroictes : au sommet des branches viennent beaux espis, plains de fleurs & de fueillettes profond incisées, non trop differens à la queue d'un renard. Cest espi commence à fleurir par bas, & va ainsi fleurissant iusques au sommet: auant que les fleurs fouurent, les petites fueillettes & boutons des fleurs sont tous d'une belle couleur perse: & incontinent apres les fleurs sortent & fourrēt & de là en auāt font de couleur iaulne entremeslée de pers, & apres que les fleurs sont tombées, ces fauillettes perses perdent leur couleur, & deuiennent verdes, & au lieu des fleurs croissent siliques larges, esquelles cōmūnement deux semences sont enclōses, non differentes au grain de fromēt plus petites toutesfois & plus brunes. La racine est greille & ligneuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist entre le fromēt & Espeautre, en terre bonne & grasse.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Iuin & aucunesfois en Iuillet.

## LES NOMS.

On appelle ceste herbe à present en Latin *Triticum vaccinum*, ou *Triticum bovinum*, cest à dire Bled de vache ou de beuf: en haut Aleman *Kunneyssen*, & d'aucuns *Baum fleisch blumen*: en Brabant *Pereffbloemen*: Et semble bien à voir que soit celle herbe inutile de laquelle parle Theophraste au liure 8. chap. 5. & Galien au premier de la faculté des aliments chap. dernier, appellée en Grec *μελαμπύριον* Latin *Melampyrum*, laquelle comme ilz escriuent est vne herbe inutile, croissant entre le fromēt, ainsi appellée pour ce quelle a la graine noire de la forme de fromēt. Ce n'est pas toutesfois le *Melampyrum*, duquel parle Dioscoride, laquelle s'appelle ausi Myagron.

## LE TEMPERAMENT.

Le Bled noir, & la graine principalement, est chaud esleuant des fumées en haut.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La semence de ceste herbe prise en viande, ou breuuage trouble le cerueau, & fait douleur de teste, & enyure, non pas tant toutesfois que l'Yraye. Il ne se trouue autre chose des vertus & operations d'icelle.

## De la Consoulde Royale.

## Chap. XV.

## LES ESPECES.

Il y a deux especes de Consoulde Royale. La Cultiuée, & la Sauvage.

## LA FORME.

La Consoulde royale cultiuée a vne tige ronde, droicte, branchue, reuēstue de fueilles tendres & dechiquetées fort menu, non guere differentes aux fueilles de la petite Auronne. Les fleurs croissent le long des tiges au sommet, & font de cinq fueillettes assemblées, vn peu semblables à la Violette, excepté que l'une des fueillettes de la fleur est longue & creuse, & a par derriere vne queue courbée & pliée comme la fleur de Lin sauvage. Ces fleurs sont de couleur l'vnefois purpurée en bleu, l'autrefois blanche, aucunesfois incarnée: & apres quelles sont peries, la semēce qui est brune croist dedans longues siliques.

La Consoulde royale sauvage est semblable à l'autre, mais beaucoup plus petite de tiges & fueilles, & plus basse. Les fleurs sont pareilles à la dessus dicte, plus petites toutesfois, & non tant amassées ensemble, d'une belle couleur bleuē en pers comme les Violettes, & apres icelles viennent les siliques, là où est la semēce.

Delphinium. Consoulde royale cultiuee

Bacinum. Consoulde royale sauvage.



## LE LIEV.

La Consoulde royale cultiuee se sème en ce pais és iardins des Amateurs des herbes. La sauua ge croist entre le blé en terre grasse.

## LE TEMPS.

La Cultiuee florit tout l'asté. La Sauvage se trouue en fleurs en Iuin, & en Iuillet.

## LES NOMS

- 1 La Consoulde royale cultiuee s'appelle en Grec *Delphinium*, & en Latin *Delphinium*, d'aucuns Modernes *Flos regius*, ou *Flos equestris*.
- 2 La Sauvage s'appelle *Delphinium terreste*, *Delphinium alterum*, & *Bacinum*, à present *Consolidaregia aut regalis*: en François Consoulde royale, & Pied d'aloüette; en haut Aleman *Rittersporn*, & là selon en bas Aleman *Riddersporen*, c'est à dire Esperon de cheualier.

## LE TEMPERAMENT.

*Delphinium* est de complexion temperément chaude.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine de la Cultiuee beuë est singuliere contre piqures de scorpions, & de siuct elle a si grand vertu contre le venin d'iceux que l'herbe seule iettée au deuant des scorpions, les rend sans force & vertu, tellement qu'ilz ne se peuuent remuer tant que l'herbe soit ostée de deuant eux.

La graine de la Consoulde royale sauvage a pareille vertu que la Cultiuee, mais non si forte. B

## De l'Ancolye.

## Chap. XVI.

## LA FORME.

L'Ancolye a les fueilles grandes, larges, ains deux ou trois coupures profondes, semblables aux fueilles de la grée *Chelidoine*, plus blanches, nō de forte odeur, & ne rendans aucū ius quand elles

elles sont blessées. Les tiges sont rondes & vnes enuiron deux pieds de haut, sur lesquelles croissent fleurs composées de deux sortes de fuellettes, dont les vnes sont petites & estroictes, & les autres croissans entre les susdites, creuses, ains vne queue l'ogue & recoquillée comme celles de la Consoude royale. Ces fleurs sont l'vnefois simples, l'autrefois doubles, & de couleur, mainteant bleue, maintenant blanche, aucunesfois perse, aucunesfois rouge, aucunesfois griuolée, & entremeslée de bleu & de blanc. Apres lesquelles croissent quatre ou cinq siliques aigues, jointes ensemble, qui contiennent vne semence noire.

## LE LIEV.

On les seme & plante icy aux iardins, & croissent en aucuns bois haut situés, & aux rochers, mais non pas en ce pais.

## LE TEMPS.

Elle fleurit le plus souuent en May & en Iuin.

## LES NOMS.

Ceste fleur s'appelle à present en Latin *Aquilegia* ou *Aquileia*, incogneue aux Anciens: en François *Ancoleye*: en haut Aleman *Agley*, & *Aglesy*: en bas Aleman *Alteley*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Ancoleye est tēperée en chaleur & humidité.

## LES VERTVS ET OPERAT.

Cest: fleur comme escrit Ruelle n'a aucun vsage en medecine.

## De la Barbe de bouq. Cha. XVII.

## LA FORME.

LA Barbe de bouq a la tige rōde, droite, nouueuse, reuelue de fuelles longues & estroictes pres semblables aux fuelles des Aulx. Au sommet des tiges elle produict de belles fleurs doubles & plaines, de couleur aucunesfois perse à fibres dorées au milieu, & aucunesfois isulne, lesquelles du matin à soleil leuant fouurent se tournans & enclinans vers le soleil, & derechef se ferment enuiron midy: Apres quelles sont peries, au chapiteau hors duquel les fleurs estoient sorties, y croist vne graine lōgue, velue par haut. Et quād elle est meure son chapiteau fouure & se conuertit en ronde boulle velue comme le Pisse en liēt, qui s'en vole au vent. La racine est lōgue, grosse cōme vn doigt & douce en saueur. Toute l'herbe avec ses tiges, fuelles, fleurs, & racine est plaine d'vn suc blanc comme lait lequel fort icelle estant entammée.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en aucuns prés, on la plante aussi aux iardins pour la beauté de ses fleurs.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en May & en Iuin.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle à present en Latin *Barba hirci*, & est tenue pour l'herbe que les Anciens ont appellée en Grec *βαρονίον κίρα*: en Latin *Bars*



Barba hirci.

barbe de bouq.





*bulbirci, & Coma*: en François Barbe de bouq: en haut Aleman *Hochbart, Sauchstot*: en bas Aleman *Hochbart & Josephs bloemen.*

LE TEMPERAMENT.

Cette herbe est temperée en humidité & chaleur.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de la Barbe de bouq boulie en eau & beuë appaise douleurs, guerissant les pointu A  
res & apostemes du costé.

La mesme racine est aussi fort bonne en viandes & salades prinse cōme les racines de Raipōce. B

Du Passe velours.

Chap. XVIII.

LA FORME.

*Amaranthus purpureus.* Passe velours,

1 LE Passe velours a tiges rondes, fort brānchues. Les fuel  
les longues, larges, retirans quelque peu aux fuelles de  
la Morelle, plus grandes toutesfois, entre lesquelles croif-  
sent le long des branches de beaux epis longs, doux au ma-  
nier de couleur purpurée en rouge, cōme beau veloux cra-  
moysi laquelle ne seuanouit pas tost, ne perit, mais se peut  
long temps garder en sa couleur & beaute, principalement  
quand les epis sont sechés en vn four à demi chaud. La se-  
mence croit aux epis qui est petite & toute noire.

2 Il s'en trouue vne autre espece qui ressemble du tout à la  
suddicte en tiges, fuelles, semence & racine, sinon que les es-  
pis ne sont point saonnés comme les autres, mais s'elargis-  
sent & recoquillēt par haut en forme de plumaces tellemēt  
qu'il la fait tresbeau veoir: elle garde aussi sa couleur cra-  
moysine comme l'autre.

3 Encores s'en trouue il vne semblable espece, laquelle  
croit à la hauteur de neuf ou dix pieds, ressemblant à l'autre  
en figure. Elle a toutesfois les fuelles beaucoup plus gran-  
des, les tiges plus espesses, plus dures, & striées ou aians cos-  
tes esleues: Les epis plus gros, plus longs & plus remplis,  
mais non de couleur si belle ne si plaisante à la veuë, & la-  
quelle ne dure point, mais se pērt incontinent, & tourne en  
couleur verdâtre & herbue, apres qu'elle est cueillie.

LE LIEV.

Toutes ces especes ne croissent pas en ce pais sans estre se-  
mées ou plantées es jardins. Les dames d'Italie sont grand  
cas de la seconde à cause de sa beaute, parquoy vous ne trou-  
ueres guere iardin qu'il n'y en aye.

LE TEMPS.

Elles produisent leurs epis en Aoult, & la semence est  
meure en Septembre.

LES NOMS.

Ces beaux Epis s'appellent de Pline au liure 21. chap. 8. *Amaranthus*, & d'aucuns Modernes *Flos  
amoris*, & *Amaranthus purpureus*: en François Passe velours: en haut Alemā *Samatblumen*, *flosa-  
mor*, & *Dausenschoon*: en bas Aleman *floume es bloemen*.

Ces herbes sont sans doute vne sorte & espece de Blitum, duquel nous escrirons au cinquiē-  
me Liure.

LE TEMPERAMENT.

Ces fleurs sont de complexion froide & seche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Passe velours bouli en vin & beu areste flux de ventre, & guerit la dysentere. A

Des Marguerites

Chap. XIX.

LES ESPECES.

Il y a deux especes de Marguerites. La Grande & la Petite. La Petite est de deux sortes, l'une do-  
mestique, & l'autre Sauvage.

LA FORME.

La grēde Marguerite a les fuelles verdes, longues, crenées tout autour: la tige rōde, reuestue de  
sēblables fleurs, croissant au cunefois deux pieds de haut, au sōmet de laquelle elle porte belles fleurs



*Bellis maior.* La Marguerite grande.

*Bellis minor hortensis.*  
La petite Marguerite domestique.



jaunes au milieu, & ornées tout autour de plusieurs belles feuilletes blanches non trop différentes aux fleurs de la camomille vulgaire, plus grandes toutesfois & sans odeur. Quand elles perissent les petites feuilletes blanches tombent jus & le jaune du milieu, qui est la semence, s'élève en haut.

*Bellis minor sylvestris.*

La petite Marguerite sauvage.

2 La petite Marguerite cultivée a les feuilles quelque peu semblables à la susdite, plus petites & moins crenées. Elle pousse ses fleurs de la racine, sur courtes queues & gresles assez semblables à celles de la grande, si ce n'est qu'elle a les feuilletes, qui en la grande environnent le jaune du milieu, si épaisses & doubles, qu'on ne voit point ou fort peu de jaune au milieu des fleurs: Et elles sont aucunes fois blanches, aucunes fois bien rouges, aucunes fois bigarrées de blanc & rouge, & celles là sont les plus communes. Il croît aucunes fois au tour de ces fleurettes moult d'autres comme petites fleurs sortis sur petites queues, du calyce des fleurettes. La racine est blanche & fibreuse.

3 La petite Marguerite sauvage ressemble à la petite domestique de feuilles. Les fleurettes sortent aussi de la racine sur queues courtes, jaunes au milieu, & ornées de feuilletes blanches, tout à l'entour comme la grande Marguerite, plus petites toutesfois & sans odeur, come toutes les autres Marguerites. La racine est semblable à celle de la Petite domestique.

LE LIEV.

La grande Marguerite, & la Petite sauvage croissent es prés & lieux herbus. La Domestique belle



belle & double est plantée és jardins.

LE TEMPS.

La grande Marguerite fleurit pour la plus part en May. La Petite domestique depuis le May bien pres tout le long de l'æsté. La petite Sauvagee florit de fort bonne heure en Mars, aucunes fois plus tost, jusques en Avril, ou plus tard.

LES NOMS.

Ces fleurs s'appellent de Pline en Latin *Bellis*, & *Bellus*, & à présent *Consolida minor*, & *Herba Margarita*, d'aucuns *Prunella veris*, principalement la petite Sauvagee en François Marguerites ou Paquettes: en haut Aleman *Marsstiechen*, *Marsstelen*, & en aucuns lieux *Zerloslöwen* en Brabant *Mardeliern*, & *Kersoumen*.

LE TEMPERAMENT.

Ces fleurs & herbes sont de nature froide & seche.

LES VERTUS. ET OPERATIONS.

La decoction de la petite Marguerite avec ses fistilles, ou à part soy faicte en eauë est vtilemēt A  
beuë contre fieures, inflammations de foye, & de toutes parties interieures.

L'herbe prinse en viandes ou potaiges, lache le ventre tout doucement. B

L'herbe de la Marguerite appliquée, prouffite à tous viceres inflammés, & apostemes, & aux C  
yeux inflammés & coulans.

La mesme appliquée sur playes, les engarde d'inflammer & apostemer. D

De la Gantelée.

Chap. XX.

LES ESPECES.

Il y a plusieurs especes d'herbes qui portent les fleurs comme clochettes ou sonettes, dont la Gantelée en est vne, de laquelle nous traicterons en ce chapitre, & est ausi de deux sortes, Grande & Petite.

*Trachelium maius.*

La grande Gantelée.



*Trachelium minus.*

La petite Gantelée.



L iij

LA

## LA FORME.

1 La grande Gantelée a les tiges quarrées, rudes, houlfues, sur lesquelles croissent feuilles aigües par le bout, & crenées à l'environ, semblables aux feuilles de l'Ortie. Les fleurs croissent le long des tiges en façon de clochettes ou sonettes, semblables aux fleurs de Raiponces, beaucoup plus blanches toutesfois, velues & houlfues par dedans, de couleur maintenant blanche, maintenant bleue, maintenant incarnée. Elle commence à fleurir au sommet de la tige, & va ainsi florissant de vers le bas. Icelles passées, la semence qui est petite & grise survient en chapiteaux longs comme à la Raiponce. La racine est blanche & bien retorse.

2 La petite Gantelée ressemble à la Grande de tiges, mais elle ne croist point si haut. Les feuilles sont longuettes, plus petites, plus blanches, & non si profond crenées que celles de la Grande, & ses semblables aux feuilles de la Saufte. Les clochettes sont violettes & perles, & croissent au plus haut de la tige bien plus amassées ensemble que à la grande Gantelée. La racine est grosse, & fort fibreuse.

A Toutes les deux Gantelées croissent d'elles mesmes en aucuns prés secs, & lieux herbis. On les plante aussi aux jardins.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent le plus souvent en Juillet.

## LES NOMS.

La Gantelée s'appelle en Grec *Trachelium*; en Latin *Trachelium*, *Cerularia* & *Vularia*, selon le nom Aleman, d'aucuns aussi *Campanula*; en François Gantelée, ou Gans nostre dame; en haut Aleman *Walshhaut*; en bas Aleman *Walstruyt*; Et semblent à voir espèces de Raiponces, comme aussi la Violette de Marie, laquelle sera descrite cy dessous.

## LE TEMPERAMENT.

La Gantelée est de complexion froide & sèche.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A La Gantelée boulie en eau, est souveraine pour guerir douleur & inflammation du col & du gozier par dedus, & toutes ulcerations de bouche, quand on la gargarize ou qu'on s'en lave la bouche.

## De la Violette d'Automne. Chap. XXI.

## LA FORME.

Entre les herbes qui portent clochettes pour fleurs il ny en a pas qui soit de plus belle couleur que celle icy: elle a les tiges menues, droictes, noueuses, & à chacun neud deux feuilles l'une contre l'autre, longues & estroictes, à costé desquelles, & au plus haut de la tige croissent belles fleurs, longues, creuses, toujours renuercées, & semblent à vne logue clochette, ains deux ou trois filets blancs au milieu. Elles sont de couleur bleue, tant belle qu'elles semblent prouoquer la beauté & couleur azurée du ciel mesme. Icelles peries survient au milieu de la fleur vne silique ronde & longuette pleine d'vne semence petite & longue.

## LE LIEV.

Ces belles fleurs croissent es prés humides, & lieux semblables incultiués assis en terre grasse.

## LE TEMPS.

Elle fleurit à la fin du mois d'Aoust & en Septembre.

## LES NOMS.

Pline appelle ceste fleur en Latin *Colombiana*, & *Viola Antanalis*; en bas Aleman elles se nomment *blaw Lelichzo*, & *Dup sent schoon*.

## LES VERTUS. ET TEMPERAM.

Les vertus, temperament, & operations de ceste belle & plaisante fleur ne sont pas encores trouuées, ny descrites par aucun.

## De la Violette de Marie. Cha. XXII.

## LA FORME.

Ceste fleur belle & fort amiable a premieremét pres de la terre des feuilles longues, larges, & vn peu houlfues, non trop differètes aux feuilles de l'Oeillet sauage. Du milieu desquelles sort au



bout de deux ans vne tige ou plus fleurs, fort bréchues, reueftues de feuilles semblables, mais vn peu plus petites. Il y croift sur les branches plusieurs fleurs creufes, belles, fort amiables, de couleur d'un beau pers pour la plus part, aus cunefois blanche, de façon affes semblable aux fleurs de la grande Gantelée, mais beaucoup plus grides, plus rondes, & non si profond dechiquetées par les bors, lefquel les auit fouuir font aufsi ployés en cinq. Icelles passées furuiennent de petites rondes bouilles à cinq queués rudes, creufes, courtes, & rebouchées, ou mouffes, au reste semblables aux bouilles de Raiponce, ou Gantelée. La semence est au milieu desdictes bouilles, petite & de couler de chafnigne. La racine est blanche & espessée, jettant à costé plusieurs autres racines.

## LE LIEV.

Ces belles fleurs se trouuent semées aux jardins des Amateurs des herbes, & ne sont pas encores fort communes.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent depuis Juillet iusques en Septembre, ou plus tard, & ne laissent ce pendant qu'elles sont en fleur à porter aufsi leur semence, tellement que souuent incontinent que ceste herbe a comencé à florir on y trouue toujours bouttes, fleurs, & semence meure.

## LES NOMS.

On appelle ces belles fleurs en Latin *Viole Mariana*: en bas Aleman *Mariettes*.

## LE TEMPERAMENT.

Ces fleurs, & leur racine principalement, sont froides & seches.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Elles ont la mesme vertu que la grande Gantelée, & se doiuent vsurper en mesme sorte.

## De l'Herbe aux cloches cerulée.

## Chap. XXIII.

## LA FORME.

- 1 Ces fleurs ont quand elles commencent à sortir les feuilles petites, rondelettes, comme celles du Violier de Mars, d'entre lesquelles sort la tige lōgue, haute & creuse, reueftue de ficillettes longues, noistres, estroictes, entre lesquelles & au sommet de la tige croissent belles cloches, plus grandes que les fleurs de Raiponce, de couleur bleuë tirant sur le pers pour la pluspart, auscunefois aufsi blanche. Icelles tombées la semence est contenuë en petites bouilles comme à la Raiponce. La racine est gresse & fibreuse. Toute l'herbe est pleine de lait lequel sort quand elle est entamée, & a la saveur de Raiponce.
- 2 Il s'en trouue encores vne espèce qui est sauvage, laquelle ressemble du tout à la susdicte de croiffon, de feuilles, tiges, fleurs, & semence: elle est toutesfois beaucoup plus petite en toutes sortes, si est ce quelle rend aufsi vn ius blanc comme la premiere.

## LE LIEV.

On plante la premiere & cultivée es jardins. La petite sauvage croist aux bords des champs & sous les hayes.

## LE TEMPS.

Ces fleurs florissent en Juin & Juillet. La sauvage fleurit aussi jusques en Aoust.

## LES NOMS.

Ces fleurs se nomment à present Belle videre: en Aleman *Blauw Klocken*, cest en Latin *Campanula carulea*.

## LE TEMPERAM. ET VERTVS.

Ces fleurs ne sont pas en vsage en Medecine, pour tant le temperament, & vertus d'icelle sont incogneus.

## De la Digitale Chap. XXIII.

## LA FORME.

LA Digitale a les feuilles longues, larges, noiratres, vn peu crenées à l'enniron, aucunement semblables aux feuilles de Bouillon blanc: d'entre lesquelles sort vne tige droite, ronde, haute de deux coudées ou environ, à costé de laquelle depuis le milieu jusques au sommet croissent belles fleurs longues, rondes, creuses, aians la forme d'vn dé à coudre, de couleur maintenant rouge par dedans tachetée de taches blanches, maintenant iaune. Icelles tombées se montrent calyces ronds & aigus par le bout, où la semence est large & longue, de goust amer. La racine est noire, fort fibreuse.

## LE LIEV.

Elle croist en lieux pierreux & montaigneux en valées obscures & humides, & là où il y a mines de fer & de charbons de mareschaux. On la plante aussi en ce pais aux jardins.

## LE TEMPS.

La Digitale florit pour la plus part en Juillet & en Aoust.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle à present en Latin *Digitalis*, *Campanula sylvestris*, & pareillement *Nola sylvestris*: en haut Aleman *fingerhut*, *fingerhut*, *maist glocklin* & *maist fessel*: en bas Aleman *Dingertortent*. C'est selon quaucuns escriuet celle espeece de *Verbascum*, que les Grecz appellent *αχυρις* & *βουαλις*, les Latins *Lychmisis*, & *Thryallis*, avec laquelle elle a fort grande similitude. LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche.

## LES VERTVS ET OPERAT:

- A La Digitale cuicte en eau ou vin, puis beue, incise & coupe l'espaisseur des humeurs grosses & visqueuses, outre ce ouure les oppilations du foye, & de la ratelle, & autres parties interieures.
- B La meisme prise en meisme sorte, ou bousée en eau miellée & beue, nettoye & purge le thorax & fait sortir & mourir les phlegmes visqueuses.

De



Digitalis.

Digitale.



## LES ESPECES.

DE ces fleurs il s'en trouue de deux fortes en ce pais: L'une Grande, & l'autre Petite. La Grands de croist de la hauteur d'un homme & florit fort tard. La Petite demeure tousiours basse, & florit de fort bonne heure.

## LA FORME.

1 Le grand Ocillet d'Inde a la tige longue, bruna tre, anguleuse, noueuse, croissant huit ou neuf pieds de haut, fort brâchue, produisant à chacune jointure tousiours deux rameaux reueff de fueil les grandes & l'ogies composées de plusieurs fueil lettes longues, estroictes, crenées tout au tour, es pandues cômme azles, & assises l'une à l'opposite de l'autre, du tout semblables aux fueilles de l'Athanasie. Les fleurs croissent au bout des brâches hors de l'ogs calyces, & rōds, de couleu bruneorangée par dessus & palleisimale par dessous. Apres que les fleurs sont passées, la semence qui est longue estroictie & noire est enlose en ces ronds calyces.

2 Le petit Ocillet d'Inde ressemble au dessusdict de tiges, fueilles, fleurs, & semence, sinon qu'il est en toutes sortes plus petit, ne croissant guere plus haut d'un pied. Elles sont toutes deux tât aux fueil les qu'aux fleurs, d'une odeur forte & mal plaissant, principalement quand elles sont frotées ou es cachées entre les doigts. LE LIEV.

Ces fleurs croissent en Aphriq, & de là ont esté apportées en ce pais, depuis que le trespuissant & inuincible Empereur Charles cinquesime eut gaigne la ville & pais de Thunes, On les plante en ce pais es iardins. LE TEMPS.

2 Le petit Ocillet d'Inde commence à fleurir en Aueil, ou en May, & de là en auant tout l'esté.

1 Le Grand cômance seulement à fleurir en Aueil LES NOMS.

Ceste fleur se peut bien appeller en Latin *Flos Africainus*, car d'Aphrique a elle esté premieremēt apportée en ce pais. Les François appellent ceste fleur Ocillet d'Inde, de là viēt que les Latins l'ont appellée *Flos Indicus*: & en haut Aleman *Indianisch Regelin*: en bas Aleman *Thuens bloemen*. Aucuns sçauans pensent que ceste herbe ayt esté appellée des Anciens *Idoxya Orbonna*, & quelle soit l'Othonna, de laquelle Dioscoride a escrit, qui croist en Arabie aux enuirs d'Egypte, & a les fueilles creées comme si elles auoient esté rongées des chenilles, ce que bien pres on peut considerer aux fueilles de cest Ocillet d'Inde quand on les regarde contre la clarté. LE TEMPERAM. ET NVISANCES.

L'Ocillet d'Inde est fort mauuais, nuisible & venimeux aux hommes & aux bestes comme i'ay cognu par experience, principalement en vn petit chat auquel i'auoye donné à mâger ces fleurs bien broyées avec fromaige frais, car incontinent il deuint fort enflé, & en peu de temps apres mourut. Et à faire ceste experience i'auoye veu, en vn petit enfant, lequel apres auoir cueilli ces fleurs les mit en sa bouche, & les leures & la bouche luy ensferent incontinent tresfort, & vn ou deux iours apres deuint fort rogneux, comme aussi souuent aduient à ceux qui ont tenu en la bouche les tuyaux de la Cigüe. Parquoy il appert euidentement que ceste herbe avec sa fleur est fort venimeuse, & de temperament fort semblable à la Cigüe, ce qu'aussi en partie on peut comprendre par son odeur ingrâte, tresforte & puante non trop différente à la senteur de Cigüe.

Du grand Muguet, &amp; Vnefueille.

Chap. XXVI.

## LA FORME.

1 Le grand Muguet a deux fueilles verdes, vnies, semblables aux fueilles du Lis blanc, plus petites toutesfois, & plus tendres, entre lesquelles croist vne tige de la hauteur d'une paulme, ou enui-



Lilium Theophrasti. Grand Muguet.



Vnefeuille.

Vnefeuille.



environ, à laquelle pendent sept ou huit belles fleurettes, ou davantage, blanches comme neige, d'odeur forte & amiable, sentans bien pres comme le Lys. Icelles fleurs tombées, il vient en leur lieu de belles bayes rouges semblables au fruit de l'Asperge domestique. La racine est fibreuse & se traîne çà & là.

Il semble bien que l'Vnefeuille soit vne espece de Muguet, Elle a la feuille non guere differente des plus grâdes feuilles du Violier de Mars, aiant plusieurs costes ou nerures du long, comme la feuille de Plantain, laquelle sort tousiours seule de terre, sinon quand l'herbe fleurit & est en graine, car alors elle produit sur vne petite tige ronde & tendre deux feuilles semblables mais plus petites, l'vne plus haut que l'autre, par dessus lesquelles sont petites fleurettes blanches, comme au petit Muguet, mais non de si forte odeur que le grand Muguet, apres lesquelles sort vn petit fruit rond, blanc au commencement puis rouge. La racine est fort grosse & se traîne.

## LE LIEU.

Le grand Muguet & l'Vnefeuille croissent aux boys ombrageux.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes deux en May.

## LES NOMS.

Le grand Muguet s'appelle à present en Latin *Lilium convalli*, c'est à dire Lis de valées: en haut Aleman *Meyrnsümle*; en bas Aleman *Meyrsmehno*. C'est sans doute vne espece de Lis, la premiere que Theophraste décrit, laquelle fleurit incontinent apres les Violettes.

La seconde espece s'appelle à present en Latin *Vniifolium*: en haut Aleman *Einstofel*: & en bas Aleman *Einsladt*, & semble bien que ce soit vne espece de Muguet, veu qu'elle luy ressemble & de fleurs & de semence.

## LE TEMPERAMENT.

Elles sont de complexion chaude & seche comme le Lis;

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A On trouue par escrit que l'eau de la fleur du grand Muguet distillée avec bon vin & fort, beue

vne



vne cuillerée, fait retourner la parole à ceux qui sont tombés en Apoplexie, & quelle pousse à ceux qui sont paralytiques, & qui ont la goutte, & quelle conforte fort le cœur.

La mesme eauë comme on dict, fortifie la memoire, & la remet à son naturel quand par maladie elle est diminuée.

Outre ce on dict aussi quelle est vilement instillée dedans les yeux enflammés, & coulans.

La racine d'Vnefeuille est tenue d'aucuns Modernes pour vne souueraine & singuliere medecine contre la peste & toute poison, quand on donne à boire la pouldre de la dicte racine au poids de demy drachme avec bon vin ou vinaigre, ou avec les deux ensemble, selon la constitution des malades, & qu'on s'en aille là dessus coucher & bien suer.

L'vne feuille est vilement appliquée avec sa racine sur playes nouvelles, car elle les contregarde de toute inflammation & aposteme.

De l'Antirrhinum.

Chap. XXVII.

LES ESPECES.

Il y a en ce pais deux sortes de ceste herbe, l'vne Grande, & l'autre Petite. La grande a les feuilles larges, la quelle est le vray Antirrhinū de Dioscoride. La Petite a les feuilles longues & estroictes.

Antirrhinon. Le grand Antirrhinum.

Orontium. Le petit Antirrhinum.



LA FORME.

Le grand Antirrhinum a les tiges droictes, rondes, bien branchues. Les feuilles noirâtres, longuettes, & larges, non guere differetes de celles du Mouron, toujours deux croissans l'vne cōtre l'autre, comme au Mouron. Au sommet croissent le long des branches fleurs l'vne dessus l'autre, longuettes & larges par deuant, formées comme la bouche d'vne Grenouille, non guere differentes aux fleurs de la Linaire, plus grandes toutesfois & sans queue, de couleur palleialne. Apres icelles viennent calyces longs & ronds, ressemblans par le deuant au muffle d'un veau, ausquelz la semence est contenue.

Encores y a il vne sorte de grand Antirrhinum qui a les feuilles longues & estroictes, pres sem

blables aux fucilles de la Linaire, & porte la fleur rouge, aucunes fois aussi blanche: Au reste du tout semblable à la fudicte.

Le petit Antirrhinum a les tiges menues & tendres, point fort branchues, les fucillertes longues & estroictes, entre lesquelles & les tiges sont assises les fleurs petites, rouges, semblables à celles du dessusdict, mais beaucoup plus petites. Icelles passées suruientent petits chapiteaux ronds, ressemblans à vne teste de mort à cause de leur petis pertuis ouuerts, là dedans est contenue vne semence petite.

## LE LIÈV.

Le premier & grand Antirrhinum ne croist point en ce país, sil n'est semé, comme aux jardins des Herboristes. Le second croist en ce país en aucuns champs, pres des voyes & sous les hayes.

## LE TEMPS.

Le grand Antirrhinum florist en Aoust & en Iuillet. Le petit porte ses fleurs en Iuillet.

## LES NOMS.

La premiere espee se nomme en Grec *αντιρρινον* ou *αντιρρινον*: en Latin *Antirrhinum*, & *Diastris* *Antigallia*: en Aleman *Diant*, & d'aucuns *Calfo nuefe*.

La seconde espee se nomme en Grec *ορανιον*: en Latin *Oranium*: en Aleman *clcyne Diant*. D'icelle fait mention Galien au 9. de Medicamentis secundum loca, entre les Medicamens qu'Archigenes a composé pour ceux qui ont la isulniffe.

## LE TEMPERAMENT.

Le grád Antirrhinú est chaud, de pareille cõplexion & vertu qu' l'Aster sticus, cõme escrit Gal. Le petit est chaud & sec & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A On trouue par escrit que celuy qui porte sur soy le grand Antirrhinum, ne peut estre endormagé ou auoir nuissance de quelque venin ou poison que ce soit.

B Le petit Antirrhinum chasse & resout la saulneur du corps qui demeure apres auoir eu la isulniffe, si on se laue de la decoction d'icelluy.

## Du Nenuphar.

## Chap. XXVIII.

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Nenuphar, le Iaulne & le Blanc, non seulement differens en fleur, mais aussi en racine. *Nymphaea alba*. Nenuphar blanc.

*Nymphaea lutea*. Nenuphar iaulne.



LA FORME.

1 Le Nenuphar blanc a les feuilles grandes, larges, rondates, aucunes fois noians sur beuë, & aucunes fois dessous, lesquelles toutes croissent de la racine sur que uës rondes longues & vaines. Les fleurs croissent pareillement sur pareilles queuës fortans de la racine, & ont au milieu moult de fibres iaulnes, & à l'enuiron xxvj. ou xxviii. feuilles blanches bien ordonnées, chacune feuille pres de la largeur d'un doigt, ou pareilles aux feuilles de la Ioubarbe. Apres les fleurs passées viennent rondes boules en leur lieu, & là dedans vne seméce large & noire. La racine est noire & rude, de la grosseur aucunes fois d'un bras, avec plusieurs fibres.

2 Le Nenuphar iaulne est de feuilles fort pareil au blanc, Les fleurs sont iaulnes, plus petites que les blanches, lesquelles se ftries suruiennent chapiteaux ronds & longs, & par le bout estroictz en forme de petite phiole. La racine est blanche & fungueuse, ou moussueuse, de la grosseur d'un bras, pleine de neuds, ou releueures, & a quelques gros filets pendans.

LE LIEU.

Ces fleurs croissent és fosses, viuiers, & semblables eaux croupies.

LE TEMPS.

Le Nenuphar fleurit en Iuin, & aucunes fois aussi plus tost.

LES NOMS.

1 La premiere espece de ces fleurs s'appelle en Grec *νυμφαίον* en Latin *Nymphaea*, d'aucuns *Cltis* aus *Veneris*, & *Papauer palustre* : és Boutiques *Nenuphar* : en François Nenuphar blanc, ou Blanc d'eau; en haut Aleman *Bercksumen*, *wasser Gigen*, *wassermaisen*, *Schwurms*, *Schwung* : en Brabant *Pfompent* & *witte Pfompent*.

2 La seconde espece s'appelle *Nymphaea lutea*, & *Nenuphar citrinum* : en François Nenuphar iaulne, ou Iaulne d'eau. La fleur d'icelle comme escrit Dioscoride s'appelle en Grec *βλεφαρα* *Blephara*.

LE TEMPERAMENT.

Toutes les deux especes de Nenuphar, & principalement la racine sont de temperature seche & froide sans aucune acrimonie.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La racine ou la seméce du Nenuphar blanc boulie en vin & beuë prouffite à ceux qui ont flux A de ventre, dyfentere & le teneisme, qui est vn desir d'aller à chambre sans pouoir rien laisser.

La mesme racine boulie en vin blanc guerit douleurs de ratelle & de vesie. B

La racine & semence du Nenuphar blanc sont fort viles cõtre l'appetit du ieu d'amours si on C en boit la decoction, ou si on en vïe en viandes, car elles sechent la semence naturelle, & font que l'homme vit en chasteté. La mesme vertu a la racine, comme dit Pline, broyée, & appliquée par dehors sur les parties honteuses.

La Conserue des fleurs d'iceluy est aussi fort vile pour toutes les mesmes maladies, dauantage D pour fieures chaudes & douleur de teste, & fait dormir doucement & à repos, chassant tous songes veneriques.

La racine d'iceluy broyée est vilement appliquée sur douleurs & inflammations d'estomach & E & de la vesie.

La mesme racine pilée avec eauë, oste toutes taches du cuir quand on ben frote, et meslée avec F poix liquide guerit la male tigne de la teste.

La racine de Nenuphar encore verde pilée & appliquée sur playes, en estanche le sang, comme G Theophraste escrit.

2 La racine de Nenuphar iaulne cuicte en gros vin rouge & beuë, arreste le flux des femmes, & H principalement le flux blanc.

De la Camomille.

Chap. XXIX.

LES ESPECES.


L A Camomille selon le dict de Dioscoride & des Anciens, est de trois fortes. L'une à fleurs blanches. L'autre à fleurs iaulnes. Et la tierce, qui est la plus grande des trois, à fleurs rouges en purpuré. Toutesfois si s'en trouue pour le present beaucoup plus de fortes; car outre les trois especes dessusdictes, lesquelles on pourroit appeller Camomille cultiuée, il y croist en ce pais encores trois ou quatre herbes semblables à la Camomille, lesquelles pourtant auons appellées Camomille sauuage. D'icelles escrirons au chapitre prochain.

LA FORME.

1 La premiere espece de Camomille a plusieurs tiges longues, rondes, se trainans le long de la terre, & s'attachans à icelle en diuers lieux, croissant peu souuent plus haut d'vne paulme. Elle

*Chamemelum leucanthemum.*  
Camomille blanche cultivée.

*Chamemelum Chrysanthemum.*  
Camomille iaulne cultivée.



a plusieurs fusilletes tendres, dechiquetées bien menu. Les fleurs sont iaulnes par dedens, & ornées à l'environ de fueillettes blanches, fort semblables aux fleurs de la Camomille vulgaire & fauvage. La racine est tendre & fibreuse.

2 La seconde espece ressemble fort à la premiere, sinon qu'elle a les fueilles plus petites. Ses fleurs ne font que boutons iaulnes, comme le milieu des fleurs de l'autre Camomille, sans avoir aucunes fueillettes à l'environ, comme la figure le demontre cleremet, au reste semblable à la premiere.

Du nombre de ces deux especes il s'en trouue encores vne, qui autour de ses petis chapiteaux iaulnes a de petites fueilles iaulnes, & ressemble du tout à la premiere tant en fueilles qu'en odeur & façon, sinon que les fleurs sont toutes iaulnes.

Ces deux especes de Camomille à sçavoir la blanche & la iaulne, ont vne odeur fort amiable, comme de Citron; dequoy elles ont pris leur nom en Grec Chamemelum.

3 La tierce espece de Camomille qui porte les fleurs purpurées en rouge, & croist plus haut que les deux autres, nous est encores incogneue, si ce n'est que soit celle fleur qu'aucuns appellent Flos Adonis, & les Autres Anemone, laquelle n'est guere differente de la Camomille soit en tiges, soit en fueilles, comme on pourra voir par les chapitres ensuyuans, là où nous en parlerons.

#### LE LIEU.

Les deux especes de la Camomille odoriferante ne croissent point en ce pais d'elles mesmes, mais on les trouue plantées es jardins des Amateurs des herbes, & y ont esté premierement apportées d'Espagne.

#### LE TEMPS.

Ces Camomilles fleurissent en Juin & Juillet, aucunes fois aussi plus tost. Elles durent tout l'hyver, & peuvent assez bien endurer le froid.

#### LES NOMS.

La Camomille s'appelle aussi en Grec *ἀνθίμις, χαί χαμαίμο*, en Latin *Chamemelum*, & com me Apu-

me Apuleiſe eſcrit *Bene olens*, A preſent *Camomille* en Aleman *Camiffle*.

- 1 La premiere eſpece ſ'appelle en Grec *Αυκάνθημον*: en Latin *Chamaemelum albam*: en bas Aleman *witte Koomſche Camiffle*.
  - 2 La ſeconde eſpece ſ'appelle en Grec *Χερσάνθημον*: en Latin *Chamaemelum luteum*: en Aleman *geel Koomſche Camiffle*.
  - 3 La tierce eſpece ſ'appelle en Grec *Ἠγάθημον*: en Latin *Erantemum*, & *Chamaemelum purpureum*.
- On la peut appeller en François *Camomille à fleur purpurée*, & en Aleman *roede Camiffle*.

#### LE TEMPERAMENT.

La Camomille principalement la blanche, eſt chaude & ſeche au premier degré, & propre à re ſoudre & ſubtilier.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoction des fleurs herbe & racine de la Camomille beuë faiſt auoir aux femmes leurs A fleurs, pouſſe hors du ventre le fruit mort, prouoque l'urine, & rompt la pierre. Elle eſt de meſme vertu quand on ſe baigne en ſemblable decoction.

Les fleurs & herbe de la Camomille boulies en vin & beuës, chaffent les ventofités, & guerif- B ſent la Colique, c'eſt à dire douleur des entrailles, & du ventre.

La Camomille vſurpée en meſme ſorte, purge & embellit ceux qui ont retenu mauuaifé cou- C leur de la jauniffe, & guerit ceux qui ont quelque vice de foye.

La Camomille broyée avec ſes fleurs & priſe à la quantité d'une drachme avec du vin, eſt fort D vtile contre morſures de ſerpens & de toutes autres beſtes venimeuſes.

La decoction de Camomille faiſte en eauë appliquée par dehors à l'endroit de la veſſie, ap- E paifſe la douleur d'icelle, & faiſt vriner & rompre la grauelle.

La Camomille machée guerit les viceres de la bouche. Pareille vertu a la decoction d'icelle ſi F on ſ'en laue la bouche.

La Camomille referre auſſi toutes playes & vlceres enuieillis, principalement qui viennent aux G anglets des yeux, quand on la broye & applique deſſus, ou qu'on les laue de la decoction d'icelle.

La Camomille meſlée avec huile & priſe en clyſtere, eſt ſinguliere contre toutes fieures cau- H ſées par obſtruction du cuir.

L'huile de Camomille appaiſſe toutes douleurs, guerit les mēbres foulés, elle relache & eſtend I tout ce qui eſt ſerré & tendu: elle mollifie & adoucit tout ce qui eſt endurci, & ouure tout ce qui eſt opilé & eſtoupé.

#### LE CHOIS.

La tierce eſpece de Camomille qui a les fleurs purpurées eſt la meilleure & de plus grande ver- tu contre la pierre, mais les deux autres prouoquent plus fort l'vrine.

### De la Camomille ſauuage. Chap. XXX.

#### LES EſPECES.

Ily a quatre eſpeces de Camomille ſauuage. La premiere eſpece eſt la Camomille vulgairé: La ſeconde eſt le *Cotula foetida*: La tierce eſt la grande Camomille ſauuage appellée *Cotula non foetida*: La quarte eſt la Camomille ſauuage à fleurs iaulnes appellée *Cotula lutea*.

#### LA FORME.

- 1 La Camomille vulgairé a les tiges greſſes, lentes, dures: les fueilles tēdres & fort dechiquetées. Les fleurs croiſſent au plus haut des brāches, iaulnes au milieu, & creueſtes à l'entour de pluſieurs petites fueillettes blanches, reſemblans du tout aux fleurs de la Camomille cultiuée à fleurs blanches, d'odeur auſſi aſſes amiable, non toutesfois tant forte ne tant plaiſante que la Camomille cultiuée.
- 2 *Cotula foetida* a la tige eſpeſſe, verte, & pleine de jus, & qui facilement ſe rompt, quand elle eſt aſſolée. Les fueilles ſont plus grādes que celles de la Camomille vulgairé, & plus verdes. Les fleurs ſont fort ſemblables à celles de la precedente. Toute l'herbe eſt d'odeur forte, ingrate, & puante, & de gouſt aſſes amer.
- 3 *Cotula non foetida* a les tiges greſſes, tendres, & lentes, pluſieurs ſortans d'une racine. Les fueil- les plus lōgues, plus grandes, & plus blāches, que celles de la Camomille vulgairé. Les fleurs ſont pareilles aux deux eſpeces precedentes, beaucoup toutesfois plus grandes & ſans odeur ſinguliere. La racine eſt groſſe & fort fibreuſe, laquelle ne meurt point ſicilement l'huyer, mais reiette tous les ans de nouveau.
- 4 *Cotula lutea* reſemble à *Cotula non foetida* de tiges fueilles, & fleurs, ſinō que les fueilles ſont plus grandes, & plus blanches, tirans ſur le cendreux, & les fleurs ne ſont point ſeulement iaulnes



Coresle non foetida.



Coresle laevis.



au milieu, mais sont aussi tout au tour reuestues de fauillettes iaulnes, de forme semblable aux autres Camomilles, & sans odeur comme le Cotula non foetida, & ne meurt aussi facilement, mais reiette tous les ans de la mesme racine. **LE LIEU.**

Les trois premieres especes croissent le plus souuent en ce pais par tous les champs à Bled. Cotula lutea croist en lieux semblables en France & Alemaigne, mais non en ce pais sinon aux iardins des Herboristes. **LE TEMPS.**

Toutes ces especes de Camomille fleussent en Iuin, & de là tout le long de l'esté.

**LES NOMS.**

1 La premiere espece de Camomille vulgaire se nomme à present *Chamemelum album*: és Boutiques *Camomille*, de laquelle on vse pour le vray *Leucanthemum*: en haut Aleman *Chamill*, combien toutesfois que ce ne soit la vraye Camomille. Pourtant l'auons nous appellée *Chamemelum syluestre*, c'est à dire Camomille sauuage.

2 La seconde espece s'appelle à present en Latin, & és Boutiques *Cotula foetida*, d'aucuns *Canta*, & *Camomilla foetida*, & en Grec *κωνιαθρις* *Cynanthemis* & *κωνιοβοτριον* *Cynobotane*, c'est à dire Camomille & Herbe de chien: en haut Aleman *Krottendill*, *Hunfzoll*, *Hunfzblum*, & *wilde Chamill*; en Brabant *Paddebloem*, & *stinchende* ou *wilde Lamille*.

3 La tierce espece s'appelle *Cotula non foetida*, & *Camomilla inodora*, d'aucuns en Grec *κοιφθαλασσον* *Bupthalamum*, c'est à dire Oeil de beuf: en haut Aleman *Kudill*, *Rundstug* & *Kuemig*, combien toutesfois que ce ne soit le vray *Bupthalamum*, comme on pourra voir par les chapitres ensuyuans: pourtant on la pourra mieux nommer *Cotula non foetida*, ou *Cotula alba*, que de luy donner vn nom qui ne luy appartient pas.

4 La quarte espece se peut bien appeller *Cotula lutea*, veu qu'elle ressemble aux autres *Cotules* dessusdictes: en haut Aleman *Steinichblumen* & *Steinblumen*, & là selon en bas Aleman *Steinichbloumen*. Aucuns qui pensent que ce soit la seconde espece de Camomille, l'appellent *Chrysanthemum*, c'est à dire Camomille iaulne: en haut Aleman *gest Chamill*, mais ilz s'abulent, & leur opinion n'est vraysemblable pour autant que ceste herbe n'a aucune odeur singuliere, dauantage la similitude de ses fauillettes n'approche en rié aux fauillettes ny de la Camomille cultiuée, ny de la vulgaire.

**LE TEMPERAMENT.**

1 La Camomille vulgaire tire à chaleur & secheresse, & n'est guere differente à la Camomille vraye.

2 *Cotula foetida* est chaude & seche, comme son odeur & saueur demonstrent.

3-4 Les deux autres especes sont temperées en chaleur, de temperament quelque peu semblable à la Camomille vulgaire. **LES VERTUS ET OPERATIONS.**

1 Comme la Camomille vulgaire est d'assez semblable temperament avec la vraye Camomille, aussi luy ressemble elle fort en ses facultés & operations, sinon qu'elle n'est d'operation si louable ne si forte.

Ceste Camomille à esté experimentée fort bonne contre Colique & grauelle. Elle prouoque aussi l'vrine, vsurpée en la mesme sorte que la vraye Camomille & cultiuée.

L'huile de ceste Camomille est singuliere contre toute douleur, soulure, retremens, durétés, & oppilations, comme l'huile de la Camomille cultiuée. Dauantage elle est meilleure & plus propre à mettre és clysteres qui se font pour la fièvre, que celle qui se fait des fleurs de la Camomille cultiuée.

2 *Cotula foetida* prouffite aux femmes auxquelles l'amarry est relaschée, & tombe d'un costé en l'autre, si on leur laie les pieds de la decoction d'icelle.

Elle est pareillement bonne contre suffocations d'amarry, la baillant à flairer ou manger, & est de fort pareille vertu au *Castorium* comme les sçauans Modernes ont trouue par experience.

3 Les Vertus & operations des deux autres, ne sont pas encores cognues, mais selon qu'on peutappercevoir, elles sont de facultés non guere differentes aux Comomilles, sinon qu'elles sont du tout plus debiles.

4 Aucuns escriuent que *Cotula lutea* bouillie en vin & beuë, est vtile à la iaulnisse, & fait retourner vne bonne couleur, qui est vn indice, qu'elle est de semblable vertu que la Camomille, car ce mesme fait la Camomille, comme nous auons dit au Chapitre precedent.

## De l'herbe que les bas Alemands appellent Bruynettekens Cha. XXXI.

**LA FORME.**

Ceste herbe a les tiges verdes & les fauillettes fort decouppées, fort ressemblit tant de tiges, que de fauillettes, odeur, & saueur, au *Cotula foetida*. La fleur est belle & purpurée en rouge, de la forme des

me des Basinets: icelles passées y furnient des chapiteaux ronds & rudes, cōme aux Basinets, mais plus longs, à l'entour desquelz la semence croist.

## LE LIEV.

Ces belles fleurs & amiables ne croissent en ce país sinon és jardins, mais en Prouence & Lan guedoc par tous les blés.

## LE TEMPS.

Cette herbe cōmance à fleurir en May & demeure fleurissant tout l'esté.

## LES NOMS.

Les tiges feuilles & toute l'herbe de ces fleurs semblables à la Camomille d'odeur, faueur, & forme, sont asses suffisantes pour demōstrer que ceste herbe est vne espece de Camomille, & principalement la tierce appellée *Heranthemum*: les fleurs seules qui ne sont fort semblables à celles de la Camomille n'ont point de doute, car si les fleurs eussent semblable façon que celles de la Camomille, nous tiendrions sans aucune faute ceste herbe pour la tierce espece de Camomille, qui est le vray *Heranthemum*, que Dioscoride escrit estre plus grande que les deux autres, & auoir la fleur purpurée, à laquelle description ceste herbe approche fort, excepté la forme de la fleur, car toute l'herbe est plus grāde, & plus haute que la Camomille, au reste elle luy ressemble du tout, & les fleurs sont de belle couleur purpurée en rouge. Toutesfois quoy qu'il en soit, ceste herbe ressemble mieux à la tierce espece de Camomille, que ne fait la Consoude royale, ou que l'Asier atticus qui ont esté mis en auant d'aucuns pour ceste espece de Camomille, combien qu'elles ne ressemblent à la Camomille ne de feuilles, ne de fleurs, ne d'odeur, & ne portent point la fleur rouge, mais bleue, ce qui contrecuiuent à la description d'*Heranthemum*, les fleurs de laquelle (comme dessus est dict) Dioscoride escrit estre purpurées en rouge. Parquoy ceste herbe peut mieux estre appellée *Heranthemum* que la Consoude royale, ou l'Asier atticus.

Aucuns en veulent faire *Flos Adonis*, mais leur opinion ne nous semble vray semblable, avec ce que *Flos Adonis*, ne semble estre autre chose qu'une espece d'*Anemone*.

## LE TEMPERAMENT.

Le goust & odeur de ceste herbe demōstrent asses qu'elle est de complexion chaude & seche, semblable à la Camomille, principalement à *Cotula foetida*.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les Vertus & operations de ceste herbe nous sont encores incognues, mais si c'est *Heranthemum*, elle est singuliere contre la pierre, comme nous auons escrit au Chap. XXIX. de ce liure.

## De l'Oeil de beuf.

## Chap. XXXII.

## LA FORME.

L'Oeil de beuf est vne belle plante, & de tiges & fleurs amiables, ne croissant point plus haut d'une paume: Elle a trois ou quatre tiges reuestues de feuilles fort menu dechiquetées & tendres, non differentes aux feuilles du Fenail, mais beaucoup plus petites, asses semblables à celles de la petite Auronne, sinon qu'elles sont plus verdes. La fleur est belle, iaulne, ayant au milieu plusieurs filets iaulnes, grande, bien pres semblable à la Soucie, sinon qu'elle est beaucoup plus grande, & n'a point tāt de feuillettes au tour du chapiteau iaulne. La fleur perie, vient au lieu d'icelle vn chapiteau rond, bien pres tel comme à la fleur que nous pensons estre *Heranthemum*. La racine est noiee & fort fibreuse.

## LE LIEV.

Cette herbe, tesmoing Dioscoride, croist aux champs hors la ville: en ce país les Amateurs des herbes la plantent en leurs jardins.





LE TEMPS.

Buphrasium.

Oeil de beuf.

Elle produict ses fleurs en Mars & en Avril.

LES NOMS.

Cette herbe à cause de ses fleurs qui sont grandes, & de la forme d'un oeil de beuf, est appelée en Grec *Βούφθαμνος* à *Βούφθαμνος*; en Latin *Buphrasium* & *Oculus bouis*; en haut Alemā *Rindfs* *aug*, *Kindug*; en bas Alemā *Rundfooghe*, & *Loe* *ooghe*. Aucuns l'appellent aussi *Cachia*, *Casta*, ou *Caltha*. C'est le vray Oeil de beuf décrit par Dioscoride.

Les Apothicaires au grand detrimēt des malades & des Medecins aussi, vendent la racine de Hellebore noir; Et de là vient que quelques gens sçavans & Amateurs des herbes tombans en erreur avec les Apothicaires ignorans, appellent cette herbe *Helleborum nigrum*, & la tiennent pour vne herbe mauuaise & vehemente, comblé que d'elle mesme elle n'ayt en soy aucune malice particuliere ny force, & ne fait aussi aller à chambre, come ie l'ay pour certain experimenté.

LE TEMPERAMENT.

L'Oeil de beuf est chaud & sec, p<sup>r</sup> acre, & plus indif que la Camomille.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Les fleurs de l'Oeil de beuf broyées & meslées avec huile & cire, & appliquées dissolvent tous oedemes, & durillons.

B On dict, tesmoing Dioscoride & Serapio, que l'Oeil de beuf guerit la jaalunisse, & rend bonne couleur au corps, si on le boit bouli en vin, apres estre forty du bain.



Chrysanthemum.

Du Chrysanthemum. Cha. XXXIII.

LA FORME.

1 Ceste herbe a les tiges rondes, vnies, se fendis en plusieurs branches. Les fueilles longues profond crendées tout autour. Les fleurs au sommet des branches, de façon semblable aux fleurs de la Camomille, beaucoup plus grandes toutesfois, & non seulement isalnes comme fin or au milieu, mais aussi tout à l'entour, d'o deur amiable. La racine est blanche & fibreuse.

2 Il se trouue encores vne autre espece de ceste herbe, qui luy ressemble du tout de tiges, couleur, fleurs, odeur, & de figure, sinon q les fueilles sont plus fort & plus profond incisées, mesme jusques à la coste du milieu. Ce que nous auons bien voulu annoter, à fin que par cela on puisse cognoistre & apprendre, qu'une mesme herbe change souuent bien fort la figure selon les lieux de sa naissance, come pour le premier on peut cognoistre par ceste herbe, laquelle en aucuns lieux n'a point les fueilles tant fort fendues ne dechiquetées, & pourtant n'approche elle tant à la description du Chrysanthemum de Dioscoride; comme quand elle



elle croist en aucuns autres lieux là où elle a les feuilles fort & profond déchiquetées, & pourtant conuient elle du tout à la description de Chrysanthemum.

## LE LIEU.

Ceste herbe croist entre les bleds, & aux iardins à la porée entre les autres herbes, & pres des voyes.

## LE TEMPS.

Elle commence à fleurir en Iuin, & de là en auant fleurit bien pres iusques en hyuer.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *Χρυσάνθεμον*, & en Latin *Chrysanthemum*, c'est à dire Fleur dorée, & *Caltha*, & d'aucuns *Baphithanum*: en haut Aleman sont *Johans Blum*, & *Chrissum*; en bas Aleman *Dohlsack*, & *Sanktsblumen*, *Santsblumen*: Incognue és Boutiques comme plusieurs autres bonnes herbes.

## LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est chaude & seche, non guere differente à la Camomille.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Chrysanthemum bouli en vin, guerit la jaunisse, & rend belle couleur quand on le boit apres auoir esté souuent & longuement au bain.  
 B La semence du mesme beuë en vin à part soy, ou broyée avec sa fleur, guerit aussi la jaunisse, comme les Modernes ont expérimenté.  
 C Les fleurs de ceste herbe pilées avec huile & cire, & appliquées en forme d'Emplastre, resoudent les oedemes qui viennent sur la teste.  
 D Les feuilles & plus tendres branchettes du Chrysanthemum se peuent bien manger en porée & salades comme les autres herbes, car par cy deuant les Anciens en ont ainsi vüé.

## De la Flambe.

## Chap. XXXIIII.

## LES ESPECES

L'Iris est de deux sortes. La premiere porte belles fleurs bleuës en pers. La seconde les a toutes blanches.

## LA FORME.

- 1 La premiere espece de Flambe a les feuilles grandes & longues, bien pres comme la feuille d'une espece trenchant à deux costés, entre lesquelles prouent la tige ronde, vnie & nue, haute de deux pieds ou dauantage, & au sommet de longs bouillons, lesquels se tournent puis apres en belles fleurs odoriferantes, de diuerses couleurs, toutesfois pour la plus part purpurées en bleu, & parties en six feuilles, desquelles les trois premieres pendent en bas courbées en forme d'arc, par dehors de couleur verdissante, & de leger bleu, entremeslées ensemble, & rayonnées de veines de couleur perse obscure, par dedens à la poignée de couleur purpurée en brun fort chargée, & ornée de petis traictz blancs, par le milieu desquels vient trauffer vne ligne large, jaune & velue. Les trois autres se dressent contremont inclinées l'une contre l'autre de belle couleur bleuë, tirant sur le iaine & blanc. La racine est grosse, longue, nouëuse, & fort fibreuse.  
 2 La seconde espece à fleurs blanches ressemble du tout à la dessusdite de feuilles, tiges, forme & fleurs, & de racine, sinon que les fleurs ne sont pas de diuerses couleurs, mais blanches comme neige. La racine est aussi vn peu plus petite, & de fort bonne odeur, principalement estant seche.

## LE LIEU.

Ces deux especes de Flambe se plantent en ce pais aux iardins.

## LE TEMPS.

Les fleurs de ces Flambes se monstrent en May.

## LES

Iris. La Flambe.



## LES NOMS:

1 La premiere espece s'appelle en Grec *ῥις*: en Latin & es Boutiques aussi *iris*: en haut Aleman *blawt Wilgen*, *blawt Schwertel*, *Wolwurz*, *blawt Wolwurz*, *Himmel Schwertel*: en bas Aleman *Sifsch* ouer *see*.

2 La seconde espece s'appelle à present *iris florentina*: es Boutiques *ires*: duquel nom elle est cognue entre le vulgaire, principalement entre les Acoistres de drap, lesquels donnent bonne odeur à leurs draps à tout ceste racine: en François Flambe blanche: en haut Aleman *weiss Wolwurz*, & *weiss Schwertel*: en bas Aleman *wit Sifsch*.

## LE TEMPERAMENT.

La Flambe est chaude au second degré, & seche au tiers.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de Flambe beuë au poids de six drachmes avec eauë mellée, pousse hors les humeurs A adustes & bilieuses, & appaise les trenchées de ventre.

La mesme racine beuë avec vinaigre seul, ou avec vinaigre & eauë, prouffite à ceux qui sont pi B qués de Scorpions, ou autres bestes venimeuses, & à ceux qui ont douleur de ratelle, ou quelque membre retiré, estendu, mortfendu ou enroydi.

La mesme boullie en vin & beuë, fait auoir aux femmes leurs fleurs, prouoque l'urine, & rōp C la pierre, & est singuliere à ceux qui commencent à deuenir hydropiques.

La racine seche mise en poudre & meslée avec miel ou sucre, & tenue souuent en la bouche D est fort bonne contre courte haleine, & toux enuieillie: elle purge le thorax, elle incise & refout les phlegmes grosses & espesses, & meurt les grosses humeurs desquelles la poictrine & les poulmons sont chargés.

La racine de Flambe pilée avec pommes de coin ou huile rosat, est vtilement induite sur dou E leurs de teste.

La mesme attirée par le nez fait esterner, elle tire hors les humeurs lentes & gluantes, & pur F ge la teste.

Icelle meslée avec vn pessaire & mise en la matrice, tire hors l'enfant mort, & fait venir le flux G menstrual aux femmes.

L'usage d'icelle est ainsi bon es bains & estuues des femmes, pour leur ouuir l'amarry & amol H lir les duretés d'icelle.

Icelle meslée avec la racine d'Hellebore blanc & deux fois autant de miel efface les lentilles, I rougeoles, & toutes taches du visage, induite dessus.

La mesme cuicte & appliquée en forme d'emplastre amollit & meurt tous dutillons, & ta- K meurs.

La racine de Flambe seche & puluerisée emplit de chair vieux viceres, & cauerneux, & fistules, L & recouure les os dénués eparce dessus.

La mesme broyée avec miel, mondifie les viceres pourris & pleins d'ordure, & tire hors les os M rompus, & est singuliere contre apostemes suruenans aux racines des ongles soit aux pieds, soit aux mains.

La mesme guerit aussi creuures, fronces, ridés & apostemes du fondement, appliquée avec hui N les ou vnguens à ce propos.

## LE CHOIS.

Entre les racines de Flambe, la meilleure & la plus prizée en medecine est celle qui (comme Di ocoride tesnoigne) croist en Sclauonie, & Macedone, & en apès celle qui croist en Afrique, mais maintenant, considéré quelles ne se peuent recouurer, on tient la Flambe blanche pour la meilleure, principalement celle de Florice, laquelle est nommée es Boutiques *ires*. La Flambe bleue & qui croist en ce pais, se met fort peu souuent en medecine.

## De la Flambe bastarde.

## Chap. XXXV.

## LA FORME.

1 LA Flambe bastarde a les fueilles longues, estroictes, bien près semblables à celles de la Flam- be, plus longues toutes fois, & plus estroictes, come vne espée longue & estroicte. Les tiges sont rondes, vnies, & creues, au sommet desquelles viennent les fleurs iaulnes à trois fueilles pendan- tes en bas comme la vraye Flambe, & trois montans à mont, beaucoup plus petites que celles qui pendent en bas. Icelles passées, suruenent grosses filiques triangles, esquelles est contenue vne semence iaulne & large. La racine est grosse se lettant deça delà, tant au cune fois des autres peti- tes racines pendantes, & plusieurs fibres, par dedans incarnée, & de saueur aspre & alstringente.

Hierosme Bouq parle d'encore vne autre espece de Flambe bastarde, laquelle ressemble a celle icy de racines, feuilles & tiges, mais la fleur est bleue, tirant sur le pourpre, au reste semblable à la fleur de l'autre. LE LIEV.

La Flambe bastarde croist en ce pais en lieux humides, es prés bas assis, & aux bords des viuiers, & eaux croupies. LE TEMPS.

Elle fleurit en May & en Juin.

LES NOMS.

1. La Flambe bastarde se nôme à présent en Latin *Gladiolus luteus*, ou *iris lutea* es Boutiques Acorus, la racine de laquelle, est vsurpée au lieu de la racine du vray Acorus, non sans grande erreur & detrimēt des malades, comme non seulement a esté escrit par nous, mais aussi par plusieurs gēs sçauans modernes, qui ont pourtant appellée *Pseudoacorus*, c'est à dire Acorus bastard: en François Glaiou de riuere ou de marés, & Flambe bastarde. en haut Aleman gest *Schwertel*, & *Wasserschwertel*. en bas Aleman gest *Lilisch*, & *Wocq*. *Boonen*.

2. La seconde espece de laquelle escrit Hierosme Bouq est sans doute vne espece de Flambe bastarde, & se peut bien appeller *iris sylvestris*: Elle s'appelle en haut Aleman *Blauu Schwertel*, c'est à dire Flambe bleu.

LE TEMPERAMENT.

La racine de Flambe bastarde est froide & seche au tiers degré, & astringente: de complexion fort semblable à la racine de Tormentille, & de Bistorta. LES VERTVS ET OPER.

- A. La decoction de la Flambe bastarde faicte en eauë bouë guerist la dysētere & arreste tout flux de ventre.
- B. La mesme prise en semblable sorte, est vtile à ceux qui pissent & crachent sang. Elle guerit aussi le flux par trop abondant & maladie des femmes, & arreste tout flux de sang.

Du Glaiou. Chap. XXXVI.

LA FORME.

LE Glaiou a les feuilles longues & estroictes, comme les feuilles de la Flambe, plus petites toutesfois & pl<sup>us</sup> estroictes, entre lesquelles croist vne tige ronde, d'environ vne coudée de haut, au sommet de laquelle pēdent par ordre belles fleurs purpurées, l'une par dessus l'autre, apres lesquelles viennent siliques rōdelettes & parties en trois, bien pres semblables à celles du Vaclet, ou *Syluicinte*, là où la semence est contenue. La racine semble deux ronds bouillettes assises l'une sur l'autre. LE LIEV.


Le Glaiou ne se trouue en ce pais sin on es jardins des Herboristes.

LE TEMPS.

Le Glaiou florit en ce pais en May & Juin.

LES

*Iris lutea*. Flâbe bastarde.



*Gladiolus*. Glaiou



LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *ξυρίδιον* & d'aucuns *μαχρακόωντον* & *ξυρίδιον*; en Latin *Gladius* *lus*, d'Apuleie *Gladiolus segetalis*, & *Lingua cervina* en cogueue és Boutiques.

LE TEMPERAMENT.

La racine de Glaieu, principalemēt celle de dessus, dessecbe, subtile, & attire quelque peu, comme dit Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de dessus du Glaieu broyée avec encens & vin, tire hors les espines & choses fichées A dedans le corps.

La mesme meslée avec farine d'Yraye & Hydromel, subtile & consume durillons. (pile. B

On dit aussi q̄ la racine de dessus beuë avec vin, incite au lieu d'amour, & celle d'en bas rend ste C

Du Glaieu puant.

Chap. XXXVII.

LA FORME.

Xyris.

Glaieu puant.

LE Glaieu puant a feuilles longues, estroictes, semblables aux feuilles de la Flambe, mais beaucoup plus petites, de couleur noiratre, d'odeur ingrate, puante bien pres comme punaises. La tige est ronde, sur laquelle croissent les fleurs comme celles de la Flambe, plus petites toutefois, & de couleur grise & cendreuse. Icelles peries suruiennent grosses siliques, dedans lesquelles est vne semence ronde, rouge, chacune graine de la grosseur d'un petit pois rond. La racine est longue, & fort fibreuse.

LE LIEV.

Cette herbe pour la plus part ne se trouve point en ce pais, sinon és jardins des Amateurs des herbes: elle croist aussi en aucuns lieux pres des hayes, & aux bords des boys.

LE TEMPS.

Elle fleurit en Aoust, & la semence est meure en Septembre.

LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *ξυρίς*: en Latin *Xyris*, & *tris siliq̄stris*: és Boutiques *Sphatula sari* d'en haut Aleman *wesssch* *Schwertel*, *wand-* *leusshnat*: en bas Aleman *wädeluyscrayt*, *wist* *lisch*, & *stinchende lisch*.

LE TEMPERAMENT.

Elle est chaude & seche au tiers degré, subliante & incisante.

LES VERTVS ET OPERATIONS

La semence du Glaieu puant, prise au poid d'un demy drachme, prouoque fort l'vrine & prise avec vinaigre consume & guerit la ratelle endurcie & oppilée.

La racine du Glaieu puant broyée avec un peu de verd de gris, quelque peu de la racine du grand Centore, & un peu de miel, tire hors toutes espines, eschardes, & os rompus, & est fort propre aux playes & contusions de la teste pour en tirer hors les os rompus.

La mesme meslée avec vinaigre, consume collections froides & tumeurs appliquée dessus.

Cette herbe fait fuyr & tue aussi les punaises, si du jus d'icelle on en trotte le lieu où elles croissent.

Du Sparganium.

Chap. XXXVIII.

LA FORME.

LE Sparganium a feuilles longues, estroictes, plus estroictes que celles de la Flambe bastarde, entre lesquelles elle p̄duiēt tiges rōdes, vnies, droictes, sans aucune ioincture, fungueuse par des, & au sommet croissent plusieurs boutons rōds, amassés ensemble, qui se chāgent en belles fleurs incarnées parties en six, lesquelles puis apres se tourment en pālles rōdes & peres contenant vne

N

semence



femence bien petite. La racine est blanche grosse, nouëale, fort fibreuse.

**LE LIEV.**

Cette herbe croist pour la plus part es fossés & eaux croupies, & se trouue aucunesfois au bord des riuieres.

**LE TEMPS.**

Elle comence à ietter ses fleurs au mois de May, & de là en auit fleurit iusques en Aoult.

**LES NOMS.**

Cette herbe s'appelle en Grec *καταπάσιον* κατὰ φύσιν: en Latin *Sparganium* & *iris foliata*, d'aucuns *Scirpus*: en bas Aleman *water lisch*: Incogne es Boutiques.

**LE TEMPERAMENT.**

Le goust de ceste herbe & de sa racine demontre asses, quelle est temperée tirant sur le froid.

**LES VERTVS ET OPERAT.**

A La racine de ceste herbe, comme escrit Dioscoride, est vilement prise par dedis contre venin de serpens.

**Du Lys. Chap. XXXIX.**


**LES ESPECES.**

IL y a deux diuerses sortes de Lys, à scauoir le Blanc & Rouge.

**LA FORME.**


1 LE Lys blanc a les feuilles longues, larges, espesses, entre lesquelles prouent vne tige røde, droite, haute de trois pieds ou dauantage, reuestue de petites feuilles, produisant au sommet belles fleurs blanches & de bõne odeur, parties en six suaelletes longues & estroictes, aiss par dehors vne ligne ou coste verte, & par dedis toutes blanches, quelque peu renuerfées par les bouts, tellemét que quid elles sont bief ioinctes ensemble, vous diries q' cest vne clochette: entre icel les apparoiſſent six languettes toutes iaulnes assises sur autät de queues, & entre icelles vne lögue queuë droite triögle par le bout, bien pres sèblable au quarrillõ d'vne cloche. La racine est ronde, bläche, de la grosseur d'vn oignon, à plusieurs escailles couchées l'vne sur l'autre, & fibreuse par dessous.

2 Le Lys rouge a la tige courte, nõ pas pl' d'vn pied de hauteur, reuestue de feuilles lögues, estroictes & noirtres. Les fleurs ont la forme du Lys blanc, mais sans odeur, & de couleur rouge comme feu. La racine est sèblable au Lys blanc aiant fibres dessus & dessous.



Lilium.  
Lys blanc.

Lilium rubrum.  
Lys rouge.



3 On trouue encore vne autre espece de Lys rouge croissant à la hauteur du Lys blanc, & produisant sur vne tige souuent dix fleurs ou dauantage, plus palles que la susdicte, sans aussi auoir ces lignes que lon voëd sur les fleurs du Lys rouge deuant dict, au reste se ressemblent assez.

LE LIEV.

Ils se plantent aux iardins en ce pais, & sont fort communs, principalement le blanc.

LE TEMPS.

1. 1 Le Lys blanc fleurit en Iuin; & le rouge en May.

LES NOMS.

1 Le Lys blanc s'appelle en Grec κήρυον, & en Latin *Lilium* & *Rosa lunonis*: és Boutiques *Lilium*: en haut Aleman *weiss Silgen* ou *Silgen*: en bas Aleman *witte Sestien*.

2 La seconde espece du Lys s'appelle en Grec κήρυον πορφύρεον: en Latin *Lilium rubrum*, *Lilium rufum*, & Ouide au deuxième liure de la Metamorphose *Hyacinthus* en haut Aleman *Rot golt Silgen*: en bas Aleman *Rode Sestien*.

3 L'autre espece du Lys rouge est aussi sans aucune doute *Lilium rubrum*, Et s'appelle des Herboristes de ce pais *Martagon*.

LA CAUSE DV NOM.

1 Constantin escrit, que quand Iupiter eut Hercules d'Alcumena, desirant qu'il fut immortel, il le porta pour allaiter sa femme Iuno ce pendant quelle dormoit, & que quand l'enfant se fut bien saoulé de lait, il le retira. De là vint que des mamelles de Iuno le lait sortit en abondance, la plus grande partie fut espadue au ciel, comme les marques y paroissent encores, c'est à sçauoir ceste voye blanche qui trauesse le ciel depuis Septentrion iusques au Midy, appellée en Latin *Via lactea*: & de l'autre partie tombée sur la terre, fut creë le Lys retenant la blancheur du lait en ses fleurs: De là est venu qu'on l'a nommée en Latin *Iunonis rosa*, c'est à dire La Rose de Iuno.

2 Quant au Lys rouge, Ouide le dit estre creë du sang du Damoyfel *Hyacinthus*, lequel Apollo occist se iouant avec luy, de sorte que les herbes furent arroulées du sang d'iceluy, & que soudain par le commandement d'Apollo la terre vint à produire vne fleur semblable au Lys, sinon quelle est rouge, comme Ouide en parle en ceste maniere au 10. de sa Metamorphose.

*Ecce eruo, qui susus humo signauerat herbas:*

*Definit esse cruor, nitidum nitentior ostro*

*Flos oritur, formamque capit quam Lilia: si non,*

*Purpureus color his, argenteus esset in illis.*

C'est à dire

Soudain le sang espadu sur la dure,

Laisse estre sang, & deuiet belle fleur,

Prenant du Lys la forme & la figure:

Mais rouge vne est, l'autre a blanche couleur.

Et à la memoire du Damoyfel *Hyacinthus* Apollo nomma ces fleurs *Hyacinthes*.

LE TEMPERAMENT.

Les fleurs du Lys blanc sont chaudes, & en partie d'vne substance subtile. La racine est seche au premier degré, & chaude au second.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine du Lys blanc cuicte en eau miellée & beuë, chasse par bas toute corruption du sang A comme dit Pline.

La mesme rostie ou pilée avec huile rosat, amollit la matrice endurcie, & prouoque le flux men B strual, appliquée pardessus.

La mesme broyée avec vinaigre, reioinct les nerfs couppez, consume les achores & guerit toute C mauuaise gratelle tant de la teste que de la face, & est vilement appliquée sur toutes dislocatiõs.

La racine du Lys blanc meslée avec vinaigre ou fueilles de Iusquiamme, ou farine d'orge, guerit D tumeurs & apostemes des genitoires.

Item cuicte en vinaigre, fait tomber les agaçons qui viennent aux pieds, tenue par trois iours E dessus sans roster.

Icele meslée avec huile ou axunge, fait reuenir le poil es parties brullées ou eschaudées. F

Item rostie sous les cendres, ou bië broyée avec huile rosat, prouffite au seu volage. Elle guerit G toutes brullures, & ferme tous viceres. La mesme vertu ont les fueilles, dauantage sont vilement appliquées sur morsures de serpens.

Le jus des fueilles cuicte avec vinaigre & miel en vne poelle de cryurt, est fort propre pour H guerir

- guérir & mondifier vieux vlceres & playes fresches.  
 I De la fleur du Lys se fait vn huile fort mollifiant & digerant, pro  
 pre pour amollir les nerfs, & guerir dureffes de la matrice.  
 K La graine du Lys est vtilement beuë contre morsures de serpens.

## Du Lys sauvaage. Chap. XL.

## LA FORME.

LE Lys sauvaage a vne tige droicte, ronde, reuestue de feuilles lon  
 gues, au sommet de laquelle eroiffent belles fleurs & amiables,  
 fort semblables en figure au Lys, parties en six fueillettes charnues  
 & espesses, courbées en dehors en forme d'aneau, de couleur palie  
 incarné, semées de petites taches, & sans aucune odeur. La racine re  
 semble à celle du Lys, sinon quelle est plus petite & aialne cōme or.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en aucuns lieux d'Allemagne commé aux boys  
 & prés situés aux montaignes: en ce pais on la plante aux iardins.

## LE TEMPS.

Le Lys sauvaage fleurit en May & en Iuin.

## LES NOMS.

Ceste fleur s'appelle en Grec *ηυπεραλιν*: en Latin *Lilii syluestre*:  
 en aucuns lieux *Affodilus* és Boutiques, & est vsurpée pour le vray  
*Aphodelus* non sans grand erreur: en haut Aleman *Gostmurtz*, &  
*Spydnisseblumen*: en bas Aleman *Sellicus* Ban caluarien, *Spydes*  
*blome*, & *wilde Selien*.

## LE TEMPERAMENT.

Galien escrit que la racine de ceste herbe est de semblable nature  
 que la racine du Lys.

## LES VERTVS ET OPERAT.

- A La racine du Lys sauvaage beuë purge les humeurs sereuses & le  
 sang, & est de mesme efficace prinse en clysteres.  
 B Les fueilles adoucisent les vlcérations des mammelles pleines de  
 lait, & les tumeurs des yeux, appliquées dessus.  
 C La racine & fueilles de ceste herbe, sont aussi vtilement  
 appliquées sur bruslures & eschaudures.

## Du Vaciet ou Iacinthe. Chap. XLI.

## LA FORME.

LE Vaciet a les fueilles longues, estroictes, comme les  
 fueilles du Porreau, entre lesquelles viët vne tige vnic,  
 ronde, chargée depuis le milieu iusques au plus haut de  
 fleurs & boutons, qui font courber le sommet en bas. Les  
 fleurs sont rondes, longues, creuses, de forme non guere  
 differente aux fleurs du grand Muguet, plus longues tou  
 tesfois, d'odeur amiable, de couleur tantost purpurée, tan  
 tost blanche comme neige, tantost ééndreüe, aucunefois  
 & pour la plus part bleus. Icelles passées viennent en leur  
 lieu siliques triangulaires, contenant vne graine petite  
 & noire. La racine est ronde & bulbeuse.

L'Hyacinthe duquel font mention Ouide, Theocrite,  
 Vergile, & autres Poëtes, est d'escrit au chapitre du  
 Lys.

## LE LIEV.

Le Iacinthe croist en ce pais aux bors des chäps & aux  
 bassieres de hautes campagnes en terre sablonneuse, & se  
 trouue en plusieurs lieux autour de Malines.

## LE TEMPS.

Le Vaciet florist en May & Iuin.

LES



Hyacinthas. Iacinthe.





LES NOMS.

Cette fleur s'appelle en Grec *κωνίδα* & en Latin *Hyaacinthus*, & selon aucuns *Vaccinium*: en Aleman *Jacinten*, & aucuns *Blum Heydenchen*.

LE TEMPERAMENT.

La racine du Vaciet est seche au premier degre, & froide au second. La graine est seche au tiers degre, & temperée en chaleur & froideur.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

La racine du Vaciet cuicte en vin & beuë, arreste le flux de ventre, prouoque l'yrine, & prou- A fette à ceux qui sont mors de bestes venimeuses.

La graine est de pareille vertu, & restraint encores dauantage le flux de ventre, elle guerit la dy- B sentere, & beuë avec vin est bonne contre la iaulnisse.

Du Narcissus. Chap. XLII.

LES ESPECES.

Il y a selon Dioscoride deux especes de Narcissus, L'une qui porte la fleur iaulne au milieu L'autre, au milieu rouge.

LA FORME.

1 Le Narcissus à fleur iaulne au milieu, a les fueil- les longues, estroictes, semblables aux fueilles du Porreau, mais grisâtres: entre lesquelles prouient la tige d'une paulme de haut ou dauantage, nue, creu- se, produisant à la cime quatre, cinq, six, aucunes fois douze fleurs ou dauantage, assises sur longues que- es triangles, chacune fleur partie en six fueillettes blanches, & au milieu vne petite fleur iaulne creu- se, contenant en soy six petis filets à teste iaulne. Toute la fleur est de bone odeur. Apres les fleurs passées, suruient en leur lieu de siliques triangles contenant vne graine noire. La racine est bulbeu- se, & visqueuse.

2 La seconde espece de Narcissus ressemble au de uantdict de fueilles, tiges, semence & racine, sinon que les fueilles sont plus estroictes, non grisâtres, & ne porte pour la plus part qu'une fleur sur cha- cune tige, plus grande que celles de l'autre, partie aussi en six fueillettes, & ayant au milieu vn petit cer- cle froncé de couleur palle ou herbacée aiant le bord rouge, leq̄l contient aussi au milieu plusieurs filets à bout iaulne. La silique triangle vient apres la fleur contenant vne semence noire. La racine aussi bulbeuse, mais non si grosse que l'autre.

3 Il y a encores deux especes de ce Narcissus qui huy ressemblent du tout, si n'est qu'elles sont de fueil- les, tiges, fleurs, semence, & racine plus petites, & que l'une fleurit plus tost, & l'autre plus tard que le second Narcissus.

LE LIEU.

Les deux premieres croissent en abondance aux prés par tout le Languedoc: En ce pais ils n'y croissent pas non plus que les deux derniers silz n'y sont semés.

LE TEMPS.

Le premier commence à fleurir en Mars, & le second en Auriil: Le premier des petis à la fin de Mars & en Auriil: Le second à la fin de May: & portent la semence meure vn moys apres.

LES NOMS.

Ces belles fleurs se nomment en Grec *κωνίδα*: & en Latin *Narcissus*, d'aucuns, tesmoing Di- oscoride *κωνίδα*, *κωνίδα*, *κωνίδα*, *Babus pomitorius*, & *Anaxoras*: Incogues es Boutiques: en hait- Aleman d'aucuns *Narcissen* *Kesslin*: en bas Aleman *Narcissen*, & *Spanische Farnettchen*.

LA CAUSE DV NOM.

Ces fleurs ont pris leur nom du noble Damoyseel Narcissus, qui fut souuent requis de plusieurs belles Damoyseelles, à cause de sa beauté, toutesfois il n'en tenoit compte: parquoy se voulant desai-



Narcissus.

faire d'elles fen alla à la chaffe, & ayant foiff'en vint à vne fontaine, en laquelle (voulant boyre) il veid fon effigie fort belle laquelle au paruant iamais n'auoit veüe, & pensant que ce fut vne des belles Damoyelles qui l'aymoient, fut eprin de fon amour, de forte que voulant baifer & embrasser sa propre figure & ne pouant, mourüt en la fin par force d'amour. A l'honneur & memoire d'iceluy, la terre (comme les Poetes racontent) a produict ceste belle fleur amyable & bien fuyrante.

## LE TEMPERAMENT.

Le Narciffus, & sa racine principalement est chaude & seche au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de Narciffus boube, rostie, ou prinse autrement en viande ou bruiage, fait auoir ap petit de vomir.
- B La mesme broyée avec quelque peu de miel, est vilement appliquée sur brulures, guerit les nerfz blessez, prouffit aux dilocatis, & donne allegeice à toutes vieilles douleurs de iouctures
- C La racine de Narciffus oste toutes lentilles & taches du visage, mellée avec semence d'Ortye & vinaigre: elle mondifie les vlcères corrompus, & meurit & rōpt les apostemes durs avec fleur de Vesu & miel: & tire hors les espines & eschardes, mellée avec farine d'Yurnie & miel.

## De la Coquelourde.

## LA FORME.

Ceste fleur a les fueilles lōgues, estroictes, fort semblables aux fueilles du Porreau, mais non si lōgues: entre lesquelles prouient la tige ronde, produisant vne belle fleur iaulne partie en six fueilles come le Narciffus, ayant au milieu vne lōgue & ronde clochette, crenelée par les bors. Apres les fleurs suruient la semence enclōse en filiques rondes. La racine est ronde, bulbeuse, pareille à celle du Narciffus.

## LE LIEV.

Elle croist en lieux humides, es boys ombrageux, & au bord des champs, comme aupres de Püers & de Bornhem là où elle croist en abōdance. On la plante aussi es iardins. LE TEMPS.

Ceste herbe produict ses fueilles, tiges, & fleurs en Feurier, & fleurit aucunesfois sous la neige. La semence est meure en Mars. L'herbe perit en Avril & en May, tellement qu'apres n'est plus veüe.

## LES NOMS.

Ceste fleur s'appelle en haut Alemā *gell Hornig-Blumen*, cest à dire Fleur de Feurier iaulne, d'aucuns aussi *gell Tijde loosen*, & maintenant en Latin, d'aucuns *Narciffus lateus*, ou *Pseudonarciffus*, pour ce que ses fleurs ressemblient aucunement aux fleurs du Narciffus. Nul autre nom ne nous est encores cognü.

## LE TEMPERAMENT.

La Coquelourde est chaude & seche, fort semblable en temperature au Narciffus.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A On a trouué par certaine experience, que deux drachmes de ceste racine encores fresche, bouëe en vin ou eau avec vn peu de semence d'Anis ou de Fenouil, & quelque petit de Gingembre, puis beues, pouissent hors par bas & purgent la phlegme lente & visqueuse. Parquoy la mesme racine est bonne contre toutes maladies causées de phlegme visqueuse.

## Du Leucoion de Theophraste. Chap. XLIIII.

## LA FORME.

Ces belles fleurs & amiables ont les fueilles estroictes plus petites & plus douces quocelles du Porreau, au reste semblables. La tige rōde, vnie, produisant au sommet belles fleurs blanches, odoriferantes, pendans en bas. Chacune des fleurs est de six fueillettes, ayans par dehors vne veine verte tout du lōg, & par dedens toutes blanches: au milieu desquelles y a six languettes comme au Lys, à la figure duquel ces fleurs approchent fort. Apres les fleurs viennent de rondes pelot-

## Chap. XLIII.

Pseudonarciffus.

Coquelourde.



pelottes, esuelles est contenue vne petite semence ronde, isulne, & vnie, non guere differente de la graine de Seneni. La racine est bulbeuse, comme celle du Narcissus. **LE LIEV.**

Ces fleurs croissent en lieux ombrageux, & es boys basiers, & situés pres des eaux: on les plante aussi aux iardins.

**LE TEMPS.**

Elle commence à sortir en Feurier, elle liure sa semence en Auril, & en May perit la tige avec les fueilles; la racine seule est de durée, comme celle du Narcissus.

**LES NOMS.**

Ces belles fleurs sont à present tenues pour vne sorte de Violettes que Theophraste appelle en Grec *λευκόνιον*, cest à dire en Latin *Viola alba*. Pourtant s'appelle elle maintenant *Leucoion*, ou *Viola alba Theophras* si: en haut Aleman *weiss hornungo blumen*: en bas Aleman *witte Spose kel blömen*, *Spoersforchens*, & *witte Tijdeloosen*.

**LE TEMPERAMENT.**

Le Temperament, & les Vertus de ceste fleur ne nous sont encores cognues.

**Du Safran. Chap. XLV.**

**LA FORME.**

Le Safran a les fueilles longues, estroictes comme le gramen. Les fleurs croissent sur tiges nues de couleur perse palle, parties en six fueillettes, du milieu desquelles pendent les filets de Safran, de couleur rouge. La racine est bulbeuse, aiant aucunes fois quatre ou cinq petites racines adioinctes.

**LE LIEV.**

Le Safran comme Dioscoride & les Anciens decrient croist au mont Corycus de Cilicie, icy est tenu pour le meilleur, & en Olympe môtaigne de Lycie, & apres d'égis ville d'etolie. Il croist main tenât en plusieurs lieux d'Allemagne, principalement aux enuirs de Vienne en Auftriche, seyl est au iour d'huy tenu pour le meilleur.

**LE TEMPS.**

Le Safran fleurit auant que les fueilles fortent, en Septembre: puis apres il produit ses fueilles herbues qui durent iusques en May. On ne trouue en asté ny fueilles, ny fleurs. La racine seule demeure croissant sous terre & produisant autres petites racines.

**LES NOMS.**

Le Safran s'appelle en Grec *κρόκος*: en Latin *Crocus*, d'aucuns (tesmoing Dioscoride) *Castor*, *Cynomers phos*, ou *Herculis sanguis*: en Arabic *Zahafaran*, & de là en François & haut Aleman *Saffran*: en bas Aleman *Soffraen*.

**LA CAUSE DV NOM.**

Le Safran se nomme *Crocus* à cause du Damoyfel *Crocus*, comme Ouide tesmoigne, duquel Galien a prins l'histoire qui recite au neuuiesme de *Medicis memis secundum loca*, là où il escrit en ceste sorte. Vn iu ueneau appellé *Crocus* sen alla iouer aux champs avec Mercure pour ietter le palle, & comme il ne se donnoit garde, il fut inconsiderement ataint en la teste par Mercure & bien blessé, dont incōtinent mourut: Or du sang d'iceluy espanché sur la terre, vint à croistre le Safran.



Crocus. Safran.



## LE TEMPERAMENT.

Le Safran est chaud au second degré, & sec au premier.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le Safran est vtilement meslé avec les medecines que lon prend contre maladies de poitrine, des poulmons, du foye, & de la vesicelle est bon aussi à bestomach pris en viandos, car il conforte bestomach & fait faire digestion, & beu avec vin cuit engarde d'enyurer, & induit à faire le ieu d'amours.
- B Le Safran prins avec vin doux fait auoir longue haleine, & est bon à ceux qui ont difficulté d'halaine, & sont althmatiques.
- C Le Safran meslé avec lait de femme & appliqué sur les yeux, les engarde de fluxio d'humeurs, & de rougeolles & petite verolle, & arreste la fluxion d'iceux, induit de sus.
- D Il est aussi vtilement appliqué sur inflammations, apostemes bulicuses, & feu volage, & est fort bon de le mesler parmy medecines des aureilles.
- E Item il est fort propre pour amollir tous durillons, & meürir toutes tumeurs crues.
- F La racine du Safran beue en vin prouoque l'vrine, elle prouifite dauantage à ceux qui ont la grauelle, & qui ne peuuent passer finon goutte à goutte.

## D'Orchis ou Couillon. Chap. XLVI.

## LES ESPECES.

Il y a beaucoup de diuerses sortes d'herbes comprises soubs ce nom Grec Orchis, & Couillon en François. Lesquelles par gens scauans sont diuisées en trois, mais nous y auons adiousté enco re vne espee non descrite ne cogneue de ceux qui ont trauailé deuant nous en la cognoissance des simples: tellement que toutes les especes de Couillon sont à present par nous comprises sous quatre especes.

## LA PREMIERE ESPECE.


La premiere espee de Couillon appellée en Grec Orchis est de cinq sortes, dont les deux pre mieres sont appellées Couillon de chien masse, & les trois autres Couillon de chien seinelle.

*Orchis primum genus.*

Le premier Couillon de chien masse.

*Orchis secundum genus.*

Le second Couillon de chien masse.




LA FORME.

- A Le premier a quatre ou cinq fueilles larges, bien pres comme la fleur de Lys, vn peu plus petites toutesfois, fort semblables aux fueilles du grand Muguet: La tige longue de pied & demy, sur laquelle croissent belles fleurs, odoriferantes, griuolées en incarné. La racine ne sont que deux petites boudes rondes comme deux noix Muscades, l'vne assise vn peu plus haut que l'autre dont la plus haute & plus petite, est plus pleine & plus dure: & la plus basse, & plus grande, est fungeuse, & plus ridée.
- B Le second ressemble vn peu a l'autre, il a toutesfois les fueilles plus estroictes, plus tendres, & semées de taches noires. Les fleurs sont maintenant d'vn pers obscur, maintenant blanches comme neige. Les racines rondes comme deux oliues, l'vne pleine & nouvelle, l'autre funguse, ridée, & fletie.

*Orchis tertiam genus.*  
Premier Couillon de  
chien femelle.

*Orchis quartum genus.*  
Second Couillon de  
chien femelle.

*Orchis quintum genus.*  
Le tiers Couillon de  
chien femelle.



- C Le tiers Couillon de chien a aussi les fueilles grandes & larges, bien pres semblables aux fueilles du Lys. Les fleurs perses. Les racines rondes & languettes en forme d'oeuf d'oyseau, dont la plus haute est ronde & petite: la plus basse, plus languette & plus grosse, toutes deux de saueur fort douce.
- D Le quart Couillon ressemble fort de fueilles au Second, sinon qu'elles ne sont pas tachetées. Les fleurs sont incarnées, semées de petites taches brunes. Les racines rondes & languettes comme deux oeuf d'oyseau, plus petites que les racines du Second.
- E Le Cinquiesme a les fueilles pareilles aux autres, plus petites toutesfois. Les fleurs petites, amassées en vn, de couleur de chastagne par dehors, & blanches par dedens, & semées de mout de taches noires. Les racines semblent deux noix longues & rondes, l'vne plus grande que l'autre.

LA FORME DE LA SECON- *Tragorchis.*  
DE ESPECE.

Couillõ de bouq.

- 2 LA seconde espece de Couillon, qui se nomme Couillon de bouq ou de lieure, a les fueilles semblables aux fueilles du Lys, mais plus petites. La tige haute de pied & demy, sur laquelle croissent force fleurs de façon moule estrange, ressemblans quant à leurs petites queuës recoquillées, & chapiteaux bigarrés, à vn petit Lezard. Chacune des fleurs à part soy est au commencement comme vn petit cas lycule rond & fermé de la grosseur d'vn pois: & quand il s'ouure, il en sort vne petite queuë longue & gresse, laquelle est blanche au haut par où elle s'attache à la tige, & semée de taches rouges, ayant à chacun costé vn petit adioustement en forme d'vne petite patte: & le reste de la queuë est recoquillé, & pendant en bas. La fleur a vne odeur forte & sentant le bouq, & faisant douleur de teste à ceux qui la flairënt long temps. Les racines sont comme deux noix Muscades.



*Orchis serapias mas.*  
Triple Couillon  
de chien masse.

*Orchis serapias  
femina.*  
Triple Couillõ  
de chien femelle,  
ou Mouche.

## LA TIERCE ESPECE

- 3 LA tierce espece appellée en Grec *Triorchis*, & en François Triple Couillon de chien, est de deux sortes. Le Masle, & la Femelle.

## LA FORME.

- A Le triple Couillon de chien masse, a les fueilles charnues comme celles du Lys, plus petites toutesfois, & plus estroictes ployées en bas vers la racine. La tige est de paulme & demy de long. Les fleurs perles. Les racines comme trois boules rōdes, dont les deux sont plus grosses, formées comme noix Muscades bien douces & pleines de seue.
- B Le triple Couillon femelle, ressemble à l'autre de tige, fueilles, & de racines douces & pleines de seue, trois aures l'vne de l'autre. Les fleurs sont de diuerses couleurs, à sçauoir perse, blanche, iaulne & verte meslées ensemble. Le bas de la fleur semble à vn fresson, & le haut à vn papillon à tout ses ziles estendus.

LA



LA QUATRIÈME ESPECE.

4 LA quatre espece de Couillon est aussi de deux sortes, L'une grande & l'autre petite.

*Testiculus vulpis.*

*Testiculus odoratus.*

LA FORME.

Couillon de Renard.

Couillon odoriferant.

A Le Couillon de Renard, n'a com-  
munement que trois feuilles, fem-  
blables aux feuilles du Lys blanc,  
toutesfois un peu plus petites &  
plus rouges. La tige est d'environ  
un pied de haut, sur laquelle crois-  
sent belles fleurs, non guere diffe-  
rentes aux fleurs de l'ak acin creu-  
se, de couleur tantost blanche com-  
me neige, tantost d'un pers obscur.  
Les racines comme deux noix ron-  
des, jointes ensemble come deux  
olives, rougeâtres par dehors, &  
blanches par dedens, l'une desquel-  
les est plus grande & plus pleine,  
augmente tous les iours: l'autre  
plus petite, funguse & fletrie, de  
saveur douce & amiable, incarnée  
par dehors, & blanche par dedens.

B Le Couillon odoriferant, n'a aussi  
si communement point plus de trois  
feuilles petites & espandues sur la  
terre, bié pres semblables aux feuil-  
les de la petite Oseille sauvage, ou  
des Marguerites. La tige grelle d'e-  
nviron une paulme de haut, sur la-  
quelle croissent fleurs fort petites,  
blanches, & odoriferantes, flairant  
bié pres come le grand Muguet,  
lesquelles sont assés au tour de la  
tige, comme felles y estoient retorses. Il a pour racine deux petites boules rondes, l'une desquel-  
les est plus dure, & l'autre plus funguse, toutes deux de saveur douce.



LE LIEU.

Toutes ces sortes & especes de Couillon croissent aux boys & es prés, & des aucuns aussi es che-  
mins descouverts maigres & herbus, & es montaignes, comme le Couillon de Renard & le Cou-  
illon odoriferant, & principalement le Couillon odoriferant lequel ne se trouve guere sinon en  
chemins herbus & lieux fort exposés au Soleil.

LE TEMPS.

Ces herbes florissent pour la plus part en May & en Juin. Le Couillon odoriferant seul flo-  
rit en Aoust.

LES NOMS.

1 La premiere espece s'appelle en Grec *ὄρχις*, *Orchis*, & *κνυδὸς ὄρχις*, *Cynorchis*: en Latin *Testicu-  
lus*, & *Testiculus vulpis*, cest à dire Couillon, & Couillon de chien: es Boutiques *Saryriones*, laçoit  
qu'il n'y aye grande similitude.

2 La seconde espece est aussi une espece d'Orchis, appelée à cause de sa puanteur, & odeur for-  
te, *ὑπόρχις* en Grec, cest à dire *Testiculus hirci* en Latin, en François Couillon de bouq: & en  
Aleman *Borpeuffchen*. Elle s'appelle aussi *Testiculus leporis*, cest à dire Couillon de lieure: es  
Boutiques aussi *Saryrius*, & usurpée pour iceluy sans aucun iugement.

3 La tierce espece se nomme en Grec *ὄρχις ἱερᾶπιᾶς*, *Orchis serapias*: en Latin *Testiculus serapias*:  
en haut Aleman *Ragwurtz*; en bas Aleman *Ragwostel*, d'aucuns aussi *ἑπίορχις* *Triorchis*, cest à  
dire Triple Couillon.

4 La quatre espece se nomme en Aleman *Standelcrayf*.

A La premiere desquelles est appelée des Herbiers vulgaires, & d'aucuns Apothicaires *Testicu-  
lus*

lus vulpis, c'est à dire Couillon de Renard: en haut Aleman gross Standelcrout: & en bas Aleman groot Standelcruyt.

B La seconde s'appelle *Testiculus odoratus*, c'est à dire Couillon odoriferant: en bas Aleman tref riechende Standelcruyt, & cleyen Standelcruyt.

## LE TEMPERAMENT.

Toutes ces herbes sont de complexion chaude & humide.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de Couillon qui est pleine de luy, principalement celle du Couillon de bouq, men-  
gée, ou cuicte avec lait de cheure & beuf, donne appetit au ieu d'amour, fortifie & nourrit le  
corps, & avec ce est singuliere à ceux qui deuiennent etiques, & ont bon besoin de nourriture.
- B La racine fletrie, est de vertu contraire, & oste l'appetit du ieu d'amour.
- C On trouue aussi par escrit que si les hommes mangent la plus pleine & plus grosse racine de  
ces herbes, & principalement de la premiere espece, qu'ilz engendrent des filz: & que si les femmes  
mangent la moindre & fletrie, qu'elles engendrent des filles.
- D La racine des Couillons, & principalement celle du Triple couillon cuicte en vin & beuf, ar-  
reste le flux de ventre.
- E La mesme racine encores nouvelle, consume & resoud toutes tumeurs, modifie vicerés pour-  
ris, & guerit fistules appliquée dessus: & icelle mise en poudre & esparée dedans vicerés phagede-  
niques: engarde qu'ilz ne rongent plus auant.
- F La mesme racine, & principalement celle du Couillon odoriferant cuicte en vin & quelque  
peu de miel, guerit les vicerés pourris de la bouche.

## D'Ophris, &amp; du Nid d'oyseau.

## Chap. XLVII

## LES ESPECES.

Ovtre les Especes de Couillon descrites au chapitre precedent, on trouue encores deux au-  
tres herbes ains quelque similitude avec les mesmes, principalement quant aux tiges & fleurs  
& pourtant sont elles comprises d'aucuns sous le Couillon. L'une desquelles s'appelle Double  
feuille, & l'autre Nid d'oyseau: lesquelles nous auons bié voulu mettre en vn chapitre à part, pour  
ce que leurs racines sont fort differentes aux racines des autres.

Bifolium.

Doublefeuille.

Nid d'oyseau.





LA FORME.

1 La Double feuille a la tige ronde, vnie, portât sans plus que deux feuilles semblables au grand Plantain. La tige depuis le milieu iusques en haut est enuironnée de mout de fleurettes verdes en azaine, bien pres semblables à petis oyillôs desuës de leurs plumes, & non guere differentes aux fleurs de plusieurs sortes du Couillon. La racine est fort fibreuse.

2 Le Nid d'oyseau a la tige nue sans feuilles, produiânt au sommet coemme vn espi. La tige avec ses fleurs est de couleur de boys ou brune, bien pres semblable à la tige de l'Orobâche (de laquelle le nous ecrirons en la sixiesme partie de nostre Histoire des plantes) plus tendre toutesfois & non si grosse. La racine ne font que fibres entrelaçées ensemble.

LE LIEV.

1 La Doublefeuille croïst voluntiers es prés humides & aquatiques.

2 Le Nid d'oyseau se trouue es champs humides & sablonneux, & es boys.

LE TEMPS.

Ces deux herbes prouiennent en May & en Iuin.

LES NOMS.

1 La premiere de ces herbes s'appelle en Latin *Trifolium*: en haut Aleman *Zweyblatt*: en bas Alemâ *Zweyblatt*, & est tenue d'aucuns pour Ophris de laquelle Pline ecrit: des autres pour vne espece de Persefeuille: des autres pour Alisma ou Plantain aquatique, & d'aucuns ausis pour Hellebore rine, c'est à dire Hellebore blanc sauvage.

2 La seconde espece Hierosime Bouq: la nomme *Mangenschien*: & aucuns Herboristes de ce pais, pour ce que les racines sont entrelaçées en forme de nid, l'appellêt Nid d'oyseau: en bas Aleman *Vogghes nest*. LE TEMPERAMENT VERTV'S ET OPER.

La complexion & vertu de ces herbes nous font encores incognues: de là vient qu'elles n'ont nul vsage en medecine. Aucuns ecriuent qu'elles ont pareille nature que le Couillon, toutesfois nous n'en auons nulle assurance ou experience.


Du Satyriou.

Chap. XLVIII.

LES ESPECES.

Dioscoride fait mention de deux sortes de Satyriou. L'vn desquelz se nomme Satyriou tryphillon, & l'autre Satyriou erithronium. *Satyrium erythronium.* Satyriou rouge.

*Satyrium trifolium.*  
Satyriou a trois feuilles.



Satyrion masculin mat.  
Satyrion royal mâle.

Satyrion masculin femina.  
Satyrion royal femelle.



#### LA FORME.

La premiere espece a toujours trois feuilles, & non plus, pres semblables aux feuilles du Lys, à beaucoup plus petites toutesfois, entre lesquelles croist la tige nue, droite, ronde, produisant au sommet belles fleurs & plaifantes, blanches, ou bleuës. La racine est ronde cõme vne petite pomme, de saveur douce & plaifante.

La se conde espece, n'a pour la plus part que deux feuilles, non par trop differetes à la susdicte. La tige ronde, laquelle produit belles fleurs bleuës estoillées, apres lesquelles surviennent ronds boutons, contenans vne graine vnie, luyfante, & iaulne comme fin or, ayant la forme du grain de Mille t. La racine ressemble à l'autre sinon que elle est plus petite.

Outre ces deux especes de Satyrion descrites par les Anciens, il se trouue apres de gens lettrés Modernes encores vne tierce espece appellée en François Satyrion Royal. Et est de deux sortes, à sçavoir mâle, & femelle.

Le Satyrion Royal mâle à les feuilles longues, estroictes, charnues, bien pres semblables aux feuilles du Lys, plus petites toutesfois. La tige ronde, produisant belles fleurs odoriferantes, de couleur perse obscure. Les racines ressemblent à deux mains, chacune desquelles a cinq ou six doigts en forme d'une main ouverte & estendue.

Le Satyrion femelle a les feuilles & la tige pareilles à l'autre, sinon que les feuilles de cestuy cy sont semées de mout de taches noires. Les fleurs sont incarnées en blanc, d'odeur amiable. Les racines formées en façon de mains comme celles du mâle, de goust asses agreable comme les autres.

#### LE LIEV.

Les deux premieres especes croissent en plusieurs lieux d'Allemagne, aux boys ombrageux en ce pais les Amateurs des herbes les plantent en leurs jardins.

Les deux autres, se trouuent en ce pais en aucuns pres & boys basiers.

LE TEMPS.

- 1.2 Les deux premiers fleurissent au commencement de Mars, aucunes fois aussi plus tost.  
 3.4 Le Satyrion royal, en May, & en Juin.

LES NOMS.

- 1 La premiere espece s'appelle en Grec σατύριον, ησα σατύριον τριφυλλου: en Latin Satyrium, & Satyrium trifolium.  
 2 La seconde s'appelle en Grec σατύριον ερυθρον: en Latin Satyrium Erythronium.  
 Ces deux especes se nomment en haut Aleman Hornungoblummen & Mertzensblumen: en bas Aleman Mertsblumen, c'est à dire fleur de Mars.  
 3.4 La tierce espece s'appelle à present σατύριον βασιλικον: en Latin Satyrium basilicum & Satyrium regium: és Boutiques Palma Christi, d'ancuns Digiti citrin: en Arabe, selon l'opinion d'ancuns Buzzeiden ou Buzzeiden: en haut Aleman Treuffblumen: en bas Aleman Sandchenocuyt.

LE TEMPERAMENT.

Le Satyrion est de complexion chaude & humide.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1.2 La racine du Satyrion fait auoir appetit au ieu d'amours, nourrit le corps, & le rend robuste. A  
 3.4 La racine du Satyrion royal broyée avec vin fait vomir, & avec ce guerit la fiure tierce, prin B  
 se deuant l'acces des fieures, comme Nicolaus Nicolus escrit au second Sermon.

De l'Hyssope.

LA FORME.

1 L'Hyssope commune a les branches quarrées, vertes, dures & ligneuses, reuestues de feuilles estroictes, aucunement ressemblés aux feuilles de la Lauande, plus petites toutes fois, & plus vertes. Les fleurs croissent au sommet de la tige par petis bouquets bien pres en forme d'espi, mais seulement d'un costé de la tige. Apres les fleurs passées suruiuent la semence noire en petis calyculés d'ou les fleurs sont tombées. La racine est noiratre & ligneuse.

2 Il se trouue encores vne autre espece d'Hyssope semée & plantée par les Herboristes: laquelle ressemble aucunement à l'autre de tiges & feuilles, si non que ses branches sont plus courtes, & plus fort pendans vers la terre: les feuilles plus noiratres & verdâtres, & plus espelées, de goust plus amer que l'Hyssope commune. Les fleurs ressemblent assés aux fleurs de l'autre Hyssope, d'une belle couleur bleue obscure, & sont fort amassées ensemble au tour du sommet de la tige, bien pres en forme d'un espi court & bien garni. La racine est ligneuse, comme celle de l'autre Hyssope.

LE LIEV.

L'Hyssope ne croist point de soy mesme en ce pais toutes fois on la trouue plantée par tous les iardins.

LE TEMPS.

L'Hyssope fleurit en Juin & Juillet.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle à present és Boutiques Hyssopus & yssopus, & là selon en François Hyssope: en Aleman Hyssop, Hyssope, & Yssope, combien toutes fois que ceste herbe ne soit pas la vraye Hyssope de laquelle Dioscoride, Galien & les Anciens escriuent, comme est assés demonsté par quelques gens doctes modernes.

LE TEMPERAMENT.

L'Hyssope est chaude & seche au tiers degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoctiō d'Hyssope avec figues, rue & miel boullies ensemble en eau, beuë profite à ceux A

Chap. XLIX.

Hyssopus communis.

Hyssope.



qui ont obstruction de poitrine, & courte haleine, à ceux qui ont toux vieille & difficile. A ce meisme est elle aussi bonne meslée avec miel & lechée souuent en forme de looth.

- B Hyssope prinse avec syrop acetous, purge par bas les phlegmes lentes & gluïtes, & tue & pouffe hors les vers. Elle à pareille vertu mengée avec figues.
- C Hyssope boullie en cauf avec figues, & gargarisée, fait meurir & rompre les tumeurs & apostemes du gosier & de la bouche.
- D Hyssope cuïste avec vinaigre & tenue en la bouche appaise douleur de dens.
- E La decoction d'Hyssope resout & consume le sang qui est amassé & grumelé sous le cuir; Da uantage guerit toutes meurtrissures appliquée dessus.
- F La meisme decoction guerit la rongne, tigne, & mauuaise gratelle, si on s'en laue.

## De la Sarriette.

## LA FORME.

LA Sarriette est vne herbe d'esté, tendre, d'environ la hauteur d'un pied: les tiges sont gressles & noires, fort branchues, reuestues de petites fueilles estroictes, aucunement semblables aux fueilles de l'Hyssope commune, plus petites toutesfois. Les fleurs croissent entre les fueilles incarnées en blanc, & d'odeur amiable. La graine noiratre. La racine tendre & fibreuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe se seme par tous les jardins, & est de grand vsage es viandes.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en Iuin.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle maintenant en Latin *Camula* & *Satureia*: es Boutiques *Saturegia*: en haut Aleman *garten hyssop*, *zwibel hyssop*, *Kunel*, *Saturey*, & *Sadaney* en bas Aleman *Luele*, *Satureye*, *Lochschel*.

## LE TEMPERAMENT.

La Sarriette est chaude & seche au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERAT.

- A La Sarriette est fort vtile & propre à prendre en viandes, comme le Thym, & le Thymbre, ausquelz elle ressemble de vertu & aussi de saueur. Comme Columel la a bien iadis escrit en ceste sorte:

*Es Satureia Thymi referens, Thymbre e q; saporem.*  
c'est à dire.

Sarriette la saueur retenant

Du Thym fleury, & du Thymbre plaisant.

## Du Thym.

## Chap. LI.

## LES ESPECES.

ON trouue deux especes de Thym, l'une appellée *Thymum creticum*, c'est à dire Thym de Candie, l'autre est nostre Thym commun.

## LA FORME.

Le Thym de Candie a plusieurs tiges menues, ligneuses, reuestues tout à l'entour de fueillettes estroictes, au sommet desquelles croissent comme petis & courts espis amassés en vn, non trop differens à l'espi du Stüchas, plus petis toutesfois, produifans fleurs purpurées. La racine est fragile & ligneuse.

Le Thym commun est vne herbe basse, sort odoriferante, aiant plusieurs branchettes fragiles & ligneuses. Les fueilles petites, de goust acre & piquant, ressemblant en branchettes, fueilles & saueur bien pres à l'autre, sinon qu'il n'est pas si blanc. Les fleurs croissent au sommet des tiges, de couleur incarnée. La racine est gresse & ligneuse.

## LE LIEV.

Le premier Thym croist en pais chauds & terre maigre, seche, & montaignes pierrenses, & sem blables lieux mal cultiués. Et se trouue en abondance au pais de Grece.

## Chap. L.


Satureia vulgaris.

Sarriette.



*Thymus creticus.*  
Thym de Candie.

*Thymus duriss.*  
Thym vulgaire.



2 Le second croist pareillement en pais chauds, es môtaignes pierreuses, en terre maigre & lieux semblables, comme en plusieurs lieux d'Italie, d'Espagne, & bien pres par tout le Langued'oc li où il croist en grande abondance.

**LE TEMPS.**

Le Thym commun florit en May, L'autre vn peu plus tard.

**LES NOMS.**

1 Le premier s'appelle en Grec *θυμ*, & d'aucuns *κισθόσαρον* : en Latin *Thymus* : incognu es Boutiques.

2 Le second s'appelle, aussi en Grec *θυμ* : de Dioscoride *Thymus duriss*, lequel ne se trouue guere à la fayson sans son *Epirhymus*, principalemēt es pais chauds. Cestuy cy est cognu des Apothicaires, & appellé *Thymus* en François & Aleman *Thym*.

**LE TEMPERAMENT.**

Le Thym est chaud & sec au tiers degré.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

Le Thym bouli en eauē avec miel & beu, prouffite cōtre toux difficile & courte haleine, il pro A uoque l'vrine, & pousse hors l'arrierefois, & fruiēt mort en la matrice, il faict auoir les fleurs aux femmes & dissout le sang grumelé dedans le corps.

Le mesme mis en poudre & prins au poids de trois drachmes avec vinaigre miellé qu'on ap- B pelle Oximel, & vn peu de sel, purge par le ventre le phlegme espes & gluant, & les humeurs acres & bilieuses, & toute corruption du sang.

Iceluy vsurpé en pareille sorte est bon cōtre douleur sciastique, douleur de costé, & du thorax C item contre inflations & ventosités du costé & du ventre, & des genitoires, & profiēt à ceux qui ont frayeur, aux melancholiques, & troublez d'esprit.

- D** Le Thym mengé du matin à jeun & du soir deusit soupper, profite aux yeux chalsieux & conlans, & d'ouleur d'iceux. A ce mesme aussi vaut il mout, vlsurpé en viandes.
- E** Il est aussi singulier contre la goute, prins avec vin, hors de la maladie, & avec vne drachme d'Oxymel, quand on est tormenté de la goute.
- F** Thym meslé avec miel en forme de looth & souuent leché, nettoye le thorax, & fait meurir & cracher le phlegme.
- G** Thym brôyé avec vinaigre, cõsime & refout les œdemes, & emporte les verrues appliqués <sup>des</sup>
- H** Item iceluy pilé avec farine d'orge & vin, appaise la douleur de hance qu'on appelle goute sciatique, appliqués dessus.
- I** Le Thym est aussi fort vtile donné à flairer aux Epileptiques.

## Du Thymbré.

## LA FORME.

**L**E Thymbré a mout de tiges ligneuses, gressles, reuestues de fueilles petites & estroictes. Les fleurs petites, incarnées ou blanches croissans en petis calyces le long des tiges, entre les fueilles, florissans depuis bas jusques au plus haut, se tournât apres q les fleurs sont tobées en forme d'espri verd, contenant la semence fort petite. La racine est ligneuse. **LE LIEV.**

Ceste herbe croist en quelques endroits de France, principalement au Langued'oc & autres côtrées chaudes, en lieux mal cultiés. Elle se trouue en ce pais aux iardins des Amateurs des herbes.

## LE TEMPS.

Il florit en ce pais en Juillet & Aouist, aucunesfois aussi plus tard.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *βίμβρα* en Latin *Thymbra* & *Canila*, d'aucuns Herboristes Alemans *Tenderich*. Se n'est pas le *Satureia*, car le *Satureia* est vne herbe differente de *Thymbra*, comme *Columella* & *Pline* ont asés donné à cognoistre.

## LE TEMPERAMENT.

Le Thymbré est chaud & sec cõme Thym.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A** Le Thymbré est fort bon & vtile pour vser en viandes, comme le Thym, la Sarriete & l'Hyssope vulgaire.
- B** Il a pareille faculté & vertu que le Thym pris en mesme sorte, comme dit *Dioscoride*.

## Du Serpollet vulgaire.

## Chap. LIII.

## LA FORME.

**L**E Serpollet vulgaire a plusieurs branchettes menues, ligneuses, se trainans aucunesfois par terre, aucunesfois eleuées d'vn pied de haut, reuestues de fueillettes fort semblables aux fueilles du Thym vulgaire, plus grandes toutesfois. Les fleurs croissent à l'environ du sommet des tiges par couronnes, comme au *Marrube*, de couleur purpurée pour la plus part, & rouge, & sont aucunesfois aussi (combien que fort peu souuent) blanches comme neige. La racine est dure & ligneuse aiant plusieurs fibres.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist par tout ce pais en lieux rudes, scabreux, secs, mal cultiés & pierreux, pres des voyes & au bord des champs à Bled.

## LE TEMPS.

Le Serpollet florit depuis le moys de May jusques à la fin de l'asté.

## Chap. LII.

## Thymbré.

## Thymbré.



LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle à present és Boutiques *Serpillan*: en haut Aleman *Quendel*, d'aucuns aussi *Kumel*, & *Kinfin*: en bas Aleman *Quendel*, & en *Brabat* *Wiser* *Wouten* *Sedstro*, & en aucuns lieux wilden *Thymus*. LE TEMPERAM.

Le Serpolet est chaud & sec au tiers degré.  
LES VERTVS ET OPERAT.

- A Le Serpolet bouilly en eauë ou vin & beu, prouoë & fait venir le flux mensrual aux femmes, pouë hors la pierre & grauelle, & prouoë à vomir
- B Iceuy pris en mesme sorte, arreste le flux de vëtrë, guerit trenchées, & est tresutile contre conuulsions & contractions de nerfs.
- C Le Serpolet prins en toutes viandes ou breuages, est souveraine medecine cõtre tout poison, & contre morsures & piqueres de bestes venimeuses & serpens.
- D Le jus d'iceluy beu au poïd de demy once avec vinaigre, est vtile contre crachemens & vomissements de sang.
- E Le Serpolet meslé avec vinaigre & huile rosat, & appliqué sur le frõc & sur les tẽples, appaise douleur de teste, & est tresbon pour resueries & phrenesie
- F La fumée d'iceluy chasse toutes bestes venimeuses

Du Pouliot. Chap. LIIII.

LA FORME.

LE Pouliot a les tiges menues, fragiles, d'un pied de lög, aucuns fois d'auitage, nõ elleuées, mais se trainns par terre, & s'attachans çà & là en plusieurs endroits. Les suelles sont rodellettes bië pres cõme celles de Mariolene, plus verdes, noïrres, & d'odeur pl forte. Les fleurs croissent en forme de couronne autour de la tige cõme au Marrube, de couleur bleüstre, aucuns fois fort blanche. La racine est fibreuse. LE LIËV.

Le Pouliot croist volontiers en lieux mal cultivés & humides, qui sõt secs en æté & pleins d'eauë en hyuer.

LE TEMPS.

Il florit en Iuin & en Aouët.

LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *Ψιλλυ*: en Latin & és Boutiques *Pulegium*: en haut Aleman *Pösey*: en bas Aleman *Pöseye* & *Pöseye*.

LE TEMPERAMENT.


Pouliot est chaud & sec au tiers degré, & de parties subtiles & incisantes.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Pouliot bouilly en vin & beu, prouoë les fleurs aux femmes, il fait sortir la secõdine, l'enfant mort & la portée nõ naturelle, il fait vriner & rompt la pierre, signamment celle qui est aux rögns.
- B Le Pouliot pris avec miel, nettoye les poulmõs & cuacue les grosses humeurs & espesses de la poitrine.
- C Iceuy pris avec miel & Aloë, purge par le ventre l'humeur melancholique, & sert grandement aux conuulsions, & retirements de nerfs.

*Serpillan vulgare.*

*Serpollet vulgaire.*



*Pulegium.*

*Pouliot.*



- D** Iceluy avec eau & vinaigre, appaise l'appetit desordonné de vomir, & douleurs & mordicacions de l'estomach.
- E** Pouliot pris en vin ayde aux morsures de bestes venimeuses, & avec vinaigre, aux Epileptiques.
- F** Si quelque fois on est contrainct de boyre eau mauuaise, infecte, ou salée, settes du Pouliot dedens, ou mettes y la poudre d'iceluy, & elle ne nuyra point à la persone.
- G** Vne guirlande de Pouliot mise sur la teste, est de grand valeur contre douleurs & tournoyemens de teste.
- H** Iceluy pilé & donné à flairer avec vinaigre, fait reuenir gens paleméz & defaillis, & prouffite à ceux qui ont le cerueau froid & humide.
- I** La poudre ou cendre d'iceluy, raffermist les gençues, quand on les en frotte.
- K** Le Pouliot pilé appaise la douleur de la goutte, & de la sciatique, frotté sur la partie tant qu'elle deuenne rouge.
- L** Le mesme melleé avec vinaigre & miel, guerit les vices de la ratelle appliqué dessus.
- M** La decoction d'iceluy est fort vtile aux ventosités, enflures, duresses & obstructions d'amarry, quand on fistied dedens, ou dessus vne cuue, là ou ladicte decoction fort. La mesme corrige aulsi la demangeon, quand on s'en laue les parties.
- N** Le parfum des fleurs du Pouliot encores fresches, chasse les pulces.
- O** Xenocrates diët quyn brin de Pouliot enuuelopé dedens vn petit de laine, & donné à flairer, ou mis entre les draps du lit, guerit la fieure tierce.

## Du Polium.

## Chap. LV.

## LES ESPECES.

**L** E Polium comme dit Dioscoride est de deux sortes, l'vn desquelz se peut nommer grand Polium, ou, comme Dioscoride veut, Polium de montaigne: & l'autre petit Polium.

## LA FORME.

## Polium.

- 1** Le Polium de montaigne est vne herbe tendre, basse, & bien flairante, ayant petites tiges & branches gresles, d'ens uiron vne palmte, ou demy pied de haut. Les fueilles petites estroictes, gristres, desquelles, celles d'en bas sont vn peu pl larges & vn peu crenelées tout à l'entour: celles qui croissent au plus haut des tiges, plus estroictes & nō crenelées. Les fleurs blanches croissent au sommet des brāches. La racine fibreuse.
- 2** Le petit Polium, n'est guere different à l'autre, sinon qu'il a les fueilles plus tendres, plus petites, plus estroictes, & plus blanches: il a aulsi beaucoup plus de petis rinceaux gresles & fragiles. Il n'a point toutesfois si grād vertu, né si forte odeur que celuy de Montaigne.

## LE LIEV.

Il ne croist point de soy mesme en ce pais, & ne sy trouue guere, sinon en quelques iardins des Amateurs des herbes, qui le plantent & entretiennent non sans grande diligence.

## LE TEMPS.

Il fleurit à la fin de May & en Iuin là où il croist de soy mesme, & en ce pais en Iuillet.

## LES NOMS.

Il s'appelle en Grec *πίλιον*, *πίλιον ὄρειον*, *καὶ τριόρειον*: en Latin *Polium*, *Polium montanum*, & *Tenthrinum*. Il n'a nom François ny Aleman qui nous soit cognu: Encores moins est il cognu es Boutiques de ce pais.

## LE TEMPERAMENT.

Le Polium est chaud au second degré, & sec au tiers.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Polium bouli en eau ou vin, prouoque le flux mensrual, & l'yvrine, & est fort vtile aux hydro-piques, & à la iaulnisse.
- B** Il prouffite grandement aux morsures de bestes venimeuses, & contre tout venin, pris en la maniere que dessus, & chasse toutes bestes venimeuses de là où il est ietté, ou bruslé.
- C** Iceluy beu avec vinaigre ayde aux maladies de la ratelle.





**D** Il guerit aussi playes, & les referme broyé encores verd & appliqué dessus.

## De la Mariolaine.

## Chap. LVI.

## LA FORME.

Maïorana.

Mariolaine.

**L**A Mariolaine est vne herbe fragile, de bonne odeur, fort connue en tous pais, ayant les tiges menues, fragiles, reueftues de fueilles douces rôdelletes & grâstres: & produifans au sommet plusieurs petis boutons, d'où fortét petites fleurs blanches, lesquelles rendét vne fort petite semen ce rouffatre. La racine est ligneuse & fort fibreuse

## LE LIEV.

La Mariolaine se plante é iardins, & en pots de terre, & ayme terre grasse & bien fumée.

## LE TEMPS.

Elle florit en Iuillet & Aouft.

## LES NOMS.

Ceste noble herbe odoriferante se nôme à present é Boutiques *Maïorana*: en François Mariolaine ou Marôneren haut Alemâ *Maïorân* ou *Maïorân*: en bas Alemâ *Maïorolaine* & *Maïorolaine*. Elle est tenue pour le vray *σαμψικον* *η* *αμαρακον* des Grecs, & *Amaracus* & *Maïorana* en Latin: com bié toutesfois qu'elle ne se traîne point par terre côme Diof. escrit que Sampficon doit faire: Pour tant elle semble plus tost auoir quelque similitude avec celle que les Grecs appellent *μαραμ*, & des Latins *Marū*, car c'est vne herbe d'odeur tresplaisante & amiable, portât la fleur bien pres comme *Origanum heracleoticum*, ce que Diof. attribue au *Marum*. **LE TEMPERAMENT.**

La Mariolaine est chaude & seche iusques au tiers degré. **LES VERTVS ET OPE.**

- A** La Mariolaine boulie en vin blanc & beuf est fort profitable à ceux qui commencent d'estre hydropiques, & ne peuvent pisser que goutte à goutte, & avec grande difficulté, & qui ont trenchées & torsions de ventre.
- B** Icelle prise en meisme sorte, prouoque les fleurs aux femmes: aussi fait elle appliquée par dessous en forme de pessaire.
- C** La Mariolaine sechée & meslée avec miel, dissout le sang caillé, & efface toutes meurtrissures noires appliquée dessus.
- D** La meisme avec sel & vinaigre est fort vtilement appliquée sur piquers de scorpions.
- E** Vn emplastre fait de Mariolaine avec huile & cire, refout les cedemes, & profite grandement aux parties desnoüées & sorties de leur lieu, mise dessus.
- F** La Mariolaine frottée & boutée dedans le nez, ou le ius d'icelle attiré par le nez, euacue les humeurs de la teste, mondifie le cerueau, fait esternuer, & est fort bonne à ceux qui ont le sentiment degasté.

## De Clinopodium.

## Chap. LVII.

## LA FORME.

**C**este herbe a les tiges menues, nues, rondes, & ligneuses: les fueilles petites, tendres, bien pres semblables à la Mariolaine. Les fleurs qui sont blanches & fort petites croissent en forme de courône au tour de la tige, de dans petis calyculs veluz. La racine est ligneuse. Toute l'herbe est d'odeur fort plaisante, pres semblable à la Mariolaine. **LE LIEV.**

Ceste herbe ne prouient pas de soymesme en ce pais, sinon que les Herboristes la plantent en leurs iardins.

## LE TEMPS.

Elle fleurit icy en Aouft ou là enuiron.

## LES NOMS.

Ceste herbe est tenue d'aucûs Herboristes pour *Marum*, mais veu qu'elle ne florit point côme



L'Origan, il nous semble qu'elle n'a aucune cōnenan *Clinopodium*, qu'is ce avec Marum, mais qu'elle a plus grande affinité *bofda Marū* avec celle qui s'appelle en Grec *κλωνοδίου*: en Latin aussi *Clinopodium*, pour laquelle nous l'auons décrit

## LE TEMPERAMENT.

Elle ressemble fort à la Marioleine quant à sa complexion. LES VERTVS ET OPERAT.

- A On boit l'herbe de Clinopodium & la decoction du ius d'icelle contre conuulsions, rompures, difficulté d'vrine, & morsures de serpens.
- B Elle prouoq̄ les fleurs, & poule hors l'enfant: Icel le beuë par acūs iours, oste les verrues qui pendēt. Icelle cūctē iusques à la tierce partie, serre le ventre, beuë avec eau si on a la sicure, & avec vin sans sicure.
- C Mais si c'est Marū, elle est tresinguliere (comme Galien dit de Marum) pour mettre en la cōposition de tous Antidotes, & pareillement pour la meller avec tous vnguens odoriferans & rechauffans, com me l'vnguentum Amarinum & semblables.
- D Le Marū cōme dit Dioscoride, a semblable tēperament & facultés que le Sifymbriū que nous appellōs Mente aquatique, & profite grandement appliqué sur vicerēs rongeis, & sert à toutes maladies froides.

## De l'Origan. Chap. LVIII.

## LES ESPECES.

L'Origan est de trois sortes, à sçauoir, le Cultiué, le Sauvage, & celuy qu'on appelle Origan si onitis

*Origanum heracleoticum*. Origan cultiué.

*Origanum hylacstre*.

Origan sauvage.



LA FORME.

- A** La premiere espece a les tiges dures, rudes, aucunes fois rougeatres, & là dessus rondes feuilles & blanchatres, plus petites que cel les du Sauvage, & non velues, au reste aucunement semblables en figure. Les fleurs ne croissent point par couronnes, mais en forme de petits espis assis sur queuez minees au plus haut de la tige. Puis apres survient vne petite semence.
- B** La seconde espece a les feuilles plus blanches, & n'a point si gran de vertu, au reste non guere differente de la premiere. Elle est in connue en ce pais.
- A3** La tierce espece Sauvage a moult de tiges rondes, noiratres, lon gues & velues, les feuilles rondes lattes, lanugineuses, plus grandes que celles du Pouliot. Les fleurs rougeatres, croissans plusieurs en semble en forme de bouquets. La graine petite, & rouffatre. La ra cine longue dure & ligneuse.
- B** Il se trouue vne sorte de ceste tierce espece portant fleurs blan ches comme neige, d'odeur & faueur plus forte que le susdict Sau uage, au reste luy ressemblant du tout.
- C** Encores sen trouue il vne tierce espece laquelle on appelle co munement Mariolaine d'Angleterre. C'est vne herbe basse, non guere dissemblable à l'Origan sauuage, ayant feuilles rondes lattes brunatres, plus petites q̄ celles du Sauvage, non velues, mais vnies & polyes. Les fleurs sont purpurées en rouge, & croissent par cou ronnes. La racine est ligneuse. **LE LIEV.**

Marum quibusdam.  
Mariolaine d'Angleterre.



Ces herbes croissent en Candie, & autres pais chauds, aucunes fois aussi en Espagne: On les plante icy aux iardins.

LE TEMPS.

- A** La premiere espece florit fort tard en ce pais, encore ne florit elle pas sinon quand l'asté est bien chaud. L'Origan sauuage & ses especes, florissent à la myxité.

LES NOMS.

Ces herbes s'appellent en Grec *ὄριγανον*, en Latin *Origanum*.

- A** La premiere se nomme *ὄριγανον ἰσπανικόν*, *Origanum heracleoticum*, & d'aucuns Castils: icy és Boutiques *Origanum Hispanick*, pour ce qu'on l'apporte sec des Espagnes à vendre en Anuers, voila dequoy les Brabantons l'appellent *Origanum* selon l'Espagnol.
- B** La seconde s'appelle *ὄριγανον ὄνιτις*, *Origanum onitidis*, in connue en ce pais.
- B** La tierce s'appelle en Grec *ὄριγανον ἄγριον*: en Latin *Origanum sylvestre*, c'est à dire Origan sauuage.
- A** La premiere est communement vsurpée és Boutiqs de ce pais pour Origan, & s'appelle en François Origan sauuage & Mariolaine bastarden haut Aleman *Wosien wolgentat*: en bas Aleman *Wariolofyne*.
- B** La seconde se peut nommer Origan sauuage à fleurs blanches.
- C** La tierce s'appelle Mariolaine d'Angleterre en François: en bas Aleman *Engelische Wariolofyne*. Et est tenue en aucunes Boutiques, & pareillement d'aucuns Herboristes pour *Marum*.

LE TEMPERAMENT.

Toutes les especes d'Origan sont chaudes & sèches au tiers degre, L'vne n'est pas plus forte que l'autre. **LES VERTVS ET OPERATIONS.**

L'Origan cuit en vin & beu, profite aux morsures de bestes venimeuses, ou piqures de Scor pion & d'Aragnes. Et avec vin cuit est vile à ceux qui ont pris excessiuement de la Cigue, ou ius de Pauot, qu'on appelle *Opium*.

Iceluy beu avec eau est de grande efficace cõtre douleurs d'estomach, & costõs ou trenchées qui viennent au tour du cuer, & fait faire legere digestiõ: & pris avec hydromel lasche le ventre tout doucement, purge par bas les humeurs adustes & melancholiques, & puoque le flux mestrual.

Iceluy mengé avec figues profite grandement aux hydropiques, & contre conuulsions.

On le baille aussi vtilement à lescher avec miel, cõtre la toux, pleureche, & oppiliatiõs de poumons. Le ius d'Origan est de grande efficace contre tumeurs des amigdales, & du gozier, & guerit les vlcères de la bouche.

Le mesme ius attiré par le nez, purge le cerueau, & oste des yeux la couleur iaune qui demeu re apres auoir en la iaunisse.

- G Il appaise aussi d'ouleurs d'oreilles distillé dedans avec du lait.  
 H Il vaut contre toute sorte de gratelle, rudesse de cuir, demagefon, & contre la maulnése, si on se baigne en la decoction d'iceluy faicte en eau, ou si seulement on s'en lave le corps.  
 I La mesme herbe meslée avec vinaigre & huile, est vilement appliquée avec laine sur contusions, meurtrissures & dislocations des parties.  
 K L'Origan sauvaige portant fleur blanche, a singuliere vertu contre toutes lesdictes maladies, comme dit Galien.

## Du Tragoriganum.

## Chap. LIX.

## LES ESPECES.

TRagoriganum est de deux sortes, comme Dioscoride a laissé par escrit.

## LA FORME.

*Tragoriganum alterum.*

- 1 La premiere espece ressemble assez à l'Origan, sinon qu'il a les tiges & fueilles plus tendres.
- 2 La seconde espece a beaucoup de tiges ligneuses, rougeâtres, les fueilles assez larges, & brunâtres, plus grides que le Serpolet vulgaire, & vn peu rudes & reuestues d'vn petit poil. Les fleurettes sont purpurées, & croissent en forme de couronne au plus haut de la tige.

## LE LIEV.

Ces herbes ne sont pas communes en ce pais, mais se trouvent seulement es jardins de diligens Herboristes.

## LE TEMPS.

Le Tragoriganum florit icy en Aoust.

## LES NOMS.

Cette espece d'Origan s'appelle en Grec *τραγοριγανον* & en Latin *Tragoriganum*, cest à dire en François Origan de bouq.

- 2 La seconde espece se nomme aussi *Prasium* & d'aucuns de ce pais a esté tenu pour le Thym.

## LE TEMPERAMENT.

Le Tragoriganum est chaud & sec, comme l'Origan: Dauantage il a aussi quelque vertu astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoction de Tragoriganum beue faict bon ventre, & euacue les humeurs cholériques, & prise avec vinaigre profite au mal de ratelle.  
 B Le Tragoriganum est fort bon contre fluctuations d'estomach & rouchez acides qui prouiennent d'iceluy, & contre hennie de vomir qu'on a sur la mer.  
 C Tragoriganum meslé avec miel & souuent lesché, ayde contre la toux & courte haleine.  
 D Il prouoque l'vrine, & faict venir les fleurs aux femmes: Iceluy induict avec farine de Polenta a puissance de dissoudre les cedemes.

## Du Basilic.

## Chap. LX.

## LES ESPECES.

LE Basilic est de deux sortes Domestique & Sauuaige. Le Domestique est aussi de deux sortes, l'vn grand & l'autre petit.

## LA FORME.

Le grand Basilic a les tiges rondes, fort branchues, sans fueilles de couleur verde pallissante, & bien pres semblables aux fueilles de la Mercuriale. Les fleurs sont à peuuiron des tiges, purpurées aucunes fois, l'autre fois blanches comme neige. Icelles tombées vient vne graine petite, noire. La racine est longue avec plusieurs filandres.

La seconde espece, n'est guere dissemblable à la susdicte. Les tiges sont rondes sans plusieurs branches



Ocimum minus.

Grand Basilic.

Ocimum minus.

Petit Basilic.



branches collaterales. Les feuilles crenées tout au tour, beaucoup plus petites & celles du grand Basilic. Les fleurs ressemblent fort à celles du Grand

Ces deux especes sont d'odeur fort amiable & singuliere, surmontés en force d'odeur la Mariolaine, & de fait, elles ont l'odeur si forte, qu'elles font mal de teste quand on les faire par trop souuent, ou par trop long temps.

- 3 Le Basilic sauvage a les tiges quarrées, velues, reuestues de petites feuilles, fort semblables à celles du petit Basilic, plus petites toutesfois & velues. Les fleurs petites, assez semblables aux fleurs du Basilic. La racine fibreuse se traîne le long de la terre, & reictant tous les ans de nouveau, ce que ne font les deux autres Basilics domestiques, lesquels doivent estre semés tous les ans.

#### LE LIEU.

Le Basilic domestique est semé aux jardins.

Le sauvage vient en terre sablonneuse, & haut esleuée.

#### LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent en Juin & Juillet.

#### LES NOMS.

- 1.1 Le Basilic domestique s'appelle des Anciens en Grec *οκίμνον*, & *οκίμνον*; en Latin *Ocimum*, & d'aucuns *Basilicum*, c'est à dire royal, maintenant *Ocimum variophyllum*; en haut Aleman *Basilg*, *Bas*

Acinos. Basilic sauvage.



sigram: en bas Aleman *Basilicom.*

Le Basilic sauuage, s'appelle en Grec *ἄκιν & ἄκιν* : en Latin *Acinus* & d'aucuns *Ocims* :  
 frum: en haut, Aleman *wild Basilgim*: en bas Aleman *wilde Basilicom.*

LE TEMPERAMENT.

Le Basilic domestique est de complexion chaude & humide.

Le Sauuage est chaud & sec iusques au deuxiesme degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Anciens medecins sont en differant quant aux vertus du Basilic. Galien dit que pour son humidité superflue, il n'est pas bon pris par dedens le corps. Dioscoride, qu'iceluy mengé trouble la veüe, & engendre ventosités, & ne se digere pas facilement. Pline escrit, qu'iceluy mengé est fort bon & propre à l'estomach, & que beu avec vinaigre, il chasse les ventosités, & arreste l'appetit de vomir, prouoque l'vrine, & avec ce qu'il est bon aux hydropiques & à ceux qui ont la nullisse. Les Medecins modernes disent qu'il fortifie le cœur & le cerueau, resiouyt & recrée, & profite contre tristesse & melancholie, & que prins avec vin guerit la toux enuieillie.
- B Iceluy selon Galien est vtilement appliqué par dehors, car il digere & meurtist. Parquoy, comme Dioscoride dit, iceluy induict avec farine d'orge, huile rosat, & vinaigre, donne alliegéce aux phlegmons.
- C Le Basilic broyé avec vin appaise la douleur des yeux: le jus d'iceluy nettoye & mondifie les yeux & en oste l'obscurité, & seche les catarrhes tōbans sur iceux souuent distillé dedés les yeux.
- D Iceluy frotté avec vinaigre, & donné à sentir à ceux qui sont esuanouys, les fait reuenir à eux. Et la semence d'iceluy, donnée à flairer fait esterner.
- E L'Acinus arreste flux de ventre & le desordōné flux mēstrual, prins en quelque sorte q̄ ce soit.

Du Pymment.

LA FORME.

Ceste herbe a au commencement de petites feuilles profond incisées tout à l'entour, & ve lues, rouges en purpurée par dessous: puis elle produit vne tige droicte, ronde, d'environ la hauteur d'vne pausme, ou d'vn pied, ayant plusieurs branches à costé, tellement qu'elle ressemble à vn arbrisseau: les feuilles qui y croissent sont longues, profond decoupees, velues, & ridées, grasses au toucher, semblables quant à la forme aux premieres, plus longues toutesfois & non rouges. La semence est amassée au tour des branches en forme de petites grapes de raisins. La racine est tendre & fibreuse. Toute l'herbe est d'odeur fort amiable, & quand la graine est meure, elle se seche, & deuenit toute iaulne, & d'odeur plus forte. LE LIEV.

Ceste herbe vient en plusieurs lieux de France apres des eaux: elle ne croist point en ce pais s'elle n'y est semée: mais là où elle est vne fois semée, elle y vient facilement tous les ans.

LE TEMPS.

Elle pduit sa graine amassée en Aoult, & est propre à cueillir en Septembre. LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ἄκιν*, & en Latin *Borrys*, d'aucuns en Cappadoce, selon que Diosc. recite, *Ambrosia incognue* és Boutiques: en haut Aleman *Trausstrant*, & là selon en bas Aleman *Drupuzcuyt*, cest à dire l'Herbe aux grappes.

LE TEMPERAMENT.

Le Pymment est chaud & sec au second degré & de parties subtiles.

LES VERTVS ET OPERAT.

A Le Pymment bouly en vin est vtilement beu de ceux qui

Chap. LXI.

*Borrys.*

*Pymment.*



qui ont le thorax estouppé & courte haleine, ou ne peuvent respirer, car elle incise & consume les grosses humeurs, & phlegmes visqueuses amassées aux poulmons & en la poitrine.

Il prouoque l'vrine & fait venir les fleurs aux femmes, pris comme dessus.

Il est aussi fort bon en viandes comme Hyslope, Thym & autres semblables, donnant aux viandes bonne odeur & bonne saveur.

Le Pymment sec mis en garderobes donne aux vestemens vne odeur gratieuse, & les preserue de vermine.

## De la Mente. Chap. LXII.

## LES ESPECES.

LA Mente est diuersé, tant en forme, qu'en maniere de croistre: car l'une est Domestique, l'autre Sauvage. La Domestique est de quatre sortes, à sçauoir Mente crespue, Baulme crespue, Mente nostre Dame, & Herbe de cœur.

La Sauvage est de deux sortes, la Mente cheualine, & la Mente aquatique.

*Menta sativa prima.*


Mente crespue.

*Menta sativa secunda.*

Baulme crespue.

*Menta sativa tertia.*

Mente de nostre Dame.



## LA FORME.

- 1 La premiere espece de Mente domestique a les tiges quarrées, noirâtres & houeues, ains sueil les quasi rondes, crenées tout au tour, de couleur verte obscure, d'odeur fort plaisante & bonne. Les fleurs sont rougeâtres & croissent à l'enueir de la tige par couronnes, comme au Pouliot. La racine est fibreuse & se traine le long de la terre, jettant puis çà puis là de nouveaux reiettons tous les ans.
- 2 La seconde espece est fort semblable à la premiere de feuilles rondes, noirâtres, & odoriferantes, de tiges quarrées, & de racines se tramans par terre, mais la fleur au sommet des tiges est comme vn petit espi.
- 3 La tierce espece a les feuilles longues, étroites, pres semblables aux feuilles de Saule, plus grandes

des toutesfois, plus blanches, plus douces & velues. Les fleurs croissent au plus haut des tiges en forme d'espi, comme à la secon de espece. La racine est tendre se traynant, fibreuse, reiettant en plusieurs lieux comme les autres.

*Menta sativa quarta.*  
Herbe de cœur.

*Mentastrum.*  
Mente cheualine.

*Sisymbrium.*  
Mente aquatique.



La quatriesme espece ressemble à la susdicte de feuilles, tiges & racine, sinon que les fleurs ne font pas tournées en forme d'espi au plus haut de la tige, mais environent la tige comme par couronnes, ainsi qu'en la Mente crespue.

La cinquieme espece de Mente, qui est la premiere des Sauvages, appellée Mente cheualine à 5 les tiges quarrées, velues, & les feuilles languettes, ridées & douces, reuestues d'une laine douce par dessus & par dessous. Les fleurs croissent au plus haut des tiges en forme d'espi. La racine est tendre & fibreuse.

La seconde espece Sauvage, qui est la sixiesme entre les Mentas, appellée Mente aquatique, ressemble à la Mente crespue de tiges, feuilles, & racines traynantes, sinon qu'elle a les feuilles & tiges plus grâdes, & est de plus forte odeur. Les fleurs sont purpurées, assises au plus haut des tiges par petits Bouquets, qui ressemblent à petits ronds chapiteaux.

#### LE LIEU.

Les Mentas satives, se trouuent en ce pais aux iardins, principalement la Mente crespue, laquelle est la plus commune & la plus cognieue.

Les Sauvages viennent en lieux bas & humides, come auprès des ruisseaux & au bord des fossés.

#### LE TEMPS.

Toutes les especes de Mente, florissent pour la plus part en Aoust.

#### LES NOMS.

La Mente cültinée s'appelle en Grec *Μέντα*, en Latin & aux Boutiques *Mentha* en Aleman *Mintze*.

La premiere espece s'appelle en haut Aleman *Weyment*, & *Krausweyment*, c'est à dire Mente crespue; en bas Aleman *Weyment*.



- 2 La seconde Krausmuntz, & Krausßalfsam, c'est à dire Baulme crespu : en bas Aleman *Krausmunte*, & d'aucuns aussi *Speyflighe*.
- 3 La tierce espece s'appelle à present és Boutiques de ce pais *Mente Sarracenicæ*, & *Mente Romana*: en François *Mente* de nostre dame, & *Mente Romaine* : en haut Aleman *Balsam muntz*, *Wespe frauen muntz*, *Speyß muntz*, *Speyßalfsam*: en bas Aleman *Roosfche munte*, & *Balsam munte*.
- 4 La quarte espece s'appelle en Aleman *Speyßkraut*, c'est à dire Herbe de cuer.
- 5 La premiere espece sauvaige qui est la cinquiesme espece de *Mente*, s'appelle en Grec *σισυμβριον* *σισυμβριον*: en Latin *Menthastrum*: en François *Mente cheualine* ou sauvaige: en haut Alemā *Katzenbalsam*, *Roosmuntz*, *Wilde Balsam*, *Wilde Muntz*: en bas Aleman *Witte water Munte*, Il semble bien à voir que ce soit le *Polemonium* d'Abfyrthus.
- 6 La sixième espece sauvaige qui est la sixiesme s'appelle en Grec *σισυμβριον*: en Latin *Sisymbrium*, de *Damegeron* sembron testimoing Constantin l'Empereur: en François *Mente aquatique*: en haut Aleman *Wassermuntz*, *Wassermuntz*: en bas Aleman *Roos munte* & *Roos water munte*.

## LE TEMPERAMENT.

Toutes les especes de *Mente* encores verdes, sont chaudes & seches au second degré : mais sechées elles sont chaudes au tiers degré, signamment, les Sauvaiges, qui sont plus chaudes que les Cultiuées.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 La *Mente* cultiuée prise en viande ou breuvage est fort bonne & vile à l'estomach, car elle le A reschauffe & renfortit, & seche toutes humeurs superflues amassées en iceluy, elle appaise aussi & guerit toutes douleurs d'estomach, & faict faire bonne digestion.

Deux ou trois brins de *Mente* beus avec ius de grenades aspres, appaisent le hocquet & vomit B semens, & guerissent la cholérique pisió, autrement dicté felonie, c'est quand on vomit continu ellement, & qu'on a flux de ventre tout ensemble.

Le ius de *Mente* beu avec vinaigre, arreste le vomissement de sang, & tue les vers ronds. C

Icelle bouille en eauë & beuë par trois iours de suite, guerit trenchées, & la colique, & arreste le D flux menstrual par trop abondant.

La *Mente* cuicte en vin & beuë, donne allegance à femmes qui sont en travail d'enfant. E

La *Mente* mellée avec farine d'orge cuicte, & mise sur tumeurs, les digere & consume. Pareil- F lement icelle appliquée sur le front, guerit douleurs de teste.

Elle est fort vilement appliquée sur mammelles par trop tendues & pleines de lait, car elle G les faict baissier & amollir, & faict que le lait ne se grumelle ou cucille point.

Icelle bien pilée avec sel, est tresinguliere medecine appliquée sur morsures de chiens enragés H

Le rus de *Mente* mellé avec eauë miellée, guerit douleurs d'oreilles distillé dedens, & oste la I rudesse & asperité de la langue, quand on l'en frotte ou lue.

L'odeur de la *Mente*, resiouyt l'homme, pourtant on seme & espard la *Mente* sauvaige en ce K pais és lieux où on faict quelque festin, & és esglises.

- 5 La *Mente* cheualine, n'a pas esté vsurpée en medecine des Anciens.

- 6 La *Mente* aquatique est en plusieurs sortes de semblable operation que la *Mente* cultiuée: Elle L guerit les trenchées, elle arreste le hocquet & vomissements, & appaise douleurs de teste vsurpée en mesme sorte que la cultiuée.

- 7 Elle est aussi singuliere contre la pierre & grauelle des rognons, & quid on ne peut piffer que N goutte à goutte, bouille en vin & beuë.

On l'applique aussi fort vilement sur piqueres de mouches à miel, & de guespes. O

## Du Calament. Chap. LXIII.

## LES ESPECES.

Ily a trois sortes de Calament descrit par les Grecs anciens, ayans chacune son nom particulier, & different.

## LA FORME.

- 1 La premiere espece, qui se peut appeller Calament de môtaigne a les tiges quarrées, reueffues d'une laine molle. Les fueilles sont quelque peu semblables aux fueilles du Basilic, plus rudes tou tesfois. Les fleurs croissent seulement d'un costé de la tige entre les fueilles, aucunesfois trois ou quatre à vne queuë. La racine est fibreuse.

Ceste herbe entiere ne ressemble pas trop mal à la seconde espece de Calament, sinon qu'elle est plus grande, elle a les tiges plus dures, les fueilles plus rudes & noyrtres, & ne se traîne point mais s'eleue de terre.

- 2 La seconde espece appellée Pouliot sauvaige, a aussi les tiges quarrées, vestues d'une laine molle,

*Calaminthe alteram genus.*  
Pouliot sauvage.



*Calaminthe tertiam genus.*  
Herbe de chat.



molle, & bien pres se trainans par terre, aians tousiours deux à deux fueilles, l'une contre l'autre, petites & douces, non par trop differentes aux fueilles du Pouliot, sinon qu'elles sont plus grandes & plus blanches. Les fleurs croissent par couronnes au tour des tiges, de couleur purpurée en bleu. La racine gresse & fibreuse.

La tierce espece qu'on appelle en ce pais Herbe de chat, n'est guere differente (comme Dioscoride aussi tesmoigne) à la plus blanche Mente sauvage. Elle produit les tiges quarrées, douces, fort noüeuses, & à chacun neud deux fueilles l'une cõtre l'autre, & aussi entre deux, des petites branchettes. Les fueilles ne sont point trop dissemblables aux fueilles de Mente cheualine, siñõ qu'elles sont vn peu plus longues, crenées tout à l'entour, aians la forme des fueilles de l'Ortye, douces routesfois & blanches, principalement au costé de dessous. Les fleurs croissent le plus souuët au plus haut de la tige en forme de couronne. La racine est tendre & fibreuse.

#### LE LIEV.

La premiere espece comme dit Dioscoride croist en lieux montaigneux. En ce pais elle est plantée és iardins des Amateurs des herbes.

La seconde espece prouient en ce pais és champs reposés, & sur aucuns tertres.

La tierce espece croist par tout és iardins, & est fort bien cogneue en ce pais.

#### LE TEMPS.

Toutes les especes de ces herbes florissent pour la plus part en Iuin & Iuillet.

#### LES NOMS.

Ceste espece de mente se nomme en Grec *καλαμίνθη*: en Latin *Calamintha*: és Boutiques *Calaminthe*: de Plinè & Apuleie *Mentastrum*.

La premiere espece s'appelle és Boutiques *Calamentum montanum*, c'est à dire Calament de montaigne: en haut Aleman *stirn, oder serch stumy*.

La seconde espece s'appelle en Grec *γαλχων ἄφρον*: en Latin *Pulegium Sylvestre*, & *Nepita*: en haut Aleman *Kommunty, wilder Poley*, c'est à dire Pouliot sauvage: en bas Aleman *wilde Poley*.

leze, & Best Munte.

3 La tierce espece s'appelle à present es Boutiques *Nepita*: en haut Aleman *Katzennuntz*: en bas Aleman *Katzenwurt* & *Wepre*. LE TEMPERAMENT.

Ces herbes sont chaudes & seches au tiers de degré principalement la premiere espece, qui se cueil le aux montaignes. LES VERTUS. ET OPERATIONS.

Le Calamêt cuit & ben, ou appliqué par dehors, ayde grandement aux morsures de bestes A venimeuses. Le mesme beu au parauant avec vin, resiste & contregarde la persone de tout venin nuisible, & chasse & fait fuyr toutes bestes venimeuses de là où il est espendu ou bruslé.

Iceluy beu avec caue muelée reschauffe le corps, & incise les grosses humeurs, & chasse toutes B frissons, & fait suer. Il a pareille vertu si on le cuit en huile, & on en frotte tout le corps.

Le Calamêt beu en la mesme maniere profite à ceux qui sont tombés de haut, & qui ont quel C que contusion, & rompüre; car il digere le sang caillé & meurtry, & est bon contre douleur de boyaux, courte haleine, oppilations de poitrine, & contre la tauin. se.

Iceluy cuit en vin & beu, prouoque l'vrine, & les fleurs aux femmes, & pousse hors l'enfant D mort, & pareillement si on l'applique par dessus en forme de pessus.

Il profite fort aux ladros s'ilz en mengent, en beuuant puis apres du meque de lait doux. E

Iceluy mangé cru, ou cuit en viandes, ou beu avec sel & miel, tue & chasse hors toutes sortes F de vers, en quelque endroict du corps quilz soyent. Pareille vertu a le ius beu, & mis en quelque lieu que soyent les vers.

Il efface aussi cicatrices & meurtrissures noires, quand on le cuit en vin, & que souuent on les G en laue, ou bien l'herbe mesme toute nouvelle cueillie, pilée & appliquée dessus.

Du Coq. Chap. LXIII.

LES ESPECES.

LE Coq est de deux sortes, Grand & Petit, se ressemblans d'odeur, sucilles, & semence.

*Balsanita maior.*

Grand Coq.

*Balsanita minor.*

Petit Coq.



## LA FORME.

Le grand Coq a les tiges gressées, rondes, dures les feuilles longues, assés larges, verdés en blanchissant, crenées à l'entour, mais fort peu. Les fleurs croissent par bouquets; & ne sont autre chose que petis boutons jaunes, fort semblables aux fleurs de l'Athanasie, sinon qu'elles sont plus petites. La racine est fibreuse, produisant plusieurs tiges & branches, & liurant tous les ans de nouveaux jetons. Toute l'herbe est d'odeur forte, mais plaisante, & de goust amer.

Le petit Coq ressemble fort au premier & grand Coq tant en tiges, fleurs & semence; que en l'odeur & saveur, plus petit toutesfois en toutes sortes & non si haut élevé. Les feuilles sont beaucoup plus petites, plus estroictes, & fort profond incisées tout à l'entour. La racine est aussi fibreuse, produisant tous les ans beaucoup de nouveaux jetons.

## LE LIEU.

On les plante toutes deux en ce país és jardins, principalement la première; laquelle est fort commune par tous les jardins.

## LE TEMPS.

Le Coq florit en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

La première espèce s'appelle en Latin *Balsamita maior*; és Boutiques de ce país *Balsamita*, d'aucuns *Menta Græca*, *Salvia Romana*, *Lassulata*, & *Herba diuina Maria*; en haut Aleman *framentkraut*; en bas Aleman *Basseme*. Il semble auoir grande similitude avec le *Passacæ checonium* de Theophraste.

La seconde espèce s'appelle en ce país *Balsamita minor*; en Languedoc *Herba diuina Maria*; en Italie *Herba Giuila*. Et est tenué par aucuns pour *Asparagoy*, *Ageratum* de Dioscoride; des autres pour *Élixypur*, *Elichrysum*; & des autres pour *Espartetus Mesue*. Selon nostre opinion, ce n'est nulle des trois; mais estimons que soit vne herbe non descrite de Dioscoride.

## LE TEMPERAMENT.

Ces deux herbes sont chaudes & seches au second degré; comme leur odeur & saveur amère le monstre.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A** Les feuilles du grand Coq à part elles, ou avec la graine de Pastenade sauvage boullies en vin & beués, guérissent trenchées de ventre, & la dysenterie.
- B** La conférie faicte des feuilles d'iceluy avec sucre, reschauffe & seche le cerueau, ouurant les obstructions d'iceluy, & est fort bonne pour arrester toutes fluxions desordonnées & catarrhes, prinse à la grosseur d'vne feue.
- C** On en vse aussi en viandes comme de la Sauge & herbes semblables, principalement és tourteaux aux œufs, à quoy elle est fort propre & leur donne bonne saveur.
- D** Le petit Coq, tout ainsi qu'il ressemble au grand d'odeur & saveur, aussi faicte il de vertus & operations, & se peut tousiours prendre & vsurper pour le grand.

## De la Sauge.

## Chap. LXV.

## LES ESPECES.

IL y a deux especes de Sauge, l'vne petite & franche, l'autre grande. La grande est de trois sortes verte, blanche & rouge.

## LA FORME.

La Sauge franche a plusieurs brâches ligneuses, & les feuilles assises sur longues queues, qui sont longues, estroictes, mal vnies, grisâtres en blanchissant, à costé desquelles y en croist deux autres fort penes comme deux petites aureilles. Les fleurs croissent le long des tiges, semblables en figure aux fleurs de l'Ortye morte, pl<sup>us</sup> petites toutesfois. La graine est noirâtre. La racine ligneuse.

La grande Sauge ne ressemble pas trop mal à la Sauge franche, sinon qu'elle est plus grande: les tiges sont quarrées & noirâtres. Les feuilles rudes, inégales, blâchâtres, semblables aux feuilles de la Sauge franche, beaucoup plus grandes toutesfois, plus rudes, & sans aureilles. Les fleurs, semence, & racine sont pareilles à l'autre.

Il se trouue vne autre espèce de ceste grâde Sauge laquelle produict feuilles blanches comme neige, aucunes fois du tout, aucunes fois à desny, laquelle on appelle Sauge blanche.

Encores se trouue il vne tierce espèce de la grande Sauge, appellée Sauge rouge, les tiges de laquelle, les nerfs des feuilles, & les petites feuilles qui ne sont que sortir sont rouges: au reste du tout semblable à la grande Sauge.

## LE LIEU.

La Sauge, comme dit Dioscoride, croist en lieux rudes & pierreux, On plante toutes les deux especes bien pres par tous les jardins de ce país.

Salvia minor. Saugé franche.

Salvia maior. Grande Saugé;



## LE TEMPS.

La Saugé florit en Juin &amp; Juillet.

## LES NOMS.

La Saugé s'appelle en Grec *ἰαλίωρον* &c. en Latin & es Boutiques *Salvia*; d'aucuns *Corfolium*; en haut Aleman *Saltze*; en bas Aleman *Sante*.

1 La premiere espece s'appelle à present en Latin *Salvia minor*, *Salvia nobilis*, & d'aucuns *Salvia officinalis*; en François Saugé franche; en haut Aleman *Spitz saltze*, *Klein saltze*, *Edel saltze*, & *Creutz saltze*; en bas Aleman *Crups saute* & *Doehens saute*.

2 La seconde espece s'appelle en Latin *Salvia maior*, & d'aucuns *Salvia agrestis*; en François grande Saugé; en haut Aleman *Groß saltze*, *Breit saltze*; en bas Aleman *grou & groote Sante*.

## LE TEMPERAMENT.

La Saugé est chaude &amp; seche au tiers degré, &amp; vn peu astringente.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

La Saugé cuicte en vin & beue, prouoque l'vrine, rompt la pierre, conforte le cueur, & apaise A douleur de teste.

Les femmes grosses la peuvent vilement manger, car, comme dict A ce, elle ferme la matrice, B & fait viure le fruit & le fortifie.

La Saugé rend ausi les femmes fort fertiles, & pourtant par cy deuant en Egypte apres grand C de pestilence on contraignoit les femmes de boire le ius d'icelle, afin de conceuoir & produire force enfans.

Le ius de la Saugé beu avec miel à la quantité de deux verres pleins, disoit Orpheus, est fort vni D le à ceux qui crachent & vomissent sang, car il arreste incontinent le flux de sang. Pareillement la Saugé escachée & appliquée arreste le sang des playes.

La decoction d'icelle boulie en eau & beue, guerit la toux, ouure les oppilations du foye, & E apaise douleur de costé; & boulie avec Aloyne arreste la dysenterie.

F La Saugé est vñlement appliquée sur playes & morſures de beſtes venimeuſes, car elle les mô Theophrasti. diſſe & guerit.

G Le vin auquel Saugé a bouly appaiſe la demâ gefon des parties hôteuſes, ſi on les laue d'icelle.

De la Saugé fauage. Cha. LXVI.

LA FORME.

L La Saugé fauage reſemble aucunement à la Saugé cultivée, de figure & d'odeur, elle produiſt tiges quarrées & noirâtres, reueſtues d'un petit poil, les fueilles non trop différentes à celles de la grande Saugé, mais vn peu plus larges, plus courtes, & plus douces. Les fleurs ne ſont guere diſſemblables aux fleurs de la Saugé, croiſſant ſeulement d'un coſté le long des tiges juſques au plus haut: icelles paſſées vient vne graine ronde & noirâtre. La racine eſt fibreuſe, reiettant de nouveau tous les ans. LE LIEV.

Ceſte Saugé fauage prouient en ce pais le lôg des hayes, aux boys & aux bors des campagnes

LE TEMPS.

Elle fleurit en Juin & Juillet.

LES NOMS.

Ceſte herbe ſ'appelle en Grec par Theophraste au 6. liure, chap. 1. de ſon Hiſtoire des plantes *σφακίαν*. en Latin *Sphacelus*: On la nôme maintenant es Boutiques *Sabaia egreſſis* & *Ambrosiana*: en haut Aleman *wifd Salfbey*: en bas Aleman *wif de Sauer*. LE TEMPERAM.

La Saugé fauage eſt chaude & ſeche, aſſes cõ forme en complexion à la Saugé.

LES VERTVS ET OPERAT.

A La Saugé fauage diſſout le ſang caillé dedans le corps, & guerit les playes du dedens: outre ce elle ayde merueilleuſement à ceux qui ſont tombés, battus: à contuſions & meurtriſſures boullie en cauë ou vin, puis beuë.

B La Saugé fauage priſe en ſemblable forte digere les apoſtemes & tumeurs interieures faiſant fortir avec l'yrine la matiere d'icelles.

De l'Oruale. Chap. LXVII.

LA FORME.

L Oruale a tiges quarrées, ayés fueilles rudes, grâtes, velues, & mal vnies, bien pres ſemblables aux fueilles de la grãde Saugé, quatre ou cinq fois plus grandes. Les fleurs ſont bleuës, tirans ſur le blanc, plus grandes que celles de la Saugé. Et quand elles ſont tombées, il ſuruiët es calyces vne ſemence noire. La racine eſt iaulne & ligneuſe. Toute l'herbe eſt d'vne odeur forte & penetrante, tellement que la ſaueur faiſt mal de teſte.

On la ſeme en ce pais aux iardins.

LE TEMPS.

L Oruale fleurit en Juin & Juillet, vn an apres quelle a eſté ſemée.

LES

Saugé fauage.



## LES NOMS.

L'Oruale s'appelle maintenant en Latin & es Boutiques *Galliericum*, *Marrifolius*, *Centrum galli* & *Searle*; en haut Aleman *Scharfack*; en bas Aleman *Scharfey*. Il semble que ce soit vne espece de *Horminum*, ce neant moins ce n'est pas *Alectorolophos* comme aucuns pensent.

## LE TEMPERAMENT.

L'Oruale est de complexion chaude & seche, paruenant bien pres iusques au tiers degre.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

L'Oruale prise en quelque sorte que ce soit, prouoque le flux menstrual des femmes, pousse A hors la secondine, & incite au ieu d'amours.

Elle enyure aussi & fait douleur de teste, pourtant est elle boulie avec la Biere par aucuns B Brasseurs, au lieu de Houblon.

Icelle a aussi toutes les vertus de *Horminum*, & peut estre vsurpee au lieu d'iceluy.

## De Horminum.

## Chap. LXVIII.

## LES ESPECES.

IL y a deux sortes de *Horminum* selon Dioscoride, Le Cultive & le Sauvage.

*Horminum sativum*. *Horminum cultive*,

*Horminum silvestre*, *Horminum sauvage*.



## LA FORME.

i Le *Horminum cultive* a les feuilles quasi rondes, vn peu recueuses d'vne laine douce, bien pres comme le Marrube. Les tiges quarrées, d'environ vn pied de haut, produisant tout au plus haut cinq ou six belles feuillettes peres en bleu; les feuilles viennent à chacune ioincture, l'vne contre l'autre, entre lesquelles croissent petits calyces portans vne fleur bleue en pers, lesquels, quand la graine commence à meurir, se courbent vers terre & pendent en bas, & contiennent vne graine noire & longette, laquelle apres auoir trempé en quelque liqueur, deuiet glueuse, bien pres comme les pepins de la pomme de coing.

Le Horminú sauvage porte grâdes fueilles, larges, eschardees tout au tour. Les tiges ausi quarrées & vn peu velues, plus longues toutes fois, & pl<sup>us</sup> grosses q<sup>ue</sup> le Cultiué. Les fleurs sont perses, croif sans ausi par courônes à l'enuirô de la tige, en petis calyces se courbâs ausi en bas quâd la semence est meure, laquelle est noiratre, ronde, & glueuse estât mouillée. La racine est ligneuse & noire.

Ces deux herbes n'ont point d'odeur particuliere, principalement la Cultiuée: car les fleurs du Sauvage flairent vn peu l'Oruale. **LE LIEV.**

Les deux especes se trouuent en ce pais semées és jardins des Amateurs des herbes.

**LE TEMPS.**

Elles liurent leurs fleurs en Iuillet & Aoust, & aucunes fois ausi leur graine meure.

**LES NOMS.**

C'este herbe s'appelle en Grec ὀρνισσός: en Latin *Horminum* & *Geminale*.

La premiere s'appelle *Horminum satiuum* & *hortense*. La seconde *Horminum syluestre*.

**LE TEMPERAMENT.**

*Horminum* est de nature chaude & seche.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

- A** La graine d'*Horminum* meslée avec miel chasse l'obscurité des yeux, & esclarcit la veue.  
**B** Iceille broyée en eauë tire hors les espines & eschardes, & resout toistes fortes d'ensifures, appliquée dessus. Semblable vertu a ausi l'herbe verde eschachée, ou broyée & appliquée dessus.  
**C** La mesme graine beuë avec du vin, incite au ieu d'amours, signamment la graine du sauvage, laquelle est de plus forte operation que celle du Cultiué.

**Du Marrube.****Chap. LXIX.****LES ESPECES.**

**I**l y a trois especes de l'herbe appelée Marrube, de figure semblables l'vne à l'autre, lesquelles ont eu des Anciéns chacune vn nom particulier, voire sans la quatriesme, laquelle n'a pas esté descritte des Anciéns. La premiere est le Marrube blanc. La seconde est le Marrube noir ou puant. La tierce est la Sauge sauvage. La quatriesme est le Marrube d'eauë.

*Marrubium.*

Marrube blanc.

Ballote.

Marrube noir.





LA FORME.

1 Le Marrube blanc a plusieurs tiges quarrées, chenues. Les feuilles rondes, froncées, velues, cendrées, d'odeur non ingrante. Les fleurs blanches, sortans de petites gosses aigues & piquantes, en uironnans la tige en forme d'aneau, ausquelles, apres que la fleur est perie, se trouue la graine rude & ronde. La racine est noire, avec plusieurs fibres.

2 Le Marrube noir ressemble au cunement au Marrube blanc. Les tiges sont aussi quarrées & velues, noires toutesfois. Les feuilles sont plus grandes, & plus longues que les feuilles du Marrube blanc, crenées tout à pentour, bien pres semblables aux feuilles de l'Ortye, noires, d'odeur forte, & ingrante. Les fleurs sont purpurées, semblables à l'Ortye morte, croissans à l'enuir de la tige comme au Marrube blanc.

Stachys. Sauge sauuage.

3 La Sauge sauuage a la tige ronde fort nouëuse, reuestue d'une petite laine blanche: Les feuilles sont toujours deux à deux de chacune ioincture, blanches aussi & velues, bien pres semblables aux feuilles de Marrube blanc, mais plus lègues & plus blanches. Les fleurs croissent en forme de petites couronnes au tour de la tige, & de couleur iulne. La racine est ligneuse & de durée. Toute l'herbe ne differe rien en odeur du Marrube blanc.

Outre celles là il y a encore vne herbe appellée Sauge sauuage odoriferante, laquelle produit tiges quarrées, grosses, & lanugineuses: les feuilles blâchâtres, douces, & vn peu crenées tout au tour, plus longues toutesfois, plus larges, & plus grides que celles des autres Marrubes. Les fleurs sôt rouges, croissans en forme de couronne à pentour des tiges. La graine est noire & røde. La racine est iulnatre.



4 Le Marrube d'eau ressemble asses au Marrube noir tant de tiges & gosses piquantes, que de feuilles & de fleurs: Les feuilles sont aussi noir verd, mais plus grandes & plus profond crenées, & nō par trop velues, vn peu froncées & plyées comme les feuilles du Bouleau quand'elles commencent à fornr. Les fleurs sont blanches, plus petites que celles des autres Marrubes. LE LIÈV.

Le Marrube blanc, & le noir croissent icy par tout es lieux incultiués, pres des murailles, hayes, voyes & aux bors des chāps. Le troisieme es plaines d'Allemaigne & autre part: En ce pais on ne le trouue sinon aux jardins des Amateurs des herbes. Le Marrube d'eau se trouue abondamment en ce pais pres des fossés, ruisseaux, & en lieux bas & humides.

LE TEMPS.

Toutes ces herbes fleurissent le plus souuent en Iuillet. La Sauge sauuage aussi en Aouust.

LES NOMS.

1 La premiere espece se nomme en Grec *μαρουμ*: en Latin *Morubium*: es Boutiques *Prasium*: en haut Aleman *weiss Andorn*, *Marobel*, *Gottsb Bergif*, & *Andorn memalin*: en bas Aleman *Mastroue*, *Mastreue*, *witte Andorn*, & *Andorn manchen*.

2 La seconde est appellée en Grec *βαμαρκ*: en Latin *Marrubium nigrum*, *Narrubium*: es Boutiques *Prasium fetidum*: en François *Marrubin noir* ou *puant*: en haut Aleman *schwartz Andorn*, & *Andorn weisslin*: en bas Aleman *stuckende* & *stuerre Mastreue* & *Andorn*, ou *Andorn weisslin*.

3 La tierce se appelle en Grec *σταχυς*, & en Latin *Stachys*: incogne es Boutiques: en haut Alemā *stuckende Andorn*, *stuck Andorn*: en bas Aleman *stuckende Andorn*.

4 La quatrieme se appelle à present en Latin *Marrubium palustre*: en haut Aleman *wasser Andorn*, *wasser Andorn*: en Brabant *wasser Andorn*, & d'aucuns l'Herbe des Egyptiens, pour ce que telz coureurs qui se disent Egyptiens, se font noirs de ceste herbe. Aucuns en font la premiere espece de *Sideritis*, combien qu'elle aye petite similitude avec icelle.

## LE TEMPERAMENT.

Les trois premières especes de Marrubin sont chaudes au second degré, & seches au tiers. Le Marrube d'eau est aussi fort desiccatif, mais sans chaleur manifeste.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A** Le Marrube blanc bouli en eau & beu, ouvre & conforte le foye, & la ratelle, & est bon contre toutes oppilations d'iceux il nettoie la poitrine & les poulmōs, d'auantage il pisse fort à la toux enuieillie, à douleur de costé, crachemens de sang enuieilliz, & secheresse & vlceres des poulmons.
- B** Le mesme prins avec la racine d'Iris fait cracher toutes grosses humeurs & phlegmes espelies & assemblées dedans la poitrine.
- C** Pareille vertu à aussi le ius d'iceluy bouli avec ius de Fenouil tant que la tierce partie soit consumée, prins vne cuillierée: & prouffite aussi à la toux enuieillie.
- D** Le Marrube blis bouli en vin, ouvre l'amarry, est bon aux femmes qui ne peuvent auoir leurs fleurs, il fait aussi jeter la secundine, & enfans morts, & ayde mout aux femmes qui ont grand travail, & à ceux qui ont esté mords de serpens & bestes venimeuses.
- E** Le ius de Marrube blanc meslé avec vin & miel, esclaireit la veue distillé es yeux. Le mesme ius versé aux oreilles, appaise la douleur, & ouvre les obstructions d'icelles. Il est aussi vtile tiré par le nez pour oster la visulneur des yeux qui demeure apres la iambuisse.
- F** Les faucilles induictes avec miel sont vtils à vieux vlceres, & ongles mauuax & vlcérés. Les mesmes meslés avec gresse de poule, resouident les strumes qui sont au col. Les faucilles seches & meslés avec vinaigre guerissent vlceres malings & ambulatoiz.
- G** Le Marrubin noir pilé, est vilement appliqué sur morsures de chiens enragés. Les faucilles d'iceluy cuictes sous les cendres chaudes dedans la faucille d'un chou, repoussent les durillons qui viennent au siege, & induictes avec miel, guerissent vlceres pourris.
- H** La Saug sauvage boullie & beuë fait auoir les fleurs aux femmes, & fait sortir l'arteriesais, & le
- I** Le Marrube d'eau n'est point vtil en Medecine. (fruit mort.)

## LES NVSANCES.

Le Marrubin blanc nuyt aux rognōs & vessie, principalement, quād il y a blessure ou exulceratiō

## De la Melisse.

*Melissa vulgaris.*

## Chap. LXX.

Melisse.

*Melissa phylli spreier.*  
Espece de Melisse.

## LES ESPECES.

Sous le nom de Melisse sont cōprises la vraye Melisse, & la Melisse bastarde, lesquelles deux sont aucunement seblables au Marrubin.

## LA FORME.

**1** La vraye Melisse a les tiges quarrées, les faucilles noiratres, seblables au Marrubin noir, plus grē des toutesfois, plus tendres, & non velues, d'odeur amiable, & tirant à l'odeur de citron. Les fleurs sont incarnées. La racine simple, dure & lieneuse.

**2** La seconde espece de Melisse resēble vn peu au Marrubin noir. Les tiges quarrées, les faucilles noiratres & rondatres, d'odeur sentant aucune fois le citrō, aucune fois forte, & mal plaisante. Les

fleurs



fleurs soit blanches, ou palles. La racine est fort fibreuse, se coulit deça delà cõme la racine del'Ortie

Il se trouue encores vne herbe laquelle aucuns tiennēt pour la vraye Melisse (ils s'abusent tous tesfois grandement) Elle a la tige quarrée, les fueilles de la Melisse vulgaire, plus grandes, plus noires & de mauuaise odeur: la fleur blanche & beaucoup plus grande que celle de la Melisse vulgaire. La racine dure & ligneuse. LE LIEV.

La premiere de ces deux herbes croist en quelques boys. La secõde en lieux incultiuēs, pres de vieilles murailles, & aucunesfois aussi pres des voyes: maintenant on les plante toutes deux es jardins. LE TEMPS.

Elles fleurissent en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.

1 La Melisse se nomme en Grec *μελισσισφυλλον* & *μαλίσφυλλον*: en Latin *Apiastrum*, *Melitana*, & *Citragois*: Boutiques *Melissa*: en haut Aleman *Melissenkraut*, & *Mutterkraut*: en bas Aleman *Con filie de greyn* & *Melisse*. LE TEMPERAMENT.

Ces herbes sont chaudes & seches au second degre, semblables au Marrubin, mais de vertus beaucoup plus foibles. LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La Melisse beue avec vin est bone cõtre morsures & piqures de bestes venimeuses. Elle conforte le cuer, & chasse toute melancholie & tristesse, comme les Modernes escriuent. A

On peut vser de la Melisse à tout ce à quoy le Marrube est bon, combien qu'en toutes sortes elle soit beaucoup plus foible, tellement que selon Gal. & Paul Aegi. on ne doit vser en Medecine de la Melisse, sinon en desaut du Marrube, au lieu duquel la Melisse peut tousiours estre vsurpée B

Si on met la melisse aux ruches de mouches à miel, ou si on les en frotte, cela retient les mouches ensemble, & y fait venir les autres. Le mesme saict aussi la seconde comme dict Ruelle. C

2 La Melisse vulgaire profite aux femmes qui ont suffocation de matrice, mengée ou flairée. D  
Le ius d'icelle est vilement mis dedans playes nouvelles, car il les recolle & guert.

De la Rue.

Chap. LXXI.

LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Rue, la Cultiuée & la Sauvage.

*Rosa borrensis.*

Rue de iardin.

*Rosa sylvestris.*

Rue sauvage.



## LA FORME.

La Rue de jardin a les tiges rôdes, dures, sans feuilles parties en plusieurs autres petites feuilles & rôdâtes, de couleur grise ou bleuë en verd, d'odeur tresforte. Les fleurs sont jaunes, croissans au sommet des tiges, apres lesquelles suruiennent siliques quarrées, contenâs la semence noire. La racine ligneuse, jaune par dedés. Ceste Rue dure hyuer & esté, & ne meurt point facilement.

La Rue sauvage ressemble fort à l'autre de tiges, feuilles, fleurs, semence, couleur, odeur, & saveur. Mais que chacune petite feuille est beaucoup plus longue, comme facilement on peut connoistre par la brêchette cy dessus mise, aussi toute l'herbe est de plus forte odeur & ne peut souffrir le froid, mais la faut garder soigneusement en ce pais contre l'hyuer, autrement elle perit incontinent, voire seulement par les premières froidures & quelque forte rimée.

## LE LIEU.

La Rue cultivée se plante es jardins, & ayme terre sèche, & là où le soleil luit beaucoup. La Rue sauvage croist aux montaignes de Cappadoce & de Galatie, en Asie la mineure : en ce pais elle se trouve semée es jardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes deux en ce pais en Juillet & Aoust, & la semence est meure en Septembre.

## LES NOMS.

La Rue s'appelle en Grec *πράσιον* : en Latin *Ruta*, & d'Apulie *Eriphion*.

La Rue de jardin s'appelle en Grec *πράσιον κάρινον* : en Latin *Ruta hortensis* : es Boutiques *R. A. I. the* : en haut Aleman *zam Krauten*, & *würin Krauten* : en bas Aleman *würin Rupte*.

La sauvage s'appelle en Grec *πράσιον ἄγριον* : en Latin *Ruta sylvestris*, & en aucuns lieux comme dit Apulie, *Viperalis* : es Boutiques *Hamel* : en haut Aleman *wald Krauten* : en bas Aleman *wald Rupte*.

## LE TEMPERAMENT.

La Rue est chaude & sèche au tiers degré : Mais la Sauvage, principalement celle qui croist aux montaignes, est beaucoup plus forte que celle des jardins.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A** Les feuilles de la Rue de jardin seules ou boullies en eau & beuës, sont vriner, & prouoquent le flux menstruel, & arrestent le flux de ventre.
- B** Les feuilles de Rue mengées es viandes, ou prises avec noyx, & figues seches estampées, sont bonnes contre tout mauuix ar, cõtre la peste & tout venin, & cõtre morsures de viperes & serpens.
- C** Les mesmes pilées & mengées, ou beuës avec vin, aydent ceux qui sont malades d'auoir mengé champignons venimeux.
- D** Le ius de Rue vsut aussi contre les mesmes accidens, & contre morsures & piqures de scorpions, mouches à miel, guêpes, & taons, & chiens enragés, quand on le prend avec vin, & qu'on met les feuilles broyées avec miel & sel sur la playe.
- E** Celuy qui sera oinct du ius de Rue, ou qui mangera la Rue à ieuu, sera comme dit Pline affermé contre tout poison, & garanti de toutes bestes venimeuses, tellement que nul venin ou beste venimeuse ne luy pourra nuire.
- F** Le mesme ius de Rue beu avec vin, purge les femmes apres l'enfantement, & pouëlle hors la fecondine, & enfant mort, & portée non naturelle.
- G** La Rue prinse en viandes par quelque espace de temps desèche & estainct la nature & semence genitale, & le lait aux mamelles des femmes allaitantes.
- H** La Rue boullie avec Aneth & beuë, appaise trêchées, prouffite aux douleurs de costé & de poitrine, difficulté d'alcine, toux, obstructiõs de poulmõs, goute sciatiq, & contre rigueurs de sieures.
- I** La Rue cuicte avec bon vin tant que la moitié soit consumée, est vtilement beue de ceux qui deuenent hydropiques.
- K** La Rue mengée crue, ou consistée en sel, ou autrement prinse en viandes, esclaireit les yeux & aiguë fort la veuë. Aussi si est pareillement le ius d'icelle induict sur les yeux avec miel, ou ius de Fenõil, ou à part soy. Les feuilles de Rue meslées avec farine d'orge appaisent la douleur des yeux, appliquées dessus.
- L** Le ius de Rue chauffé dedans l'escorce d'vne pome de grenade, & distillé dedans les oreilles, allege les douleurs d'icelles. Le mesme meslé avec huile rosat, ou huile de Laurier & miel, est bon contre le son & bourdonnement des oreilles, quand souuent on le verse goutte à goutte tout chaud dedans icelles.
- M** Les feuilles de Rue pilées avec huile rosat & vinaigre, sont vtilement induictes sur douleurs de
- N** icelles pilées avec feuilles de Laurier, & induictes, dissoluent & guerissent tumeurs & enflures des genitoires.

Les feuilles de Rue mêlées avec vin, poyure, & nitre, leuent toutes taches de la face, & embel-  
lissent la peau : & mêlées avec miel & saum, guérissent toute mauuaise graille. Les mesmes feuilles  
broyées avec oing de pourceau ; guérissent toute rudesse de peau, & tigne, strumes & durillons,  
appliquées dessus.

La Rue mêlée avec miel, adoucit douleurs de ioinctures, & avec figues, elle oste les enflures p  
des hydropiques.

Le jus de Rue donné à flairer avec vinaigre, fait résveiller les Lethargiques, cest à dire qui  
font surpris de profond sommeil.

La racine de Rue mise en poudre & mêlée avec miel, dissout le sang qui est caillé entre la peau R  
& la chair, & corrige toutes meurtrissures, cicatrices & taches surannées au corps, quand on  
les en frotte.

L'huile dedans laquelle la Rue est cuïste, ou long temps trempée, reschauffe toutes parties re- S  
froidées, & prouoque l'vrine, induïste sur l'endroit de la vésie, & prouffite aux oppilations & tu  
meurs de ratelle : & baillée en chystere chasse les ventosités, enflures & douleurs des boyaux.

On dict aussi que les feuilles de Rue pilées & appliquées par dehors dessus le nez, estanchent T  
le sang qui en coule.

Le jus de la Rue sauuaige meslé avec miel, vin, jus de Fenoi, & siel d'une pouille, aiguise la veue, V  
& oste toute tache, & la maille d'iceux. D'auantage la Rue sauuaige a semblable faculté que la Rue  
de iardins, mais beaucoup plus vertueuse, & de fait elle est si forte, que pourtât les Medecins an-  
ciens n'en ont voulu vsér, sinon aux vices & mailles des yeux en la maniere que dessus.

Du Rosmarin.

LA FORME.

LE Rosmarin est vn arbrisseau ligneux, ayant  
plusieurs branches & rinseaux, gresles, durs, li-  
neux, reueclus de feuilles longues & tendres, blan-  
ches du costé deuers la terre, & verdes de l'autre  
costé. Les fleurs sont blanches, ayans quelque peu  
de bleu entremeslé, lesquelles peries s'vriuent vne  
petite graine. La racine & le tronc sont durs & li-  
gneux. Les feuilles & fleurs sont de tresforte odeur  
plaisante toutesfois, & de bon goust.

LE LIEV.

Le Rosmarin croist abondamment en plusieurs  
lieux d'Espagne, & de France, comme Prouence &  
Languedoc. On le plante icy aux iardins, & le gar-  
de on en grande diligence.

LE TEMPS.

Le Rosmarin florit deux fois l'an, l'une fois au  
commencement de l'esté, la seconde fois en Au-  
tunne.

LES NOMS.

Le Rosmarin s'appelle en Grec *βουκαβις* ou *βουκαβισ*  
ou *βουκαβισ* en Latin *Rosmarinum coronarium* : és Bou-  
tiques *Rosmarinus* : en haut Aleman *Rosmarein* : en  
bas Aleman *Rosmarin*. Il s'appelle en Latin *Rosma-  
rium coronarium*, c'est à dire Rosmarin, duquel on  
vse à faire chapeaux & courlandes à la difference de  
l'autre Libanotis qui est de diuerses sortes, duquel  
nous parlerons aux Chapitres ensuyuans. La fleur  
de ce Rosmarin s'appelle és Boutiques *Anthos*.

LE TEMPERAMENT.

Ce Rosmarin est chaud & sec au second degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Dióscoride & Galien escriuent que ce Rosmarin boula en eau, & donné à boire deuant faire A  
quelque exercice, guerit la iaulnasse.

Chap. LXXII.

*Rosmarinum coronarium.* Rosmarin.



**B** Les Arabes medecins, & ceux qui sont venus apres disent que le Rosmarin cõforte le cerueau, la memoire, & les sens interieurs, & qu'il fait reuenir la parole, signammét la conserue faite des fleurs d'iceluy avec sucre, quand on la prend tous les matins à ieun.

**C** Les cendres du Rosmarin bruslé, raffermissent les dens & les embellissent, si on les en frotte.

De la Lauande.

Chap. LXXIII.

## LES ESPECES.

**L** Lauande est de deux sortes; Malle & Femelle. Le Malle a les fueilles, fleurs, espis & tiges grands, plus longs, plus hauts, plus gros, & d'odeur plus forte. La femelle est plus menue, plus courte, plus basse, & d'odeur plus amiable.

*Lauandula mas.*

Lauande malle.

*Lauandula femina.*

Lauande femelle.



## LA FORME.

Toutes les deux especes de Lauande ont la tige quarrée, creuse, ayans ioinctures & neuds, auquelz viennent fueilles grisâtres, longues, estroictes, charnues, plus larges & plus longues que les fueilles du Rosmarin. Les fleurs qui sont bleuës croissent amassées ensemble au plus haut de la tige en forme d'epsi. La racine est ligneuse ayant plusieurs fibres.

## LE LIEU.

La Lauande croist en quelques endroits d'Italie, d'Espaigne, & de France es môtagnes & lieux rudes & pierreux fort exposés au Soleil. On la plante icy aux iardins, la femelle principalement qui est vulgaire par tous les iardins, car le malle ne se trouue sinon chez les Herboristes.

## LE TEMPS.

La Lauande florit en Iuin & en Iuillet.

## LES NOMS.

La Lauande s'appelle à present en Latin *Lauandula*: es Boutiques *Lauandula*, d'aucuns en Grec *Pseudoneraus*, des autres *Hirculus*, & d'aucuns aussi *Rosmarinum coronarium*. Il semble que ce soit l'herbe que Virgile appelle *Casia*.

La premiere espece s'appelle *Lauandula mas*: en François Lauande malle: en haut Alemã *Spica* & *Spica*

& *Spica nardus* en bas Aleman *Sauender*, & *Sauender manchen*,

La seconde epoque se nomme *Lauandale* feminine en François Lauande femelle; en haut Aleman *Safender*; en bas Aleman *Sauender wiffhen*.

LE TEMPERAMENT.

La Lauande est chaude & seche au second degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Lauande boulie en vin & beue, prouoque l'vrine, & fait venir les fleurs aux femmes, & pouf- A  
se hors la seconde & l'enfant mort.

Les fleurs d'icelles seules ou avec Canelle, Noix muscades, & cloux de Gyrofle guerissent B  
battement de cuer, la iaulnise font tresingulieres contre Apoplexie, & tournoyement de teste  
& confortent le cerueau & membres paralytiques.

La Conserue des fleurs saicte avec succe, prouiffite aussi grandement aux mesmes maladies, C  
prinse du matin à ieu, de la grosseur d'une seue.

L'eau distillée des fleurs d'icelle guerit les membres paralytiques, si on les en laue. D

De Stichas.

Chap. LXXIII.

LA FORME.

*Stichas.*

Ceste herbe est belle, de bonne odeur, & fort play-  
sante, ayant plusieurs branches fragiles, couruertes  
de fueilles longues, estroictes, blâchâtres, plus petites  
plus tendres, & d'odeur plus amiable, que les fueilles  
de la Lauande. Au plus haut de la tige croissēt de beaux  
epis, ayans la fleur bien amassée petite & bleue. Ces  
epis se vendent par tout es Boutiques sous le nom de  
*Storchades Arabicum*.

Il y a encores vne autre herbe que les Apothicaires  
appellent *Stichas citrina*, laquelle nous auôs descrit au  
LX. Cha. du premier liure.

LE LIEV.

Ceste herbe croist aux isles appellées Storchades, si  
tuées à l'opposite de Marseille, & en plusieurs lieux de  
Languedoc & de la Prouence, & en Arabie. Icy au-  
cuns Herboristes la sement & entretiennent avec gran-  
de diligence.

LE TEMPS.

La Stichas florit en May & Iuin, vn peu deuant la  
Lauande.

LES NOMS.

Elle se nomme en Grec *σῖχος*, *σῖχος*; en Latin  
*Stichas* & *Storchas*; es Boutiques *Stichas Arabica* & *Stor-  
chades Arabica*; en Arabic *Astochodos*; nul autre nomme  
nous est encores connu pour le present.

LE TEMPERAMENT.

La qualité de Stichas est chaude & seche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoction de Stichas avec ses fleurs, ou bien des  
fleurs, seulement, beue, ouure les opilations du soye,  
des poulmons, de la rate, de l'amarry, de la vesie & de  
toutes autres parties interieures, nettoyant & chassant  
hors toutes mauuaises humeurs & corrompues.

Elle est aussi tresutile contre douleurs de teste, & maladies du thorax, & des poulmons: Elle B  
saict venir aussi les fleurs aux femmes, si on la prend en la mesme sorte que dessus.

On la messe avec ses fleurs non sans grande efficace, es Antidotes & contrepoisons.

Les fueilles & fleurs d'icelle souuent données à flairer, confortent le cerueau, la memoire & D  
les sens interieures.

Du Dictam.

Chap. LXXV.

LES ESPECES.

Dioscoride l'ancien Herboriste saict mention de trois sortes de Dictam, la premiere desquel-  
les seulement est le vray Dictam. La seconde est le Dictam bastard. La tierce est vne autre



espece de Dictam produisant fleurs & semence.

LA FORME.

1 La premiere espece, qui est le vray Dictam, est comme dit Dioscoride, vne herbe chaude, & acre, fort semblable au Pouliot, sinon que ses feuilles sont plus grandes, reuestues d'une laine douce & blanche: il a les sommités des verges courbées, ayans feuilles non si velues que les autres, tirés sur le purpuré, entre lesquelles croissent les fleurs purpurées. Toute l'herbe est de tresplaisante odeur.

2 La seconde espece qui s'appelle Pseudodictamnus, c'est à dire Dictam bastard, ressemble fort au premier, come dit Dioscoride: sinon qu'il n'est point chaud & ne pique point la langue. Nous en auons icy mis la figure laquelle nous auons fait tailler selon le naturel. Il a les tiges rôdes, douces, velues, renouées, & ayant des ioinctures, à chacune desquelles y a deux feuilles blanches, rôdelettes, douces & velues, nō guere differētes en figure à celles du Pouliot, sinon qu'elles sont plus grandes & toutes blanches, douces & velues comme les premieres feuilles du Bouillon blanc, sans odeur, & de saueur non acre, mais amere. Les fleurs sont de couleur leger persé & croissent au tour des tiges en forme de courônes, come au Pouliot & au Marrube.

3 La tierce espece est semblable en figure à la seconde, sinō que ses feuilles sont plus verdes & plus velues, reuestues d'un poil blanc & doux, bien pres semblables aux feuilles de la Mēte aquatique. Toute l'herbe est de tresbonne odeur & plaisante, sentant entre la Mēte aquatique & la Sauge, comme aussi Dioscoride tesmoigne.

LE LIEV.

1 La premiere espece & vray Dictam vient en Crete, qui est vne isle de la mer Mediterranée, que nous appellons maintenant Candie, & ne se trouue autrepars, comme tous les Anciens escriuent: Parquoy ce n'est pas merueille, qu'il ne se trouue en ce pais sinon sec aux Boutiques d'aucuns apothicaires sçauans & diligens, lesquels par grand soing & diligence le recourent de Candie pour en vser en Medecine.

2 Les deux autres especes ne croissent pas seulement en Cádiz, mais aussi en plusieurs autres pais chauds. Ces deux especes a en tout le premier en ce pais le grand Herboriste Ian de Vrockom, les ayant semées, & avec grand soin entretenues en son beau verger, & bien peuplé de toutes sortes d'herbes estrangeres, & me les a enuoyées.

LES NOMS.

1 La premiere espece s'appelle en Grec *Δικταμνος*, en Latin *Dictamnus*, & *Dictamnus Creticus*, d'aucuns selon que Dioscoride recite *Παλιγιανή*: es Boutiques *Diptamnus*, cōbien que toutesfois les apothicaires aient vsé d'une autre herbe au lieu d'iceluy, laquelle n'est point vne espece de Dictam, comme nous dechirerons en son lieu. (Hard.)

2 La seconde espece s'appelle en Grec *Ψευδοδικταμνος*, & *Pseudodictamnus*, c'est à dire Dictam bastard.

3 La tierce espece s'appelle aussi en Grec *Δικταμνος*: en Latin *Dictamnus*, & se peut bien nommer *Dictamnus tertium genus*, ou *Dictamnus non Creticus*.


LE TEMPERAMENT.

1 Le vray Dictam est chaud & sec comme le Pouliot, mais de parties plus subtiles.

2 Les deux autres sont aussi de complexion chaude & seche, nō pas toutesfois si chaude q̄ le vray.

Pseudodictamnus.

Dictam bastard.





LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Le vray Dictam a pareilles vertus que le Pouliot, & est encore meilleur & plus fort: il fait ve- A  
nir les fleurs aux femmes, & pousse hors l'arierefais & l'enfant mort beu ou mengé, ou appliqué  
par bas en forme de pessus. Pareille vertu a la racine, qui est fort chaude & acree à la langue.

Le ius du Dictam est fort vtilement beu contre tout venin & morsures de bestes venimeuses B  
& serpens.

Le Dictam a si grande vertu contre tout venin, que par sa seule odeur il dechasse toutes bestes C  
venimeuses & malignes, & de fait les tue, & red'fis aucune vertu si on les touche seulement d'iceluy

Le ius d'iceluy est de souveraine & singuliere efficace pour toutes plaies saictes par glaiue ou D  
autre forte d'armures, & toutes morsures de bestes venimeuses, distillé dedens, car il les nettoye,  
mondifie, & guerit.

Le Dictam allége douleur de ratelle, la desenfiant & diminuant, quand elle est par trop gran- E  
de & enflée, pris par dedans, ou appliqué par dehors.

Il tire hors les eschardes & espines, si on le broye & applique dessus. F

On trouue escrit par les Anciens, que les Cheures de Candie, tirées & fichées de quelquedard G  
ou fleche; cherchent incontinent le Dictam & le mengent, & que par la vertu d'iceluy les fle-  
ches tombent & les playes guerissent.

2 Le Dictam bastard ressemble aucunement de vertus au premier, mais il n'est pas de si grande H  
efficace.

3 La tierce espece est mout vailable meslée parmy medecines, breuuages, & emplastres qui se I  
font contre morsures de bestes venimeuses.

Du Fenoi.

Chap. LXXVI.

LES ESPECES.

IL se trouue deux sortes de Fenoi. L'un est le vray Fenoi appellé en Grec *Marabron*. L'autre est  
celuy qui croist fort haut qu'on appelle *Hippomarabron*, c'est à dire grand Fenoi.

LA FORME.

*Feniculum.*

*Fenosil.*

1 Le vray Fenoi a les tiges rondes, noueuses, de la  
hauteur d'un homme, fort branchues, verdes  
par dehors, & creuses par dedans, & remplies d'une  
moelle blanche & mouleuse. Les fuicilles sont lon-  
gues, tendres & fort menu dechiquetées, tellement  
que se ne semble que vn amas de filets menus, plus  
grandes, plus douces, & de meilleur odeur que les  
fuicilles d'Aneth. Les fleurs pailles iualnes croissent  
par esmouchettes au pi<sup>h</sup> haut des tiges, la fleur perie  
elle se tourne en semence logue, ayt toujours deux  
grains ensemble. La racine bléche, longue & simple.

2 La seconde espece appellée grand Fenoi, a la ti-  
ge ronde, noueuse, aucunfois de la grosseur d'un  
bras, & haute de seize ou dixhuit pieds, telmoyn le  
treffiquant Ruelle. LE LIEV.

Le Fenoi croist en ce pais aux iardins.

LE TEMPS.

Il floeit en Juin & Iuillet, & la semence est meure  
en Aoust.

LES NOMS.

1 La premiere espece s'appelle en Grec *μαράβρον*:  
d'Actuarius aussi *μαράβρον*: en Latin & es Bouti-  
ques *Feniculum*: en François Fenoi: en haut Aleman  
*feneusel*: en bas Aleman *Wenechel*.

2 La seconde espece s'appelle en Grec *ἵππομαράβρον*:  
en Latin *Feniculi erraticum*, c'est à dire Fenoi  
grand, ou de cheual, & Fenoi sauvage.

LE TEMPERAMENT.

Le Fenoi est chaud au tiers degré, & sec au pre-  
mier. LES VERTVS ET OPER.

A Les fuicilles verdes du Fenoi mézées, ou la semence  
d'ice-



d'iceluy beuë avec ptifane, remplit les mammelles de lait.

- B La decoction des cymes du Fenoi beuë, allège douleur des rognons, fait vriner & letter la pierre, & protoque les fleurs aux femmes. Autant en fait la racine, laquelle non seulement est bonne aux choses deuant dictes, mais aussi à l'hydropisie, boulie en vin & beuë.
- C Les fueilles & graine du Fenoi beuës avec du vin, profitent contre piqures de scorpions, & morsures d'autres bestes venimeuses.
- D Le Fenoi ou sa semence beuë avec eauë, appaise d'ouleur d'estomach, & l'enue de vomir qu'ont ceux qui sont trauaillés de la fieure.
- E L'herbe, la graine, & racine du Fenoi sont tresbonnes pour les poulmons, foye, & rognons; car elles ouurent les obstructions d'icelles parties, & les confortent.
- F Les racines pilées & induictes avec miel, sont bonnes contre morsures de chiens enragés.
- G Les fueilles pilées avec vinaigre sont vilement appliquées sur fe u volage, & toutes tumeurs chaudes. Et broyées avec cire, sur meurtrissures.
- H Le Fenoi bouli en vin, ou pilé avec huile, est tresbon aux parties honteuses, soit qu'on les en veuille estuuer, ou froter d'iceluy.
- I Le jus d'iceluy distillé aux oreilles, tue les vers engendrez leans. Iceluy seché au soleil, est vilement meslé parmy collyres, c'est à dire medicaments que lon prepare pour aiguiser la veuë.

## De l'Aneth.

## LA FORME.

L'Aneth a les tiges rondes, genouillées, fort brâches & ramées, hautes de pied & demy, ou de deux pieds. Les fueilles sont fort dechiquetées, nõ guere dissemblables au Fenoi, plus dures toutefois, & ayans les filets plus gros. Les fleurs intines, croissans par esmouchettes au sommet des tiges, comme au Fenoi: apres lesquelles peries viët la semence qui est petite & large. La racine est blanche & perit tous les ans.

## LE LIEV.

On seme icy l'Aneth par tous les iardins à porcé

## LE TEMPS.

Il fleurit en Iuin & Iuillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ἀνηθον*: en Latin & es Boutiques *Anethum*: en François *Aneth*: en haut Aleman *Dyssen* & *Schoftraut*: en bas Aleman *Diffe*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Aneth est bien pres chaud iusques au tiers de gré, & sec au second.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La decoction des cymes de l'Aneth avec la semence faicte en eauë & beuë, fait venir beaucoup de lait aux femmes.
- B Il chasse les ventosités, il appaise les inflations & trenchées de ventre, il arreste le vomissement & flux de ventre, & prouoque l'vrine, pris cõme deuant.
- C Il est tresutile contre suffocations d'amarry, si on fait recevoir aux femmes la fumée de la decoction d'iceluy par vne selle persee.
- D La graine d'iceluy fort eschauffée, & souuent flairée fait cesser le hoquet, & le sanglot.
- E Icelle bruslée, efface les condylomates & fronses du fondement induicte dessus. L'herbe reduicte en cendres, reserre & guerit vicerès par trop moictes, signamment ceux qui sont es parties honteuses, si on l'espard dedans.
- F L'Aneth cuict en huile, digere & refout, appaise douleurs, incite à Venus, & meurt toutes tumeurs crues.

## LES NVISANCES.

Si on en vse trop souuent il diminue la veuë, & la semence de generation.

## Chap. LXXVII.

Anethum.

Aneth.



LA FORME.

Anisum. Anis.

L'Anis est de feuilles pareil au Persil tout nouvellement forty: il a les tiges rondes, creuses, ayans les feuilles au commencement rondes, puis apres, autres feuilles dechiquetées comme les feuilles de l'Ache, plus petites toutesfois & plus blanchatres. Au plus haut des tiges croissent plusieurs belles esmouchettes; produisans fleurs blanches, comme les esmouchettes de la petite Saxifrage, ou du Coriandre. Apres que les fleurs sont passées suruiuent la semence qui est blanchatre, & d'odeur & saveur douce & plaisante.

LE LIEU.

L'Anis croist de soy mesme en Syrie & Candie. Maintenant on le trouue asses en abondance semé es jardins tant en la haute qu'en la basse Alemaigne.

LE TEMPS.

Il fleurit en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.

L'Anis s'appelle en Grec *ἀνίσον*, & en Latin & es Boutiques Anisum: en haut Aleman *Anis*; en bas Aleman *Anijs*.

LE TEMPERAMENT.

La semence d'Anis de laquelle seule on vse en Medecine, est chaude & seche au tiers degre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La semence d'Anis resout les ventosités, & sert aux rouxcs & inflations de l'estomach, & des boyaux: & appaise douleur, & torsions de ventre: elle arreste le flux de ventre, & fait pisser & ietter la pierre, si on la prend seche, ou avec du vin ou de l'eau, & fait aussi passer le hoquet non seulement beut ou prise par dedans, mais aussi flairée seulement.

Elle guerit la dysentere, & arreste le flux blanc des femmes, & on la donne tresutilement aux hydropiques, car il ouure les conduits du foye & estanche la soif.

Anis mangé en abondance incite au ieu d'amour, & fait aux femmes auoir grande quantité de lait.

La graine d'iceluy machée fait auoir bonne bouche & longue haleine, & corrige la puanteur de la bouche.

Icelle sechée au feu & prise avec du miel, purge le thorax de superfluités phlegmatiques, & fond adouste amandes ameres, elle guerit la toux enuieillee.

Icelle beut avec du vin est tresutile contre piqures de scorpions & morsures de toutes autres bestes venimeuses.

Elle est singuliere pour la donner à manger aux enfans qui sont suiets de choyr du haut mal, de sorte que ceux qui la tiennent seulement en la main, se disoit Pythagoras, ne sont plus suiets de tomber du haut mal.

Il appaise squinance, c'est à dire enflure du gosier, gargarisé avec miel, vinaigre, & hyssope.

La graine d'iceluy liée en vn sachet ou mouchoir & tenue deuant le nez & fleurée, engarde de songer & réuer & fait bien dormir.

Le parfum d'icelle attiré par le nez guerit douleur de teste.

Icelle pilée avec huile rosat & mise aux oreilles, guerit playes interieures des oreilles.

De Ammi.

Chap. LXXIX.

LES ESPECES.

L'Ammi est de deux sortes, selon l'opinion des Medecins modernes. Le Grand Ammi, & le Petit Ammi.

LA FORME.

Le grand Ammi a la tige ronde, verte, ayant plusieurs branches & rameaux; les feuilles grandes & longues, parties en mout d'autres feuillettes crenées tout à l'entour. Au sommet de la tige croissent les fleurs blanches, estoillées, par grandes esmouchettes rondes, lesquelles produisent une petite semence acre & amere. La racine est blanche & fibreuse.



Ammi commune.

Grand Ammi.

Ammi persan.

Petit Ammi.



Le petit Ammi est vne herbe fort tendre & petite, d'un pied de haut ou vn peu dauantage. La tige est grosse & fragile. Les premieres & plus vieilles feuilles sont longues, & fort profond de coupées tout à l'entour, celles d'en haut retirent aux feuilles du Fenoi ou de l'Aneth, vn peu plus petites toutesfois. Au plus haut de la tige croissent par esmouchettes les fleurettes blanches, lesquelles puis apres se tournent en semence petite, & grise, chaude & acre en la bouche. La racine est petite & menue.

## LE LIEV.

Ces deux herbes ne croissent icy d'elles mesmes, sinon semées es jardins des Amateurs des herbes. Ce neantmoins où elles ont vnefois esté semées, elles y croissent de leger tous les ans, par leur graine qui tombe de soy mesme.

## LE TEMPS.

Elles florissent en Iuillet & Aoust, & soudain apres liurent leur semence.

## LES NOMS.

La premiere espect se nomme es Boutiques Ameer, sous lequel nom elle est cognie en ce pais. Icelle selon nostre opinion est le vray *Ammi* décrit par Dioscoride, lequel s'appelle aussi *Caminum Arabiopicum*, *Caminum regium*, & comme dit Ruelle *Caminum Alexandrinum*.

Le petit est tenu de plusieurs sçauans Modernes pour *Ammi*, pourtant l'auons nous reduict sous ce chapitre icy.

## LE TEMPERAMENT.

La semence d'Ammi est chaude & seche iusques au tiers degré.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La graine d'Ammi est tresbonne contre torsions & douleurs de ventre, chaude pisse, & quand on ne peut passer que goutte à goutte, si on la boit avec du vin.
- B Elle fait venir les fleurs menstruales aux femmes, & le parfum d'icelle avec resine & poulpe de raisins mise sur charbons ardans, mondifie & nettoye la matrice, si on le recoit par vne selle perféc.

Elle

**C** Elle profite contre morsures de toutes bestes venimeuses beuë avec vin : On la mesle avec Cantharides, à fin qu'elle resiste au venin d'icelles, & qu'elles ne soient si nuisibles à l'homme comme quand on les prend seules.

**D** Ammi broyé avec miel, digéré le sang grumelé, & efface les meurtrissures noires qui viennent par batue ou cheute, si on l'applique dessus en forme d'emplastre.

**LES NVISANCES.**

La graine d'Ammi prise en trop grande abondance, fait venir les palles couleurs, comme celles d'un mort.

**Du Carui.**

**LA FORME.**

**L**A Carote a la tige vuyde, anguleuse, à mout de nœuds & jointures: la feuille fort semblable à celles de la Pastenade. Les fleurs sont blanches, croissans par esmouchettes, liurés vne semence petite & piquete à la langue. La racine est assez grosse longue & saulne, ayant bien pres le goust de Paste nade.

**LE LIEV.**

Ceste Carote vient en Carie comme dit Dioscoride. On la trouue à present en aucuns pres secs d'Allemagne. En ce pais on la seme aux iardins.

**LE TEMPS.**

Elle florit en May vn an apres qu'elle a esté semée, & rend sa semence en Iuin & Iuillet.

**LES NOMS.**

Ceste herbe s'appelle en Grec καρω : en Latin *Carum* ou *Carum*: es Boutiques *Carui*, & a pris son nom du pais de Carie là où elle croist en abondance: en François Carui, ou Carotes: en haut Aleman *Kammel*, en bas Aleman *witte Comijn*.

**LE TEMPERAMENT.**

La graine du Carui est chaude & seche iusques au tiers degré. **LES VERTVS ET OPER.**

**A** La graine des Carottes est fort idoine & propre à l'estomach, & à la bouche-elle ayde à faire digestion, & fait pisser, & estainct toutes ventosités & inflations des parties interieures. Bref elle respond à l'Anis en vertus & operations.

**B** La racine du Carui boullie, est bonne à manger comme les Pastenades.

**Du Comin. Chap. LXXXI.**

**LES ESPECES.**

**L**E Comin selon Dioscoride est de deux sortes. Cultivé & Sauvage.

**LA FORME.**

**1** Le Comin cultivé a la tige droicte, longue, ayant plusieurs rameaux: les feuilles fort dechiquetées, non guere differentes au Fenoi. Les fleurs croissent par esmouchettes comme à l'Anis, Fenoi, & Aneth. La graine noiratre & longue.

**2** Le Sauvage (se dit Dioscoride) la tige fragile, d'enuirõ vne paulme de haut, sur laquelle croissent quatre ou cinq feuilles fort dechiquetées, & crenées à l'entour. Elle n'est pas encore connue.

L'autre espèce Sauvage de laquelle Dioscoride fait mention sera descrite au chap. LXXXIII. entre les Nyelles.

**LE LIEV.**

Le Comin cultivé croist en Ethiopie, Egypte, Galatie, Asie la mineur, Cilicie & Terentie. On le seme aussi en quelques endroits d'Allemagne, mais il desire terre chaude & humide.

**LES NOMS.**

Le Comin cultivé & vulgaire s'appelle en Grec *κμινον* *κμινον*: en Latin *Cuminum sativum*: es Boutiques *Cuminum*: en François Comin: en haut Aleman *Romische hummel*, & *zamm er Kammel*: en Basabson *Comijn*.

**Chap. LXXX.**

*Carui. Carote.*



Le Comin suuage s'appelle en Grec *κίαννον* & *κίαννον* Latin *Sylvestre Cuminum*, & *Cuminum ru-  
ficum*.

## LE TEMPERAMENT.

La graine du Comin est chaude & seche au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Comin resoult & digere toutes vérolités de l'estomach, du vétre, des boyaux, & de l'umary.  
Danantage il est tresbon pour trenchedes, torsions & douleurs de ventre, non seulement pris par  
la bouche, mais aussi ietté dedés le corps par clysteres, ou appliqué par dehors avec farine d'orge  
B Iceluy mangé ou beu, profite grandement à ceux qui ont la toux & qui sont refroidés, ou qui  
ont le thorax esboupés & beu avec du vin à ceux qui ont esté frappés de quelq' beste venimeuse.  
C Il resoult les tumeurs & enflures des genitoires & parties honteuses, appliqué dessus.  
D Iceluy mellé avec farine d'Ytraie, & pulpe de raisins, arreste le desordonné flux menstruel  
des femmes, appliqué sur le ventre en forme d'emplâtre.  
E La graine d'iceluy pilée, & donnée à fleurir avec vinaigre, arreste le sang coulant par le nez.

## LES NVISANCES.

Le Comin pris en trop grande abondance, fait perdre la couleur naturelle, & la rend pale &  
desfaicte.

## Du Coriandre.

## LA FORME.

LE Coriandre est vne herbe fort puante, sentant  
comme les punaises, elle porte la tige ronde, fort  
branchue, d'environ pied & demy de haut, les fueil-  
les sont blâchâtres, fort de coupées: celles de dessous  
& premier sortans, ressemblent pres aux fueilles du  
Cherfueil ou Persil: celles d'en haut & dernieres, ne  
sont guere dissimilables à celles là mesme, ou à cel-  
les de la Fumeterre, plus tendres toutesfois & beau-  
coup plus dechiquetées. Les fleurs sont blanches &  
croissent par esmouchettes. La graine est toute ron-  
de, creusée par dedans, d'odeur plaisante estât seche.  
La racine dure & ligneuse. LE LIEV.

Le Coriandre se sème aux champs & iardins, & de  
mande terre bône & grassé. LE TEMPS.

Il florit en Iuillet & en Aouût: & vn peu apres, la se-  
mençe en est meure. LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *κίαννον*, & *κίαννον*:  
en Latin & es Bouiques *Coriandrum*: en Aleman *Co-  
viander*. LE TEMPERAMENT.

Le Coriandre encore verd & puant, est de cõple-  
xon froide & seche, nuisible à la persone. La graine  
seche & odoriferante est chaude propre à beaucoup  
de choses. LES VERTVS ET OPER.

- A La graine de Coriandre preparée, prinse simple-  
ment ou couverte de sucre apres manger, ferme la  
bouche de l'estomach, arreste les vomissemés & ay-  
de à digerer les viandes.  
B Icelle rostie & beue, avec du vin tue & fait sortir  
hors du corps les vers & arreste le flux de ventre, la  
dysentere, & tbut flux de sang desordonné.  
C La graine de Coriandre se prepare en ceste sorte. Prenez graine de Coriandre bien seche, sur  
laquelle ietteres bon fort vin & du vinaigre mellés ensemble, & la laissez ainsi tréper par l'espa-  
ce de xxiiij. heures, puis l'osteres & secheres, la gardant pour sen seruir en Medecine.  
D Il faut aussi noter que les Apothicaires ne doiuent vendre à persõne la graine de Coriandre non  
preparée, ny la couvrir de sucre, ny en vsen Medecine, car isoit ce qu'elle soit seche & de bon  
odeur, elle ne se peut contresfois guere mettre en vsage sans grand detrimet & nuissence.  
E L'herbe de Coriandre encores fresche avec mie de pain de froment, ou farine d'orge cusée,  
digere toutes tumeurs chaudes & inflammées, & avec farine de seues, dissout les strumes & bosses.

## Chap. LXXXII.

Coriandrum.

Coriandre.



Le jus de Coriandre indulté avec ceruse, escume d'argent, vinaigre, & huile rosat, guerit le feu de volage, & allége toutes inflammations furuenues à la peau.

LES NVISANCES.

Le Coriandre verd prins par dedens le corps fait deuenir enroué, fait tomber en frenesie, & esourdite tellement le sens qu'il semble qu'on soit yuré. Et beu à la quantité de quatre drachmes tue la personne, se dit Serapio.

De la Nielle.

Chap. LXXXIII.


LES ESPECES.

LA Nielle est de deux sortes, Cultiuée & Sauvage. La Cultiuée est derechef partie en deux. L'une porte semence noire, l'autre palle iaulne, au reste pareilles l'une à l'autre, soit en tiges, soit en fueilles, fleurs, & odeur.

*Melanthium sativum.* Nielle domestique.

*Melanthium sylvestre.*

Nielle sauvage.



LA FORME.

- 1 La Nielle cultiuée a vne tige fragile, fort branchue, d'environ vn pied de haut. Les fueilles sont dechiquetées, & les semblables aux fueilles de Fumeterre, plus verdes toutesfois. Les fleurs croissent à la sommité des branches, blanches, tirans sur vn leger bleu, chacune partie en cinq fueillettes en forme d'une petite roué. Apres les fleurs passées suruiennent de petis chapiteaux ayés cinq ou six cornes vigues par dessus, chacun chapiteau distingué par dedans en cinq ou six chambrettes, là dedans est contenue la semence, laquelle (comme auons dict) aucunefois est noire, aucunefois palle iaulne, semblable à la graine d'un Oignon, de faueur acre, & de bonne & forte odeur.
- 2 La Nielle sauvage a la tige striée, enuiró deux poulmes de haut, les fueilles de couleur cédreuse fort incisées, plus tédres, & plus fort dechiquetées que celles de la Domestique, retirans aux fueilles de l'Aneris. Les fleurs sont semblables à la Cultiuée, plus bleues toutesfois: les chapiteaux sont diuisés en cinq siliques cornues fort semblables à ceux de l'Ancoyle, auquel est enclósé la semence odoriferante.

3 Il se trouue encores vne autre Nielle fort belle & plaisante, appellée Nielle de Damas, fort re-

Melanbium Damasenum. Nielle de Damas.

semblant à la Sauvage de feuilles menu dechiquetées, elle a toutesfois la tige plus longue. Les fleurs sont bleues, parties en cinq, semblables aux autres, plus belles toutesfois & plus bleues, ayans par dessus cinq feuillettes bien menu dechiquetées, du milieu desquelles la fleur sort. Apres la fleur perie viennent chapiteaux comme à la cultiuée, auquelz est contenue la semence, noire comme la cultiuée, mais sans odeur. **LE LIEU.**

1) Ces Nielles ne se trouuent en ce pais sinon aux iardins auquelz elles sont semées.

2) La Sauvage se trouue en aucuns lieux d'Alemaigne par les espaignes. **LE TEMPS.**

La Nielle fleurit en Juin & Juillet.

#### LES NOMS.

La Nielle s'appelle en Grec  $\mu\alpha\lambda\acute{\alpha}\delta\iota\sigma\upsilon\pi$  : en Latin *Melanbium*, *Nigella*, & *Papauer nigrum*: en Boutiques *Nigella*, d'aucuns *Girb*: en François *Nielle* ou *Poyurette*.

1) La premiere espee s'appelle *Melanbium sativum*, & *Nigella domestica*, d'aucuns *Salufandria*: en haut Aleman *Schwartz humich*, *Schwartz humel*: en bas Aleman *Dardus*, & la semence *Dardus saet*.

2) La Nielle sauvage se nome *Melanbium silvestre*: en haut Aleman *S. Catharinen Blum*, c'est à dire *Fleur de S. Catharine*, d'aucuns *waldt schwartz humich*: Quelques gens doctes la tiennent pour le *Comin sauvage*, duquel auons fait mentio au cha. LXXXI.

3) La tierce espee s'appelle à present *Melanbium Damasenum*, & *Nigella Damasena*, c'est à dire *Nielle de Damas*: en haut Aleman *schwartz Losäder*.

#### LE TEMPERAMENT.

La semence de Nielle est chaude & seche iusques au tiers degré.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La semence de Nielle beuë avec du vin, met fin aux courtes haleines, elle resout & estainct toutes ventosités qui sont au corps, elle prouoque l'vrine, & le flux menstrual. Elle accroist le lait aux femmes, si elles en boyuent par plusieurs iours.
- B La mesme tue & pouille hors les vers tant beuë avec vin ou eauë, qu'appliquée sur le nombril & ventre. Pareille vertu a l'huile tirée de la semence d'icelle & induicte sur le ventre & nombril.
- C Icelle beuë à la quantité d'une drachme avec eauë, est fort vtile contre tout venin & morsures de bestes venimeuses.
- D La seule fumée d'icelle rostie ou bruslée, chasse les serpens & autres bestes venimeuses, & tue les mouches & moucherons.
- E Icelle mellée avec huile de Iris, & appliquée sur le front, guerit mal de teste: & souuent mise de dans le nez, profite aux suffusions des yeux qui ne sont que commencer.
- F Icelle bien sechée & pilée, & lyée dedans un drap de soye ou de linge bien delyé & souuet fleurée, guerit tous catarrhes, seche le cerueau, & fait reuenir l'odorament perdu.
- G Et bouillie avec eauë & vinaigre, & tenue en la bouche, appaise douleurs de dens, & si on la mache bien seche, guerit vlcères de la bouche.
- H Elle efface lentilles, & autres taches, & nettoye gratelles & rongnes, & amollist vieux ordemes & duretés pilée en vinaigre & induicte dessus.
- I Elle trempée en vin vieil ou pissate comme dit Pline, & appliquée, fait cheoir les poresux ou verrues des pieds, si au parauant tils sont scarifiés à l'entour.

Du Libanotis, ou Rosmarin.

Chap. LXXXIII

#### LES ESPECES.

LE Libanotis selon Dioscoride est de deux sortes, l'un fructier, & l'autre non fructier. Le fructier est de deux ou trois sortes comme il apparostrera par ce present chapitre.





*Libanotis primum genus.*  
La premiere espece de Libanotis,

*Libanotis al-  
terum genus.*

La 2. espece  
de Libanotis.



*Libanotis Theo-  
phraſti.*

La 3. espe-  
ce de Li-  
banotis.

LA FORME.

- 1 La premiere espece fruiſſiere, a les feuilles fort menu dechiquetees, aſſes ſemblables aux feuilles du Fenoil, plus grâdes toutesſois & plus larges, le plus ſouuent couchées & eſtendues en rōdeur ſur la terre, entre leſquelles vient la tige haute d'une coudée ſur laquelle croiſſent les fleurs par eſmouchettes cōme à l'Aneth, & produiſent vne ſemence groſſe, rōde, & anguleuſe, de forte odeur, & gouſt acre. La racine eſt groſſe, cheuelue par haut, ſentit la reſine.
- 2 La ſecōde espece a vne tige haute, notieufe com me le Fenoil, les feuilles non guere differentes au Cherſueil, ou à la Cigue, plus grandes toutesſois, plus larges, & plus charnues. Au plus haut des tiges croiſſent eſmouchettes produiſans fleurs blanches, leſquelles ſe tournent en ſemence odoriferante, Jar ge bien pres comme celle de l'Angelique. La racine eſt noire par dehors, & blanche par dedans, che uelue par haut, & ayant l'odeur de reſine ou encēs.
- 3 Encores y a il vne espece de ces herbes portant fruit, laquelle eſt deſcrite par Theophraſte au li. 9. cha. 2. Elle a auſſi la tige droicte, notieufe, les fueil- les plus grâdes que celles de l'Ache. Les fleurs croiſ- ſent ſur eſmouchettes cōme aux deux autres espe- ces, produiſans ſemence groſſe, longue, mal vnie, &

R. iij acre.



acre. La racine est grosse, espesse, blâche, ayât par haut vn gros poil, sentât aussi l'encens ou la resine

Les Libanotides non fructiers comme dit Dioscoride, resembtent aux fructiers de fueilles, & racines, sinon qu'ilz ne portent ne tiges, ne fleurs, ne semence.

L'autre espee de Libanotis appellée *Rosmarinum coronarium*, & en François Rosmarin a esté descrite au cha. LXXII. de ce liure. LE LIEU.

Les trois Libanotides fructiers se trouuent en Alemaigne aux hautes montaignes & deserts. La premiere espee croist aussi en Brabant à l'environ de Louuain es lieux montaigneux & rudes, pour la plus part toutesfois on la plante aux iardins, cōme pareillemēt les deux autres espees

## LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent en Iuillet.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *Λιβανotis*, pour ce que la racine sent l'encens qui se nomme en Grec *Libanos*: en Latin *Rosmarinus*.

La premiere espee s'appelle icy es Boutiques *Fœniculus porcinus*; en haut Aleman *Bertwontz*; en bas Aleman *Bertwontz*, cest à dire Racine d'ours: d'aucuns cōme dit Diosc. *Zea* & *Capsanema*.

La semence d'icelle s'appelle en Grec *καρχυρος*, & *καρχυρος*; en Latin *Carchrys* ou *Cachrys*.

La 2. espee s'appelle en haut Aleman *Schwartz hirtswontz*, cest à dire Racine de cerf noire.

La tierce est descrite par Theoph. pourtāt l'auons nous appellée *Libanotis Theophrasti*: en haut Aleman *witfz hirtswontz*, cest à dire Racine de cerf blanche. La semence de celle icy est appelée aussi de Theoph. *Carchrys* ou *Cachrys*. LE TEMPERAMENT.

Ces herbes avec leur graine & racine sont chaudes & seches iusques au tiers degré, propres à inciser, resoudre, & mondifier. LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Les racines de Libanotis beuës avec du vin, prouoquent l'vrine & le flux menstrual, & guerissent trenchées & douleurs de ventre, & sont viles contre morsures de serpens & autres bestes venimeuses.

B La semence est bonne pour les mesmes ehofes, outre ce est singuliere contre le mal caduc, & vieilles indispositions de la poictrine. On la donne à boyre avec poyure cōtre la iaulnisse, signamment celle de la seconde espee, car quant à la graine de la premiere appellée *Cachrys* il n'est guere bon de la prendre par dedans le corps, veu que par sa grand chaleur & acrimonie, elle rend le gosier aspre.

C Les fueilles de tous les Libanotides pilées, arrestent le flux des hemorrhoides ou morenes, & adoucissent les condylomates & inflammations du fondement, en meurissant & amollissant toutes

D tumeurs froides & absces. Le ius de l'herbe & des racines mis avec miel aux yeux, aiguise la veue, & eclairec les yeux obscurcis.

E La racine seche avec miel, mondifie viceres pourris, & digere & deguste toutes tumeurs.

F La semence induicte avec huyle, profite à ceux qui sont trauaillés de conuulsion, & fait suer.

G Icelle meslée avec farine d'Yraie & vinaigre, donne allegeance aux goutes, quand on l'applique dessus.

H Elle purge aussi & guerit le mal saint Main, induicte dessus avec bien fort vinaigre.

I On induicte sur le front la semence appellée *Cachrys* contre fluxions des yeux.

## Du Sefeli.

## Chap. LXXXV.

## LES ESPECES.

LE Sefeli selon Dioscoride est de trois sortes. Le premier, se nomme *Sefeli Massiliense*. Le second *Sefeli Arabiopicum*. Le tiers, *Sefeli Peloponense*.

## LA FORME.

La premiere espee de Sefeli, dict de Marseille, a les fueilles fort dechiquetées, plus grosses & plus espesses que celles du Fenoi, la tige haute, genouillée, portant au plus haut esmouchettes comme l'Aneth, ayans la semence languette & anguleuse, acre & piquante. La racine est longue comme celle de la grande Saxifrage, d'odeur plaisante, & goût acre.

Le second Sefeli, a, comme dit Dioscoride, les fueilles de l'yarre, plus petites toutesfois & longues, tirans à la façon de celles du Cheuresueille. La tige noiratre, haute de trois ou quatre pieds, fort ramue. La fleur iaulne. La semence grosse comme vn grain de froment, charnue, noire & amere, croissant par esmouchettes.

Le tiers Sefeli Peloponnesiaque a la tige droite, lōgue cōme le Fenoi, ou plus lōgue, croissant plus haut q̄ celui de Marseille. Les fueilles sont fort decoupees & parties en plusieurs fueillettes, p<sup>r</sup> grâdes & plus larges q̄ celles de la Cigue. La graine croist par esmouchettes large & charnue.

LE LIEV.

Sefeli Masiliense.

Sefeli de Marseille

- 1 La premiere espece croist,tesmoing Dioscoride en Prouence,& principalement aupres de Marseille pourtant l'appelle elle Sefeli de Marseille.
- 2 Le second croist,selon le mesme Dioscoride, en Ethiopie: Et croist aussi en asses grande quantité en Prouence & Languedoc.
- 3 La tierce espece croist en Peloponnesus, qu'on appelle maintenant la Morée, située en Grece qui est maintenant sous l'Empire du Turc.

LE TEMPS.

- 1 Le premier florist deux fois l'an au Printemps, & en Automne.
- 2 Le second & le tiers florissent en Automne.

LES NOMS.

- 1 La premiere espece s'appelle en Grec *σίσυμα σπυλαστικόν*: en Latin *Sefeli Masiliense*, d'aucuns *πικυράριον*, id est *Larum cuminum*, qui vaut autant à dire que Comin large en François:és Boutiques selon Iacobus de Manijs *Siler montanum*: en haut Aleman *waldt Kumel*.
- 2 La seconde espece s'appelle en Grec *σίσυμα αἰθιοπικόν*: en Latin *Sefeli Aethiopicum*, & des Egyptiens *κίον φράξ*, *Cyonos phrice*.
- 3 La tierce espece s'appelle *σίσυμα πηλοποννησιακόν* en Latin *Sefeli Peloponnesense*, cest à dire Sefeli de Peloponnesus.

LE TEMPERAMENT.

La graine & racine de Sefeli sont chaudes & seches au second degré, & de parties subtiles.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La semence beue avec du vin cõforte & eschauffe l'estomach, ayde à faire digestõ, elle dissout trenchées & douleurs de ventre, elle guerist les frissons de la sieur, & est tresutile contre difficulté de respirer, & toux enuieille. Bref elle est vtile à toutes parties interieures.
- B Elle faict vriner, elle est bonne à ceux qui ne peuuent pisser q̄ goutte à goutte, & contre chandepisse, elle prouoque les fleurs menstruales, pouffe hors l'enfant mort, & faict retourner en son lieu l'amarry qui monte à mont.
- C Elle vaut moult à ceux qui sont trauaillés du haut mail.
- D Le voyager qui boira la semence de Sefeli avec poyure & vin ne sentira point de froid par le chemin.
- E Celle donnée à boyre aux cheures & autres bestes à quatre pieds, les ayde à facilement mettre hors leur fruit: Pareille vertu ont les feuilles quand on les leur donne à manger.

Du Sefeli de Candie. Chap.LXXXVI.

LA FORME.

C'est vne herbe tendre, enuiron de pied & demy de haut. Elle a les brâchettes tẽdrettes & menues, reuestues de peu de feuil les fort & menu dechiquetées, nõ guere dissẽblables aux feuilles du Coriandre, celles d'en bas plus larges & moins dechiquetées, cels les d'en haut plus tẽdres & pl̄ fort decoupées. Au sõmet des brâchettes croissent esmouchettes à fleurs blâches, les feuilles passées suruiuent la semence qui est rouge, ronde & plate, enuironnée d'vne bordure blanche, deux l'vne cõtre l'autre, chacune desquelles a la forme d'vne targe ou bouclier. La racine est tẽdre, grelle, mourant tous les ans, tellement qu'il la faut resemer d'an en an.

R. iij. LE



Tordylion. Sefeli de Candie



## LE LIEV.

Cette herbe, tesmoing Dioscoride, croist sur Amanus montaigne de Cilicie: on la trouue en ce pais és iardins d'aucuns diligens Herboristes.

## LE TEMPS.

Il fleurit en Iuillet, & en Aoult en est la semence meure.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *τορ δάυκος*, ή σίσαδα κρητικόν, de Paul Aegineta *τορ δάυκος*: en Latin *Tordylion* & *Seseli Creticum*: incognue pour la plus part aux Boutiques.

## LE TEMPERAMENT.

La semence du Sefeli de Candie, est chaude & seche au second de gré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A. La semence de Tordylion beuë en vin, prouoque l'vrine, & profite à ceux qui ne peuvent pisser que goutte à goutte, & fait venir les fleurs aux femmes.
- B. Le ius d'iceluy beu à la quantité d'une drachme avec bon vin cuit l'espace de dix iours, guerit le mal de reins ou rognons.
- C. La racine prise avec du miel & leschée souuent, fait cracher les grosses phlegmes & visqueses amassées aux poulmons & en la poëtrine.

## Du Daucus, ou Carotte sauvage. Chap. LXXXVII.

## LES ESPÈCES.

ON trouue trois sortes d'herbes comprises sous le nom de Daucus, cōme Dioscoride & tous les Anciens escriuent, entre lesquelles la troisieme est seulement cogneuë pour le present.

## LA FORME.

1. La premiere espece est vne herbe tendre, ayant la tige d'environ vne paulme de haut, reuestue de feuilles beaucoup moindres & plus tendres que les feuilles du Fenoi. Au plus haut de la tige y croist des esmouchettes de fleurs blanches comme au Coriandre, rendans vne semence blanche & velue, de bonne odeur, & de goust acre. La racine est de la grosseur d'un doigt, longue d'une paulme.

*Daucus tertium genus. Carotte sauvage.*

2. La seconde espece ressemble à l'Ache sauvage, la semence duquel est d'odeur tresplaisante & aromatique, de goust acre & piquant. Ces deux especes sont encore pour le present incognues.

3. La tierce espece, selon Dioscoride, a les feuilles de Coriandre, les fleurs blanches, l'esmouchette de la Pastenade sauvage, & la semence logue. Pour ceste espece est à present tenue l'herbe qu'aucuns appellent Carotte sauvage, aucuns Nid d'oyseau: car elle a les feuilles semblables au Coriandre, plus grandes toutesfois, nō guere dissemblables à celles de la Pastenade iaulne. Les fleurs sont blanches, croissans sur esmouchettes pareilles à celles de la Pastenade iaulne, au milieu desquelles se trouue vne fleurette ou deux rougeatre tirant sur le noir. La graine est languette & nouëe, s'attachant aux vestemens. La racine gresse & dure.

## LE LIEV.

1. La premiere espece croist en lieux pierreux, biē exposés au soleil, principalement en Candie, comme Dioscoride escrit.
3. La tierce espece croist en ce pais par tout, aux bors des chāps, en lieux pierreux & pres des voyes.

## LE TEMPS.

La tierce espece de Daucus florit en Iuillet & Aoult.

## LES NOMS.

Le Daucus s'appelle en Grec *δάυκος*: en Latin *Daucum* & *Daucium*.

1. La premiere espece s'appelle *Daucum Creticum*,

c'est



c'est à dire Daucus de Candie.

3 La tierce espece s'appelle aux Boutiques *Daucus*, d'aucuns aussi *Daucus Creticus*: en haut Aleman *Dogefers*, c'est à dire Nid d'oyseau: en bas Aleman *Leonfiens cruyt*.

LE TEMPERAMENT.

La semence de Daucus est chaude & seche, bien pres iusques au tiers degre.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine de Daucus beuf profite contre difficulte d'vrine, contre la grauelle & la pierre: elle A prouoque l'vrine, & fait venir les fleurs menstruales, & pousse hors l'enfant mort & arrierefais.

Elle donne allegance aux douleurs & trenchées de ventre, resout les ventosités, & guerit la B Colique, & meurit la toux enuicille.

Icelle prise en vin, est tresutile contre morsures de bestes venimeuses, signamment contre pi- C qures de Phalanges.

Icelle pilée & appliquée, dissout & degaste tumeurs froides, & molles. D

La racine du Daucus de Candie beue en vin, arreste le flux de ventre, & est souveraine contre E tout venin & poison.

De la Saxifrage.

Chap. LXXXVIII.

LES ESPECES.

LA Saxifrage est de deux sortes, Grande & Petite.

*Saxifraga maior.*

Grande Saxifrage.

*Saxifraga minor.*

Petite Saxifrage.



LA FORME.

1 La grande Saxifrage a la tige longue, creuse, noieuse, ayant fucilles verdes, tirans sur le noir, composees de plusieurs fucilles asiles sur vne queue, de figure semblable à la Pastenade cultiuée, plus petites touuesfois, chacune fucille à part crenée tout à l'entour en saço de sic. Les fleurs blanches croissent par esinouchettes. La graine ressemble à celle du Persil vulgaire, sinò qu'elle est plus chaude, & plus piquante à la langue. La racine est simple, blanche, & longue comme la racine du Persil, acre & eschauffant comme le Gingembre.

La petite

La petite Saxifrage ressemble à la grande de tiges, de feuilles, fleurs & semence, fin qu'elle est de tous points beaucoup plus petite, & de plus grand chaleur & acrimoine. La racine est aussi longue & simple, d'un gouff acre & fort chaud.

Encores y a il vne autre petite Saxifrage ressemblant à la susdicte de tiges, fleurs, semence & racine, de forme, saveur, & odeur, sinon que les feuilles sont incisées plus fort & d'une autre sorte, non guere dissemblables aux feuilles du Persil, ou de l'Ache sauvage.

## LE LIEU.

La grande Saxifrage croist es hauts prés en terre grasse.

La petite croist sous les hayes, & le long des champs, en lieux herbus & secs. Toutes les deux especes sont fort cōmunes en ce pais. LE TEMPS.

La Saxifrage florit depuis le mois de Juin usques en Aoust, de là en auant la semence est meure.

## LES NOMS.

La Saxifrage s'appelle en Latin & es Boutiques de ce pais *Saxifragia*, & *Saxifraga*, de Simon Iauentis *Petra sordida*, d'aucuns *Bibineia*: en haut Aleman *Bibernell*, & *frethmosen*: en bas Aleman *Beuernert*, & *Beuernelle*. Il y en a aussi aucuns qui les appellent *Nipinnula*, *Pōmpinella*, & *Pōpinnula*, lequel nom est le propre de nostre Pimpinelle descrite au chap. XCIII. du premier liure: & qui n'appartient rien à ces herbes, comme il appert par le vers antique *Pōmpinella pilos*, *Saxifraga non habet pilos*, c'est à dire, La Pimpinelle a des cheueux, La Saxifrage n'en a nulz. Par lequel il est tout manifeste, que nostre Pimpinelle vulgaire appellée en haut Aleman *Kolbrosirant* laquelle a les feuilles velues, a esté nommée paiff long temps en Latin *Pōmpinella*, & celle icy qui ne les a point velues, *Saxifragia*. Aucuns sçauans Modernes veulent reduire la Saxifrage sous quelques chapitres de Dioscoride, appellans la petite Sison, & la grande *Petrofelinum Macedonicum*, & faisant de la tierce vne espece de Daucus.

## LE TEMPERAMENT.

La Saxifrage avec ses feuilles graine & racine est chaude & seche usques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La semence & racine de Saxifrage beuë avec du vin, ou la decoction d'icelles faicte en vin, fait vriner, rompt la pierre des rognons & de la vessie, & est singuliere contre difficulté d'vrine, & opipulations des rognons & de la vessie.
- B La racine faict venir le temps aux femmes, & pousse hors de la matrice, la se condine & l'enfant mort, prinse en la maniere que dessus.
- C La racine sechée, puluerisée & prise avec sucre, conforte & eschauffe l'estomach, ayde à faire bonne digestion, guerit trenchées de ventre & la Colique en chassant les ventosités.
- D Icelle & la semence profitent grandement à ceux qui sont surpris de quelque conuulsion, qui sont tormentés d'Apoplexie, qui sont trauaillés de fieures longues & froides, & à ceux qui sont mords de quelque beste venimeuse, ou qui ont pris quelque poison.
- E Icelle beuë avec du vin & vinaigre, guerist de la peste, & tenue en la bouche preserue les hommes de ladicte maladie, & purifie le mauuais air.
- F La mesme machée, faict ietter force phlegmes, & tire du cerueau toutes superfluités grosses & visqueuses, elle appaise douleur de dens, & faict reuenir la parolle à ceux qui sont surpris d'Apoplexie. Partille vertu a elle si on la boulit en vinaigre seul, ou en y adioustant de l'eauë, la tenit puis apres en la bouche.
- G Les jus des feuilles de Saxifrage, nettoye & oste toutes taches & lentilles, & embellit la face faisant bon tainct.
- H Il modifie vlcères pourris mis dedans. Telle vertu ont les feuilles broyées & appliquées dessus.
- I L'eauë distillée seule ou avec vinaigre, esclarcit la veue, en oste toutes obscurités, la mettis dodis.

## De la Romptpierre.

## Chap. LXXXIX.

## LA FORME.

LA Romptpierre ou Saxifrage blanche a feuilles rondes, espāduës sur la terre pour la plus part & vn peu dechiquetées par les bors, non guere differentes aux feuilles du Lysart terrestre, plus dōces toutes fois, plus petites, & plus verdes en iaulnissant. La tige vient entre les feuilles, ronde, velue, haute d'environ pied & demy, portant au sommet plusieurs fleurs blanches, ressemblans bien pres aux Gyroflées. La racine est noiratre, ayant mout de filandres, ausquelles pendent plusieurs grains ronds purpurés, en rougissit, plus grans que la greine de Coriandre, de gouff amer, desquelz on vse en Medecine, & les appelle on *seum Saxifragæ albæ*, c'est à dire graine de Romptpierre blanche.

*Saxifraga alba.* Romptpierre blanche.



*Saxifraga aurea.* Romptpierre dorée.



- 2 Il y a encores vne autre appellée Romptpierre dorée, laquelle croist à la hauteur d'une paume & demy, ayant les feuilles fort semblables à l'autre. Au plus haut de la tige croissent deux ou trois feuillettes amassées ensemble, au milieu desquelles sortent petites fleurs de couleur d'or, & puis apres de petis chapiteaux remplis d'une semence rouge bien petite, & fourrés d'eux mesmes quand la graine est meure. La racine est tendre se traînant par terre, jettant beaucoup de tigettes.

LE LIEU.

- 4 La Romptpierre blanche prouient en Alemagne, en lieux raboteux, secs, pierreux & sablonneux. On la trouue icy plantée es jardins des Herboristes.

- 2 La Romptpierre dorée croist en quelques endroits de Flandre, en lieux humides & aquatiques.

LE TEMPS.

- 3 La premiere fleurit en May. En Juin petit l'herbe avec ses fleurs, & ne se void plus, iusques à l'année ensuyuante.

- 2 La Dorée fleurit en Mars & Avril.

LES NOMS.

- 1 Ceste herbe se nomme en Latin *Saxifraga alba*: en François Romptpierre & Saxifrage blanche: en haut Aleman *Weiß Steinsäck*: en bas Aleman *wit Steinsäck*.

- 2 La seconde s'appelle *Saxifraga aurea*: en François Romptpierre, ou Saxifrage dorée: en haut Aleman *Golden Steinsäck*: en bas Aleman *Gulden Steinsäck*. Elle a trouué ce nom pour ce qu'elle ressemble à la Saxifrage blanche, & porte fleurs dorées.

LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe, principalement la racine avec la semence, est de chaude complexion.

Mais la Saxifrage dorée est de qualité froide, comme le goust le demonstre euidentement.


LES VERTUS ET OPERATIONS.

- 1 La racine de Saxifrage blanche avec sa graine boulie en vin & beuë, prouoque l'vrine, modifie A & nettoye les rognons & la vessie, rompt la pierre & la poulle hors, & est singuliere contre difficulté d'vrine, & toutes imperfections & douleurs des reins.

- 2 Quelle vertu a la seconde, il nous est encore inoognu, veu que nul ne l'a encore experimentée. B

## LES ESPECES.

LE Gremil est de deux sortes, Cultivé & Sauvage. Le Cultivé est de deux especes, Grand & Petit  
*Lithospermum maius.* Grand Gremil. *Lithospermum minus.* Petit Gremil.



## LA FORME.

Le grand Gremil a les tiges longues, gressles, velues, lesquelles pour la pluspart se coulent par terre, reuestues de feuilles loguettes, brunes en couleur, & velues, entre lesquelles & les tiges sont assis caucilles houlus, produisans premierement vne fleur bleuë, & puis apres vne graine rondelette, dure & pierreuse, d'assez bonne grosseur. La racine est dure & ligneuse.

Le petit Gremil droit a les tiges rondes, ligneuses, fort branchues, les feuilles longues, estroictes, aiguës, noiratres, plus petites que celles du grand Gremil. Entre les feuilles & les tiges croissent petites fleurs blanches, produisans vne belle graine ronde, blanche, dure & pierreuse, laquelle ressemble aux perles, plus petite que la graine de la deuant dictée.

Le Gremil sauvage ressemble au petit de tiges, feuilles & fleurs, sinon que la graine n'est pas si blanche, ne si vnie mais vn peu ridée comme la graine de la Langue de beuf vulgaire, & les feuilles sont vn peu plus rudes.

Outre ces deux especes il se trouue encores vn Gremil sauvage fort petit, duquel le scauant Hierosme Bouq fait mention en son Herbiere. Il croist à la hauteur d'vne paulme, ayant la tige reuestue de petites feuilles & estroictes comme Lin, entre lesquelles & la tige il produit vne graine petite, vnie, noire, dure, fort semblable à celle du petit Gremil.

## LE LIEU.

Le Gremil cultivé croist en aucuns pais en lieux rudes. Icy on le seme aux vergers. Le petit toutesfois ne croist guere de soy mesme, sinon le long des ruisseaux & riuieres.

Le Sauvage se trouue en lieux pierreux & rudes.

## LE TEMPS.

Le Gremil fleurit en Iuin, Juillet, & Aoust, & liure ce temps pendant aussi sa semence.



## LES NOMS.

Le Gremil s'appelle en Grec *λιβόστρομη* & en Latin *Lithospermum*, d'aucuns *γερμόνι*; des Arabes *Miliam Soter*; es Boutiques *Miliam folis*; en François Gremil, ou Herbe aux perles; en haut Aleman *Wettersich*, & *Betsteinomen*; en bas Aleman *Petrlencruyt* & *Betsteinfact*.

## LE TEMPERAMENT.

La graine du Gremil est chaude & seche jusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine du gremil pilée & beuë en vin blanc, rompt & pousse la pierre hors, & prouoque l'vrine. A

## De la Betoine.

## Chap. XCI.

## LA FORME.

## Betonica.

## Betoine.

1 LA Betoine a les feuilles asses longues & larges, de couleur verde obscure, crenées tout à l'en-tour en forme de sie, & de bonne odeur. Entre lesquelles vient la tige quarrée, rude, longue de pied & demy, couuerte de feuilles pareilles, plus petites toutesfois, & produisant au plus haut vn court espi plein de fleurs odoriferantes, de couleur rouge pour la plus part, & aucunes fois (mais peu souuent) blanche comme neige: apres lesquelles vient aux espiz vne graine noire, longue & anguleuse. La racine est fibreuse.



2 Paul Aegineta fait mention d'encores vne autre Betoine, appellée des modernes *Veronica*, laquelle nous auons décrit au cha. XVII. du premier volume.

## LE LIEV.

La Betoine croist aux prés & boys ombrageux, & lieux montaigneux: on la plante aussi par tout es jardins.

## LE TEMPS.

La Betoine fleurit le plus souuent en Iuillet.

## LES NOMS.

La Betoine ou Betoine se nome en Grec *κρίσπος*, & *κρίσπος*; en Latin & es Boutiques *Betonica* & *Veronica*; en haut Aleman *Bianut Betonich*; en bas Aleman *Betonie*.

## LE TEMPERAMENT.

La Betoine est chaude & seche jusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPER.

La decoction de Betoine beuë, prouoque à vriner, rompt la pierre des rognons, mondifie & purge la poitrine & les poulmōs de phlegme & bouë, & prouffit moult aux phtisiques, & qui sont trouuillés de la toux.

Les feuilles d'icelle seche sont vilement données à la quantité d'vne drachme avec hydromel B cest à dire eauë miellée, à ceux qui sont trouuillés de conuulsion: item contre maladies d'amarry.

ICelles prises en mesme sorte, font venir le flux menstrual.

Les feuilles seches beues en vin sont vailables contre morsures de serpens, & appliquées aussi D par dehors sur les morsures: & à ceux pareillement qui ont pris quelque poison. Et si on les prend au parauant elles preferuent les gens de tout venin.

La Betoine ouure & guerit oppilatōs de foye, de ratelle, & des rognōs, & vaut cōtre hydropisie. E

Icelle beuë avec vin & eauë, prouffit à ceux qui crachent sang, & guerit toutes playes interieus F res, & exterieures. Icelle prise avec hydromel, lasche le ventre tout doucement, & donne alle G geance au haut mal, furie, & douleur de teste.

Elle conforte l'estomach, ayde à faire digestion, & appaise les rouchs & appetit de vomir, si on H la prend avec miel purgé, du soir apres souper. La mesme vertu a la consēue d'icelle faite avec sucre, prise à la grosseur d'vne feue.

La racine de Betoine sechée & prise avec eauë miellée, fait cracher & vomir la phlegme vis- I queuse & gluante, & autres humeurs superflues.

## LES ESPECES.

SI on prend l'herbe qu'on appelle vulgairement *és Boutiques* *Leuisticum*, pour vne sorte de *Ligusticum*: il se trouuera alors deux especes de *Ligusticum*, L'vne qui est le vray, décrit par les Anciens, Le second qui sera vn *Ligusticum* bastard & sauvage.

*Ligusticum verum.*

*Ligusticum vulgare.*

*Liuesche.*



## LA FORME.

1 Le vray *Ligusticum* décrit par Dioscoride ressemble de racine à la premiere espece de *Panax*: il a les tiges menues, genouillées comme l'*Aneth*. Les feuilles semblables à celles du *Melilot*, plus douces toutesfois & de meilleure senteur, d'ond celles d'en haut sont plus tédres & plus incisées. Au plus haut des tiges croist la graine par esmouchettes, laquelle est dure, & longue, bien pres semblable à la semence du *Fenoil*, d'odeur aromatique, de goust acré & piquet. La racine est blanche, odoriférante, ressemblant fort à celle de la premiere espece de *Panax*. Il n'est pas pourtant encores cognu en ce pais.

2 L'autre herbe, laquelle on prend en ce pais pour *Ligusticum*, a les feuilles grandes, larges, odoriferantes, fort decouppées, bien pres semblables aux feuilles d'*Angélique*, plus grâdes toutesfois plus belles, plus verdes en couleur, & plus profond & plus fort de couppées. La tige vnie, ronde, nouguse ou genouillée, & creuse, de la hauteur d'vn homme ou d'auantage, ayant esmouchettes au plus haut des branches, produisant fleur iauine, & la graine ronde, large & platte, plus grande que la semence d'*Aneth*, & plus petite que celle d'*Angélique*. La racine est longue & grosse, produisant tous les ans nouvelles tiges. LE LIEV.

1 Le vray *Ligusticum* croist en Ligurie sur le mont *Apenninus* pres de la ville de *Gennes*, & *és* montaignes circonuoisines. La seconde espece, on la plante icy *és* iardins.

## LE TEMPS.

2 La *Liuesche* fleurit pour la plus part en *Iuillet* & en *Aouft*.

## LES NOMS.

1 La premiere & vraye espece se nomme en Grec *λευστικόν*, & de *Galien* *λευστικόν*: en Latin *Ligustic*

Ligusticum: d'aucuns aussi selon Dioscoride *Panaxes*, sous lequel nom il est encores à present connu és Boutiques de Gennes: de Pline aussi *Canila babula*.

2 La seconde espee s'appelle és Boutiques *Leuisticum*, & en vient les Apothicaires au lieu du vray Ligusticum: en François *Leuelle* ou *Liuesche*: en haut Aleman *Kiesstockel*: en Brabant *Souette*, & *Leustisch*.

LE TEMPERAMENT.

1 Le Ligusticum est chaud & sec jusques au tiers degré.

3 La Leuelle est aussi chaude & seche, de qualité fort semblable au Ligusticum.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La racine de Ligusticum est fort bonne pour toutes maladies interieures, chassant routes ven- A rosités, principalement celles de l'estomach, & contre morsures de serpens & de toutes autres bestes venimeuses.

La mesme racine bien sechée & beuf avec du vin fait vriner, & esmeure les fleurs menstruales. B Pareille vertu a elle misé par dessous en forme de pessus.

La graine de Ligusticum reschauffe l'estomach, ayde à faire digestion, & est plaisante à la bou- C che, pourtant ont par cy deuant ceux de Gennes vié en leurs viandes au lieu de Poyure, comme encore aucuns font tesmoin Antonius Musa.

2 La racine & graine de Leuelle sechées & beués en vin, sechent & eschauffent l'estomach, don- D nent allegiance aux trenchées, & chassent les inflations, & ventosités d'iceluy.

Icelles esmeuent l'vrine, & resueillent la maladie naturelle des femmes, soit quelles les pren- E nent par dedans, soit quelles se baignent en la decoction d'icelles en quelque cuue.

Bref la Liuesche n'est guere differente en facultés & vertus au Ligusticum, & en peut on vser F sans aucune erreur au lieu d'iceluy.

L'eau qui est distillée de la Liuesche, eclaircit la veuë, & efface toutes taches, lentilles & rou- G geur de la face, si on l'en lene souuent.

De l'Angelique. Chap. XCIII.

LES ESPECES.

Angelique est de deux sortes. La Cultivée, & la Sauvage.

*Angelica sativa.* Angelique domestique. *Angelica sylvestris.* Angelique sauvage.



## LA FORME.

- A** Angelique cultiuée a les feuilles grandes, larges, fendues en autres feuilles crenées à l'environ, fort semblables aux plus hautes feuilles de la Branche vrsine Germanique, plus tendres tout tesfois, plus longues, plus verdes, & de plus forte odeur. Entre ces feuilles vient la tige, seulement la troisieme année apres qu'elle est semée, grosse, genoillée, creuse par dedans, sentant bien pres le Petroleum. Au plus haut des tiges croissent comme petis sachets ou petites vesies enfilées, & ou sortent les esmouchettes rondes comme au Fenoi, produisans fleurs blanches, & puis apres vne semée grosse, large, double, beaucoup plus grosse q celle d'Aneth, seblable à la graine de la tierce espece de Séseli. La racine est grande & espesse, noiratre par dehors, blanche par dedans, laquelle (est blecée) fort vne liqueur oleaginuse & grasse, cōne gēme, & forte en odeur & saueur.
- B** L'Angelique sauuage ressemble à la Cultiuée, sinon que les feuilles ne sont pas si fort decoupées, & sont plus estroictes & plus noiratres. Les tiges beaucoup plus gressies, & plus courtes. Les fleurs plus blanches. La racine beaucoup plus petite, & plus fibreuse, & non pas à beaucoup pres de si forte odeur.

## LE LIEV.

L'Angelique cultiuée est semée icy aux iardins. La Sauuage croist en lieux obscurs, & ombreux, le long des eaux, & es boys bas abis. LE TEMPS.

Les deux especes d'Angelique florissent en Iuillet & en Aoult.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en François Angelique: en haut Aleman *Angelich*, Des *Herbigens* es *Italiens*, ou *Dioscorides* Boutiques & en Brabat *Angelica*. Nul autre nō ne nous est encore cognu.

## LE TEMPERAMENT.

Angelique, signamment la Cultiuée est chaude & seche, bien pres iusques au tiers degre.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Les Modernes escriuent que les racines d'Angelique sont fort contraires à tout poison, peste, & mauuais air & insect, & en vne en ceste sorte.
- B** Si quelcun est surpris d'Epidyemie, ou est empoisoné, on luy baillera incontinent a boyre vne drachme de ceste racine puluerissee, avec du vin en yuer, & avec eauē rose en esté, & puis on le mettra coucher, & couurira on bien, tant quil aye bien sue. Peucedanum. Queue de pourcean.
- C** Icele prise à ieu du matin, ou tenue seulement en la bouche, en garde & preserue d'estre frappé de la peste, & de tout mauuais air, & venin.
- D** On dict ausi que les feuilles d'icelle pilées avec feuilles de Rue & miel sont fort vtilement appliquées sur morsures de chiens enragés, de serps & vipers si incontinent apres estre mordu, on boit du vin auquel la racine ou feuilles d'Angelique ayent bouly.

## Du Peucedanum. Chap.XCIII.

## LA FORME.

Ceste herbe a la tige gresse, fragile, genoillée, les feuilles plus grandes que les feuilles de Fenoi, retirans aux feuilles du Pin. Au plus haut des tiges croissent esmouchettes pleines de petites fleurs iaulnes, lesquelles se tournent puis apres en semence large. La racine est grosse, longue, noire par dehors, blanche par dedans, de forte odeur, & pleine de liqueur iaulne, ayant la saueur non guere differente au soulfre, & porte au haut de la racine hors de terre vne espesse cheueure comme les racines des Libanotides (descrits cy dessus) entre les feuilles & la tige.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist es hautes môtagnes d'Alemai gne, en Languedoc aux boys, & en aucuns autres pays. Icy les Herboristes la sement en leurs iardins.

## LE TEMPS.

Le Peucedanum fleurit en Iuillet & Aoult.

## LES NOMS.

Elle s'appelle en Grec *πυκνάνθη* en Latin & es Bonti



Boutiques Peucedanum, d'aucuns aussi *γυαθ*. *Γαυαθου* id est, bonus Genius, Pinastellum, Stataria, & Faniculus porcinus: en François Peucedanon, & Queuë de pourceau: en haut Aleman *Harstrang*, d'aucuns *Hestwelswurts*, & *Hewfenschel*, c'est à dire Racine fouldreuse, & Fenol de porceau: en bas Aleman *Weriens Benchel*. LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe, & signamment la liqueur de la racine est chaude au secôd degré, & seche iusques au commencement du tiers. LES VERTVS ET OPERATIONS.

La liqueur de la racine de Peucedanum prise seule, ou avec amandes ameres, & Rue, comme A dit Pline, profite grandement à la courte haleine, appaise douleurs & trenchées de ventre, chasse & resout toutes ventosités & inflations de l'estomach, & de toutes parties interieures, Elle diminue la ratelle, elle lasche le ventre tout doucement, & purge par bas le phlegme & la cholere.

Item prise côme dessus, prouoq' l'vrine, & donne allegeance aux douleurs des rognons, & de la B vessie, elle esmeut le flux mēstrual, fait aisēmēt enfanter, & pouille hors la secôdine & enfant mort.

Le ius de Peucedanum vaut contre la toux, si on le prend avec vn œuf mollet.

Iceluy mis deuant le nez & donné à fleurir ayde grandement aux femmes qui sont trauuillées D de suffocation d'amarry, & refuseille les Lethargiques, ou gens par trop endormis.

Iceluy induit sur le frōt avec huile rosat & vinaigre est tresbō cōtre Phrenesie appellée en Grec E Phrenesie, grandes douleurs enuicillies & tournoyemēs de teste, songes tumultueux & epilepsies.

Il guert appliqué comme dessus paralise, conuulsion & contraction de nerfs, & toutes mala- F dies froides & antiques, principalement la goute sciaticque.

La fumée d'iceluy brullé sur charbons vifz enchasse les serps & toutes autres bestes venimeu- G ses se trainans par terre. Le ius d'iceluy mis dedans le creu des dens mauuaises, appaise la dou- H leur d'icelles: & ietté dedans les aureilles avec huile rosat guert la doulour d'icelles.

On l'applique vilement sur hergnes de petis enfans, & le nombril par trop éléué.

La racine a pareille vertu que le ius, mais elle n'est pas du tout de si grāde efficace. On boit tou- K tesfois la decoction d'icelle, contre toutes les maladies ausquelles le ius est bon.

Icelle sechée & puluerissee, mondifie vieux vlceres puans & corrompus, & tire hors les escailles L des os, & fait venir cicatrice aux vlceres difficiles à fermer.

On la mette aussi vilement en tous vnguens & emplastres, propres à eschauffer quelque partie M du corps que ce soit.

Icelle sechée & broyée avec huile d'Aneth, fait suer, si on en frotte le corps.

### De Ostrutium. Chap. XCV.

#### LES ESPECES.

L'Ostrutium est de deux fortes. Cultiué & Sauvage, non guere differens l'un de l'autre, tant en feuilles, qu'en fleurs & racines, tous deux connus en ce pais. LA FORME.

1 Ostrutium a les feuilles grandes, larges, bien pres semblables aux feuilles de la grande Ache, plus verdes toutesfois & d'odeur plus forte, chacune des feuilles partie en trois autres, qui derches ont deux ou trois fentes, tellement que chascune feuille est diuisée en sept ou neuf parties, & chacune creneé tout au tour comme vne sie. Entre ces feuilles croisēt les tiges tēdres, genouillées rougeatres par bas vers la terre, portans au sommet des esmouchettes à fleurs blanches, apres lesquelles vient la semēce large comme la semence d'Aneth. La racine est longue, de la grosseur d'un doigt, se coulant, & iettant en plusieurs endroits nouuelles feuilles, nouatre par dehors, & blâchte par dedans, acre à la langue, & forte en odeur

2 Le Sauvage appellé Herbe Gerard, n'est guere differēt au dessusdict en feuilles, fleurs, & racines sinon que les feuilles sont plus petites, croiffans sur queues lōgues, la racine plus tēdre, plus blanche, & non si grosse. Aussi toute l'herbe avec la

S iij racine,



racine, n'est point si tresforte, si n'est elle pas toutesfois sans quelque forte odeur & saueur.

## LE LIEV.

Ostrutium se trouue aucun fois es bois & deserts sur petites montaignes. On le plante aussi en assez grande abondance es iardins tant en haute qu'en basse Alemagne.

La seconde espece Sauvage croist par tous les iardins de soy mesme. C'est vne vraye herbe inutile. La où ces Herbes sont vne fois plantées, ou croissent d'elles mesmes, elles y demeurent volontiers, & guignent tous les ans pais de plus en plus.

## LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent icy en Iuin & en Iuillet.

## LES NOMS.

La premiere espece se nomme d'aucuns Herbiers, & d'aucuns Apothicaires, *Ostrutium*, *Ostrutio* en on, *Ostrutium*, ou *Asterancium* en haut Aleman *Weyffertours*. Nous la tenons avec quelques autres gens doctes pour l'herbe que les Grecs appellent *σπύριον*, les Latins *Lanaria* & *Radicala*, les Arabes *Condifi*, qui est la vraye *Herba fouslonum*, & *Saponaria*. Parquoy on la peut bien appeller en François Herbe à fouslonen haut Aleman *weschtant* & *Briffenhrant*, en Brabant *Weyppuyt*, c'est à dire Herbe fauoniere.

Le Sauvage s'appelle pour le present *Herba Gerardii*, *ἡ ἑπτὰ φύλλων*, & *Septifolium*, c'est à dire Herbe Gerard, & Septuicelles en bas Aleman *Gerardt* & *Heurmblat*.

## LE TEMPERAMENT.

Ostrutium, principalement la racine est chaude & seche iusques au tiers degré.

Le Sauvage est assez de pareille qualité, mais non si forte.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de Struthion ou Ostrutium faict vriner, nettoye & mondifie les rognons & la vesie & ouvre les oppilations du foye, est vtile à la jaunisse enuieillie, & comme Pline escrit, elle purge la matrice, elle esmeut le flux menstrual, & pousse hors l'arriere fais & l'enfant mort.
- B Icelle beuë avec la racine de Cappres, rompt la pierre, & la fait sortir par l'vrine, & par mesme moyen est tresbonne contre duretes de ratelle.
- C Icelle prise avec miel, mondifie le thorax, & resout grosses phlegmes & visqueuses; & est tresutile à ceux qui ont la toux, qui ont courte haleine, & contre difficulté de respirer, si on en prend enuiron vne cuillierée. Et si on la boit avec eauë miellée, elle guerit gens qui souspirent profondement & continuellement.
- D Elle faict esterner si on la met pilée avec du miel dedans le nez. Et tenuë en la bouche & machée, appaise douleur de dens, & tire du cerueau beaucoup de phlegme & humeurs.
- E Icelle reduicte en forme d'onguet avec vinaigre & farine d'orge, emporte mauuaises roignes & gratelle, & efface toutes taches du cuir.
- F Icelle cuitte avec vin & farine d'orge, puis appliquée, resout & efface toutes tumeurs froides.
- G Appliquée par dessous en forme de pessaire, elle esmeut les fleurs menstruales, & tire hors de la matrice l'arriere fais & enfant mort.
- H On la mesle vtilement en tous vnguens & emplastres faicts pour eschauffer & amollir, & parmy colluyres que lon prepare pour esclaircir & conforter la veuë.
- I Dauantage, les nouveaux Praticiens disent que Ostrutium n'est pas seulement vtile contre tout poison, mais aussi quelle est tresinguliere contre tout mauuais air & infect, pareillement contre la peste, si on la boit avec du vin. Et quicelle pilée seule ou avec ses fueilles, resout & guerit carbocles pestilentioux, anthraces, & tumeurs appliquée dessus.
- K La racine d'icelle beuë en vin guerit rigeurs de fieures enuieillies, & l'hydropisie, & faict suer.
- L Icelle prise en mesme sorte, conforte & corrobore l'estomach, ayde à la digestion, faict reuenir l'appetit, & digere les ventosités & inflations des flancs & du ventre.
- M Elle ayde aussi grãdement à ceux qui sont tombés de haut, lourdement hurtés, ou rompus par dedans, car elle guerit les blessures, & dissout le sang caillé & figé dedans le corps.
- N Icelle pilée avec ses fueilles, est fort vtilement appliquée sur morsures de chiens enragés, & sur toutes morsures & piqures de serpens & semblables bestes venimeuses.
- O Le Sauvage pilé puis appliqué sur membres trauuillés de la gouste, appaise la douleur, & en oste l'enflure.
- P Et comme on a experimenté en plusieurs lieux elle guerit les morenes si de la decoctio d'icelle on foment le siege.

FIN DE LA SECONDE PARTIE DE L'HISTOIRE  
DES PLANTES.

**LA TIERCE PARTIE**  
**DE L'HISTOIRE DES PLANTES, TRAI-**  
**TANT DE LA FORME, NOMS, TEMPERAMENT, VER-**  
**tus, Operations & nuisances des racines, & herbes**  
**portans medecine, & plantes nuisibles.**

PAR REMBERT DODOENS.

De la Sarrafine, ou Aristolochie. Chap. I.

LES ESPECES.

**A**ristolochie, comme dit Dioscoride, est de trois sortes, à sçavoir la Longue, la Ronde, & celle qu'on nomme *Clematis*.

*Aristolochia rotunda.*

Aristolochie ronde.

*Aristolochia clematis.*

Tierce espece d'Aristolochie.



**LA FORME.**

- 1 L'Aristolochie longue a les tiges gresles, tendres, hautes d'environ vne paulme, les fueilles larges semblables aux fueilles du Lyarre. Les fleurs purpurées & de forte odeur, apres lesquelles tombées vient le fruit en façon de petites poyres. La racine est de la grosseur d'un doigt ou d'un poulce, iaulne par dedens, pres semblable à la racine de Gentiane, de goust acré & amer, & forte en odeur.
- 2 L'Aristolochie ronde a beaucoup de tiges tendres sortans de la racine-les fueilles rondes comme celles du Lyarre & de l'Aristolochie longue, plus rondes toutesfois & plus noires-les fleurs blanches, formées comme vn cochluchon du temps passé. La racine ronde de la grosseur d'une petite raue, ridée, iaulne par dedens, non différente à la Longue en odeur & saueur.
- 3 La tierce espece a aussi les tiges menues, tendres, portans fueilles semblables au Lyarre. Les

fleurs croissent entre les feuillés, & sont longues, creuses, de couleur palle iaulne, apres lesquelles produict aussi vn fruit en forme de poyre. Les racines sont longues, menues, reueltes d'une corce epesse, semblable aux autres de gouff, odeur & couleur.

Outre ces trois, Plin describe encores vne Quatriesme espece, incognue en ce pais, laquelle est la moindre de toutes les Sarrafines: elle a les feuilles de Lyarre, plus petites. Les fleurs noiratres, ou palles, de la façon des autres. La grainé enclose en pareilles pommes comme celle de la Rode, & a mout de racines de la grosseur de jons.

## LE LIEV.

L'Aristolochie longue & ronde croissent en plusieurs lieux d'Italie, pareillement en quelques endroits de France comme en Prouence & Languedoc au tour de Mompelier, où se trouue aussi en grand quantité la quarte Espece: De là on apporte en Auers à vendre la Ronde.

La tierce Espece ayme les vignobles & lieux hauts: elle se trouue en plusieurs lieux de Brabant, le long des hautes campagnes.

## LE TEMPS.

L'Aristolochie florit en May & Iuin.

## LES NOMS.

Aristolochie s'appelle en Grec ἀριστολόχια: en Latin *Aristolochia*: és Boutiques *Aristologia*: en François Sarrafine: en Aleman *Wstertacep*.

La premiere espece se nomme en Grec ἀριστολόχια μακρά: en Latin *Aristolochia longa*, & *Aristolochia* ma: d'aucuns *δακτύλιος μαλακός* par, & *τύβινον*, *Dactylitis*, *Melocarpion*, & *Teuxinon*.

La seconde Espece s'appelle ἀριστολόχια στρογγύλη, *Aristolochia rotunda*, & *Aristolochia* *famine*: d'aucuns *χαμαίολον*, & *Malum terre*.

La tierce Espece s'appelle ἀριστολόχια κλαματίτις, *Aristolochia clematitis*: és Boutiques de ce pais *Aristolochia longa*: en Brabant *Sarrafijn cruyt*, & d'aucuns là selon en Latin *Herba Sarracenia*.

La quarte est appelée de Plin *πυλώχια*, & *πολύριζον*, *Pistolochia*, & *Polyrhizon*.

## LE TEMPERAMENT.

Les racines d'Aristolochie sont chaudes & seches iusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les racines d'Aristolochie sont singulieres contre tout poison, contre morsures & piqures de bestes venimeuses, prinés avec vin, ou appliquées sur la morsure.
- B L'Aristolochie longue esmeut le flux méstrual des femmes, & prouoque l'vrine: & si on la boit avec poyure & myrrhe, elle pousse hors la secondine, l'enfant mort, & toutes autres superfluités amassées dans la matrice. Elle fait pareille operatiō si on l'appliq par dessus en forme de pessus.
- C L'Aristolochie rōde est fort propre pour les mesmes effets: outre ce elle profite grandement à ceux qui ont courte aine, le hoquet, douleur de costé, la ratelle endurcie, conuulsio, epilepsie, la poutte, & frissons: & à tous ceux qui sont blessés ou rompus par dedans, si on la boit avec eau.
- D Icelle tire hors les esquilles des os rompus, les fleches, dards, espines & eschardes, appliquée sur le lieu avec poix ou resine, comme dit Plin.
- E Icelle mondifie & nettoye tous vlcères pourris, malings, & cauerneux: & les emplit de chair nouvelle. Principalement elle guerit les vlcères & vices des parties honteuses si on les laue de la decoction d'icelle faite en vin.
- F L'Aristolochie ronde embellit & nettoye les dens, & les raffermis, quand on les frotte souuēt de la poudre d'icelle.
- G La tierce espece ressemble fort aux deuantdictes en vertu, sinon qu'elle n'a point si grande efficacité, tesmoing Dioscoride.

## LE CHOYS.

L'Aristolochie ronde est de parties plus subtiles, & de plus forte operation, fort mondifiante, & abstersiue, & subtiliante les grosses humeurs.

La Longue n'est pas de parties si subtiles, ne tant abstersiue, mais elle fait mieux croistre la chair és vlcères.

La Clematitis a la meilleure odeur, parquoy elle est plus propre à faire vnguens.

## De la Racine creuse.

## Chap. II.

## LES ESPECES.

LA Racine creuse est de deux sortes. L'une a la racine toute ronde, & non creuse par dedans. La racine de l'autre est creuse au dedans: au reste elles ressemblent l'une à l'autre de tiges, feuilles, fleurs, & semence.



## LA FORME.

Radix caud.

Racine creuse.

LA Racine creuse a les tiges tendres & menuës, d'environ vne pausme de longues feuilles petites, semblables aux feuilles de Rue: au pl<sup>us</sup> haut des tiges elle porte fleurs semblables en façon, à celles de la Consoude Royale, plus petites toutesfois & incarnées, aucunesfois blanches, bien amassées ensemble. Apres les fleurs apparoissent filiques contantes vne graine røde & noire. La racine de l'vne est toute ronde, ferme, l'autre par dedans, couuerte d'vne pesu noirastre: la racine de l'autre est souuent longuette comme vne poyre, creuse par dedous & par dedans.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en lieux ombrageux, & au pé dant des montaignes. La petite qui n'est pas creuse se trouue en aucuns lieux de Brabant & pres de Louvain. L'autre qui est creuse croist en Alemagne. Et là ou l'vne croist, l'autre n'y croist point, tellement que iamais celle qui est plaine ne se trouue avec la creuse, ny la creuse avec la plaine.

## LE TEMPS.

Ceste herbe commence à produire de bonne heure ses tiges & feuilles en Feurier, & florit en Mars & iure sa semence en Aueil, de là en auant l'herbe perit, & ne demeure sin on la racine sous la terre.

## LES NOMS.

La racine par dedés creuse s'appelle en Aleman *hohwastel*, c'est à dire Racine creuse en François, & *hohwastel* en bas Aleman, parquoy là selon on la peut appeller en Latin *Radix caud.*

L'autre qui est plaine, ferme, & espesse, se nomme en Brabant *Boonkens hohwastel*. Ceste racine principalement la creuse a esté tenue long temps es Boutiques de par deça pour la vraye Aristolochie ronde, & encores est elle pour le iour d'huy tenue & vsurpée par les Apothicaires ignorans. Aucuns sçauis cuident que ceste herbe soit la *Pistolochia* descrite par Pline: Les autres en font vne espèce de Fumeterre appellée *Capsos phragmites*: Les autres la reduisent sous les espèces de Hyacinthe. Aucuns en font *ερίφύα*, *Eriphyra* & *Planta veris*, avec laquelle elle semble auoir plus grande similitude.

## LE TEMPERAMENT.

La Racine creuse est chaude & seche au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine creuse guert la squinnee, & vieilles enflures du gosier & des amigdales, si on gar-A garize la decoction d'icelle faite en eau seulement, ou avec vinaigre, car elle coupe les grosses humeurs & les consume.

Elle est bonne pareillement contre tumeurs de la luette tenue en la bouche & machée, ou la B poudre d'icelle appliquée dessus.

Icelle avec vnguent populeon, degaste les morenes, & appaise la douleur d'icelles. C

## De Apios.

## Chap. III.

## LA FORME.

APIOS comme dit Dioscoride, a trois ou quatre tiges, menuës, rougeâtres, qui ne s'eleuent guere de terre, ayans feuilles largettes, non par trop differentes aux feuilles d'Hypericon, vn peu plus estroictes toutesfois. Les fleurs croissent au sommet des tiges. La racine est fonde & espesse, formée en façon de poyre, noire par dehors, blanche par dedens & pleine de ius.

## LE LIEV.

Apios croist en isle de Lemnos, & quelques endroits d'Italie, principalement en Apulie. On la plante icy es iardins des Herboristes.

# 214 De Apios. Chap. III.

## LES NOMS.

Cette herbe se nomme en Grec *ἄπιος* : d'aucuns *χαμαίβοδανος* & *ἰχθυος*; en Latin aussi *Apios*, *Chamaebolus*, & *Ichthys*, De Theodorus Gaza *Casrica*, & des autres *Radix sylvestris*.

## LE TEMPERAMENT.

*Apios* est de nature chaude & seche.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La partie d'enhaut de la racine d'*Apios* prise, purge par vomissemens les humeurs phlegmatiques & bilieuses : mais la partie inferieure purge par bas : & prise toute entiere, purge les mesmes humeurs par haut & par bas.
- B Parcille vertu a le ius d'icelle prins par dedans.

## De *Asclepias*, ou *Vincetoxicum*.

### Chap. IIII.

## LA FORME.

**A** *Asclepias* ressemble aucunement à la tierce espece d'*Aristolochie*, en tiges & feuilles, Elle a les tiges vnies, rondes, menues, d'environ deux pieds de haut, portant feuilles noerates, non guere differentes aux feuilles de *Lycarre*, plus longues toutesfois. Les fleurs croissent sur petites queues entre les feuilles, de couleur palle blanche, ou palle iaulne, aucunesfois noire, de forte odeur, apres lesquelles viennent loques filiques aigues, lesquelles fouurent d'elles mesmes quand elles sont meures & là dedans est contenue vne graine enuoloppée en vne laine blanche, qui est rougeatre & large, nō guere differēte à la graine de *Gentiane*. Les racines sont longues, rondes, fibreuses, entrelacées biē pres comme celles de l'*Hellebore* noir bastard.

## LE LIEV.

L'*Asclepias* prouient es montaignes rudes, hautes, & sablonneuses, & en lieux pierreux.

## LE TEMPS.

Elle florit en Iuin, & liure sa semence en Aouft.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *ἀσκληπιάς*, & en Latin *Asclepias*, d'aucuns *κιάριον*, *Hederula*, & *κισσόφυλλον*, *Hederæ* *folium*, & à present *Hirundinaria* : en haut Aleman *Schwalben-tourty*; en bas Aleman *Schwalbenstef*.

## LA CAUSE DV NOM.

Cette herbe a prins son nom du bon vieillard *Esculapius* qui se nomme en Grec *Ἀσκληπιός*, lequel les Grecz & Gentils disent auoir esté premier inuēteur de la Medecine, pour tant est il tenu & honoré d'icieux pour vn Dieu.

## LE TEMPERAMENT.

*Asclepias* est de qualite chaude & seche, & de parties subtiles. LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de ceste herbe boulie en esuē & bouē, appaise trenchées de ventre, & est fort vtile à ceux qui sont mords de quelque beste venimeuse, ou de chien enragē, non seulement prise par dedans le corps, mais aussi appliquée par dehors.
- B Les feuilles d'icelle pilées & appliquées profitent grande mēt aux vlcères malings, tāt des mammelles, que de la matrice.

Du Caba-

*Apios.*



*Asclepias.*



LA FORME.

Afarum. Cabaret.

LE Cabaret a les fueilles verdes tirans sur le noir, ron des, semblables aux fueilles de Lyarre, beaucoup toutesfois plus rondes & plus molles, entre & sous lesquelles, sur la terre croissent sur courtes queues belles fleurs brunes & bien odoriferantes, formées comme la fleur d'une Grenade, & cōme le calcule de Hanebane; ou Insiquame. Les racines sont menues, lōgues, tortues, se iettans çà & là, & ayans plusieurs fibres, d'odeur plaisante, & de goust piquant à la langue.

LE LIEV.

Il croist voluntiers en lieux vmbreux, & terre sca-breuse & seche, principalement au pendant des montaignes & es boys qui sont fort vmbreux.

LE TEMPS.

Le Cabaret florit vn efois au commencement du printemps, & encores vn efois à la fin de presté.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec ἀράρις en Latin & es Boutiques *Afarum*: d'aucuns *Nardus rustica*, & *Perpensa*, Macer la nomme *Vulgo*: en François Cabaret en haut Aleman *Häselwurtz*: en bas Aleman *Häselwurtel* & d'aucuns *Mansfoosen*.

LE TEMPERAMENT.

Le Cabaret est chaud & sec iusques au tiers degre, principalement la racine, laquelle le plus souuēt est vsur pée en Medecine.

LES VERTVS ET OPER.

La racine du Cabaret boulie en vin & beuë, prouoq l'vrine, & prouffite à la strangurie, & contre la toux, courte aleine, difficulté de respirer, & conuulsions & contraction de quelque membre.

Icelle prinse en mesme sorte, est vtile contre tout venin & toutes morsures & piqures de serpens & bestes venimeuses.

Icelle cuiète en vin est fort bonne aux hydropiques, & contre la sciatique.

La mesme prinse avec vin miellé, esmeur le flux menstrual aux femmes, & pouffe hors la seconde & autres superfluites hors la matrice.

Les fueilles du Cabaret broyées avec vin, puis passées, & le ius d'icelles beu, font vomir & purgent par vomissement le phlegme visqueux & la cholere.

On applique vilement les mesmes sur douleurs de teste, sur inflammations des yeux, sur mamelles par trop emplies de lait, quand on les veut secher: & sur feu volage, signaimment quand il ne faict que commencer.



A  
B  
C  
D  
E  
R

De la Serpentaire, ou Serpentine. Chap. VI.

LES ESPECES.

**D**RACINEALS, c'est à dire Serpentaire, est de trois sortes, comme dit Pline, à sçauoir la Grande, la Petite, & l'Aquatique.

LA FORME.


1 La premiere espece appellée la grande Serpentaire, porte vne tige grosse, vnie, nue & ronde, semée de mout de taches rouges comme vn serpent. Les fueilles sont parties en plusieurs autres, dont chacune à part ressemble aux fueilles de Parelle ou Ozeille. Au sommet de la tige croist cōme vne grappe amassée, comme à l'Aron, verte au commencement & puis apres iauue en rouge, de goust fort chaud & acre. La racine est ronde & blanche.

2 La seconde espece a les fueilles grandes, larges comme Lyarre, tachetées de blanc, semblables en figure à celles d'Aron, non si lōgues toutesfois. La tige est aussi lōgue, vnie, & semée de plusieurs taches rouges & perses, au plus haut de laquelle croist vn fruit cōme à la premiere espece. La racine aussi ronde & blanche, couuerte d'une petite & deliée peau. Ceste espece n'est pas encores cogneue en ce pais.

La tier-

*Dracunculus maior.* Grande Serpentine.

*Dracunculus palustris.* Serpentine aquatique.



*Dracunculus Matthioli.*



3 La tierce espece, laquelle se peut nommer Serpentine aquatique, a feuilles grandes, larges, r6des, bien pres aussi semblables aux feuilles de Lyarre, plus grandes toutesfois, lesquelles prouiennent d'une tige ronde, pleine de jointures & neuds, se trainant par terre, & jettant en plusieurs endroits racines fibreuses, par lesquelles elle se fiche en la terre. A l'extremite d'icelle croist vne petite tige droite, portant comme vne petite grappe amass6e, verte au commencement, & puis apres rouge. Et droit dessous la grappe croist vne feuille semblable aux autres, du tout blanche par dessus & verte par dessous, laquelle s'esleue d'elle mesme qu'el le fruit est meur, de sorte que la moyntie de la grappe est bien couverte.

4 Outres ces Espece y en a encore vne autre mise en lumiere par le trescaut Matthioli, laquelle produit feuilles grandes & larges, enuolop6es l'une dans l'autre & la tige droite, portant a la cyme ses fleurs en forme d'un epi. La racine de laquelle est aussi ronde comme celle des autres devant dictes, ainsi que la figure le demonstre. LE LIEV.

1 La premiere Serpentine croist volontiers en lieux vmbreux, & on la plante en ce pais 6s vergers.

2 La seconde ayme aussi lieux vmbreux, les hayes, & se trouue en abondance 6s Isles de Maiorque & Minorque.

La tier

3 La tierce espece croist en ce pais en lieux humides & aquatiques, au bord des fossés & flets, & aucunefois aussi le long des riuieres. **LE TEMPS.**  
Elles florissent en Iuillet, & en Aoult est le fruit mür.

**LES NOMS.**

1 La premiere espece se nomme en Grec *Dracunculus maior*: en Latin *Dracunculus maior*, d'aucuns *Serpentaria* & *Colubrinæ*: en Boutiques *Serpentaria maior*: de Serapio Luf: en François *Serpentaire* ou *Serpentine*: en haut Aleman *Schlangenkraut*, *Wschentwurtz*: en bas Aleman *Speckwostel* & *Wschentwostel*.

2 La seconde espece s'appelle en Grec *Dracunculus minor*.

3 La tierce s'appelle à present *Dracunculus palustris*, & d'aucuns *Arum palustre*: en François *Serpentaire d'eau* ou *aquatique*: en haut Aleman *Wasser Schlangenkraut*, *Wasser Wschentwurtz*: en bas Aleman *Water Wschentwostel*.

4 La quarte est tenue de *Matthiolus* pour *Dracunculus*, ce que toutesfois selon nostre opinion n'est vray semblable, car à mon iugement celle là est le premier *Dracunculus*, laquelle nous auõs pour icelluy baillée. **LE TEMPERAMENT.**

Ces herbes, principalement leurs racines & fruit, sont chaudes & seches iusques au tiers degré.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

Les racines de ces herbes boullies ou rosties, & meslées avec miel, puis lechées, prouffitent à ceux qui ne peuuent auoir leur aleine, qui sont tormentés de toux difficile, & de catarrhes, c'est à dire defluxion d'humours hors du cerueau en la poitrine; contre conuulsions, car elles coupent, meurissent, & cõsumēt toutes grosses humeurs & visqueuses, & nettoiyēt toutes parties interieures.

Pareille vertu ont elles si on les boullit trois ou quatre fois tant quelles ayent perdu leur acrimonie, puis qu'on les mange es viandes comme dit *Galen*.

Icelles sechées & meslées avec miel, nettoiyent viceres malings & rongeurs, & difficiles à curer, C signamment avec la racine de *Couleurée*, & oste toutes taches blanches & escailleuses, du corps de la personne, si on les en frotte.

Le ius de la racine d'icelles oste toutes taches & mailles des yeux, & est vilement meslé avec *D* collyres,

Le mesme distillé es oreilles avec huile, oste la douleur d'icelles.

Le fruit de la *Serpentaire* guerit viceres malings, & mange la chair superflue qui croist dans le nez, c'est polype, & est tresvilement appliqué sur chancre & semblables viceres malings.

Les feuilles encores verdes & fresches, sont pro pres pour playes nouvelles & freschement faictes, mais estans seches, elles n'y duisent point.

On trouue aussi par escrit que si on met vn frõs maige entre ces feuilles, quelles le garderont de gaster & pourrir.

*Dioscoride* escrit que lon dit que ceux qui porteront sur eux les feuilles ou racine de la grande *Serpentaire*, ne pourront estre seruz ne piques de viperes ou serpens.

**Du Pied de veau. Chap. VII.**

**LA FORME.**

LE Pied de veau a grandes feuilles, verdes, larges, bien pres semblables à la *Iorte*, entre lesquelles vient vne tige, d'enuiron vne paulme de haut, au sommet de laquelle croist comme vn pestel ou pilon portant en la fin plusieurs grains ronds amassés en vn, faisans ensemble comme vne grappe de raisin, verde au commencement, & puis apres bien rouge. La racine est blanche, ronde, bien pres comme vne olive, ayant plusieurs fibres.

**LE CIEV.**

Aron syme lieux froids & vmbreux.

**LE TEMPS.**

Les feuilles d'Aron sortent en Mars & Aueil, & elles



elles perissent & euanuissent en Juin, demourant la tige avec le fruit desnuée iusques en Juillet & Aoust, & de là en auant se meurit le fruit.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec ἀρίφρον en Latin Arumés Boutiques Aron & Barba Aron: d'anciens Per vituli, Lapha, & κολοκάστρον Colocasionen François Pied de veau & Vit de prestre: en haut Alleman Passerpiest & Teufschén Jngber: en Brabant Papecullshens, & Calfsoet.

## LE TEMPERAMENT.

Le Pied de veau est de complexion chaude & seche, & est plus chaud en vne region qu'en l'autre comme dit Galien, car celui qui croist en Italie est seulement chaud iusques au premier, ou pres du second degré, & celui qui croist en ce pais est chaud iusques au tiers.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les racines, suelles & fruit d'Aron, ressemblent fort en facultez à la Serpentaire, principalement de celui qui croist en ce pais, lequel est fort chaud comme auons dict.

## D'Arifaron.

## Chap. VIII.

## LES ESPECES.

Il se trouue à present deux especes d'Arifaron, l'une à feuilles larges, & l'autre à feuilles estroictes.

Arifaron.

Arifaron alterum.



## LA FORME.

Le premier & vray Arifaron a les feuilles formées comme celles d'Aron, beaucoup toutesfois plus petites, entre lesquelles prouient vne tige tendre, sur laquelle croissent les fleurs & le fruit. La racine est longue & grosse comme vne olive.

Le second Arifaron a feuilles estroictes, & la racine epesse & large, bien pres comme vne petite raue, ainsi que la figure le monstre.

LE LIEV.

Ces deux herbes sont estrangeres en ce pais & ne se trouvent sinõ es iardins des Herboristes.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *αἰσάρα*; & en Latin *Arifarum*, & *Arifaris*: d'aucuns aussi *Aris*, comme dit Plinẽ.

LE TEMPERAMENT.

*Arifarum* est chaud & sec de complexion, plus qu'Arõ, testmoing Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

*Arifarum* ressemble fort aussi en facultez & operations au *Dracunculus*, & la racine de cestuy A cy est fort propre pour guerir fistules difficiles à curer, comme dit Dioscoride.

De la Centaurée.

Chap. IX.

LES ESPECES.

Dioscoride, Galien, & tous les Anciens medecins font deux especes de Centaurée, Grande & Petite.

*Centaurium magnum.*

Grande Centaurée.

*Centaurium minus.*

Petite Centaurée.



• LA FORME.

1 La grande Centaurée a la tige ronde, droicte, d'environ cinq ou six pieds de haut, sur laquelle croissent grandes feuilles & larges, parties en autres feuilles fort ressemblans aux grandes & intérieures feuilles d'un Noyer, sinon que chacune feuille est plus longue & crenée tout au tour. Au plus haut de la tige croissent chapeaux ronds & squameux, fort pareils à ceux des Bleüets, beaucoup plus grands toutesfois, hors desquelz sort la fleur blanche tirant sur le pers, qui ne sont autre chose que filets bien menus. Apres les fleurs peries la graine se trouue enclõse es chapeaux, qui est brune, semblable a la graine du Chardon nostre dame, mais plus grosse, enucloppée, d'un poil lanugineux. La racine est longue, pleine de jus, & de couleur brunẽ en rouge.

La petite Centaurée a tiges petites, tendres, anguleuses, & les feuilles petites, non guere différentes à celles de la Mariolaine: à la sommité des tiges croissent fleurs belles, incarnées, lesquelles souurent du matin apres Soleil leuant, & se ferment derechef au soir. Les fleurs tombées croissent petites siliques aiguës, de la grandeur d'un grain de bled, contenans vne graine fort petite. La racine est petite, ligneuse & de nul vsage en Medecine.

## LE LIÈV.

La grande Centaurée, ne croist de soy mesmes en ce païs, mais elle se trouue és iardins d'aucuns Herboristes qui la sement & entretiennent avec grande diligence. Desoy mesme tesmoing Dioscoride elle prouient en Lycie, la Morée, Arcadie, Helide, Messie, & en plusieurs endroits de Phloe & Smyrna, & ayme lieux gras, haut situés, & là ou le Soleil luit fort.

La petite se trouue icy és prés haut assés & secs, & campagnes herbues.

## LE TEMPS.

La grande Centaurée florit en ce païs en Iuin, & la semence est meure en Iuillet.

La petite florit depuis Iuillet iusques en Septembre, & liure souuent sa semence.

## LES NOMS.

La grande Centaurée se nomme en Grec *κνροάριον* τὸ μέγα: en Latin *Centaarium magnum*: d'aucuns tesmoing Apulcie Maronion, Nefion, Pelethronia, Linnier, Hemeroton, *αἰμα ἀρωδιου*, id est, *Herculis sanguis*, Polybidion, & *Vasfira*: en aucunes Boutiques non sans erreur *Rhapontica*: en bas Aleman *Groote Santosie*.

La Petite s'appelle en Grec *κνροάριον* τὸ μικρὸν: en Latin *Centaarium paruum* & *Centaarium minus*: d'aucuns *Febri faga*, *Bel terra*, & *Multiradix*: és Boutiques *Centaaria minor*: en François *Centaurée* & *Fiel de terre*: en haut Aleman *heint Tausenéguldendranz*, *stoberkraut*, *Erdgall*, & *Biberkraut*: en bas Aleman *clayn Santosie*, ou *clayn Lentosie*.

## LA CAUSE DV NOM.

La Centaurée s'appelle en Grec *Centaarium*, & *Chironion*: à cause du vieil Chiron Centaure, lequel a tout le premier trouué ces deux herbes & les a môstrées à Esculapius comme dit Apulcie, ou comme les autres disent, pour ce qu'il fut par icelles guery d'vne playe qu'il eut d'auoir laissée tomber vne des fleches d'Hercules sur son pied.

## LE TEMPERAMENT.

La grande Centaurée est chaude & seche iusques au tiers degré, & astringente.

La Petite est de qualité semblable à la grande.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de la grande Centaurée prinse à la quantité de deux drachmes en eauë fil y a fleurs & en vin, sans sieure, est vtile à ceux qui sont rompus, qui crachent sang, contraction de quelque membre, courte haleine, difficulté de respirer, & contre trenchées de ventre, & toux enuieillie.
- B Icelle beuë en vin, prouoque les fleurs menstruales, & pouffe hors de la matrice l'enfant mort, comme elle fait aussi appliquée par dessus en forme de pessus.
- C La racine de la grande Centaurée encores verde, ou trempée en eauë, guerit & consolide toutes playes fresches & nouvelles, appliquée dessus.
- D Le ius de la racine, lequel on amasse & garde en aucuns païs, a pareille vertu que la racine.
- E La racine de la petite Centaurée n'a nul vsage en medecine, mais les feuilles, fleurs & ius d'icelle sont necessaires.
- F La petite Centaurée boulie en eauë ou vin, purge par bas les humeurs bilieuses, & phlegmatiques & grosses, parquoy elle profite à ceux qui sont trouuillés de Sciaticque, filz sont purgez par icelle iusques au sang.
- G Elle est fort bonne contre oppilations de foye, contre la iaulniffe, & contre duresses de ratelle.
- H La decoction de la petite Centaurée, beuë, tue les vers & les pouffe hors par bas. Elle est aussi tresvtile contre conuulsions & spasmes, & toutes maladies des nerfs.
- I Le ius d'icelle prins ou appliqué par bas en vn pessaire, reueille le flux menstrual, & iette hors l'enfant mort.
- K Le mesme avec miel esclaircist la vueë, & en oste tous brouillas, si on le distille dedans les yeux & est vilement meslé en tous collyres à ce propos.
- L La petite Centaurée verde, pilée, & appliquée, consolide & guerit playes fresches, & referme vieux vlcères malings, & difficiles à curer.
- M Icelle secheë & puluerisée se mesle vilement avec vnguents, emplastres, poudres, ou semblables medecines qui remplissent de chair les fistules & vlcères canerneux, & qui amolissent duresses.



LES ESPECES.

Le Rha est de plusieurs sortes, non dauéres en figure, mais seloñ la diuersité des lieux où il croist, & se trouue. L'un croist en Pontus, & se nomme *Rhaponticum*. Le second en Barbarie & s'appelle *Rubarbarum*. Le tiers és Indes & s'appelle *Rauedfeni*, &c.

LA FORME.

Rha.

Rheubarbe.

Rha a les feuilles grandes, larges, comme celles du Bouillon blanc, ou du grand Glouteron, crenées tout à l'entour en forme de sié, verdes & vnies par dessus, & blanches & velues par dessous. Entre icelles prouient vne tige ronde, droicte, d'environ vne coudée de haut, & au dessus vn beau chapi téau fort squammeux, lequel quand il fouure monstre vne belle fleur purpurée, & puis apres la graine, non differente à celle de la grande Centaurée, vn peu plus longue toutesfois. La racine est longue, grosse & fungueuse.

LE LIEV.

Rha prouient és régions de Pontus, au dessus le Bosphore pres le fleuue Rha, pareillement en Barbarie & és Indes se dit Mesue. Nous l'auons veu en ce pais au iardin de M. Gaspar vander heyden à Louvain, lequel l'auoit semé & entretenu avec tres grand soing.

LE TEMPS.

Il florit en Iuin.

LES NOMS.

Ceste herbe, & signammét la racine s'appelle en Grec *ῥῆ*, *ῥῆος*: en Arabiq *Rheu* & *Raed*, ou *Rauet* de Plin en Latin *Rheoma* & *Rhazoma*.

- 1 Celle qui croist au dessus du Bosphore s'appelle en Grec *ῥῆ ροῦντικόν*, en Latin *Rha Ponticum*, ou *Rhaponticum*: de Mesue *Raed Tareicum*, c'est à dire Rha de Turquie.
- 2 Le second qui croist en Barbarie se nomme *Rha Barbarum*, & de Mesue & des Apothicaires *Rhas barbarum*.
- 3 La tierce croissant és Indes s'appelle *Rha*, ou *Rheum Indicum*, & des Medecins Arabes *Rauet feni*, ou *Raedfeni*.

LE TEMPERAMENT.

Rha est chaud au premier degré, & sec insques au second, & de nature astringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Racine du Rha Ponticum, se dit Dioscoride, prouffite contre inflations, fluctuations, & de labilité d'estomach, & toutes douleurs d'icelui. Dauantage elle est fort propre à ceux qui sont trouués de conuulsion, ou de quelque maladie du foye ou de la ratelle, contre torsions & douleurs de ventre, & des rognons & de la vessie. Item cōtre douleurs de mammelles, de la matrice, à ceux qui sont molestés de la goutte sciatique, qui erachent sang, qui soupirent, ont le hoquet, cōtre la dysenterie, flux de ventre, & contre fieures, & morsures & piqures de toutes bestes venimeuses.

Pour les mesmes effects on le prend à la quantité d'vne drachme avec eau miellée ou hydromel, sil y a sieure: avec syrop acetes contre maladies de la ratelle: avec vin miellé, contre maladies du thorax: & tout sec & sans humeur, cōtre humidité & relachement d'estomach.

La racine de Rha Pontique broyée avec vinaigre guerit la gratelle blanche & vilaine, & oste les taches palles & lurides du corps, induicte dessus.

Rheubarbe & Rauedfeni comme escrit Mesue, prins à la quantité d'vne drachme, purge par bas les humeurs bilieufes, parquoy prouffite contre toutes fieures chaudes, inflammations & opilations de foye, & iaunisse, signamment quand on le baille avec megue de lait, ou avec quelque eauë ou bruuage rafraeschissant.



## 222 Du Cyclaminus, ou Pain de pourceau. Ch. XI.

**E** Le Rheubarbe de sa propriété est aussi utile contre tout flux de sang soit par bas, soit par haut & ayde grandement à ceux qui ont quelque playe au dedans ou rōpure, contre lourdes cheutes & battures, & contre conuulsions de quelque partie & contraction ne nerfs.

**F** Il gucrit aussi la dysentere, & tout flux de ventre, bien fesché au feu, puis beu avec ius de Plantain, ou avec gros vin rouge. **LE CHOYS.**

Le meilleur Rha, comme dit Mesue, est celui qui croist es Indes appellé Rhaedfeni, puis apres le Rheubarbe de Barbarie, & celui qui a le moins de vertu est le Rhabontique.

### Du Cyclaminus, ou Pain de pourceau. Chap. XI.

#### LES ESPECES.

**I**ly a deux sortes de Cyclaminus, selon Dioscoride, L'vn est vne herbe basse ayant la racine rōn de lequel on nomme simplement Cyclaminus, nous l'appellons Pain de pourceau. L'autre croist haut, & s'enneloie au tour des arbres, lequel n'a point de racine singuliere, il s'appelle Cyclaminus altera.

#### LA FORME.

**1** Le Pain de pourceau a les fueilles rondes, de verd obscur, estendues sur la terre, non guere differentes aux fueilles du Cabaret, plus petites toutesfois, & rougeatres au costé de deslous qui regarde la terre. Entre icelles viennent les fleurs assises sur courtes queue's, de couleur incarnée, ou purpurées en rouge. La racine est noiratre par dehors, & blanchatre par dedans, ronde, large, bien pres comme vne petite rane, ayant plusieurs fibres.

De ceste espeece sen trouue encores vn qui a les fueilles larges, anguleuses, fort semblables à celles du Lierre, plus petites toutesfois & semées de taches blanches: les fleurs belles d'vn pers obscur, fort sēblables aux Violettes de forme & de couleur, & celle icy a la racine ronde, rougeatre, de la grosseur du chapeau de Saffran.

**2** La seconde espeece de Cyclaminus a les tiges longues, noueuses, s'ennelōpāt au tour des arbres & hayes: les fueilles moindres q̄ celles du Lierre. Les fleurs sont blanches, odoriferantes. La racine est tendre, petite, & inutile. **LE LIEV.**

Le Pain de pourceau ayme lieux vmbreux, sous les arbres, hayes & buissons & en aucuns bois, toutes fois il ne se trouue point par tout.

#### LE TEMPS.

Le Pain de pourceau pert en Aoust ses fueilles, puis apres les fleurs sortent de terre & durent iusques à la fin de Septembre. **LES NOMS.**

**1** La premiere espeece s'appelle en Grec κυλάμιον & ἰχθυόειρον: en Latin Cyclaminus, Rapum terra, Tuber terra, & Vmbilicus terre: id̄ Apuleio Orbicularis, Palatia, Malum terra, Rapum porcinum, & Pānis porcini: es Boutiques Cyclonen, & Arabica: en François Pain de pourceau: en haut Aleman Erat apffel, & erapfot, Schwamstot & Erdmuets: en bas Aleman Dreyerhs broot.

**2** La seconde espeece s'appelle en Grec κυλάμιον & ἄγρα: en Latin Cyclaminus altera: d'aucuns κύμαρ, κυλάμιον, καὶ κυλάμιον: Et pour icelle tenons nous la Viorne, laquelle sera descrite cy apres au chapitre XLVIII.

#### LE TEMPERAMENT.

Le Pain de pourceau est chaud & sec iusques au tiers degre.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

**A** La racine du Pain de pourceau feschée, mise en poudre & prise à la quantité d'vne drachme, ou de drachme & demie avec eau's miellée autremēt dite hydromel, purge par bas grosses phlegmes & visqueuses, & autres humeurs aigueuses.

**B** Icelle prise en vin, prouffitte contre tout poison: & contre morsures & piqures de bestes venimeuses appliquée au dehors sur les blessures.

Cyclaminus. Pain de pourceau.



Icelle beue en vin ou avec hydromel, guerist la iaunisse, ouure les oppilations du foye, & fait C partir du corps la couleur iaune, si apres l'auoir prinse en ceste sorte on est bien couuert, & on sue.

Icelle prouoque aussi le flux menstrual des femmes, & pouisse hors l'enfant mort, beue, ou ap- D pliquee par dessous en forme de pessus.

Le ius d'icelle induict sur le nombril, ou sur le ventre, lasche le ventre tout doucement. Pareil- E le vertua il appliquee avec laine au fondement en forme de suppositoire.

Iceluy avec vinaigre arreste le fondement par trop relasché & tombant, induict dessus; F

Iceluy avec miel distillé dans les yeux esclarcist la veue, & oste toutes taches, la maille, & obscu- G rité des yeux.

Iceluy tiré par le nez, nettoye le cerueau, & purge par le nez les grosses & froides phlegmes. H

La racine du pain de pourceau embellist aussi le cuir, guerit mauuaise gratelle, & alopecies, effa- I ce les taches & cicatrices prouenantes de pustules & rougeoles, & toute laideur du visage.

Icelle appliquée sur la ratelle, ou bien le ius d'icelle mis aux vnguens ou huiles à ce propos, K diminue & guerit la ratelle par trop endurcie & oppilée.

Icelle guerit aussi les playes, meslée avec miel & vinaigre, & appliquée dessus, comme escrit L- Dioscoride.

La decoction d'icelle racine est vtile pour estuuer membres desnoüés, podagres, mules à ta- M lons, & roignes de la teste.

L'huile dans laquelle icelle est cuise, reserme vieux viceres: d'icelle aussi on fait vn onguent N avec vn peu de cire fort bon pour mules à talons & pieds engelés.

La racine pendue aux femmes qui sont en travail, les deliure d'enfant incontinent. O

LES NVISANCES.

En quelle maniere que ceste racine soit prinse, elle nuit fort aux femmes enceintes, parquoy elles se garderoient de non seulement la prendre par dedans, mais aussi de ne l'appliquer par de- hors en maniere quelconque, ne la porter sur elles, ne la planter en leurs iardins, car quand seule- ment elles ne seroient que marcher dessus, elles en seroient endommagées, se dit Dioscoride.

De la Gentiane. Chap. XII.

LA FORME.

1 Les premieres fueilles de Gentiane sont gran- des & larges, couchées & estendues sur la ter- re, bien pres semblables aux fueilles du grand Plan- tain, entre lesquelles prouient la tige ronde, vnüe, creuse, genouillée, de la grosseur d'vn doigt, & aucu- nefois de la hauteur d'vn homme, reuestue de fueils les plus petites, & aucunesfois crenées tout à l'en- tour. Les fleurs sont iaunes. La graine large & plat- te comme la graine d'Angelique, mais beaucoup plus petite, nō guere differēte à la graine de Giro- lée. La racine est lōgue, ronde, de couleur de terre par dehors, iaune par deds & de gouffortamée.

2 Outre la deuantdicte Gentiane, il se trouue en- cores deux autres sortes d'herbes, qui sont à pre- sent tenues pour Gentiane.

3 L'vne ressemble du tout à la Gentiane, plus pe- tite toutesfois, portant fleurs bleuës, & de goust beaucoup plus amer: pourtant Hieronimus Tra- gus dit qu'elle est de beaucoup pl<sup>us</sup> grāde efficace.

4 L'autre a tiges rondes, vnies, reuestues de fueil- les verdes, vnies, longues & estroictes, tousiours si- tuées deux à deux l'vne contre l'autre: au som- met de la tige croissent comme petites sonnettes de couleur cerulée, vn peu plus petites que les fleurs de la seconde espece de Ranunculus. La ra- cine est iaune, lōgue & amere.

LE LIEV.

La Gentiane croist sur hautes montaignes, &

Gentiana.

Gentiane.



en aucunes vallées entre la feugere, comme en plusieurs lieux d'Allemagne & de la Bourgoigne

## LE TEMPS.

La Gentiane fleurit en Juin, & la femence est meure en Juillet & Aouft.

## LES NOMS.

La Gentiane se nomme en Grec *γυριανή*; en Latin & es Boutiques *Gentiana*; d'Apuleius *Alce Galicea*; de Narce, *χρυσόπιπ*; Chironion, *Basilica*, *Cymialis*; en haut Aleman *Entzian*, *Bitterwurts*; en bas Aleman *Gentian*.

## LA CAUSE DV NOM.

Gentius Roy d'Illyrie a esté premier inuenteur de ceste herbe, & tout le premier la mis en medecine, pourtant selon le nom d'iceluy est appellée *Gentiana*.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de Gentiane mise en poudre & prise à la quantité d'une drachene avec vin, vn petit de poyure & de Rue, profite grandement à ceux qui sont mords ou piqués de quelque beste enragée, & qui ont prins quelque poison.
- B Iceille beue avec eäue, est vtile contre maladies de foye, & d'estomach, elle ayde à la digestion des viandes, & les retient dans l'estomach, & l'usage en est tresbon pour toutes maladies froides des parties interieures.
- C Le ius d'icelle guert mal de costé, & ayde à ceux qui sont tombés de haut, à gens rompus, car elle refout le sang liqé, & guert les playes.
- D La racine de Gentiane guert ausi playes profondes & rongeantes, signamment quand on distille le ius d'icelle dedans.
- E Iceuluy ius appliqué avec quelque linge bis delié, appaise & estaint douleur & chaleur des yeux & nettoye & efface toute laidure & taches du cuir de la personne, induict dessus.
- F La racine de Gentiane appliquée par dessous en forme de pessus, prouoque les fleurs aux femmes, & tire hors l'enfant mort.

## De la Croifée.

## LA FORME.

LA Croifée a les tiges rondes & genoillées: les fuil les longues, estroictes, & espesses, toujours deux l'une contre l'autre, & vn peu courbées en bas, entre lesquelles au sommet de la tige viennent six ou sept fleurs bleues, façonnées comme petites clochettes, sortans hors de calyces verts. La racine est longue, blanche, percée par le milieu en forme de croix.

## LE LIEV.

Ceste herbe se trouue en Allemagne en lieux rudes & non cultiués. LE TEMPS.

La Croifée florit en Juillet & Aouft.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en haut Aleman *Wodergere* & *Sperrenstich*; en bas Aleman *Wodergreter*, d'aucuns en Latin *Cruciana*, c'est à dire Croifée, d'aucuns *Chiliodonnis*: Les autres en sont le Phyteuma de Dioscoride: Les autres ausi *Cratogeom*: aucuns *Strution*. Conrad Gesnerus pense que ce soit vne espece sauuaige de Gentiane, l'opinion duquel nous semble approcher plus pres de la verité.

## LE TEMPERAMENT.

L'amertume de ceste herbe donne asses à cognoistre quelle est chaude & sèche & de qualité non guere differente à la Gentiane.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La decoction des fuilles ou racine de la Croifée beue, nettoye le thorax de toutes superfluités & gros flegmes amassés en iceluy, & est bonne contre le haut mal,

## Chap. XIII.

## Croifée.



Icelle prise en mesme forte que dessus, ou pulverisée & prise, est fort vtile contre tout venin B & poison, contre bar infect & maladies pestilenciales.

Il est bon de laver les playes & viceres malings du vin auquel icelle à bouli, ou espandre dedis C la poudre d'icelle, car elle les nettoye & guerit.

Les porcers d'Alemaigne la donnent bachee bien menu à manger aux pourceaux, & par ce D moyen les preserver du feu & semblables maladies qui en temps de peste frappée es pourceaux.

De Enule campane.

LA FORME.

1 **E**nule campane porte feuilles grandes, larges, & douces, non gueres differentes aux feuilles du Bouillon blanc, plus grandes toutesfois, entre lesquelles croist vne tige grosse, velue, longue, plus hau te bien souuent que la hauteur d'un homme, reue stues de semblables feuilles, mais vn peu plus petites: & à la cyme croissent belles fleurs grandes, iaulnes, en forme d'estoille, semblables en figure à la fleur de Chrysanthem, toutesfois beaucoup plus grandes, & bien pres de la grandeur de la paulme d'une main; lesquelles peries se tournent en laine ve lue, à laquelle est attachée la graine, & sermoile au vent, comme la semence des Chardons. La racine est grosse & grande, ayant plusieurs autres petites raci nes adionctes, reuestues d'une escorce epesse, brune par dehors & de couleur de terre, & pour la plus part blanche par dedans, & laquelle n'est de guere forte odeur & siveur, estant encores fresche, mais quid elle est seche, elle est forte & aromatique, con tenant en soy vne humeur grasse & oleagineuse.

2 Le second Helenium, lequel Dioscoride descri t aussi, nous est incogneu: il a les branches tendres, se traynans le long de la terre, couuertes de petites feuilles come celles de la Lentille. La racine est blan chatre, de la grosseur d'un doigt, large par haut, & estroitee par bas.

LE LIEV.

1 Enula campana ayme les valées de pais haut situés, comme pres des prés & lieux bas & humides. Elle se trouve aussi aucunesfois es lieux secs & hauts & om brageux, & es bois. Elle est fort commune par toute Flandre & Brabant, & bien cogneue par tout.

2 La seconde espece d'Helenium croist en lieux maritimes, & es collines.

LE TEMPS.

Enula campana florit en Iuin & Juillet, la semence en est meure en Aoust. Le temps meilleur pour cueillir la racine est la fin de Septembre, quand elle a perdu tiges & feuilles.

LES NOMS.

1 Ceste herbe se nomme en Grec *ἑλενιον*: en Latin *Isula*, & selon Apuleie *Isula campana*: d'aucuns Panaces *chironon*, ou Panaces *centauryon*: es Boutiques & en François *Enula campana*: en haut Alemañ *Mlanzwort*: en bas Alemañ *Wanwostel* & *Welanwostel*.

2 La seconde est appellée *Helenium aegyptiacum*, mais elle est encore incogneue des Modernes.

LE TEMPERAMENT.

Enula Campana encores verde, a vne humidité superflue, laquelle doit estre consumée auant qu'on la puisse mettre en vsage. Mais icelle sechée, elle est chaude au tiers degré, & seche au second.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoction d'Enula campana beue, prouoque l'vrine, & le flux menstrual aux femmes, A. & prouffit à ceux qui sont trauiuillés de rompures au dedans, ou qui ont quelque membre retré.

Chap. XIII.

Helenium. Lyonne.



- B** La racine prisee avec miel en forme de looth, nettoye le thorax, meurit & fait cracher le phlegme visqueux, & prouffite grandement contre la toux & courte haleine.
- C** Icelle mise en poudre & beue, est vtile contre morsures & piqures de bestes venimeuses, & contre ventosités & inflations des parties interieures.
- D** Icelle confitte, est conuenable à bestomach & ayde à la digestion.
- E** Les feuilles bouillies en vin & appliquées sur la hanche, appaisent la douleur que nous appellons sciatique.

## Du Meum.

## Chap. XV.

## LA FORME.

**M** Eum est décrit par Dioscoride entre les racines, parquoy nous ne pouons auoir autre connoissance de la forme, sinon entant qu'il a pleu aux Anciens de nous la laisser par esent, veu qu'elle est incogneue en ce pais: Cela disie à fin qu'on cognoisse, que les herbes, desquelles les Apothecaires & autres vident au iourd'huy en medecine, ne sont point le vray Meum, ce que nous ne pourrions sçauoir, si ce n'estoit que lon trouuast la forme & nature du vray Meum descrites.

Meum selon Dioscoride ressemble en tiges & feuilles à l'Aneth, sinon qu'il est plus gros & de la hauteur de deux coudées, ou trois pieds. Les racines sont longues, grosses, odoriferantes, eschauffans la langue, & se iettans de çà de là.

## LE LIEU.

Meum croist en Macedoine, & abondamment en Espagne.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *μαῖον*: en Latin *Meum*: Es Boutiques *Mew*, retenans seulement le nom, car le vray Meum est encores incognu, mais les Apothecaires vident en lieu d'iceluy, d'une espece de Persil sauuage, laquelle est descrite en la cinquieme partie de nostre Histoire des plantes, & n'a aucune similitude avec la description de Meum, pourtant n'est ce pas aüssi Meum.

## LE TEMPERAMENT.

La racine de Meum est chaude iusques au tiers de gre & seche iusques au second.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Les racines de Meum bouillies en eau, ou seulement desinellées en eau & beues, ouurent vertueusement les opilations des rongnons & de la vesie, prouuoquent l'vrine, donnent allegeance à la strangurie, & consomment toutes ventosités & inflations de bestomach.
- B** Icelles prises avec miel, appaisent douleurs & trenchées de ventre, sont bones aux affections de Pamarry, podagres & douleurs de ioinctures, & contre tous catarrhes & phlegmes descendis sur le thorax.
- C** Si les femmes s'assent dessus la decoction d'icelles, elle leur fait auoir leurs fleurs.
- D** Icelles induictes sur le bas ventre des petits enlans, les fait pisser & vriner.

## LES NVISANCES.

La racine du Meum prise en trop grande abondance, fait douleur de teste.

## De la Piuoine.

## Chap. XVI.

## LES ESPECES.

**I** l y a deux sortes de Piuoine, selon que Dioscoride & les Anciens ecriuent, à sçauoir Malle & Femelle.

## LA FORME.

La Piuoine malle a les tiges grosses, rougeastres, d'une coudée de haut: les feuilles grandes, larges, composées de plusieurs feuilles ioinctes ensemble, non guere différentes aux feuilles du Gaugier de figure & grandeur. Au plus haut de la tige croissent grandes & belles fleurs rouges, bien pres semblables aux Roses rouges, & ayans aussi au milieu des filets jaunes. Apres que les fleurs sont tombées, suruiennent grandes filiques, trois ou quatre ensemble, lesquelles foururent estant meures, à se void en aucunes de beaux grains rouges avec la semence noire, polie, & luisante, pleine de moelle blanche. Les racines sont blanches, longues, menues & odoriferantes.

La Piuoine femelle a aussi les tiges grosses, & rouges à leur premier sortir les feuilles sont aussi grandes & larges, mais decoupees en plus de parties, bien pres fendues comme les feuilles d'Angelique, de la Leueise, ou de l'Ache. Les fleurs sont aussi grâdes & rouges, plus petites toutesfois, & plus palles que celles du Malle. Les filiques & semence sont pareilles à celles du Malle. Des racines dependent beaucoup de neuds gros comme glans.

## LE LIEV.

Les deux especes de Piuoine se trouuent plantées es jardins de ce pais.

## LE TEMPS.

La Piuoine florit au commencement de May, & liure sa semence en Juin.

## LES NOMS.

La Piuoine s'appelle en Grec *πρωϊον*: & en Latin *Pœonia*, d'aucuns *πρωϊον*, & *γλυκωρις*, *Dulcisida* & *Idem dactylus*, d'Apulcie *Aglaophotis*, *σινδωπ*, *συχαιουπ*, *σινδωπ*, *σινδωπ*, & *Herba casta*: & Boutiques *Pionia*: en haut Aleman *Pronien* *blum*, *Pronien* *rosen*, *Sichstours*, *Kunigzblum*, *Pfingstrosen*: en bas Aleman *Pioene* & *Pionstomen*, & en aucuns lieux de Flandres *Mafibloemen*.

## LA CAUSE DV NOM.

La Piuoine a prins son nom du bon vieillard *Pæon*, me decin tresancien & qui a premier donné la cognoissance de ceste herbe.

## LE TEMPERAMENT.

Les racines de Piuoine sont seches iusques au second degré, & chaudes au premier, & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La racine de Piuoine seche beue à la grosseur d'une feue avec hydromel, prouoque le flux mensstrual, nettoye la matrice de celles qui sont accouchées, & appaise douleurs & trenchées de ventre.
- B Icelle ouure les oppilations du foye & des rognons, & boulie avec gros vin, arreste le flux de ventre.
- C La racine de la Piuoine masle pendue au col guert du haut mal, comme Galien & plusieurs autres ont experimenté, signamment les petis enfans.
- D Dix ou douze grains rouges de la semence beus avec gros vin rouge chargé, rude, arrestent les fleurs aux femmes.
- E Quinze ou seize grains noirs beus en vin ou hydromel, donnent allegeance aux suffocations d'amarry, & aydent grandement ceux qui sont trauaillés de l'Incube, qui est vn mal, qu'il semble qu'on soit de nuit opprellé de quelque grand fais, ou enuahi de quelcon, & de songes melancholiques.



## De la Valeriane.

## Chap. XVII.

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Valeriane, Cultiuée & Sauvage. La Sauvage est aussi de deux sortes, Grande & Petite. Outre icelles en trouue encores vne estrangere espece, laquelle à present on appelle Valeriane Greque.

## LA FORME.

- 1 La Valeriane domestique a au premier les feuilles verdes, tirans sur le blanc, larges, entre lesquelles vient vne tige ronde, creuse, vnie, & genouillée, sur laquelle croissent feuilles estendues, incisées, semblables aux feuilles de la racine appelée Pastenade domestique: au sommet de la tige viennent esmouchettes à fleurs blanches, incarnées au commencement ou persatres, puis apres blanches. La racine est de la grosseur d'un doigt, ayant des fibres & petites racines adioinctes.
- 2 La grande Valeriane sauvage, ressemble bien pres à la Domestique, elle a aussi les tiges rondes, vnies, creuses, & distinguées par neuds. Les feuilles ressemblent à celles estendues, composées de plusieurs feuilles situées l'une à l'oposte de l'autre, semblables aux feuilles de la Valeriane domestique, qui croissent au plus haut de la tige, plus grâdes, & plus incisées. Les fleurs croissent, & sont de meisme sorte qu'à la Domestique, de couleur tirant sur le pers. La racine est tendre, se traitant deçà & delà, & iettant tous les ans de nouueaux iettons, & tiges nouuelles en diuers lieux.

*Valeriana hortensis.*  
Valeriane cultivée.



*Pho Græci. Valeriana peregrina.*  
Valeriane Grèque.

*Pho parvan. Valeriana sylvestris minor.*  
Petite Valeriane sauvage.





3 La petite Valeriane sauvage ressemble fort à la grande Valeriane vraye, sinon qu'elle est plus petite en toutes sortes. Les premières feuilles & plus basses semblent comme petites feuilles de Plantain, les autres qui croissent au tour de la tige, sont profond incisées, sont retirans aux feuilles de la Valeriane sauvage, ou à celles qui croissent au tour de la tige de la Valeriane domestique. Les tiges sont rondes, genouillées, d'environ vne paulme de haut. Les fleurs ressemblent aux fleurs des autres desusdictes. Les racines sont grosses & se trainans le long de la terre.

4 La Valeriane Greque a deux ou trois tiges, ou davantage, creusées sur lesquelles croissent faciles est dues, bié pres semblables à celles de la Valeriane sauvage, plus longues toutefois, plus estroictes, & plus fort incisées, retirans aux feuilles de la Vesse sauvage, si non qu'elles sont plus grandes. Les fleurs croissent amassées beaucoup ensemble au sommet de la tige, de couleur perse, tristé sur leger bleu, parties en cinq suillettes, ayans au milieu de petits filets blancs, à petits pointés iaulnes pendans. La graine est petite, & croist en filiques rondes. Les racines ne sont que fibres.

## LE LIEU.

La Valeriane domestique & la Greque sont semées & plantées es jardins. Les deux autres croist icy en lieux humides, & près bas & aquatiques.

## LE TEMPS.

Les trois premières especes de Valeriane fleurissent depuis le May iusques en Aouist. La Greque fleurit la plus part en Iuin & Iuillet.

## LES NOMS.

1 La première especes de ces herbes s'appelle en Grec *φύ*, Phu: en Latin *Valeriana*, & *Nardus syluestris*, ou *Nardus rusticus*: en Boutiques *Valeriana domestica*, ou *Valeriana borifolia*, d'aucuns Modernes *Marinella*, *Genicularis*, & *Herba benedicta*: en François Valeriane: en haut Aleman *groß Baldrian*: en bas Aleman *tamme* ou *groote Valeriane*, & d'aucuns *Sint Floris cruyt* ou *Specteruyt*, cest à dire Herbe à espieu, pour ce que ses premières feuilles ressemblent fort en figure au ser d'un espieu.

2 La seconde especes s'appelle *Valeriana syluestris*, *Phu syluestre*, & *Valeriana syluestris maior*: en François grande Valeriane sauvage: en haut Aleman *wiß Baldrian*, *Katzentwurtzel*, *Augentwurtzel*, *wendtwurtzel*, & *Dennenmarch*: en bas Aleman *wißde Valeriane*.

3 La tierce especes est aussi vne Valeriane sauvage, pourtant l'uons nous appellée *Valeriana syluestris minor*, cest à dire, petite Valeriane sauvage, & aussi *Phu pariam*, & *Valeriana minor*.

4 La quatriesme est appellée des Herboristes modernes *Phu Græcum* & *Valeriana Græca*, cest à dire Valeriane Greque, & se peut bien appeller *Valeriana peregrina*, ou *Pseudophu*, car ce n'est pas vne Valeriane, mais quelque autre herbe estrangere, laquelle nous ne pouons comparer à aucune de celles qui sont descrites par Dioscoride.

## LE TEMPERAMENT.

La racine de Valeriane est chaude & seche iusques au second degré.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

1 La decoction des racines de la Valeriane domestique beue, prouoque l'vrine, fait venir les fleurs aux femmes, & donne grande alleeance aux douleurs de costé & de la poictrine. Pareille vertu ont elles puluerisées & beués avec du vin.

2 On les mesle aussi aux Antidotes & preseruatifs, cest à dire medecines composées contre venins & la peste, comme est la Teriaque, & Mithridat, &c.

3 Les feuilles & racines de la grande Valeriane sauvage boullies en eau, guerissent pustules & vlcères de la bouche, mesmes l'apreté & inflammation du gosier, si on s'en laue la bouche, & si on la gargarise.

On la donne fort vilement en brutage à ceux qui sont rompus par dedans.

4 Les deux autres Valerianes ne sont point vsurpées en medecine.

## De Rhodia radix.

## Chap. XVIII.

## LA FORME.

LA Racine sont les roses à trois ou quatre tiges fortans de la racine, reuestues de feuilles charnues, semblables à celles de *Cassia maior*, sinon qu'elles sont plus estroictes, & crenelées par haut. La racine est grosse, ayant plusieurs fibres, & quand on bescache ou rompt, elle sent la rose, & de là à elle prins son nom.

## LE LIEU.

La Racine sentant les roses prouient en Macodoine & Hongrie. En ce pais les Herboristes la plantent en leurs jardins.

## LE TEMPS.

Elle florit en May, mais elle porte bié peu souvent fleur.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ρῳδιὰ ρίζα* : en Latin *Radix Rhodiæ*, & *Radix rosarum* : en François Racine sentant les roses : en haut Alemā *Rosentouet* ; en bas Aleman *Rosentouetel*.

## LE TEMPERAMENT.

La Racine sentant aux roses, signamment celle qui croist en Mace doine, est chau de iusques au second degré, & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La Racine sentant les roses appliquée avec huile de rosat sur le front & sur les temples, appaise douleur de teste.

## Du Pyrethre. Chap. XIX.

## LA FORME.

**P**Yrethre a les fueilles fort incisées, semblables aux fueilles du Fenoul. Les fleurs sont iaunes au milieu, enuironnées de petites fueilles blanches & persattes par dessous, semblables aux fleurs de la Camomille, ou de la grande Marguerite. La racine est longue, droite, de la grosseur d'un doigt aucunes fois, chaude & bruslant la langue.

## LE LIEV.

Ceste herbe ne croist de soy mesme en ce pais, mais on la trouue plantée aux iardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

Le Pyrethre fleurit depuis le mois de May iusques à la fin de l'esté, pendist lequel temps la graine est meure.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *πυρεθρον* : en Latin *Salsuaris* : les Boutiques *Pyrethrum*, d'aucuns auis si en Grec *πυρεθρον*, *πυρεθρον*, *πυρεθρον* : en François Pyrethre, ou Pied d'Alexandre : en Aleman *Berttram*.

## LE TEMPERAMENT.

La racine du Pied d'Alexandre est chaude & seche iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La racine de Pyrethre prinse avec miel, est bon contre Epilepsie, Apoplexie, secheresse, & maladies de teste enuicillies, & contre toutes froides maladies du cerueau.
- B Icelle tenue en la bouche & machée, tire par la bouche grande quantité de flegmes du cerueau.
- C Icelle cuicte en vinaigre & tenue toute chaude en la bouche, appaise douleurs de dens.
- D L'huile dans lequel Pyrethre a bouly, induict, fait suer, & profite grandement contre frissons, & membres morfondus & paralytiques.

## Du Pyrethre sauage. Chap. XX.

## LA FORME.

**L**E Pyrethre sauage a les branches rondes, fragiles : les fueilles longues, & estroictes, creuées tout à l'entour en forme de siciau plus haut de la tige croissent les fleurs, ressemblans aux fleurs de



Pyrethrum.

Pyrethre.



# Pyrethre sauuage. Ch. XX

*Pyrethrum flouestre.*

Pyrethre sauuage.

de la Camomille, iuinistres au milieu, & enuironnées de petites fueillettes blanches. La racine est tendre, fort fibreuse. Toute l'herbe est acre & piquete, bien pres de saueur semblable au Pyrethre, pourtant aussi s'appelle elle Pyrethre sauuage.

### LE LIEV.

Le Pyrethre sauuage se trouue aux bois des champs, & en pres hauts lieux ombrageux, & au cinctours aux montaignes & lieux pierreux.

### LE TEMPS.

Le Pyrethre fleurit depuis le moys de May iusques en Septembre.

### LES NOMS.

Ceste herbe se nomme à present en Latin *Pyrethrum flouestre*, cest à dire en François Pyrethre sauuage : en Aleman *wilcken Bertram* : d'aucuns iurets *Reinsafin*, cest à dire Tarnesie blanche. Ce n'est pas *Agave*, *Psammis*, ou *Serratamentaria*, mais vne autre herbe incogneue aux Anciens.

### LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est de complexion chaude & seche.

### LES VERTVS ET OPER.

- A Ceste herbe tenue en la bouche & machée, tire aussi du cerueau les phlegmes visqueuses, bié pres aussi fort que ne fait le Pyrethre: dauantage avec ce prouffite grandement contre douleurs de dés.
- B Elle est bonne aussi en fallades comme le Dragon & la Roquette, desquelles nous escrirons au cinquième liure.

## Du Diptam bastard, ou Tragium.

### Chap. XXI.

### LA FORME.

Ceste herbe ressemble au Lentisque de branches & de fueilles, & à la Reguelisse. Elle porte tiges rondes, noires, rudes, & fueilles esten dues, comme la Reguelisse. Au plus haut des tiges croissent belles fleurs tirés sur le pers, lesquelles du costé & moytié d'en haut a quatre ou cinq fueilles, & en la partie d'embas, des filets longs, courbes, pendans bien pres en forme de barbe. Les fleurs peries, viennent au lieu de chacune fleur quatre ou cinq filiques, vn peu rudes par dehors, & gluantes au manier, & de forte odeur, bien pres d'odeur de bouq: esquelles est contenue la graine noire, vnie & luisante. Les racines sont longues, blanches, aucunes fois de la grosseur d'vn doigt, & croissent de trauers l'vne sur l'autre.

### LE LIEV.

Ceste herbe croist en lisle de Candie tesmoing Dioscoride, en ce pais on la trouue es iardés des Herboristes.

### LE TEMPS.

Elle fleurit en ce pais en iuin & iuliet, & aucunes fois la graine en est meure.

### LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *Tragium*, en Latin *Tragium*, & est la premiere espece de *Tragium* descrit



*Tragium, Diptam bastard*



descriit par Dioscoride. Aucuns Herboristes l'appellent *Frazinella* : aucuns Apothicaires vident de la racine d'iceluy au lieu de *Dictam*, & l'appellent *Diptamum*, non sans erreur manifeste, & pourtant est elle appellée d'aucuns *Pseudodictamum notum*, c'est à dire *Dictam* bastard.

## LE TEMPERAMENT.

Le *Tragium* est bien pres chaud iusques au tiers degré, & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La graine de *Tragium* prinse à la quantité d'une drachme, ayde à difficulté d'vrine, fait vriner, rompt la pierre en la vessie, & la fait sortir, & prouoque les fleurs menstruales aux femmes.
- B Pareille vertu ont aussi les feuilles, & le ius prins en mesme sorte : & appliqué par dehors, tire hors les espines & eschardes.
- C La racine prinse avec vn peu de *Rheubarbe*, tue & pouffe hors les yeues, & est à cela de singuliere vertu, comme à present on a trouué par experience.
- D On dit aussi (tesmoing *Dioscoride*) q les Cheures sauuages blessées de fleches, ou autre dard, mengeans de ceste herbe les font tomber hors de leur corps, come quand elles mengeent du vray *Dictam*. De là vient, peut estre, q ceste herbe à esté vsurpée es *Boutiques* au lieu du vray *Dictam*.

## Du Polemonium.

## Chap. XXII.

*Polemonium altera species.*

Polemonium.



## LA FORME.

**P**olemonium a les tiges tendres, genoillées: les feuilles asses larges, tousiours deux l'une contre l'autre sortans de chacune ioincture. Au sommet des tiges croissent fleurs blanches, pendans en bas, & croissent loignans l'une à l'autre en forme de bouquet, apres lesquelles peries vient la semence noire en calyces ronds. La racine est blanche, vnie & longue.

Encores y a il vne autre herbe, laquelle est aussi tenue pour *Polemonium*, icelle pduit aussi tiges à loües, genoillées, plus loües toutes fois q la dessusdicte ayés feuilles loües, estroüices par le bout

& larges ioinant la tige. Les fleurs de ceste icy sont de couleur rouge claire, & croissent par es-moucbettes, bien pres comme à la Valeriane. La racine est longue, blanche, grosse, & odoriferate.

3 Le Polemonium duquel parle Absyrus, est la Mente cheualine descrite au second liure.

LE LIEV.

Toutes les deux especes croissent aux montaignes en lieux rudes & pierreux: On les plante en ce pais es iardins.

LE TEMPS.

Ces herbes florissent en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.

1 La premiere s'appelle en Grec *παλμάριον*, *καὶ προκορυφία*: en Latin *Polemonium* & *Polemonis*, d'aucuns *χίλιος ἄνθος*, *Chiliodynon*, c'est à dire Cent vertas: es Boutiques, tesmoing Bernardus de Gordonio, *Herba tunica*: des Herboristes modernes *Beben* ou *Bein album*. Ce ne semble toutefois estre l'espece de *Beben* laquelle *Scrapio* descrit au 223. chapitre.

2 La seconde est aussi tenue pour *Polemonium*, & est appellée des Herboristes *Beben rubrum*. Cel l'icy semble à voir le *Narcissus* duquel *Vergile* en ses *Georgiques*, & *Columella in hortis* font mention.

LE TEMPERAMENT.

*Polemonium* est de temperament sec iusques au second degré, & de parties subtiles

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de *Polemonia* beue en vin, est vile contre la dysentere, & contre morsures & piqu-A  
res de bestes venimeuses,

Icelle beue avec eau, prouoque l'vrine, & donnee allegeance à stranguries, & douleurs autour B  
de la hance.

On la donne avec vinaigre contre duresses & oppilations de la ratelle, & à ceux qui ont quel-C  
que affection en la ratelle.

Icelle tenue en la bouche & machée, appaise douleur de dens.

Icelle pilée & appliquée, guerit piqures de Scorpions: Et de fait elle a si grande vertu contre E  
Scorpions, que celui qui la tient en la main, ne pourra estre piqué ou en domage d'aucun scorpis.

Du Cyperus, ou Souchet.

LA FORME.

1 LE Souchet a les feuilles longues, estroictes & dures. La tige anguleuse, & triangle, croissant à la hauteur d'un pied ou dauantage, au plus haut de laquelle croissent des epis doubles & feuillus, là est la semence contenue. La racine est longue entrelassée l'une dans l'autre, noiratre, pleine, odoriferante, ayant plusieurs fibres.

2 Encores s'en trouue il vne autre espece, ressemblant à la deuantdicte de feuilles, & tiges: toutesfois elle n'a pas racines longues, mais plusieurs racinettes rondes de la grosseur d'une olive, ioinctes ensemble: Et de celle icy parle *Dioscoride*.

LE LIEV.

Le *Cyperus* tesmoing *Dioscoride*, croist en lieux bas, humides & cultiués. Il ne se trouue en ce pais, sinon es iardins des Herboristes.

LE TEMPS.

Ceste herbe porte son espi feuillu en Iuin & Iuillet avec sa graine.

LES NOMS.

Elle se nomme en Grec *κύπερος*: en Latin *Cyperus*, *Cypivus*, & *Cyperis*, d'aucuns *Aspalathis*, & *Erysisyperum*: es Boutiques *Cyperus*: de *Cornelius Celsus* *tuncus quadrans*, de *Pline* *tunculus angulosus* & *Triangularis*: en François *Souchet*: en Aleman *wilden Salsgan*.

LE TEMPERAMENT.

La racine du Souchet est chaude & seche au tiers degré.

Chap. XXIII.

Cyperus.

Souchet.



## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les racines de Souchet boullies & beutes, prouoquent à vriner, & esmeuent le flux menstruel aux femmes, poussent hors la pierre, & secourent les hydropiques.
- B Icelle prinse en mesme sorte, porte remede contre piqures & venin de scorpions & à la toux.
- C Elle est ainsi veile contre refroidemens, oppilations & estouffemens d'amarry, si on en esbue tout chaudement le ventre.
- D Icelle reduicte en poudre, referme vieux & par trop bumides vicerés de la bouche, & des parties honteuses, esbandue dedans, ou induicte dessus avec vin.
- E On la mesle vilement parmy vnguents & emplastres chauds & maturatifz.
- F La graine de Souchet beuf en eaué comme dit Plinc, arreste flux de ventre, & tout flux menstrual desordonné, & fluxeurs des femmes; mais prinse en trop grande quantité, engendre douleur de teste.

## De l'Ellebore blanc.

## LA FORME;

L'Ellebore blanc a fueilles grandes, larges, nervées, semblables aux fueilles du grand Plantain ou de la Gentiane. La tige ronde, haute de deux ou trois pieds, au plus haut de laquelle croissent le lög & au tour de la tige, fleurs l'une sur l'autre, pales en couleur, parties en six fueillettes, lesquelles ont vne ligne verte au trauers. Icelles passées viennent en leur lieu petites filiques, ou la semence est osteneue. La racine est ronde, de la grosseur d'un doigt, ou d'un pouce blanche par dedans & par dehors, ayüt plusieurs fibres grosses.

## LE LIEV.

L'Ellebore blanc croist en Anticyra, pres de la montaigne Oeta, & en Cappadoce & Syrie, mais le meilleur en Cyrene. Les Herboristes de ce pais le plantent en leurs iardins.

## LE TEMPS.

Ellebore blanc florit en ce pais en Juin & Juillet.

## LES NOMS.

Ceste espede d'Ellebore s'appelle en Grec *Μακροκάρων*: en Latin *Veratrum album*: & Bouriques *Helleborus albus*: d'aucuns *Pignatocaris* & Sansguè Herculè: en François Ellebore blanc: en haut Aleman *weiss Riefwurtz*: en bas Alemä *witte Riefwortel* ou *wit Riefwurtz*.

## LE TEMPERAMENT.

La racine d'Ellebore est chaude & seche au tiers degre.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine d'Ellebore blanc fait vomir excessiuelement & avec grand force toutes humeurs superflues, visqueuses, venimeuses & malignes: pareillement elle prouffitte contre le haut mal, phrenesie, longues douleurs de teste, folie, tristesse, la goutte, goutte sciaticque, toute sorte d'hydropisie, poison, & contre toutes maladies froides, difficiles à curer, & qui ne veulent ce der à nulz autres medicamens. Mais en quelle maniere il la faut preparer auant que la bailler à aucun, & pareillemēt en quelle sorte il faut preparer le corps de la personne qui la doit prendre, il a esté assez amplement descript par plusieurs Anciens, ce que nous n'auons voulu repeter, pour auant que les choses quil y faut obseruer sont si longues, qu'elles ne se pourroient comprendre en peu de parolles, mais empiroient bien vn liure. D'autre part pour ce que selon la doctrine de Galien on ne doit donner par dedans ceste racine vehemente, mais en faut seulement vser au dehors du corps.

## Chap. XXIII.

*Veratrum album.* Ellebore blanc.

# De l'Ellebore blanc sauuaage. Ch. XXV. Li. 3. 235

Elle fera donques bonne contre toutes rudesses, gratelles, mauuaises roignes, laides cicatri- B ces, & ladrerie, si on l'induit & dessus avec huile ou vnguent.

Icelle couppee par petis loppins, & mise dedans fistules, emporte la dureté d'icelles. C

Item appliquee par dessous en forme de pessaire, esmeut le flux menstrual aux femmes, & tire D hors l'enfant qui est mort.

La poudre d'icelle mise au nez, ou attirée par le nez fait esternuer, reschauffe, & purge le cer- E ueau de toutes humeurs grosses & visqueuses, les faisant sortir par le nez.

Icelle boulie en vinaigre & tenue en la bouche, appaise douleur de dens, Et meslée parmy les F medecines des yeux, esclaireit & aiguise la veüe.

La racine d'Ellebore broyee avec farine & miel, est bonne pour tuer rats, souris, & semblables G bestes, & les chasser hors: pareillement si on la met cuire avec lait, & que les mouches en mengent elle les tue, car toutes celles qui en mengent, viennent à l'enfler, puis creuent: Par cela on peut co- gnoistre, combien dangerueuse est ceste racine.

## LES NVISANCES.

L'Ellebore blanc prins non preparé, & non en temps & lieu, ou en trop grande quantité, est fort nuisible à la personne: car il estrangle, il trouble toutes les parties interieures, fait conuul- sion de tous les nerfs du corps humain, & en la fin tue la personne. Pourtant ne la doit on pas prendre sinon preparée, & ce encores non sans grande garde & bonne discretion. Car vn person- nage trop ieune ou trop vieil, ou debile, qui crache sang, qui a mal en l'estomach, qui a la poictri- ne estroicte, & le col long & telles sortes de gens de biles ne la pouuent prendre en quelle manie- re que ce soit, sans grand dommage & detrimant. Pourtant ces Coureurs & Triacleurs, & autres ignorans font tresmal, la donnant sans aucune discretion à chacun, soit vieil ou ieune, fort ou de- bile, car bien souuent ilz les tuent, ou pour le moins les iettent en grand danger de leurs perones.

## De l'Ellebore blanc sauuaage.

### LA FORME.

### Helleborine.

## Chap. XXV.

### Ellebore blanc sauuaage.

Ceste herbe ressemble à l'Ellebore blanc dessus dict, sinon quelle est en toutes choses moindre: Elle a la tige droicte & les fucilles neruees, ressemblans aux fucilles du Plantain ou de l'Ellebore blanc, mais plus petites. Les fleurs dependent de la tige, de couleur blanche, creuses au milieu, ayans de petites taches iaunes, & incamees, de façon fort estrange, & quand elles sont peries suruisent vne petite graine comme sable en- closé en siliques grossettes. Les racines sont espandues deçà delà pleines de seue, ayans l'escorce epesse, & de goust amer.

### LE LIEV.

Ceste herbe croist en Brabant en aucuns prés humides, & lieux vmbreux & obscurs.

### LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en Iuin & Iuillet.

### LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *μαμαρινα*, pour ce quelle re- semble en figure à l'Ellebore blanc: en Latin *Helleborine*, & *Epi- passis*: en Aleman *wilde wite Dierstuyt*, cest à dire Ellebore blanc sauuaage. Aucuns pensent que *Helleborine* est vne her- be ressemblant à *Helleborus* seulement en vertus & non en fi- gure: Ceux là ne voudroient receuoir ceste herbe pour Hel- borine: mais par ce se cognoist leur opinion estre faulle, que, ne Galien, ne Dioscoride, attribuent aucune vertu de l'Ellebo- re à *Helleborine*.

### LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est de complexion chaude & seche.

### LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoctio d'*Helleborine* beue, ouure les oppillations du foye, & prouffite grandement à ceux qui ont quelque indisposition du foye, ou qui ont prins quelque venin, ou qui sont mors de quelque beste venimeuse. A



Veratrum nigrum. Elleboire noir.

Pseudohelleborus niger.  
Elleboire noir bastard.

## LES ESPECES.

Sous ce nom de *Helleborus niger*, c'est à dire El  
leboire noir, sont comprises par les Herboristes  
modernes trois herbes, dont la premiere est le  
vray *Helleborus niger*: La Seconde est vne herbe  
estrangere non guere differente en vertus au vray  
Elleboire noir, & s'appelle Herbe de Christ: La tier  
ce que les bas Alemans appellent communement  
*Wiercruyt*, c'est à dire Herbe au feu.

## LA FORME.

1 Le vray Elleboire noir a fueilles rudes, noirâtres,  
parties en quatre ou cinq crenes profondes, sem  
blables en façon aux fueilles de Vigne, ou, comme  
dit Dioscoride, aux fueilles de Plane, plus petites  
toutesfois. Les tiges sont vniés & polies, au sommét  
desquelles croissent les fleurs par petites esmou  
chettes, fort amassées ensemble, comme à la Scabi  
euse, de couleur de clair pers. Apres que les fleurs  
sont tombées, suruient la graine, qui n'est guere dif  
ferente au grain de bled. Les racines sont plusieurs  
filets longs & noirs, fortans tous ensemble d'vne  
mesme teste.

2 L'Herbe de Christ a grâdes fueilles & espesses,  
verdes, parties en sept ou huit pars, dont chacune  
partie





partie est longue; aigue par le bout, l'une moitié crenée par les bords comme vne sie, & l'autre moitié qui est plus pres de la tige est vnée & non crenée. Les fleurs croissent entre les feuilles sur courtes queues sortans de la racine, & sont de la grandeur d'une grande piece d'argent, de belle couleur, & blanche comme neige, ayans au milieu mout de tendres filets & courts, dequelz pendent de petits poindz iaulnes. Apres que les fleurs ont demouré assez long temps, & qu'elles commencent à perir, elles deuiennent perles, & puis apres verdes. Apres les fleurs elle produit quatre ou cinq siliques ioinctes ensemble, biens pres comme à l'Anbolle, esquelles la graine est contenue. Elle a pour racine mout de fibres grosses & noires.

3 Les feuilles de l'Elleboire bastard, ressemblent au commencement aux feuilles de la precedente Herbe de Christ; plus petites toutesfois, parties aussi en mout d'autres feuilles estroictes, qui sont crenées tout à l'entour, & de tous costés comme vne sie. Les fleurs ne sortent pas de la racine, mais croissent sur la tige là où tiennent les feuilles, & sont beaucoup plus petites que les fleurs de l'Herbe de Christ, de couleur herbacée. Apres qu'elles sont passées, il y suruiuent aussi quatre ou cinq petites siliques ioinctes l'une à l'autre, dedans lesquelles est contenue la graine, qui est noire & ronde. Les racines sont plusieurs fibres noires, entrelassées ensemble.

4 L'Herbe aux pouds que Fuchsius tient pour vne espece de Helleborus noir, on la trouuera cy dessous entre les Aconits, dequelz elle en est vne espece.

5 L'autre que Hieronimus Bouq met pour Elleboire noir, & laquelle les Apothicaires ont tenue pour Elleboire noir, est descrite en la seconde partie de ceste Histoire, là où nous auons monstré, que ce n'est pas vne espece d'Helleborus niger, mais le vray Buphthalmu, & pource non nuisible ne dangereux, comme plus amplement a esté là déclaré. **LE LIEU.**

1 L'Elleboire noir croist en Atole, en Beotie sur le mont Helicon, & en Phocide sur le mont Parnassus; & se trouue en ce pais aux iardins de quelques Herboristes.

2 L'Herbe de Christ n'est aussi guere commune en ce pais, elle se trouue seulement aux iardins de quelques Herboristes.

3 L'Elleboire bastard croist en aucuns bois de ce pais, comme au bois de Soignie, en Brabant, & on le plante en plusieurs iardins. **LE TEMPS.**

1 L'Elleboire noir fleurit en ce pais en Iuin, & incontinent apres la semence est meure.

2 L'Herbe de Christ fleurit de fort bonne heure, enuiron le Noël & en Ianuier, bié pres iusques au Mars. En Feurier tombent les feuilles vieilles, & en Mars y en croist de nouuelles.

3 L'Elleboire bastard florit aussi souuent de bonne heure, mais la plus part en Feurier, aucunes fois aussi iusques en Aueil. **LES NOMS.**

1 L'Elleboire noir s'appelle en Grec *μαύρα ρίζα*: en Latin *Veratrum nigrum* & *Helleborus niger*, d'aucuns *Melanopodium*, *Præcium*, *Polystichon*, *Melanorhizon*, & d'aucuns Modernes *Laparia*: en haut Aleman *schwartze Rieftwurrtz*; en bas Aleman *swarte Rieftwurrtz*.

2 La seconde est appellée d'aucuns sçauans Modernes *Planta leonis*, c'est à dire Plante de lion, & semble bien que ce soit l'herbe que Alexander Trallianus & Paulus Agineta appellent en Grec *κοροπόδιον*: en Latin *Coronopodium*, & *Pes cornicis*. Elle s'appelle en Brabant *heylichhersternyt*, c'est à dire Herbe de Christ, ou de Noël, pour ce qu'elle souuent elle florist à la Noël, signamment quand luyuer n'est point grand.

3 La tierce s'appelle maintenant *Pseudohelleborus niger*, *Veratrum adaltherinum nigrum*, & est tenue d'aucuns pour l'herbe que Pline appelle *Cosyligo*: en haut Aleman elle se nomme *Christwurrtz*, c'est à dire Racine de Christ: en Brabant *die Rieftwurrtz*, c'est à dire Herbe au feu pour ce que à tout icelle on en oste vne maladie aux bestes qu'ilz appellent le feu: d'aucuns *wandwurrtz*, comme l'a mis par escrit le tresçauant & tresrenomé en ion temps Spierinck resident à Louvain: aucuns aussi appellent *Wæneruyt*. **LA CAUSE DV NOM.**

Ceste herbe s'appelle *Melanopodium*, pource qu'un berger appellé Melampus en Arcadie a curé par ceste herbe les filles de Proetus qui estoient folles & hors du sens: & dóna premiere cognoissance de ceste herbe. **LE TEMPERAMENT.**

1 L'Elleboire noir est chaud & sec iusques au tiers degré.

2 L'Herbe de Christ, & l'Elleboire bastard sont de temperament fort semblable à l'Elleboire noir.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

1 L'Elleboire noir prins par dedés fait puissamment aller à chaire, & purge par bas les phlegmes A grosses & visqueuses, & humeurs bilieuses: dauantage il prouffite à ceux qui deuiennét enragez & sont hors du sens, ou qui sont pelins & melancholiques. Item aux gouteux, & contre la sciaticque.

Les mesmes vertus a elle si on la prend en potages, ou cuicte avec chair boulie, car elle lachera B aussi le ventre, & poullera hors toutes humeurs superflues.

- C Icelle appliquée en forme de pessus, esmeut les fleurs menstruales aux femmes, & tire hors ben fant mort.
- D Icelle mise par trois iours aux fistules & vlcères cauerneux, elle les purge & en emporte la dureté & callosité.
- E La racine dicelluy mise aux oreilles deux ou trois iours durans, prouffite grandement à ceux qui ont dure ouye.
- F Elle appaise douleur de dens, si on se l'auë la bouche du vinaigre dans lequel elle aura bouly.
- G On applique vilement vne emplastre fait de ceste racine, & de farine d'orge & vin, sur le ventre des hydropiques.
- H Icelle broyée avec encens, poix resine, & huile, guerit toute rudesse de peau, gratelle, taches & cicatrices, quand on les en frotte à tout.
- I La Plante de lion, ou herbe de Christ, n'est gueres differente en vertus à l'Elle bore noir. Elle purge aussi & pousse hors par bas vigoureusement la melancholie & autres humeurs superflus.
- K La racine de l'Elle bore bastard trempée en vin puis beuë, lasche aussi le ventre comme l'Elle bore noir, & prouffite grandement à toutes maladies, auxquelles l'Elle bore noir est conuenable.
- L Ce suc & elle aussi avec plus grande force & puissance, si on la prend en vin, reduicte en poudre au poid d'vne drachme.
- M Icelle boulie en eau avec Rue & Aigremoine, ou Eupatoire bastard, guerit la jaunisse, & purge par bas les superfluités iuuenes.
- N Icelle mise aux oreilles des beufz, brebis, ou d'autre bestail, ayde au bestail qui a maladie de poulmons, comme escriuent Pline & Columella, car elle tire toute l'indisposition des poulmons aux oreilles.
- O Et en temps de peste, si on boute ceste racine au corps d'vne personne, elle attire là tout le venin & suc du corps, Pourtant incontinent que quelque soudaine maladie frappe au bestail, les paisans la bouted incontinent en quelque lieu là ou elle peut le moins nuire, & soudain tout le mal se vient là rendre, & par ainsi le bestail est conserué.

## LES NVISANCES.

Combien que l'Elle bore noir ne soit si vehement q̄ le blanc, toutesfois on ne le donne point sans danger, principalement à gens qui sont sains. Car come dit Hippo. *Carnes habentibus sains, Helle borus periculosus, facit enim conuulsionem*, c'est à dire, A ceux qui sont sains, l'Elle bore est fort dages reux, car il fait conuulsions. Pourtant on ne dora Elle bore à prendre, si ce n'est en maladies desesperées, & ce à gens robustes, & non en tout temps, mais seulement au Printemps : encores ne le faut il pas donner, sil n'est corrigé & preparé.

## AMENDEMENT.

Quand on dore l'Elle bore avec poyure lög, hyssope, & graine de Daucus & d'Anis, il fait meilleur operation & avec moins de danger. Pareillemēt sil est bouli au brouet d'vn chappō, ou de quelq̄ autre chair, puis le brouet donné à boire.

## De Aloë. Chap. XXVII.

## LA FORME.

Aloë a les feuilles fort grandes & longues, espesses de deux doigts, ayans tout au tour de courtes pointes aigues loing l'vne de l'autre. La racine est espesse & lögue. Les fleurs, tiges & graine ne ressemblent pas trop mal aux fleurs & graine de Affodile, comme dit Dioscoride, car elles n'ont pas esté encores veues en ce pais. Toute l'herbe est d'odeur forte, & de goût amer. Et de ceste herbe qui croist es Indes se tire le jus, lequel mis secher, est aussi appellé Aloë, & est porté par tous les endroits du monde, pour en vser en Me decine.

## Aloë. Perroquet.



## LE LIÈV.

Aloë croist en grande abondance en Inde, & de là vient le meilleur ius, Elle croist aussi en aucuns endroits d'Alie & d'Arabie maritime, mais le ius d'icelle n'est pas guere bon. On la trouue aussi en ce pais aux iardins de quelques Herboristes.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec ἀλόη: & là selon en Latin & tous autres langages de la Chrestien té Aloë, & le ius d'icelle pareillement. Les François appellent aussi l'herbe Perroquet à cause de sa verdure.

## LE TEMPERAMENT.

Le ius de ceste herbe qui s'appelle Aloë, & duquel seulement on use en medecine, est chaud, bien pres iusques au second degré, & sec iusques au tiers.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

**A** Le ius d'Aloë qui est brun & de couleur de foye, qui est clair & bien net, lache le vêtre en purgant les humeurs froides, phlegmatiques & bilieuses, signamment. celles desquelles l'estomach est chargé. Et est seule entre toutes autres medecines ( qui pour la plus part gulent l'estomach ) fort singuliere & propre pour l'estomach, le confortant, mondifiant, sechant, & chassant hors toutes humeurs superflues, si on le prend avec eau à la quantité de deux drachmes.

**B** On la prend avec canelle, gingembre, macis, cubebes, galanga, semée d'anis, & semblables espicces pour chasser & appaiser la douleur de l'estomach: & avec ce le reconforte, reschauffe, & fait ietter les phlegmes.

**C** Icelle est aussi bonne contre iaulnuise, se dit Dioscoride, & prise vn petit à la fois prouistte contre crachemens de sang, & tout flux de sang, excepté celui des hemorrhoides.

**D** Elle mise en poudre & esparé sur playes fresches & sanglantes, arreste le sang d'icelles, & les consolide. Pareillement mise sur vieux viceres, les resferme. D'auantage cest vne souverainne medecine pour tous viceres des parties honteuses, & du fondement.

**E** Icelle meslée avec vin cuit, guerit les excroissances & creueures du siege, & arreste le par trop abondant flux des hemorrhoides, induicte dessus: car prise par dedans elle les fait sortir, & saigner.

**F** Icelle avec miel, dissout tout sang figé, & efface toutes contusions, & marques noiratres.

**G** Elle est aussi conuenable contre toutes inflammations, bleseures, & demangefons des yeux, & contre yeux coulans, & obscurcis.

**H** Aloë meslée avec huile rosat, & vinaigre, puis induite sur le front & les temples, appaise douleur de teste.

**I** Si on frotte souuent la teste d'icelle meslée avec vin, elle empesche que les cheueux ne tombent.

**K** Icelle induicte avec vin, guerit aussi pustules & viceres des genciues, de la bouche, du gosier, & des amygdales.

**L** Brief icelle appliquée par dehors, est vne medecine fort propre à consolider, arrestant tout flux de sang, & mondifiant & nettoyant toute ordure.

Ricinas. Paulme de Christ.



## De la Paulmé de Christ. Chap. XXVIII.

## LA FORME.

**L**A Paulme de Christ a la tige grande, ronde, creue, plus haute qu'vn bien grand homme, ayât fueils les fort grandes, & larges, parties en sept ou neuf diuisions, plus grandes, & plus fort incisées que les fueilles du Figuier, semblans au pied d'vne oye, ou à vne main estê due. Au sommet croist vne massue pleine de fleurs amassées ensemble en forme de grappe de raisins, d'od les plus basses sont iaulnes, & perissent sans porter fruits: les plus hautes sont rouges, produfians filiques triangulaires, esquelles sont contenues trois graines grises, vn peu plus petites que Phasoles.

## LE LIEV.

Ceste herbe ne croist pas de soy-mesme en ce pais, mais les Herboristes la plantent en leurs jardins.

## LE TEMPS.

On la seme en Avril, & la semence en est meure en Aoust & Septembre, & tost apres, survenant le froid, toute l'herbe perit.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *χίνυ ργία* & en Grecien Latin *Ricinus*: és Boutiques & des Arabes *Cherna*, d'aucuns *Cataputia maior*, *Pentadactylon*, & *Palma Christi*: & là selon en François Paulme de Christ: en haut Aleman *wunderbaum* & *Creutzbaum*, & d'aucuns *Zechen bosner*: en bas Aleman *wunderboom*, *Creutzboom*, & *Stoffensruyt*.

## LE TEMPERAMENT.

La graine de Paulme de Christ est chaude & seche iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La graine de Ricinus prise par dedans, lasche le ventre, fait vomir & pousse hors les phlegmes visqueuses, les tirant des parties lointaines, & aucunefois les humeurs bilieuses, & superfluités aqueuses.
- B Le bouillon de chair avec laquelle ceste graine a cuist, beue, prouffite à la Colique, c'est à dire douleur de ventre, contre la goite & douleur de hanche que l'on appelle sciaticque.
- C Celle pilée avec meue de lait & prise, pousse hors les superfluités aqueuses, & les humeurs cholériques, dauantage prouffite contre hydropisie & iaulnisse.
- D L'huile que l'on tire de ceste graine appellée *Oleum Cicinum*, & és Boutiques *Oleum de Cherna*, eschauffe & seche, & est fort bon d'en froter toutes rudesses & mauuaise gratelle.
- E Les fueilles de Ricinus encores verdes pilées avec farine d'orge rostie, adoucisent & donnent allegeance aux inflammations & vlceres des yeux, & broyées avec vinaigre, guerissent le feu voyage.

## LES NVISANCES.

- F La graine de Ricinus renuerse l'estomach, & fait son operation en trouuillant fort la personne.

## LA CORRECTION.

Mais en y adioustant graine de Fenoi, ou d'Anis, & quelques especes, comme Canelle, Gingembre, &c. elle ne renuerse pas si fort l'estomach, & son operation est plus douce & amiable.

## Des Tithymales. Chap. XXIX.

## LES ESPECES.

IL y a selon Dioscoride sept sortes de Tithymales: dont les aucunes sont à present cognees, les aucunes seront à ceste heure mises en lumiere par nostre diligence, & les aucunes sont encores incognees.

## LA FORME.

La premiere espece de Tithymale appellée Tithymale masle a les tiges rondes, rouges, d'environ vne coudée de haut, c'est à dire vn pied & demy. Les fueilles sont longues & estroictes, plus estroictes & plus longues que les fueilles d'Oliuier, dont celles qui viennent au plus haut, semblent (auant qu'elles soient parcreués) estre velués. La graine croist au plus haut des tiges en petites fueilles rondes & creuses, comme si c'estoient petis susferons, au trauers desquelles la tige croist: Elle est encluse en siliques triangulaires, semblable à la graine de Ricinus, soit en croissant, soit en figure, mais beaucoup plus petite. La racine est ligneuse, ayant mout de fibres.

La seconde Espece de Tithymale, a tiges droictes, d'environ vne paulme de haut, autour de laquelle croissent beaucoup de fueilles par interualles, & sans ordre, espesses, blanchatres, ayans au bout vne poincte aigue, non guere differentes aux fueilles de Ruscus, plus grandes toutesfois, plus espesses, & non noiratres, mais toutes blanches, de la couleur de Tithymale marin. Et quand elles sont eschachées, il en sort du lait comme hors des autres Tithymales. Les fleurs sont isulnes, croissans par esmouchettes comme à la Racine sentant les roses. Le fruit est triangulaire, pareil au fruit des autres Tithymales.

La tierce espece laquelle on peut bien appeller Tithymale marin, a six ou sept belles tiges rouges, ou dauantage, sortans d'vne mesme racine. Les fueilles sont petites, pres comme les fueilles de Lin, croissans au tour de la tige fort serrées. Les fleurs sont isulnes, & croissent sur petites esuelles, comme à la premiere espece de Tithymale, puis apres vient la graine triangulaire, comme aux autres Tithymales. La racine est ligneuse, longue, & vnice.

Ceste espece de Tithymale a les fueilles, esuelles & fleurs beaucoup plus espesses, que nulle autre espece de Tithymale.



*Tithymalus Myrsinæ.*  
Premier *Tithymale* femelle



*Tithymalus*  
*Paralios.*

*Tithymale*  
*marin.*

*Tithymalus*  
*heliocopiæ*

*Tithymale*  
*tournant au*  
*Soleil.*



4 La quarte espece, appellée Tithymale tournant au soleil selon le nom Grec, a trois ou quatre tiges rougeâtres, d'environ vn pied de haut, & les fauilles moins espessées que la Pourcelaine domestique. Les fleurs sont iaulnes, croissans par esmouchettes. La graine p a uille aux autres Tithymales.

A5 La cinquiesme espece appellée Tithymale pareil au Cypres a les tiges rondes, rougeâtres, d'environ vn pied de haut; les fauilles fort petites, verdes, estroictes, semblables aux fauilles du Sapin, beaucoup toutesfois plus petites & plus molles. La graine est petite, au reste semblable aux autres, & prouient sur petites esuelles persâtes, au milieu des branches colaterales.

B De ceste sorte s'en trouue il encores vne fort petite, laquelle on peut bien appeller petit Tithymale pareil au Cypres. Il a les tiges fort petites, tendres, & gressées, d'environ vne paulme de haut & là dessus petites esmouchettes, portans fleurs de couleur pale iaulne, puis apres ensuyt la graine semblable aux autres, mais beaucoup plus petite.

C D'auantage encores y a il vne troiesime sorte de ceste espece, dont les fauilles sont toutes blâches, au reste semblable au Tithymale pareil au Cypres, comme nous a dit le diligent & grand Herboriste Ian de Vreckom, qui a eu autrefois de tel Tithymale croissant en son iardin: Toutes fois nous ne l'auons point veu, voylà dequoy ie n'en baille plus ample description.

6 La Sixiesme espece est grande & haute de 8. ou 9. coudées, croissant en forme d'arbre. La tige est aucunesfois de la grosseur d'vne iibe (comme Pierre Belon escrit) & produit beaucoup de branches espandues au large, rougeâtres, teuesues de petites fauilles, semblables aux fauilles du petit Myrte. Le fruit ressemble à celui des autres Tithymales.

7 La Septiesme espece a les fauilles douces comme les fauilles du Bouillon, mais elle est encores incogne.

Toutes ces especes de Tithymale sont pleines de liqueur blâche comme lait, laquelle en fort quand ilz sont escachés ou bleffés, & est amere & acre à la langue.

#### LE LIEU.

1 La premiere espece de Tithymale ne croist pas en ce pais de soymesmes, & se trouue peu souuent si ce n'est aux iardins des diligens Herboristes.

2 La seconde, dit Dioscoride, croist en lieux mal cultiués.

3 La tierce croist es enuiron de la Mer, & se trouue en Zelande sur les digues & terre sablonneuse, seche, mal cultiuée & maritime.

4 La quarte croist au tour des villes es plates campagnes, & quelques iardins: elle est fort commune en ce pais.

A5 La cinquiesme appellée Tithymale pareil au Cypres, ne se trouue point en ce pais sinon es iardins des Herboristes.

B Mais le petit de la mesme espece, croist au tour de Malines, aux bords d'aucunes campagnes, ce neant moins il ne se trouue pas par tout.

6 La sixiesme espece croist en lieux pierreux.

#### LE TEMPS.

Toutes les especes des Tithymales florissent pour la plus part en Iuin & Iuillet, & leur semence est meure en Aoust.

#### LES NOMS.

Toutes les especes de ceste herbe s'appellent en Grec *τιθυμάλων* en Latin *Lactaria*: en François Tithymales ou Herbe à lait: en haut Aleman *wolffsmilchen* bas Aleman *wolffsmelch*.

La pre-



- 1 La premiere espece se nomme en Grec *τιθυμάλου χαρκαίας, καὶ ἀμυγδάλου*: en Latin *Tithymalus mas*, ou *Lactaria mascula*, c'est à dire Tithymale masle.
- 2 La seconde espece se nomme en Grec *τιθυμάλου μωρεϊνίτης*, & d'aucuns *Caryites*: en Latin *Tithymalus feminis*, c'est à dire Tithymale femelle, & de Theodore Gaza *Myrtaria*.
- 3 La tierce espece se nomme *παράλιου*, *Paralios* & *Tithymalus* ou *Mecan*, de Theophraste *κίρκου*, *Coecos*. Ceste espece se peut bien appeller en François Tithymale marin: en Alemã *Zee wolfsmecht*.
- 4 La quatriesme se nomme en Grec *τιθυμάλου ἰουσοκαπίου*, c'est à dire en Latin *Tithymalus solsequinus* ou *Lactaria solsequia* & en François Tithymale suyuant le soleil, & Recueille matin: en Aleman *Donnerwende wolfsmecht*: & en Brabant *L'roonhène cruyt*, (pres).
- 5 La cinquiesme est appellée en Grec *τιθυμάλου κνιταριουαίας*, c'est à dire Tithymale pareil au cy.
- 6 La sixiesme s'appelle en Grec *δυσπόδης* & d'aucuns *Leptophyllos*: en Latin *Tithymalus arborifescens*, c'est à dire Tithymale croissant en forme d'arbre.
- 7 La septiesme espece est nommée en Grec *τιθυμάλου πλατυφύλου*, & d'aucuns tesmoing Her molanus *Barbarus Corymbites* & *Amygdalites*: en Latin *Tithymalus latifolius*, ou *Lactaria latifolia*, c'est à dire Tithymale à larges feuilles.

## LE TEMPERAMENT.

Tous Tithymales sont chauds & secs bien pres jusques au quart degré, de qualité fort acre, mordante, & rongeante, en premier lieu le lait, puis apres le fruit & les feuilles. La racine est la moins forte. Et entre tous les Tithymales, se dit Galien, le Masle est le plus fort, puis apres le Tithymale femelle, en tiers lieu la Sixiesme espece, & le Tithymale à feuilles larges, Le Cinquiesme en force est celuy qui est pareil au Cypres, Le sixiesme est le Tithymale marin, Le septiesme & le moins fort de tout est le Tithymale suyuant le soleil, ou Recueille matin.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le ius de Tithymale est vne tresforte medecine laschant le ventre & aucunes fois faisant appetit de vomir, faisant sortir les phlegmes visqueuses, & humeurs bilieuses. Pareille vertu a la graine & aussi la racine, principalement l'escorce d'icelle, & sont fort prouffitables à ceux qui deuient hydriopiques, quand on la baille avec discretion, & bien corrigée.

Iceluy meslé avec huile fait tomber le poil du lieu qui en aura esté oint au soleil.

Iceluy mis au creux des mauuaises dents, apaise la douleur d'iceux, si est ce toutefois qu'en ce faisant, il se faut garder de toucher aux dents saines: pourtant faut il premier couvrir les saines de cire. A ce mesme vaut aussi la racine du Tithymale cuicte en vinaigre & tenue en la bouche.

Iceluy guerit aussi toute rudesse de peau, rongnes, ladrerie, & mauuaise gratelle, & tigne de la teste, il fait tomber & emporte toutes sortes de verrues, il oste les callosités & duresses des fistules, & des vlcères phagedeniques & pourris, & prouffite contre phlegmons & carboncles.

Il tue aussi les poisons, si on le mesle avec quelque viande, & puis qu'on leur donne à manger. E

## LES NVISANCES.

Le ius, la graine, & les racines de Tithymales sont leur operation avec grande violence, & sont force à la nature de l'homme, troublans le corps, fort peruertisans l'estomach, escorchans le gozier, & le rendans rude, tellement que Galsen a escrit qu'il ne faut pas donner à prendre par dedans ces herbes & moins le ius, s'ins seulement les appliquer par dehors, & ce non sans grande discretion.

## LA CORRECTION.

Si on met tremper vn jour entier l'escorce de la racine des Tithymales en vinaigre, puis qu'on la seche & puluerise, en y adioustant de la graine d'Anis, ou de Fenoi, gomme de *Tragacantha* & *Mastix*, & qu'on la donne ainsi ensemble avec quelque ius refroidant, comme d'Endiue, Cicorée ou de pommes d'Orenges, elle fera son operation sans grand troublement & perturbation, & n'eschauffera, ne inflammera point le gozier, ne les parties interieures.

## De Ezula.

## Chap. XXX.

## LES ESPECES.

**E**Zula est de deux fortes, comme dit Mesue, Grande & Petite, Ce que Dioscoride donne aussi asles à cognoistre quand il escrit que *Pityusa*, est petite en vn lieu, & grande en l'autre.

## LA FORME.

1 La grande Ezula a les tiges droictes, hautes, sur lesquelles croissent feuilles grandes & larges, plus grandes que les feuilles du Tithymale masle. Les fleurs & la graine croissent au plus haut de la tige, & prouiennent aussi aucunes fois à costé des tiges, semblables à la graine de Tithymale. La racine est grosse & espesse, reuecque d'une escorce espesse.

Pityusa maior. Grande Ezula.

Pityusa minor. Petite Ezula.



La petite Ezula est de tiges & feuilles beaucoup moindre, les feuilles sont estroictes, semblables aux feuilles du Lin sauuage. Les fleurs & graine ressemblent à celles de la premiere, sinõ quel les font plus petites. Les racines sont petites, reuestues d'une escorce deliée. Ces deux especes ressemblent aux Tithymales, pourtant ont elles este tenues pour especes de Tithymale d'aucuns anciens, ainsi que dit Diosconde, comme elles sont encores maintenant, & rendent aussi vne liqueur blanche comme lait, quand elles sont blessées, laquelle est acre & piquante.

## LE LIEV.

Le grand Ezula croist en aucuns pais au bois & deserts. Et en ce pais aux jardins des Herboristes & Le Petit prouient en lieux rudes, pierreux, & se trouue en ce pais aux landes & garrigues, mais a non par tout.

## LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent à la myzisté comme les Tithymales.

## LES NOMS.

Ces herbes s'appellent en Grec πτυύσα: en Latin Pityusa: en Arabiq de Mesue *Alsebyan*: és Boutiques *Ezula* & *Esula*, & semble que ce nom *Esula*, soit descendu de *Pityusa*, car en laissant les deux premieres syllabes *Pity*, demeure *usa*, duquel on a fait vn diminutif *vsula*, lequel a été facilement tourné en *Esula* ou *Ezula*. LE TEMPERAMENT.

Ezula est chaud & sec au tiers degré, acre, piquant, & brulant par dedans, de qualité fort semblable aux Tithymales.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le ius, la graine & racine d'Ezula laschent le ventre, & chassent hors les grosses phlegmes & visqueuses, & humeurs bilieuses & aigueuses, comme les Tithymales.
- B Brief tous les deux especes d'Ezula ressemblent du tout aux Tithymales en facultés & operations, conuenables à tout ce, à quoy les autres sont propres & prouistables.

## LES NVISANCES.

Comme Ezula ressemble aux Tithymales de temperament & facultés, Elle est aussi nuisible & dommageable gõtme eux.



LA CORRECTION.

La malignité d'Esula se corrige comme celle des Tithymales.

De l'Espurge.

Chap. XXXI.

LA FORME.

Lathyrus.

Esforge.

**E**spurge a vne tige brune, haute de deux pieds ou dauantage, de la grosseur d'un doigt: Les feuilles longues & estroictes, semblables à celles de la Saulx ou d'un Amandier. La tige se fend au sommet en plusieurs autres branchettes, reuestues de feuilles rondelletes, sur icelles brâchettes vient le fruit triangulaire, côme celui de la Paulme de Christ, plus petit toutesfois, là où sont contenus trois petis grains ronds, lesquels sauent hors de leur corce par la chaleur du Soleil quâd le fruit est meur. La racine est ligneuse & nō guere grosse.

Toute l'herbe avec tiges & feuilles red vn lait blanc comme les Tithymales, quand elle est entamée.

LE LIEV.

On la plante en ce pais en plusieurs lardins.

LE TEMPS.

Elle red ses fleurs & semence en Iuillet & Aoust.

LES NOMS.

Cette herbe se nomme en Grec *λαβύρις* & en Latin *Lathyrus*: es Bôitiques *Osparatia minor*, d'aucuns aussi tesmoing *Diolcoride Tithymalus*: en François Espurgeien haut Alemâ *Sprighaut*, *Sprung hoser*, & *Treibhoser*: en bas Alemâ *Sprung cruyt*, & en aucuns endroits de Flandre *Sprugie*.

LE TEMPERAMENT.

Cette herbe est chaude & seche iusques au tiers degré, de semblable qualité que les Tithymales.

LES VERTVS ET OPER.

**A** Si on prend six ou sept grains d'Espurge, ilz lachent le ventre puissamment, en poullant hors les humeurs phlegmatiques, cholériques, & aqueuses.

Pareille vertu a aussi le ius, mais il est de beaucoup plus forte operation.

**B** Brief l'Espurge & le ius d'icelle, sont de semblables facultés que les Tithymales.

LES NVISANCES.

**C** L'Espurge est nuisible à la personne comme les Tithymales.

LA CORRECTION.

Quand on prend les grains d'Espurge avec dactes, ou figues, ou avec gomme de Tragaganc, Mastic, graine d'Anis, & avec le ius de quelque herbe rafraichissante, Ou si on boit de l'eau incontinent apres les auoir prins, ilz ne pourront exciter inflammation aux parties interieures, ne fort troubler la personne, & ne seront guere nuisibles au corps de l'homme.

Du Reueille matin des Vignes. Chap. XXXII.

LA FORME.

**1** **L**E Reueille matin des Vignes est vne plante formée comme vn arbrisseau, non guere differente au Tithymale suuant le Soleil, beaucoup toutesfois plus petite, croissant à la hauteur d'en uiron paulme & demy, ayant plusieurs brâches, reuestues de fort petites feuilles. La graine est petite, croissant en siliques triangulaires comme l'Espurge. La racine est longue & bien fibreuse: Toute l'herbe est pleine de lait comme les Tithymales.

**2** Outre celle icy, l'en trouue encores vne autre, descrite par Hippocrate & Dioscoride, appelée *Peplis*. Laquelle a mout de feuilles rondes, semblables aux feuilles du Pourpier domestique, rouges par dessous. La graine croist entre les feuilles, semblable à celle du Reueille matin de vignes. La racine est petite & fort tendre.

Cette herbe est aussi pleine de liqueur blanche ne plus ne moins que la precedente.



## LE LIEV.

1 Le Reucille matin de Vignes croist en ce pais és jardins à la porec, entre les teues & porées, & en aucuns endroits aux Vignes.

2 Peplos, comme raconte Dioscoride, croist en terre salée, le long de la mer. LE TEMPS.

Peplos florit & liure sa semence à la myzété comme les Tithymales. LES NOMS.

1 Le Reucille matin des vignes se nôme en Grec πέρλας, en Latin Peplos: és Boutiques *Exala rotans* d'aren haut Aleman *Teufels misch*: en bas Aleman *Duquels misch*.

2 L'autre s'appelle en Grec πέρλις: en Latin Peplos, Hippocrates l'appelle πέρλιον *Peplion*, aucuns *Pey salica sylvestris*.

## LE TEMPERAMENT.

Peplos est chaud & sec iusques au tiers degré, cõme les Tithymales: de semblable temperament est aussi Peplos.

## LES VERTVS ET OPER.

A La graine & ius de Peplos ont toutes telles vertus & operations, que la graine & ius de l'Espurge, & du Tithymale, & seruent à tout ce à quoy les Tithymales sont propres, parquoy ilz lâchent aussi le ventre & chassent hors les phlegmes visqueuses & humeurs bilieuses & aqueuses.

B Ceste herbe gardée en saulmure puis mengée, refout les ventosités des boyaux & de l'amarrý, & guerit durellés de la ratelle.

C De pareilles vertus est aussi le Peplis comme escrit Dioscoride.

## LES NVISANCES ET CORRE.

Ceste herbe nuit aussi à l'homme ne plus ne moins que l'Espurge, & est corrigée & amendée en la mesme sorte, cõme est declaré au cha. precedent.

## Du Tripolium. Chap. XXXIII.

## LA FORME.

Ceste herbe a les faucilles longues, larges, verdes, vnies, & glissées, semblables en figure aux faucilles de Guede, entre lesquelles prouiet vne tige droite & crõde, de la hauteur de pied & demy ou enuirõ, reuestue de pareilles faucilles, si elles n'estoient plus petites. Elle se partit au sõmet en plusieurs braches, sur lesquelles croissent belles fleurs, perses auãt son urir: & quand elles sont ouuertes, elles ont par dedans vne couronne toute isulne, enuirõnée de faucillettes azurées, semblables aux fleurs de la Camomille en figure. Puis quand elles perissent, elles se tournent en graine velue & blâche, laquelle s'emolle au vent. La racine est longue & grosse, reuestue d'vne ecorce assez espesse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist le lõg de la mer, là ou les flos des qndes vont & viennent tellement que aucuns fois elle est couuerte de la mer, & aucuns fois elle est au sec. Il s'en trouue grand' quantité en Zelande.



## LE TEMPS.

Ceste herbe florit en juillet & Aoust.

## LES NOMS.

On l'appelle en Grec *τριπολιαν* Latin *Tripoliam* : en Arabe de *Serapio* chap. 330. *Turbith*, mais ce n'est pas le *Turbith* de Mesue ou d'Anicenne. Elle n'a pas de nom en langue vulgaire que ie sache, sinon qu'aucuns l'appellent *Camomille bleue* ou *Marguerite bleue*, lequel nom ne luy conuient pas toutesfois, attendu qu'elle n'est pas des especes de *Camomille* ou *Marguerites*.

## LE TEMPERAMENT.

La racine du *Tripolium* est chaude iusques au tiers de degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

L'escorce de la racine de *Tripolium* prise avec vin à la quantité de deux drachmes, chasse hors par bas (se dit *Dioscoride*) les humeurs aqueuses. D'auantage elle prouffite grandement aux *hydropiques*.

Icelle est aussi vtilement meslée parmy les *Antidotes* & *Contrepoisons*.

Les feuilles de ceste herbe, selon qu'aucuns Modernes disent, ont singuliere vertu pour toutes playes, tellement qu'elles les consolident & referment incontinent, si on distille dedans le ius d'icelles, ou si on met dessus les feuilles eschachées.

## De Thapsia.

## Chap. XXXIII.

## LA FORME.

**T**hapsia comme escrit *Dioscoride*, ressemble au *Ferula*, finon que ses tiges sont plus gresles, & qu'elle a les feuilles de *Fenoil*. Les fleurs sont iaulnes, croissans par esmouchettes come à *Paneth*. La graine est large, plus petite toutesfois que celle de *Ferula*. La racine est longue & espesse, noiratre par dehors, & blanche par dedans, ayant l'escorce espesse, pleine de liqueur blanche, & piquante à la langue.

## LE LIEV.

*Thapsia* croist en l'isle de *Thapsus* pres de *Sicile*, & on la trouue aussi pour le present sur la montagne de *Garganus* en *Apulie*, & en plusieurs autres lieux d'Italie.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *θαψια* en Latin *Thapsia*, *Ferulago*, & *Ferula syluestris*; de *Mesue* en Arabe *Turbith*, Et cestuy est le *Turbith* duquel il faut vser es *Boutiques* en dispensant les medecines descrites par *Mesue*.

## LE TEMPERAMENT.

*Thapsia*, signamment l'escorce de la racine, est bien pres chaude au tiers de degré, ayant adioincte vne humidité superflue, qui est la cause que facilement elle se corrompt, & ne se peut longuement garder.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

L'escorce de la racine de *Thapsia* prise à la quantité d'environ vne drachme, ou moins, lasche le ventre, en chassant hors les *phlegmes visqueuses*, & grosses humeurs, & aucunes fois aussi les humeurs bilieuses. Car elle les tire avec soy non seulement de l'estomach (lequel elle mondifie du tout) mais aussi des parties plus lointaines. D'auantage elle prouffite contre difficulté d'aieine, opilation de poitrine, colique, & mal de costé, conuulsions de nerfz, contre la goutte, & douleurs de ioinctures & parnies extremes.

On induict vtilement avec huile sur mauuaise tigne de la teste qui fait tomber les cheueux, & elle fait croistre les cheueux.

Icelle avec encens & cire, dissout le sang figé, & efface toutes taches noires & cōcusions noires.

Le ius de la racine avec miel, oste toutes lentilles, & autres taches du visage, & la rogne.

Iceluy meslé avec soultre resout toutes tumeurs, induict dessus.

D'icelle racine avec huile & cire on en fait vn vnguent fort prouffitable contre douleurs de teste enuieillées, contre douleur de costé, & des parties exterieures.

## LES NVISANCES.

En massant & tirant le ius de ceste racine, ou la moelle d'icelle il suraict grande inflammation en la face d'iceluy qui la tire, & aux mains s'elleue plein du pustules. Et quand on la prend par dedans elle excite grandes ventosités, inflations, troublemens & subuertilemens de tout le corps; Et prise en trop grande quantité, blesse les entrailles & parties interieures.

## LA CORRECTION.

Quand on veut recueillir le ius de *Thapsia*, ou qu'on veut creuser la racine, il se faut oindre la face & parties nues d'un vnguent fait d'huile rosat & de cire.

Et quand on la veut donner par dedans pour lacher le ventre, il y faut adiouster Gingembee ou Poyure long, & quelque peu de sucre, puis la donner ainsi. Car preparée en ceste sorte, elle ne fera guere nuisible à la nature.

De l'Hermodacte.


*Colchicum cum floribus.*

Tue chien avec les fleurs.

Chap. XXXV.

*Colchici folia et semen.*

Tue chien avec les fueilles & semence.



LA FORME.

L'Hermodacte a fueilles grandes, larges comme le Lis, trois ou quatre sortans d'une mesme racine, entre lesquelles la tige croist d'environ la hauteur d'un pied, produisant filiques triangulaires comme le Glaiueul de marés, plus petites toutesfois, lesquelles s'ouurent & fendent en trois estans meures, & là dedans est enclose la graine ronde, noire & dure. Les fleurs croissent, apres que les fueilles & tige sont peries, sur courtes tiges ou queues, semblables aux fleurs du Safran. La racine est ronde, large par haut, & estroicte par bas, blanche & douce, reuecstue de plusieurs tuniques, ayant d'un costé droit au milieu comme vne fente ou vne diuision, là ou la tige qui porte la fleur croist. Ceste racine de uient noire estant sechée.

Il se trouue aussi aux Boutiques des racinettes rondes, blanches, lesquelles ilz appellent Hermodactes, de figure aucunement semblable au susdict, si non que elles sont plus plattes & ont point de diuision au milieu comme le dessusdict. Toutesfois Mesue n'a point laissé par escrit queelles fueilles & fleurs elles ont.

LE LIEU.

Le Tue chien selon Dioscoride croist en Messenie, & en l'isle de Colchis d'ou il a prins son nom. Il se trouue aussi en ce pais es prés gras, & en grand abondance à l'entour de Viluorde.

LE TEMPS.

Les fueilles de Tue chien sortent en Mars & Avril, la graine est meure en Juin. En Juillet perissent les fueilles & la tige. Et en Septembre sortent de la terre les plaistans fleurs.

LES NOMS.

L'espece d'Hermodacte icy figurée se nomme en Grec *καλχικόν ἑσφιμαρον* : d'aucuns en Latin

tin *Agrestis bulbis*: en François Tue chien, ou Mort aux chiens: en haut Alemā *Zetislofen*, & *wilfen Zetislofen*: en bas Aleman, des Herboristes *Shermodactilen*.

- 2 La seconde espece qui se trouue és Boutiques, est appellée de Paul *Agineta*, *Mesue*, *Serspio*, & aucuns autres anciens Medecins en Grec *ἰσχυρὸν ἰσχυρῶν*: & en Latin *Hermodactilus*, & de ce nom est il aussi cogneu és Boutiques.

## LE TEMPERAMENT.

- 1 Le Tue chien est mauuais & venimeux, pourtant aussi ne s'en sert on en medecine.  
2 Le second *Hermodacte* est chaud & sec au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 2 L'*Hermodacte* duquel on vse és Boutiques, pouille hors par bas les phlegmes visqueuses, les at tirant des parties plus lointaines, & est tresbon d'en vser cõtre la goutte, la sciastique, & toutes dou leurs de ioiñctures.

## LES NVISANCES.

- 1 Le Tue chien prins par dedans excite demageçon par tout le corps comme fil auoit esté frot tẽ d'Orties, inflamme l'estomach, & blesse les parties interieures, tellement qu'en la fin s'en ensui uent excretions sanglantes, & puis apres la mort.  
2 L'autre *Hermodacte* duquel on vse és Boutiques, excite fluctuations, ventositẽs, & vomisse mens, & subuertit ou renuerse l'estomach.

## LA CORRECTION.

- 2 Si on adiouste à l'*Hermodacte* duquel vsent les Apothicaires, du Gingembre, ou Poyure lög, graine d'Anis, ou de Comin, & quelque peu de *Mastix*: ainsi prins il ne renuertera point l'esto mach, & n'excitera guere de ventositẽs.

## De Laureole.

## LA FORME.

- L'Laureole croist à la hauteur de pied & demy, ou dauantage, & a mout de branches lentes, & qui ne se rompent facilement, si on les tord & plie, couuertes d'une escorce epesse: Au tour d'icelles croissent pour la plus part au sõmet plusieurs fueil les amassẽes ensemble, espesses & noiratres, sembla bles en figure aux fueilles de Laurier, non pas si grandes toutesfois, lesquelles machẽes eschauffent & bruslent merueilleusement la bouche, la langue & le gosier. Les fleurs croissent sur courtes queuẽs ioignant & dessous les fueilles, biẽ amassẽes ensẽm ble au tour de la tige, & sont de couleur herbacẽe, ou blanche tirant sur le verd. Le fruiet est verd au commencement, puis apres quand il est meur, noir, bien pres de la facon d'une baye de Laurier, mais plus petite. La racine est ligneuse & longue.

## LE LIEV.

- La Laureole vient aux montaignes rudes, & en tre les bois. & se trouue au pais de Liege & de Namur, le long de la riuierẽ de Meuse, & en aucuns endroits d'Alemaigne.

## LE TEMPS.

- Elle fleurit de fort bonne heure, en Feurier: la semence est meure en May.

## LES NOMS.

- Ceste plante se nomme en Grec *ἰσχυρὸν ἰσχυρῶν*, *Daphnoides*: és Boutiques *Laureole*: en François & bas Aleman *Sauerole*: en haut Alemā *Zetisand*.

## LE TEMPERAMENT.

- Elle est chaude & seche iusques au tiers degré, aprochant bien pres du quatriẽme.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- Les fueilles de Laureole laschent le ventre, en euacuant par bas les phlegmes visqueuses & su persuẽtes aqueuses, & sont vtilẽs aux hydropiques. Pareille vertu ont quatorze ou quinze de ses bayes prinses à vne fois.

## Chap. XXXVI.

Daphnoides. Laureole.



B Les feuilles d'icelle machées & tenues en la bouche, attirent beaucoup d'eau & de phlegmes hors du cerveau, Et mises dans le nez, elles font esterneuer.

## LES NVISANCES.

Laureole subuertit fort l'estomach, & inflamme, blesse & brusle les parties interieures.

## LA CORRÉCTION.

Les feuilles de Laureole sont amendées, & rendues plus commodes à prendre, en mesme sorte que Chamelea.

## Du Mezereon.

## Chap. XXXVII.

## LES ESPECES.

Mezereon selon qu'Auicenne, Mesue, & Serapio escriuent, est de deux sortes, l'un a feuilles larges, & l'autre a feuilles estroictes. Et est décrit des anciens Grecs Medecins sous les deux noms de Chamelea & Thymelea.

## LA FORME.

1 Chamelea est vne plante humile, d'environ vn pied & demy ou deux pieds de haut: les tiges sont ligneuses, fort branchues: les feuilles sont longues, estroictes, noires, fort ressemblans aux feuilles de l'Oliuier, si elles n'estoient plus petites. Au sommet des tiges croissent petites fleurs palles ou iaulnâtres, puis apres le fruit triangulaire, comme aux Tithymales & Es-purge, verd au commencement, rouge quand il est meur, puis noirâtre ou brun quand il est sec: duquel chacun grain est rond & pres scéblable à vn grain de poyure, dur, amer au commencement, puis chaud & brulant la bouche.

2 Thymelea a moult de verges menues, d'environ vne coudée, ou coudée & demy de haut: les feuilles petites, plus petites, plus estroites & plus drues que celles de Chamelea. Les fleurs sont petites, blanches, croissans au sommet des vergettes. Le fruit verd au commencement, puis rouge, assez semblable au fruit de l'Aube espine, ayant au dedans vn petit pepin blanc couuert d'vne pellicule noire, fort chaud & brulant à la langue. Ces deux plâtes ne perdent pas leurs feuilles, mais demeurent yuer & vertes tousiours verdes. LE LIEV.

Ces plantes prouiennent en lieux rudes & incultiués, & pres des voyes, & se trouuent en aucuns endroits de France, comme en Languedoc au tour de Mompelier en abondance.

## LE TEMPS.

1 Chamelea fleurit au commencement de l'esté, & liure sa semence en Automne.

2 Thymelea florit aussi en esté, & le fruit est meur en Aoult.

## LES NOMS.

Les Medecins Arabes appellent toutes ces deux plantes d'vn nom Mezereon, & aucuns, Raspiens vitan, & Paciens vidadas.

1 La premiere espece s'appelle en Grec χαμδαία: en Latin Chamelea, Oleago, Oleastellus, d'aucuns Citocicinus, & se pourroit bien appeller Chamelea trisoccos à la difference du Chamelea Germanica.

2 La seconde espece se nomme en Grec θυμδαία: en Latin Thymelea, d'aucuns Cneoron, Cestron, & aussi Chamelea: en Syrie Apoitam. Elles sont toutes deux incognues es Boutiques de ce pais.

La graine de Thymelea s'appelle en Grec κικκω: en Latin Grati gudiua: incognue aussi es Boutiques, car au lieu d'icelle les Apothicaires de ce pais prennent la graine du commun Mezereon duquel nous parlerons au chapitre ensuyuant.

Chamelea.



## LE TEMPERAMENT.

Toutes les deux espèces de ces herbes sont chaudes & seches au tiers degré, fort approchant du quatriesme. LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les feuilles de ces deux espèces de Mezereon purgent par bas avec grand force & violence le plegme, & humeurs bilieuses, principalement les humeurs serueuses, dauantage prouffissent aux bydropiques, si on les donne avec discretion & bon iugement.

A ce mesme valent les grains de Thymela, quand on prend la moelle de vingt grains. Les feuilles de Chamelea pilées avec miel, mon dissent les vicerres pourris.

## LES NVISANCES.

La qualité de ces herbes approche fort de la nature du venin, fort nuisible & mauuaise à l'homme en beaucoup de fortes. Elles portent grand dommage à l'estomach, au foye, & à toutes parties nobles, les eschauffans, bledians, & trouans, & induisant vicerres aux intestins, & en la fin purgent le ventre iusques au sang. LA CORRECTION.

Les feuilles verdes de Chamelea laissons on tremper vn iour & vne nuit dedans bon fort vinaigre, puis on les sechera, & gardera pour en vser. Et si dedans ce vinaigre premier auoient trépe pommes de Coing, ou la graine de Berberis, il en seroit meilleur & plus conuenable pour preparer les feuilles de Chamelea. Et quand on veut vser des feuilles ainsi preparées, il les faut mettre en poudre & les donner avec semence d'Anis, & Mastix, ou on les mettra bouillir en megue de lait, signamment de lait de cheure, ou au brouet de quelque chappon, puis lon donra à boire ledict megue ou brouet.

## Du Mezereon d'Allemagne.

## Chap. XXXVIII

## LA FORME.

CE Mezereon, lequel on appelle en haut Aleman *Schidtsast*, est vn petit arbrisseau d'enuiro trois ou quatre pieds de haut, ayant les branches courtes & qui ne se rompent facilement, & là dessus feuilles longues, fort semblables à celles du Troesne, plus blanches toutesfois, & plus tendres. Les fleurs croissent le long des branches, de couleur purpurée & de bonne odeur, apres lesquelles suruiennent les bayes, verdes au commencement; rouges quand elles sont meures; puis qu'el les sont seches, noires & ridées; & ressemblent bien pres à la graine de Chanure qu'on leur a osté la peau qui les couure, sinon qu'elles sont vn peu plus rondes & plus grandes. Et si on les mache on les trouuera fort chaudes & bien fort & longuement brulantes la bouche & le gozier. Ce que non seulement fait le fruit, mais aussi les feuilles, l'escorce, & les racines. LE LIEV.

Ce Mezereon croist en plusieurs endroits d'Allemagne, aux bois humides & obscurs, & en lieux rudes & mal cultivés. LE TEMPS.

Il florit de bon heure en Feurier ou Mars, deuant qu'il produise ses feuilles. Le fruit deuiant rouge & meur en Aoult & Septembre.

## LES NOMS.

Ceste plante est appellée es Boutiques d'Allemagne *Mezereon*, & a esté tenue l'og temps pour le vray *Chamelea*, parquoy on la peut bien appeller *Chamelea Germanica*: en haut Aleman *Schidtsast*; *Leustbraut*, & *Ketterschast*: en bas Aleman *Zerbstast*, & le plus souuent *Mezereon*.

La graine d'icelle est vsurpée des Apothicaires de ces pais pour *Coccus gnidios*, & est appellée du commun peuple *Wancharro* *Sesichens*, c'est à dire Bayes d'yurognes, pour ce que, apres les auoir mengées, on ne se peut facilement souler de boire.

*Chamelea Germanica.*

*Mezereon vulgare, Mezereon d'Allemagne.*



## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles, l'escorce, la racine & fruict de ceste plante sont aussi chaudes & seches, bien pres iusques au tiers degre, de qualite fort pareille au fruict de Thymelea.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les fueilles de ce Mezereon purgent puissamment & violement par bas le phlegme & humeurs cholériques, pareillement aussi les humeurs aqueuxes, & on en vst en Boutiques de ce pais au lieu des fueilles de Chamelca.
- B) Pareille vertu ont aussi les bayes, lesquelles machées laissent au gosier vne telle chaleur & l'ur l'ure, qu'à grand' peine la peut on estaindre à force de boire.

## LES NVISANCES.

Ceste plante icy est sans doute nuisible à la personne, veu quelle est fort chaude, & de forte & vehemente operation, parquoy elle bleste & nuyt aux parties interieures.

## LA CORRECTION.

Les fueilles de ce Mezereon s'accoustrent tout en telle sorte que les fueilles de Chamelca. En mesme maniere doit on aussi preparer le fruict & escorce, quand on les veut donner à prendre avec quelque medecine.

## Del'Herbe aux pouilleux.

## Chap. XXXIX.

## LA FORME.

## Staphis agria.

## Herbe aux pouilleux.

STaphis agria a les tiges droites, noiratres, ayis fueilles parties en cinq, six, ou sept coupures, pres semblables aux fueilles de la Vigne sauuage. Les fleurs croissent fort courtes queues, de belle couleur bleue, ou celestine, parties en cinq ou six fueillettes. Apres lesquelles passées suruiennent de siliques fermées, ausquelles est contenue vne graine triangulaire, noiratre, acré, & bruslante à la bouche. La racine est ligneuse & simple,

## LE LIÈV.

Les Herboristes de ce pais la sement en leurs iardins, & croist volontiers en lieux vmbreux.

## LE TEMPS.

L'Herbe aux pouilleux fleurit à la myzsté.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *σταφίς αγρία* & syrien Latin *Herba pedicularis*, ou *Pianitaria*, d'aucuns en Grec *σταφισαγρία*, cest à dire Tue poux, ou *σταφισαγρία* Boutiques *staphis agria*: en François Staphis aigre, ou Herbe aux pouilleux: en haut Aleman *Leuschraut*, & *Spriehellmar*: en bas Alemã *Suyf cruyt*, & la graine puluerisée *Suyf powder*, cest à dire Poudre aux poux.

## LE TEMPERAMENT.

La Staphis aigre, signammé la graine, est chaude presque iusques au quatriesme degre.

## LES VERTVS ET OPER.

- A Quinze grains de l'Herbe aux pouilleux font vomir avec violence, purgeant par ce moyen les phlegmes grosses & visqueuses.
- B La graine de Staphis aigre meslée avec huile, chasse les pouds de la teste & de tous les endroits du corps, & guerit toute mauuaise gratelle, roignes, & demangeson.
- C Icelle cuicte en vinaigre & tenue en la bouche, appaise douleur de dens.
- D Elle machée tire beaucoup d'humidité de la teste, & mondifie le cerueau.
- E D'icelle aussi trempée en vinaigre on frotte les acoufremés pleins de pouds pour les en chasser & faire mourir.

## LES NVISANCES.

- F La graine de l'Herbe aux pouilleux est fort nuisible à la nature si on la prend par dedans, fort eschauffant & inflammant les parties interieures, & subuertissant l'estomach: & si on la tient en la





bouche, elle excite inflammation en icelle, & au gosier, pourtant on ne doit point legèrement vsér de ceste graine, sinon au dehors du corps.

LA CORRECTION.

Auant qu'vsér de la graine de Staphisigre, il la faut tremper en vinaigre, puis la secher, & quand elle est seche, la donner à boire avec hydromel c'est à dire miel bouly avec eau: & qui l'aura prin se, il se doit pourmener sans s'arrester, & doit souuent boyre de l'hydromel. Et se faisant, elle parfera son operation, sans grande nuissance.

Du Concombre sauuaige.

Chap. XL.

LA FORME.

*Cucumis sylvestris.*

Concombre sauuaige.

LE Concombre sauuaige a les fueilles rondes, rudes, plus petites & plus rudes que celles du Concombre vulgaire. Les tiges sont rondes & houlues, couchées le long de la terre, sans clauicules, sur lesquelles & au creux des ailes entre les fueilles croissent courtes queues, soufflans vne fleur pale isulne, apres lesquelles suruiennent de petis Concombres houlus, d'enuiron la grosseur d'vn pouce, & de mesme longueur, pleins de ius & d'vne graine brune, laquel le sort hors incōtinent que lon touche ces Concombres qui sont meurs. La racine est blanche, espesse, & grosse, ayant plusieurs autres petites racines pendantes. Toute l'herbe est de goust fort amer, principalement le fruit, duquel on recueille le ius, puis on le seiche, dōt on vse en medecine.

LE LIEV

Ceste herbe se trouue es iardins des Herboristes de ce pais: Et là ou elle a esté vnfois semée elle y recroist legèrement tous les ans.

LE TEMPS.

Ces Concombres florissent en Aoust, & le fruit est meur en Septembre.

LES NOMS.

Ce Concombre s'appelle en Grec *σικυρ* & *αγρο* en Latin *Cucumis agrestis, sylvestris*, & *erraticus*: d'aucuns *Cucumis anguinus*: es Boutiques *Cucumis aspinus*: en François Concombre sauuaige: en haut Aleman *wild Cucumer*, ou *esels Cucumer*: en bas Aleman *wilde Concommeren*, ou *esels Concommeren*.

Le ius du fruit estant seché s'appelle *Elaterium*, es Boutiques *Blasterium*.

LE TEMPERAMENT.

Le ius du Concombre sauuaige est chaud & sec iusques au second degre, de qualite mondifiante & resoluente. La racine est de pareille faculte, mais non si forte que le ius.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

*Elaterium* (c'est le ius de Concombres sauuaiges seché) prins à la quantite d'environ vn demy A scrupule, chasse par bas les phlegmes visqueuses, & humeurs bilieuses, principalement les aqueuses: d'auantage il est bon aux Hydropiques, & qui ont fort courte aleine.

Iceluy delayé en lait doux, puis tiré par le nez, chasse des yeux la mauuaise couleur qui demeure apres auoir eu la inuulnise, appaise douleur de teste, & mondifie le cerueau.

Iceluy appliqué par bas en forme de pessus avec vin miellé, esmeut le flux menstruel des femmes, & tire hors l'enfant mort.

*Elaterium* appliqué par dehors avec vieil huile, ou miel, ou fiel de taureau, guerit la squinancie, & enleures du gosier. Le ius de la racine, & resforce d'icelle pareillement, purgent aussi les phlegmes & humeurs bilieuses & serueuses, & prouffitent aux hydropiques comme *Elaterium*, sinon qu'ilz ne sont pas de si forte operation.



- F La racine du Concombre sauvage amollie en vinaigre & appliquée, apaise la douleur, & oste l'enflure de la goute. Le vinaigre d'as leſquelle a bouly tenu en la bouche, apaise douleur de des
- G Icelle induicte avec farine d'orge roſtie, diſſout les cedemes, & appliquée avec terebinthine, rompt & ouure les apoſtemes.
- H Icelle miſe en poudre, & induicte avec miel, nettoye, guerit & eſſace toute mauuiſe graille, dartres, demangeſon, rougeoles, lentilles, toutes taches & cicatrices du corps de l'homme.
- I Le ius des ſucilles diſtillé aux oreilles, en oste la douleur.

## LES NVISANCES.

Elaterium prins au dedans, bleſſe les parties interieures, & ouure les petites veines, & excite torſions de ventre & trenchées en faiſant ſon operation.

## LA CORRECTION.

Pour empêcher qu'il ne nuise, il le faut donner avec hydromel, ou avec lait doux & quelque peu de ſel & de ſemence d'Anis, ou le bailler pulueriſé avec gomme de Tragacantha, & quelque peu d'Anis & de ſel.

## De la Coloquinte.

## LA FORME.

- 1 LA Coloquinte ſe traine avec ſes reinſeaux, le lög de la terre, ayäs ſucilles rudes & houſſues, griſatres, ſort ſendues & couppees, pres ſemblables aux ſucilles du Concombre citrin. Les fleurs ſont palles. Le fruit rond, de couleur verte au commencement, puis apres ſaulnatre, duquel l'eſcorce n'eſt point eſpeſſe ne dure, & le dedens eſt fungeux, plein de grains gris, & de gouſt fort amer, le ql on ſeche & garde pour ſen ſeruir en medecine
- 2 Il ſe trouve encores vne autre eſpece de Coloquinte, non guere ſemblable à la premiere. Ceſte cy a des tiges longues, rudes, montans bien haut, & ſattachäs par tout avec des clavicules comme les Courges. Les ſucilles reſemblent à celles du Concombre ſauage. Le fruit reſemble du tout à vne Courge, ſinon qu'il eſt beaucoup plus petit, de la groſſeur ſeulement d'vne poyre. Ces Courges ſauages ont l'eſcorce de deſſus fort dure, ligneuſe, & verte, & par dedäs ſont pleines de ius, & de gouſt fort amer.

## LE LIEV.

- 1 La premiere eſpece croiſt en Italie & Eſpaigne, deſquels lieux on apporte en ce pais le fruit ſec.
- 2 La ſeconde nous l'auons aucuneſois veü aux jardins de quelques Herboriſtes.

## LE TEMPS.

La Coloquinte produit ſon fruit en Septēbre

## LES NOMS.

- 1 La Coloquinte ſe nomme en Grec καλοκίνθη: en Latin Colocynthis, de Paul Agineta auſſi ſίκος νιαιές Boutiques Colocynthis: en Aleman Coloquint oppreſin, & Coloquint appel.

- 2 La ſeconde eſpece ſe peut bien nommer en Grec καλοκίνθη ἄγρια: en Latin Cucurbita ſilueſtris en François Courge ſauage: en Aleman wiſde Lantwoortē, car c'eſt vne eſpece de la vraye Courge.

## LE TEMPERAMENT.

La Coloquinte eſt chaude & ſeche iuſques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le bläc & moelle interieure de la Coloquinte prinſe en iürö au poid d'vñ ſcrupule, laiſche puiſſamment le ventre en purgeät les phlegmes viſqueuſes, les humeurs bilieufes, & ſuperſuites gluantes & puantes, meſmes aucuneſois iuſques au ſang ſi on la prend en trop grande abondance.

Parcille

## Chap. XLI.

Colocynthis.

Coloquinte.



Pareille vertu a elle si on la bouillit ou met tréper en hydromel ou quelque autre liqueur, puis B on la donne à boire: elle sert grandement à toutes maladies froides & dangereuses, comme Apoplexie, Epilepsie, Tournoyemens de teste, difficulté de respirer, la Colique, & aux nerfs trau- suls, & dislocation de membres. (dement.

Pour les mesmes effects, on la peut aussi letter es clysteres & suppositoires qui se môt par le fon C L'huile auquel la Coloquinte est cuicte, ou qui a cuicte dedans la Coloquinte, instillé dedans D les oreilles, en oste le bruit & bourdonnement. LES NVISANCES.

La Coloquinte est fort contraire au cuer, à l'estomach, & au foye, & trouble & blesse les en- traillies & autres parties interieures. LA CORRECTION.

Il faut adiouster à la moelle de la Coloquinte, gomme de Tragacantha, & du Mafix puis les reduire en trochasques avec du miel, d'iceux on se sert en Medecine.

## De Gratiola.

## Chap. XLII.

## LA FORME.

## Gratiola.

Gratiola est vne herbe basse, d'enuiro vne paulme de haut, ressemblant au- nement à l'Hyssope vulgaire, elle a plu- sieurs tiges quarrées, & les fueilles vn peu largettes, plus larges que celles de l'Hyssope, & plus longues que celles de la petite Centaurée. Les fleurs viennent entre les fueilles sur courtes queues, de couleur blanche, ayant quelque peu de pers mellé parmy. Toute l'herbe est de goust amer, bien pres comme la petite Centaurée.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist voluntiers en lieux bas & humides, & se trouue es prés: en ce pais les Herboristes la plantent en leurs jardins. LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en ce pais en Juillet & Aoult. LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle des modernes en Latin *Gratiola*, & d'aucuns aussi *Gratia Dei*, c'est à dire Gracie de Dieu: en Italien *Stans ea Canale*: Et semble bie à voir que ce soit vne espece de *Centaurium minus*.

## LE TEMPERAMENT.

Gratiola est sans doubtte chaude & se- che, & de fait elle est plus seche q chaude.

## LES VERTVS ET OPER.

Gratiola boullie & beue, ou mégee avec quelque visde, lasche fort le ventre, & par mesme moyé purge les grosses phlegmes & humeurs bilieuses. Celle seche & puluerisée puis espandue sur les playes, consolide & B guerit les nouuelles, & nettoye les vieilles & pourries. Pourtant elle est conuenable pour mettre avec les huyles & vnguens propres à mondifier & guerir playes.

## De Sene.

## Chap. XLIII.

## LA FORME:

Sena est vne petite plante & basse, ayans les branches menues & tendres, & les fueilles tendres & rondelletes, dont chacune n'est guere differente aux fueilles du Fenugrec: de couleur palle font les fleurs: apres lesquelles passées l'aruiennent petites filiques plattes & courbées, contenant vne graine brunatre & platte. LE LIEV.

Sena vient en Alexandria, pareillement en plusieurs lieux d'Italie & de la Prouince, mais la meil- leur est celle d'Alexandrie. LE TEMPS.

On la seme au Printemps: Elle fleurit à la myzité, & produit filiques, soudain apres on la cueil- le & met secher.



## LES NOMS.

Sene se nomme par Actuarius en Grec, & par les Medecis Arabes en Arabe Sena: & de ce nom est elle cognee es Boutiques, & en François & Aleman.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles de Sene sont chaudes jusques au second degre, & seches jusques au premier.

## LES VERTVS. ET OPER.

**A** Les follicules & feuilles de Sene prins à la quantité d'une drachme, lâchent le ventre en euacuant le phlegme & la cholere, & principalement l'humour melancholique & noir.

**B** A ce mesme on les donne à boyre avec le brouet d'un poulet, ou avec purée de poys, ou quel que autre liqueur semblable.

**C** Les feuilles de Sene prises en ceste sorte, profitent à gens tristes, pelants, craintifs, & qui espouventent de peu de chose, & à tous melancholiques, & qui sont subiets à Epilepsie: d'auantage elles conuiennent contre toutes opplations de foye, encores plus de la ratelle, contre douleurs de teste, gruelle, galle, & laderie. Brief la purgation faicte par feuilles de Sene, sert à toutes maladies causées par humeurs melancholiques, adustes & salées. **LE CHOYS.**

Les follicules selon le iugement de Mesue sont les meilleurs pour enuier en medecine, puis apres les feuilles: les tiges & branches sont inutiles.

## LES NVISANCES.

Sena excite ventosités & torsions au ventre, & est de fort lente operation.

## LA CORRECTION.

Il faut adiouter au Sene, graine d'Anis, Gingebre, & quelque peu de Sel gemma. Ou on les fait bouillir avec graine d'Anis, raisins, & quelque petit de Gingembre. Car acoustrée en telle sorte elle fera son operation legerement, & sans aucune moleste.

## Du Suyn. Chap. XLIIII.

## LES ESPECES.

**A** **C**eux qui traouillent à present en la cognoissance & science des Herbes, trouuent quil y a deux especes de Suyn: dont l'une est fort commune, & bien cogneue, l'autre estrangere & non guesre cogneue, laquelle pourtant se nomme Suyn sa uage.

## LA FORME.

**I** Le Suyn vulgaire croist souuent à la hauteur d'un arbre, ayant le tronc gros, fort, & ligneux, d'où procedent & croissent plusieurs branches longues, droictes, & noisettes, creuses par dedans, & pleines de moelle. blanche & douce, couuertes par dehors d'une escorce grise ou cedreuse, sous laquelle y en a encores vne joygnant le bois, verte, laquelle on appelle escorce mediane. De chacun neud ou ioincture vient vne feuille d'un



Sambuc.

Suyn.



d'un verd obscur, de forte odeur, & partie ou diuisée en mout d'autres fueillettes, desquelles chascune est vn peu crenelée à l'entour. Au plus haut des tiges croissent les fleurs blanches, amassées ensemble par esmouchettes, comme les fleurs de Pastenades. Et quand ces fleurs sont tombées, il y suruiuent des petites bayes rondes, verdes au premier, puis apres noires, desquelles on espraint vn ius rouge & vineus. En ces bayes est contenue la graine plate & petite.

B De ceste espece de Suy, l'en trouue encores vne autre sorte, les bayes de laquelle sont blanches en iaulnissant: au reste du tout semblables aux autres: & ceste espece est Estrangere & se trouue bien peu souuent.

2 La seconde espece, c'est à dire le Suy sauuage est pareille à la premiere espece de tiges & branches noieuses, & pleines d'une moelle blanche, & en odeur de fueilles. Mais elle est fort differente à icelle en fleurs & fruct: car les fleurs de ce Suy sauuage ne croissent point par esmouchettes plates & larges comme les fleurs du premier & commun Suy, mais amassées ensemble comme les fleurs de Vimarina laquelle aucuns appellent Roynette, du Pygamum, & du Troefne. Et quand ces fleurs iaulnes en blanchissant sont tombées, les bayes croissent en meisme façon, amassées ensemble bien pres comme vne grappe de raisins. Elles sont rondes, rouges, de saueur mal plaisante & estrangere.

LE LIÈV.

1 Le Suy vulgaire se trouue en abondance en ce pais par les hayes & seps, & ayme lieux vmbreux & humides.

2 Le Suy sauuage croist aussi en lieux obscurs & humides, mais il se trouue fort peu souuent.

LE TEMPS.

1 Le Suy vulgaire fleurit en May ou plus tard.

2 Le Suy sauuage fleurit en Auri: & le fruct de tous deux est meur en Septembre.

LES NOMS.

1 Le Suy vulgaire se nôme en Grec ἀκρί: en Latin & es Boutiques *Sambucus*: en François Suy, ou Sus: en haut Aleman *Holder*: en bas Aleman *Wiser*.

2 Le Suy sauuage s'appelle à present *Sambucus bluestris*, & *Sambucus cernuus*: en haut Aleman *Wiser Holder*: en bas Aleman *Wisse Wiser*.

LE TEMPERAMENT.

1 Le Suy vulgaire est chaud & sec iusques au tiers degré, principalement l'escorce, les fueilles & bourgeons.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Les fueilles & tendres ietons du Suy vulgaire prins avec quelque porée ou potage, laschent le ventre, euacuans par meisme moyen le phlegme visqueux, & humeurs sereuses.

La verde escorce mediane des branches du Suy, ne differe guere aux fueilles & tendres ietons, sinon qu'elle est de plus forte operation, purgeant les humeurs sereuses avec violence & perturbation.

Les grains, principalement la petite plate graine sechée, prouissent aux hydropiques, pareillement à ceux qui sont fort gras, & deuiendroient volontiers maigres, si on les prend du matin à la quantité d'une drachme, avec du vin, moyennant qu'on continue par bonne espace de temps.

Les fueilles verdes pilées sont vtilement appliquées sur phlegmes & colles tions, & appliquées en forme de Cataplasme avec sein de bouc ou de beuf apaisent douleur de gouste.

2 Le temperament, les vertus & operations du Suy sauuage sont encores incognues.

LES NVISANCES.

Le Suy est de sa propre nature du tout cōtraire à l'homme, il fait de grandes fluctuations, & appetit de vomir & perturbations en l'estomach, aux entrailles & vêtre, il affoyblit tout le corps, & degaste la vertu, & sanité du foye.

De l'Hyble. Chap. XLV.

LA FORME.

Combien que l'Hyble ne soit point vn arbre, ne plante ligneuse, mais vne herbe prouenant tous les ans de sa racine de nouveau: si est ce toutefois que nous l'auons en ce lieu voulu descrire, non pas seulement pour ce qu'il ressemble au Suy, mais aussi pour ce que les Anciens ont tousiours escrit du Suy & des Hybles ensemblement, lesquels ray voulu s'uyre en cest endroit: Hyble doncques n'est pas vne plante ligneuse, ains vne herbe ayant tiges longues, droictes, grosses, anguleuses, distinguées par neuds & ioinctures, comme les branches du Suy, sur lesquelles croissent fueilles de couleur verde obscure, parties en plusieurs autres, fort semblables aux fueilles du Suy, tant en figure, cōme en odeur. Au plus haut des tiges produit il ses fleurs par esmouchettes, puis apres les grains ou bayes comme le Suy. La racine de la grosseur d'un doigt, d'assez

## 258 Del'Hyeble. Cha. XLV.

bonne longueur, plus convenable en medecine que la racine du Suyn, laquelle est ligneuse & mal propre pour ce faire. **LE LIEU.**

L'Hyeble vient en lieux mal cultiues, pres des voyes, & aucunes fois par les champs, principalement là où il y a quelque humidité & bon fond & gras.

### LE TEMPS

L'Hyeble fleurit en Juin & Juillet. Et en Aoust liure il son fruit.

### LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *χαιουδον*, cest à dire en Latin *Humilis sanbucus*: en François Suynbas & humale: elle se nomme en Latin *ebulus*, & *ebulus*: en François Hyeble: en haut Aleman *Stich*: en bas Aleman *Spüch*, *Stich* & *Wissel* *Wier*.

### LE TEMPERAMENT.

L'Hyeble est chaud & sec comme le Suyn, d'antage, il resoud, & est de parties subtiles.

### LES VERTUS ET OPER.

- A** Les feuilles & nouueaux iettons des Hyebles, ont pareille vertu que les feuilles & tendres iettons du Suyn, si on les prend en mesme sorte.
- B** Les feuilles appaisent aussi & guerissent enflures & tumeurs des parties honteuses, iointes & appliquées dessus.
- C** La racine boulie en vin & beuë profite aux hydropiques, car elle purge les aquolités par bas.
- D** Elle amollit pareillement & desopile l'amarry enduree & oppilée, & resout les enflures du ventre, si les femmes recoivent la fumée de la decoction d'icelle par vne selle persée.
- E** Le ius du fruit d'Hyeble noircit les cheveux.
- F** La fumée d'Hyeble brulé, chasse les serpens & autres bestes venimeuses.

### LES NVISANCES.

L'Hyeble nuyt aussi à l'estomach & aux parties interieures, comme le Suyn.

## De la Couleurée. Chap. XLVI.

### LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Couleurée, blanche & noire, comme dit Dioscoride. La Blanche est commune & bien cognue par tout. La Noire nous est encores incognue, & ne se trouue point en ce pais.

### LA FORME.

- I** La Couleurée blanche ressemble aucunement à la Vigne commune, de feuilles & clauicules, sinon quelle est du tout beaucoup plus houlue & plus blanche: Elle a les tiges tendres & gresles, si elle est fort haut, & s'envelopans autour des hayes & arbres, comme le Houblon, & se attachant par tout avec ses clauicules. Les feuilles sont grandes, fendues en quatre ou cinq coupures profondes, fort semblables aux feuilles de la Vigne, plus blanches toutes fois, plus houlues, & plus rudes. Les fleurs croissent plusieurs ensemble, de couleur blanche, apres lesquelles surviennent de bayes rondes, ver-



Bryonia alba. Couleurée blanche.



des au commencement, & puis apres toutes rouges. La racine est fort grosse, longue, & espesse, amere, & de goust fort estrange.

La Couleuree noire, comme dit Dioscoride, a feuilles pareilles au Lierre, plus grandes toutefois, & bien pres semblables aux feuilles du grand Liseron portant doches pour fleurs, laquelle on appelle *Volubilis maior*: Elle a aussi tiges semblables, s'enueloppans autour des hayes & des arbres, & se fichant par tout avec ses clauscules. Le fruit est amassé en un comme petites grappes, verd au commencement, puis apres du tout noir qu'ild est meur. La racine est noire par dehors, & iaulne par dedans comme Bouys.

## LE LIEU.

La Couleuree blanche croist par tout en ce pais le long des champs, s'enueloppant autour des feps & des hayes.

Pour le present il n'y a encores personne qui ayt trouue la Noire, que se sache.

## LE TEMPS.

La Couleuree blanche commence à fleurir en May, & le fruit est meur en Septembre.

## LES NOMS.

La Couleuree blanche se nomme en Grec *Αλευρα*, *Αλευρα*, *Αλευρα*, *Αλευρα*; en Latin *Vitis alba*: en Arabie *Alphesera*, de Matheus Syriacus *Vitacea*: es Boutiques *Bryonia*: en François Couleuree blanche en haut Aleman *Witswurts*, & *Sunde hurs*: en bas Aleman *Bryonia*.

L'autre espece Noire se nomme en Grec *Αλευρα*, *Αλευρα*, *Αλευρα*; en Latin *Vitis nigra*, & *Bryonia nigra*, d'aucuns *Χειμων*, *Χειμων*, hoc est *Chironia vitis*. Et se peut bien appeller en François Couleuree noire: en haut Aleman *Witswurts* *Witswurts*: en bas Aleman *Swerter Bryonia*.

## LE TEMPERAMENT.

La racine de la Couleuree blanche est chaude & seche iusques au tiers degre.

La noire est de mesme complexion, mais non du tout si forte.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de Couleuree, signamment le ius d'icelle, lasche puissamment le ventre, & fait sortir A les phlegmes visqueuses, prouoque l'vrine, & est fort conuenable pour nettoyer & mondifier le cerueau, le thorax, & parties interieures, de phlegmes & grosses humeurs & visqueuses.

La racine de Bryonia prise enuiron à la quantite d'une drachme tous les iours par l'espace B d'un an, guerit du mal caduc.

Elle ayde aussi à ceux qui sont trouués d'Apoplexie, & de tournoyemens de teste: en outre C on la mesle vtilement parmy les medicamens que lon fait contre morsures de serpens.

La racine de Bryonia beue enuiron à la quantite d'une demy drachme avec vinaigre par tren D te iours, guerit la ratelle endurcie & fort oppilee. A ce mesme vaut elle pilee avec figues puis appliquée sur l'endroit de la ratelle.

D'icelle on en fait un Electuaire avec miel, lequel prouffite grandement à ceux qui ont cour- E te aleine, qui sont trouués de toux enuieillee, & de mal de costé, & à ceux qui sont bleffés ou rompus par dedans, car elle resout le sang caillé.

Appliquée en forme de pessaire par dessous, elle esmeut les fleurs aux femmes, & fait sortir p barrires faix, & l'enfant mort.

Pareille vertu a aussi vn bain fait de la decoction d'icelle: outre ce il purge & nettoye la mati G ce, de toutes immundicités & ordures, si elles passeoient dessus.

Icelle pilee avec du sel, est vtilement appliquée sur vlcères malings ambulatifz, rongans, pour H riflans, & coulans, principalement qui sont aux iambes.

A ce mesme prouffissent aussi grandement les feuilles & le fruit, appliqués en mesme forte que la racine.

Elle nettoye le cuir, & efface les rides & fronces, lentilles, & toutes sortes de taches & cicatri- I ces si on la mesle avec farine d'Orabus & de Fenugrec. Aussi fait bien l'huile dans lequel la racine de Bryonia a esté cuicte.

Elle pilee & demeslee avec du vin, resout le sang figé, efface toutes cicatrices, & contusions noi- K res, degaite tumeurs recentes, & meine à maturité & rompt vieilles apostemes. Elle tire hors les eschardes, & os rompus, & appaise vlcères malings suruenans aux racines des ongles.

Le fruit de Bryonia est bon contre rognés, & mauuaise gratelle. L Les premiers iectons ou asperges sont tresbons mangés en salade, pour l'estomach, ilz lasché M aussi le ventre, & prououent l'vrine.

La racine de la Couleuree noire prouffite à toutes les maladies dessusdictes comme la Cou- N leurée

## De la Vigne sauuage. Chap. XLVII.

leurée blanche, mais elle n'est pas si forte: toutesfois elle sert grandement contre le mal caduc, & tournoyemens de teste, & à prouoquer l'vrine, à esmouoir le flux mensrual, & pour amoindrir & desoppiler la ratelle enflée & oppilée.

Les tendrons & nouueaux ieçons de ceste Couleurée, sont aussi fort bons en salade, pour purger les superfluités aqueuses & pour lascher le vêtre, ne plus ne moins que les asperges de la Couleurée blanche.

### LES NVISANCES.

La racine de Bryonia par sa violence trouble & renuerse l'estomach, & autres parties interieures: outre plus, icelle avec ses fueilles, fruit, tiges & racines, est du tout contraire & mauuaise aux femmes enceintes, soit quelle soit preparée ou non, soit quelle soit meslée parmy autres medecines femellement qu'on ne leur peut donner ladicte racine, ou aucune medecine composée d'icelle, sans grand danger & interest.

### LA CORRECTION.

La mauuaistie en est ostée en y adioustant du Mastix, Gingembre, & Canelle, & la prenât avec miel

## De la Vigne sauuage.

### LA FORME.

LE SÉEL nostre dame a les sarmés longs, lents, ligneux, couuerts d'une escorce fendue, rampant en haut, & se tournant au tour des arbres, & des hayes, comme les sarmens de Vigne. Les fueilles ressembloit aux fueilles de la Moréle, plus grandes toutesfois, non guere differentes au fueilles du grand Lizerô. Les fleurs sont blanches, petites & moussues, apres lesquelles peües vient le fruit amassé en vi en forme de petites grappes de raisins, rouge quand il est meur, contenant trois ou quatre grains. La racine est fort grosse, epaisse, & fendue aucunesfois par le bout en trois ou quatre parties, brunatre par dehors, & blanche par dedans, & visqueuse, comme la racine de la grande Consoude. LE LIEV.

Ceste herbe croist en ce pais es boys humides & lieux basiers, ombrageux, & aquatiques.

### LE TEMPS.

Elle fleurit en May & Iuin, & le fruit est meur en Septembre. LES NOMS.

Elle s'appelle en Grec *ἀμπέλαιος* & *ἀμπέλιος*: en Latin *vitis fyluestris*, cest à dire Vigne sauuage, toutesfois ce n'est pas ceste espee de Vigne sauuage qu'on appelle *Labrusca*, laquelle ressemble du tout à la Vigne domestique, mais c'est (comme de uant est dict) vne herbe des especes de Bryonia laquelle s'appelle aussi en Grec *Αμπέλιος*, cest à dire Vigne, pour ce quelle monte, & s'enveloppe autour des arbres & des hayes, comme la Vigne. Ce que nous auons bien voulu admonester à fin que personne ne tombe en erreur avec *Aucicenna*, *Serapio*, ou autres Medecins Arabes, & ne pense que *Labrusca* & *Vitis fyluestris* soient vne mesme chose. Columelle appelle ceste plante *Tamus* à l'imitation duquel Plaine a appellé le fruit *Vna Taminea*, & appelle aussi en quelque lieu ceste plante *Salsolfram*. Elle se nomme en quelques Boutiques *sigillum beate Marie*, cest à dire Séel ou signet nostre dame: en Italien *Tamaro*: On la peut appeller en François Couleurée sauuage: en Aleman *wilde Bryonie*, pour ce que c'est vne espee de Bryonia, à la difference de la vraye Vigne sauuage.

Aucuns cuydent que ceste herbe soit le *Cyclaminus altera*, toutesfois leur opinion se peut facilement demonstrier faulse, par ce que ceste herbe a la racine fort grosse, & comme *Dioscoride* escrit, *Cyclaminus altera* a la racine inutile, cest à dire, fort petite.

### LE TEMPERAMENT.

La Couleurée sauuage est chaude & seche, propre à nettoyer, purger & resoudre.

## Chap. XLVII.

*vitis fyluestris.*

Séel nostre Dame.





## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de ceste plante boulie en eau & vin trempé d'un petit d'eau marine & beuf, purge A par bas les humeurs aquenes, & prouffite grandement aux hydropiques.

Le fruit de ceste plante dissout tout sang caillé, & efface cicatrices & contusions noires, lentil B les & autres taches du corps.

Pareille vertu ont les racines hachées ou gratées bien menu, puis appliquées dessus avec vn C linge en forme d'emplastr, comme nous mesmes auons trouué par experience.

Les nouueaux iectons qui ne font que sortir de terre, sont aussi bons mengés en sallade, com- D me ceux des autres Couleures.

## Du Clematis altera.

## Chap. XLVIII.

## LES ESPECES.

DE ceste sorte de plante, ou Liseron, laquelle, à la difference de la Peruence, appellée en Latin Clematis, on nomme Clematis altera, il s'en trouue pour le present deux especes, sans encores la Viorne, laquelle aucuns pensent aussi estre vne espece de Clematis altera.

Clematis altera.

Clematis alterius altera species.



## LA FORME.

1 La premiere espece, laquelle est la vraye Clematis altera, a les tiges menues, lentes, & tendres, par lesquelles elle se soustient, & monte en haut. Les feuilles sont languettes, & largettes, croissans trois ou quatre ensemble, fort acres & piquantes à la langue. Les fleurettes sont blanches. La racine grosse, petite & filueuse.

2 La seconde espece ressemble fort à la deuandictée de tiges, & feuilles, sinon qu'elle a les feuilles plus grandes, les tiges plus fermes, & est vn peu plus haute de croisson. Les fleurs sont grandes, parties en quatre en forme de croix, de couleur bleuë, en rien semblables aux fleurs de l'autre.

3 La Viorne qu'aucuns tiennent pour Clematis altera, a les tiges longues, nouëes, lentes, plus grandes, plus longues, & plus grosses que la susdicte, non guere differentes aux sarments de Vigne par

par lesquelles elle monte sur les arbres & hayes: sur icelles croissent les fueilles composées pour la plus part de cinq autres fueilles: desquelles chascun ne est assez large & non guere dissemblable aux fueilles de Lierre, plus petites toutefois. Les fleurs croissent comme par esmouchettes, plusieurs ensemble, de couleur blanche, & odoriferantes. Apres lesquelles passées, survient la graine petite & brunatre, portant de petites quenés courbes & plumées. La racine est fort fibreuse.

## LE LIEU.

- 1 Clematis altera est vne herbe estrangere, & ne se trouue en ce pais, sinon es iardins d'aucuns Herboristes.
- 2 La seconde est aussi estrangere en ce pais, mais en Angleterre: là croist elle abondamment es hayes, aux bords des champs, & le long des voyes.
- 3 La Viorne est vulgaire en ce pais, & se trouue es bois, es hayes, & aux bords des champs.

## LE TEMPS.

- 1, 2 Les deux premieres fleurissent en ce pais fort tard en Aoult & Septembre.
- 3 Mais la Viorne fleurit en Juin.

## LES NOMS.

- 1 La premiere se nomme en Grec κληματαρις ἄγρια, d'aucuns ἑπιγυριεν en Latin Clematis altera, Ambraxam, Epigotis, & d'aucuns Modernes Flammula.
- 2 La seconde est aussi tenue pour Clematis altera à cause de la semblance qu'elle a avec l'autre, cōbien toutefois q̄ ses fueilles ne piquent pas à la langue.
- 3 La tierce s'appelle maintenant Vitalba: en François Viorne: en Aleman Lynen ou Senen, & d'aucuns waldraeben. Quelques sçauans tiennent aussi si ceste plante pour vne espece de Clematis altera, cōbien toutefois que ses fueilles n'ayent aussi grande acrimonie, ou ne piquent à la langue. Parquoy il nous semble qu'elle a plus grande similitude avec celle qu'on appelle en Grec κυκλάμιον ἄγριον: en Latin Cyclaminus altera, d'aucuns Cissusambeton & Cissiphibon.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles de Clematis altera sont chaudes iusques au commencement du quart degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La graine de Clematis altera prinse avec eauë ou hydromel, purge par bas les humeurs bilieus, & les phlegmes visqueusës & grosses, comme dit Dioscoride.
- B Les fueilles induictes guerissent & ostent le mal Saint Main.
- C Le fruit de Cyclaminus altera beu en vin blanc quarante iours durant, guerit duresses & oppilation de la ratelle, purgeant par les vrines & par le ventre. Et prouffite à ceux qui ont courte aiee, ne, quand ilz le prennent par de dans.

## Du Lyarre.

## Chap. XLIX.

## LES ESPECES.

Il y a trois especes de Lyarre selon Dioscoride. La premiere a le fruit blanc, celle là nous est incognue. La seconde porte le fruit noir, celle là croist par tout ce pais abondamment. La tierce espece est petite & se traîne le long de la terre, & ne porte point de fruit.

## LA FORME.

Le Lyarre noir a les branches dures & ligneuses, couuertes d'une escorce grise, epesse, par lesquelles elle embrasse les murailles, parois, toits, arbres, hayes, & tout ce qu'elle rencontre. Les fueilles sont dures, vaines, de couleur verte en brunissant, triangulaires au commencement, puis apres quand elles sont plus vieilles, rondatres. Les fleurs croissent au plus haut sur queues droites & longues, plusieurs ensemble, faisans comme vne esmouchette, de couleur palle: puis apres viennent les bayes d'environ la grosseur d'un poys, amassées en vn, verdes au commencement, puis apres quand elles sont meures, noires.

Hedera nigra.

Lyarre noir.

Hedera helix.

Petit Lyarre.



§ La tierce espece de Lyarre n'est guere differente à la susdicte, sinon que ses rinceux sont plus gresles & plus tendres, & ne s'esleuent pas en haut, mais se trainent le long de la terre. Les feuilles sont le plus souvent triangles, de couleur verte en brunissant, & sur la fin de l'asté enuiron l'Autumne, brunatres en rougissant d'un costé. Ce Lyarre n'a ne fleurs ne fruit.

LE LIÈV.

2 Le Lyarre noir croist par tout ce pais sur vieilles murailles, maisons, parois, toits, & sur les arbres & hayes, autour desquelles elle se tourne & attache.

3 Le petit Lyarre vient aux boys, & se traine le long de la terre entre la mousse.

LE TEMPS.

Le Lyarre noir fleurit en asté, & le fruit est meur en yuer.

LES NOMS.

Le Lyarre s'appelle en Grec *μαρὸς*, & d'aucuns *κίαναρ*: en Latin *Hedera*: en haut Aleman *Ephew*, ou *Eppich*: en bas Aleman *Deyl*.

1 La premiere espece qui nous est incogne s'appelle *Hedera alba*, & de Pline *Hedera femina*.

2 La secode espece se nomme *Hedera nigra*, & *διωρία*, *Diosyria*, de Pline *Hedera mas*, des Modernes celle qui embrasse les arbres *Hedera arborea*, & celle qui croist sur les murailles *Hedera muralis*: en François Lyarre noir: en haut Aleman *Schwarzere eppich*, & *Adur ephew*, ou *Baum ephew*: en bas Aleman *Deyl*, & *Boom Beyl*, ou *Quer Beyl*.

3 La tierce espece s'appelle en Grec *δαί*: en Latin *Clauicula* & *Hedera le*: en François petit Lyarre: en haut Aleman *hlein Ephew*: en bas Aleman *clayne Deyl*.

LA CAUSE DV NOM.

Le Lyarre se nomme en Grec *Cissus* à cause d'un damoyfel appellé *Cissus*, lequel aux conistues là ou les Dieux estoient inuités, dansoit au deuant de Bacchus, & fouuent le basfoit & caresoit. Or il aduint que quelque iour comme il dansoit, il tomba à terre & se tus. Ce qui e cognoissant la Terre, produisit incontinent le Lyarre retenant le nom du Damoyfel. *Cissus*, lequel parereu se

vin à enuveloper autour de la Vigne, à la memoire que le Damoyfel Cissus estoit acoustumé d'embrasser ainsi Bacchus le Dieu du vin.

## LE TEMPERAMENT.

Le Lyarre est en partie froid, sec, & astringent, & en partie chaud & acre. Davantage il a encores vne humidité superflue quand il est verd, laquelle s'éuanuit quand il est sec.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les feuilles de Lyarre bouliées en vin, guérissent grandes playes & vicerés, & arrestent vicerés rongeurs & phagedéniques.
- B Icelles acoustrées en la mesme sorte, & bien broyées, pilées & appliquées, guérissent aussi brûlures & eschaudures faictes par feu ou eau chaude.
- C Icelles cuictes en vinaigre, guérissent la ratelle endurcie & oppillée, appliquées dessus.
- D Le jus des feuilles & du fruit pareillement attiré par le nez, purge le cerueau, & fait sortir par le nez le phlegme visqueux, & autres humeurs froides, desquelles le cerueau est chargé.
- E Iceuy mis dedans les oreilles, arreste les humeurs coulans hors d'icelles, & guérit les vicerés, & rongnes d'icelles, & pareillement aussi des narilles.
- F Iceuy aussi induit seul, ou avec huile rosat, proufite à douleurs de teste enuieillies.
- G Les fleurs de Lyarre appliquées en forme d'emplastre avec huile & cire, guérissent toutes brûlures.
- H La decoction d'icelles fleurs faicte en vin & beuë deux fois le iour, guérit la dyfentere.
- I On met cuire cinq bayes de Lyarre avec huile rosat en l'escorce d'une pomme grenade: cest huile appaise & guérit douleur de dens, quand on la met en l'oreille opposite au costé ou on a mal de dens.
- K La gomme du Lyarre tue les pouës & les lendes, & induite, elle oste le poil d'icelle partie sur la quelle on l'induit.

## LES NVISANCES.

Le fruit de Lyarre prins en trop grande quantité, faict defailement de cuer, & trouble l'esprit & entendement: l'usage d'iceluy est aussi fort dangereux aux femmes, principalement aux femmes enceintes, & nouvellement acouchées.

## Du Lyarre terrestre.

## LA FORME.

Le Lierre terrestre a mout de tiges quarrées, tendres, prouenis d'une mesme racine fibreuse, sur lesquelles croissent fucilles rondelettes, mal vnies, & crenées tout à l'étour, de forte odeur, & de goust amer, plus petites, plus rondes, & plus tendres que les feuilles du Lyarre. Les fleurs croissent entre les fucilles, & de goust amer, & de couleur purpurée.

## LE LIEV.

Le Lierre terrestre est fort commun par tout ce pais, & croist en plusieurs iardins, es lieux ombrageux & humides.

## LE TEMPS.

Le Lierre terrestre fleurit depuis le mois d'Auril iusques à la fin de l'esté, & demeure verd le plus souuent toute l'année.

## LES NOMS.

Ceste herbe est tenue pour celle que les Grecs appellent *χαιμακίδιον*, les Latins *Hedera terrestris*, & *Corona terre*: & de ce nom est elle cognue es Boutiques. Elle se nomme en François Lyarre ou Lierre terrestre: en haut Aleman *Gundersteb*, & *Grand reb*: en bas Aleman *Wunderstau*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Lyarre terrestre est chaud & sec presque iusques au tiers de degré, signamment les fleurs.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La decoction du Lierre terrestre beuë, ouvre les oppilas

## Chap. L.

Chanacissus. Lierre terrestre.



oppilations du foye & de la ratelle: & continuée sept iours durans est fort vtile à ceux qui ont la jaunisse.

Icelle prinse en mesme sorte par l'espace de treante ou quarante iours, prouffite à ceux qui ont B la sciarique, c'est à dire douleur de hanche.

Ceste herbe estachée entre les mains, puis mise dedans les oreilles, guerist le bruit & son des C oreilles, & la dure ouye.

## De Cheurefeuille.

## LA FORME.

LE Cheurefeuille a plusieurs sarments menus, par lesquels il se lie autour des arbres & hayes: sur icelles croissent longues fueillettes & tendres, blanchâtres d'un costé, & de l'autre verdes en pallissant. Au bout des sarments croissent les fleurs par bouquets, odoriferâtes, de couleur plai fante, blanche ou palle en purpurée, longues & creusées, bien pres comme les boursettes de l'Ancoolye. Apres les fleurs viennent rondes bayes, rouges quand elles sont meures. La racine est ligneuse.

Il se trouue encores vne autre espeece, laquelle produit ses fueilles l'une à l'opposite de l'autre & jointes ensemble, tellement que la tige passe au trauers; au reste elle ressemble aïles à la precedete.

## LE LIEV.

Le Cheurefeuille croist par tout ce pais sur le bord des champs, entre les Genefts & les hayes. Il se trouue aussi aux bois, principalement les deux dernieres espees.

## LE TEMPS.

Le Cheurefeuille florist en Iuin & Iuillet: & la graine est meure en Aoust & Septembre.

## LES NOMS.

Ceste herbe ou maniere de Liseron se nomme en Grec *πικρόλευρον*, d'aucuns *ἀγνή κοίρατος*, *εὐλάνη*, *ἐπαίρις*, *καλοκαίρις*, *καλοκαίριμος*, *εἰθίνα*, *Carpathon*, *Splenion*, *Epatisis*, *Clematis*, & *Calycauthemon*: en Latin *Volucrus maia*, *Perichlymenum*, & *Syria mater*: es Boutiques *Caprifolium*, & *Maters filia*, & d'aucuns *Lilium inter spinas*: en François Cheurefeuille: en haut Aleman *Weyßblatt*, *Speck gilsen*, *Zewßling*, & *waldgilsen*: en bas Aleman *Weyßensladt* & *Wammehens cruyt*.

La seconde espee s'appelle en haut Aleman *Handtsküßchen*, c'est à dire Cerises de chien.

## LE TEMPERAMENT.

Le Cheurefeuille est chaud & sec bien pres iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le fruct de Cheurefeuille beu avec du vin par l'espace de quarante iours, amoindrit & guerit A la ratelle endurcie & oppilée, & purge par les vrines les mauuaises humeurs si tresfort, que apres le sixiesme ou dixiesme iour, vrine deuiet toute sanglante.

Il prouffite aussi à ceux qui ont difficulté de respirer, & qui sont traillés de toux difficile: da B uantage il donne allegiance aux femmes qui sont en trauail d'enfant, & seche la semence genitale de l'homme prise comme dessus.

Les fueilles ont pareille vertu que le fruct, comme dit Diofcoride: Outre ce elles sont demourer derriere les frissons qui sont accoustumées de venir au commencement des fieures, quand on les cuict en huile, puis qu'on les pile bien & qu'on en oygne le dos auant l'access des fieures. C



D Elles guérissent playes & vlcères ords & moites, & effacent les taches & cicatrices du corps & de la face.

## LES NVISANCES.

Les fueilles & fruit de Cheurefeuille, font fort nuisibles aux femmes enceintes, car elles leur font du tout contraires.

## Du Liferon.

## Chap. LII.

## LES ESPECES.

IL y a deux especes de Liferon, l'une porte fleur bleue, & l'autre la porte blanche, dont l'une est grande, & l'autre petite. La Grande se lie autour des hayes & des arbres. La petite se traine pour la plus part le long de la terre.

*Smilax lenis alba maior.*  
Grand Liferon blanc.

*Smilax lenis alba minor.*  
Petit Liferon blanc.



## LA FORME.

Le Liferon bleu a les rinceaux tendres, menus, par lesquels il monte & s'enveloppe autour des arbres & paux. Les fueilles sont larges & anguleuses, semblables aux fueilles plus vieilles de Lyarre, si on qu'elles ne sont pas dures. Les fleurs sont bleues cloches creuses. La graine est noire & presque triangulaire, contenue en chapiteaux, ainsi comme au grand Liferon blanc.

Le grand Liferon blanc a aussi les tiges & sarments tendres & menus, par lesquels il se lie au tour des arbres & hayes, comme le Houblon. Sur iceux croissent fueilles molles, verdes, polies, bien pres semblables aux fueilles de Lyarre, plus menues toutesfois & plus molles. Les fleurs sont grandes, blanches, creuses, de la forme d'une cloche. Et quand elles sont passées il vient en leur lieu de chapiteaux ou boutons fermés, qui contenaent vne graine noire & anguleuse. La racine est grosse, blanche, & semble à beaucoup de cheueux espes se trainans sous la terre, & sortans, & reiettans en plusieurs endroits, de goust quelque peu amer, & pleine de liqueur blanche.

Le petit Liferon blanc ressemble fort à la susdite de tiges, fueilles, fleurs, graine & racines, si ce n'est qu'elle est en toutes fortes beaucoup moindre, & le plus souvent se trainant par terre. Les tiges

tiges sont gresles & polies: les feuillettes tendres & molles: les fleurs semblables à petites cloches, de couleur purpurée ou incarnée: la graine anguleuse, comme celle des autres.

LE LIEV.

- 1 Le Liferon bleu ne croist pas en ce pais sinon és jardins des Herboristes là ou il est semé.
- 2 Le grand Liferon blanc croist en ce pais par tous les jardins, autour des sèps & hayes.
- 3 Le petit Liferon blanc vient aux champs, principalement entre les esteules, & aucunes fois aussi entre l'avoïne, l'orge, & autres grains.

LE TEMPS.

- 1 Le Liferon bleu fleurit fort tard en ce pais.
- 2, 3 Les blancs florissent en Juin & Juillet.

LES NOMS.

Le Liferon se nomme en Grec *σμύλαξ αία*, de Galien *μύλαξ*, Milax: en Latin *Smilax lenis*, de Marc Caton *Coniugulum*: és Boutiques *Volubilis*, d'aucuns *Campanula*, & *Fanis arborum*: en François Lifer, ou Liferon: en Aleman *winde* & *wanghe*.

- 1 L'espece qui porte fleurs bleuës s'appelle *Coniugulum nigrum*, & selon l'opinion des Modernes *scuans*, de *Coluwella in borris*, *Ligufram nigrum*: des Herboristes *Campans lazara*.
- 2 Le grand Liferon blanc s'appelle és Boutiques *Volubilis maior*: en haut Aleman *Groß winden* *hant*, & *Groß weiß glochen*: en bas Aleman *Groote winden*. Ceste espece est tenue d'aucuns, pour le *Ligufram album*, duquel Vergile parle.
- 3 Le petit s'appelle *Volubilis minor*: en François Campanette, ou Vitreole: en haut Aleman *klein winden* *hant*: en bas Aleman *Kleine cloephen* *winde*. Et semble qu'elle aye grande similitude avec celle que les Grecs appellent *χαμαίνα*: en Latin *Chaucissus* & *Hedera terrestris*.

LE TEMPERAMENT.

Le Liferon est de qualité chaude & seche.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Liferon n'est pas conuenable en medecine comme Galien & Pline tesmoignent.

*Helixne cissampelos*. Liferon noir.

Du Lizet, ou Liferon noir.

Chap. LIII.

LA FORME.

LE Liferon noir a les branches rougeâtres, polies, fort menues comme gros filets, desquelles il s'enveloppe & lie autour des arbres, hayes, estaches, & toutes herbes qu'il peut atteindre. Les feuilles ressemblent aux feuillettes de Lyarre, plus petites toutes fois & plus deliées, fort ressemblans aux feuillettes du Liferon blanc. Les fleurs sont blanches & fort petites. La graine est noire, & triangulaire, comme celle de la Dragée aux cheuaux, plus petite toutes fois, & plus noire, croissant par amas: chacun grain est en clos & couuert d'une petite peau. La racine est aussi gresle & tendre comme vn filet.

LE LIEV.

Le Liferon noir croist és Vignobles & aux bors des champs & des jardins, autour des hayes, des sèps, & entre les herbes.

LE TEMPS.

Il liure sa semence en Aouët & Septembre, puis apres il perit.

LES NOMS.

Le Liferon se nomme en Grec *βήλας κισσαμπος*, & de Constantin l'Empereur *μαλακοίαν*, *Malacoissos*, hoc est, *Mollis Hedera*. Aucuns l'appellent en Latin *Convolvulus*, aucuns *Vitalis*, c'est à dire Liferon de Vigne: és Boutiques *Volubilis media*, c'est Liferon moyen: en haut Aleman *Schwartz winden* & *Mittel winden*: en bas Aleman *Süwerte winden* & *Middle winden*.



## LE TEMPERAMENT.

Le Liferon noir est chaud de nature & a faculté de dissoudre.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le jus des feuilles de ce Liferon beau, lasche le ventre.  
 B Les feuilles broyées & appliquées, resouvent & consomment les tumeurs, cōme Galien escrit.

## Du Soldanella, ou Chou marin.

Chap. LIII.

## LA FORME.

*Brafica marina.*

Chou de mer.

Soldanella a mout de tiges menues, rouges, par lesquelles elle se traine le long de la terre & se jette ça & là, reuueffues de feuilles petites, rondes, verdes, plus rondes & plus petites q̄ les feuilles de Lyarre, semblables aux feuilles du Cabaret, ou de la rōde Aristolochie, plus petites toutesfois. Les fleurs ressemblent à celles du petit Liferon, de couleur cler rouge ou incarnée. La graine est noire, & croist en siliques ou ron ds chapiteaux comme aux Liferons. La racine est greille & longue. Brief ce Liferon ressemble fort au petit Liferon, excepté q̄ les feuilles sont beau coup plus rōdes & plus espesses, & de goust salé.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist abondamment en Zelide sur les digues, & en Flandres le long de la Mer, & en toute terre salée située pres de la Mer.

## LE TEMPS.

Ceste herbe florit en Juin, depuis ce temps la on la peut cueillir & garder pour sen seruir en Medecine.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec κρημνι θαλασσια: en Latin *Brafica marina*: és Boutiques Soldanella: en Aleman Zee winde.

## LE TEMPERAMENT.

Soldanella est chaude & seche iusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Soldanella purge puissamment par bas toutes sortes d'humours aqueufes, & ouure les oppilations du foye, & on la donne fort vilemēt aux hydropiques: mais il la faut boullir avec le brouet de chair grasse, puis la boire, ou la secher & la prendre en poudre.

## LES NVISANCES.

Soldanella prinse en poudre principalement, nuit fort à l'estomach, & le trouble fort.

## LA CORRECTION.

On y adiouste la semence d'Anis, de la Canelle, du Gingembre, & beaucoup de sucre, & la faut prendre ainsi puluerisée ensemble.

## Du Smilax, ou Liferon aspre.

Chap. L V.

## LA FORME.

Le Smilax aspre a les tiges & rinceaux tendres, atourés de mout de poinctes & escpines, se lians & enuelopans au tour des arbres, hayes, buissons, comme les autres Liferons & l'attachans par leurs capreoles à tout ce qu'ils rencontrent. Les feuilles ressemblent assez aux feuilles de Lyarre, mais elles sont plus longues & aigues par le bout. Les fleurs sont blanches. Il a pour fruit de rondes bayes, amassées ensemble en forme de grappe de raisins, lesquelles sont rouges quand elles sont meures. La racine est grosse & dure.

## LE LIEV.

Ce Smilax, selon le tesmoignage de Pline, croist en lieux aquatiques & mal cultivés, des vallées basses & fort ombreuses. On ne le trouue point en ce pais sinon és jardins d'aucuns diligens Herboristes.

## LE TEMPS.

Le Smilax aspre fleurit au Printemps, & és pais chauds aussi en Automne.

## LES NOMS.

Ce Smilax se nomme en Grec σμίλαξ τραχηῖα, ἢ μίλαξ τραχηῖα: en Latin *Smilax aspera*, d'au-





cuns *Volubilis aspra* ou *pungens*: en François Smilax aspre, ou Lifer piquant: en haut Aleman *Stetshend windt*: en bas Aleman *Stetshende windt*. Et la racine de ceste plante est la *Zarza parilla*, ou comme aucuns escriuent *Sparta parilla*, laquelle aucuns modernes louent beaucoup en plusieurs maladies, combien qu'il en ensuiue peu d'effect.

*Smilax aspera.*

Smilax aspre.

LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est chaude & seche.

LES VERTVS ET OPER.

Les feuilles & fruit du Smilax aspre prouffit grandement contre tout venin & poison, & ne preferuent pas seulement du venin peins au par auant, mais aussi de celuy qu'on auroit pris apres auoir mangé ces feuilles ou fruit. Et de lait à celuy qui en mange tous les iours, nul venin ne luy peut nuire.

On escrit aussi de ceste herbe, que si on donne à vn enfant nouueu né du ius de ceste herbe, que nul venin ne luy pourra nuire.

De la Scammonée. Chap. LVI.

LA FORME.

LA Scammonée est vne espèce & maniere de Liferon, qui produit mout de tiges d'une mesme racine, longues de quatre ou cinq pieds, asses grosses & charnuës, lesquelles ont feuilles triangulaires, velues, non guere differentes aux feuilles du Liferon noir, bien pres semblables aux feuilles de Lyarre, plus douces toutesfois. Les fleurs sont blanches, rondes comme vne cloche, de forte odeur & mal playfante. La racine est loque, fort grosse, blanche, & de forte odeur, & pleine de liqueur, laquelle on amasse & seche, & appelle Scammonium de grand vsage en medecine.



LE LIEV.

Elle croist en Asie, Myfie, Syrie, & Iudée, mais la meilleure vient d'Asie & de Myfie.

LES NOMS.

Ce Liferon s'appelle en Grec *σκασμονια*, d'aucuns aussi, comme escrit Dioscoride, *σκασβανια* *σιζα*, & des anciens Romains en Latin *Colophonium*.

Le ius de la racine s'appelle en Grec *σκασμωνιον*: en Latin *Scammonium*: es Boutiques quand elle n'est pas encore preparée, *Scammones*, & quand elle est preparée *Diagredium*, ou *Diagridium*.

LE TEMPERAMENT.

La Scammonée est chaude & seche jusques au tiers de degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le ius de la Scammonée seche, qui s'appelle Scammonium, come dessus est dict, prins au poids de cinq ou six grains de Bled, purge fort vaillamment par bas les humeurs bilieuses: d'auantage, il est fort bon contre iaulniße, pleuresie, frenesie, fieures chaudes, & contre toutes maladies lesquelles prennent leur origine des humeurs chaudes & cholériques.

Iceuy induict avec miel & huile, refout tous edemes, & avec vinaigre il guerit toute fe gratelle & galle.

La Scammonée induite avec huile rosat & vinaigre, guerit vieilles douleurs de teste.

Icele appliquée avec de la laine en forme de pessaire par dessous, esmeut les fleurs menstruales aux femmes, & fait iecter la secondeine & l'enfant mort.

LES NVISANCES.

La Scammonée, c'est à dire, le ius de Scammonium est vne medecine forte & violente, apportant beaucoup de nuissance & de dommage si on la prend non preparée & hors de temps & lieu. Premièrement elle peruertit fort & fait fluctuations & des vents en l'estomach. Secondement,

elle eschauffe tellement le foye & le sang, qu'elle excite fieures en ceux qui sont d'un temperament chaud. Tiercement elle ouure les veines & blesse les parties interieures, iusques à faire les excremens sanglans aucun fois. Parquoy la Scammonée est sans failir fort nuisible au foye, au cueur, & autres parties interieures.

## LA CORRECTION.

La premiere nuifance se corrige, en mettant cuire la Scammonée dans vne pomme de Coing, ou dans vn Pasté de pommes de Coing iusques à ce que les pommes soient molles & assez cuites. Quand le Scammonium est ainsi préparé on l'appelle Diagredium.

La seconde se corrige, en la meslant avec quelque ius froid, comme ius de Rosés, Pysium, ou avec la poulpe de pruneaux.

La tierce, quand on adiouste au Diagredium du Mastix, ou du ius de pommes de Coing.

## De Dulcamara.

## LA FORME.

Ceste plante a lestiges ou sarmens gresles, tendres, & ligneux, par lesquelz elle monte le long des arbres, hayes & buissons. Les fueilles longues, verdes, non guere differentes aux fueilles de Lyarre, vn peu plus petites toutesfois, ayans aucun fois deux oreilles ou adioustemés comme la Saage franche. Les fleurs sont perles, amallées ensemble, chacune fleur partie en cinq fueillettes estroictes, ayant au milieu vne petite poincte isulne. Et les fleurs passées, il vient en leur lieu des bayes languettes, rouges, & viles, de faueur estrige, amallées ensemble comme les bayes de Lyarre. La racine est petite & fibreuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe vient en lieux humides, pres des fossés & estangs, entre les hayes & buissons.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en Iuillet, & sa graine est mourt en Aoust.

## LES NOMS.

Les sçavans modernes appellent ceste herbe en Grec *γλυκύμηλον*, ή *γλυκύμηλον*; en Latin *Dulcamara* & *Amara dulcis*; Aucuns Herboristes de France l'appellent *Solanū lignosum*, c'est à dire Solanum ligneux; en haut Aleman elle se nomme *Ze senger se sieber*, & *Synschhramt*; en bas Aleman *Alfo ranche*.

## LE TEMPERAMENT.

Elle a le temperament chaud & sec.

## LES VERTVS ET OPER.

A La decoction des fueilles faite en vin & beuz, ouure toutes oppilations du foye; d'auantage proufite contre iaultisse causée d'oppilations.

B La mesme decoction prise comme deuant, est vtile à ceux qui sont tombés de haut, contre contusions, dislocations, & contre rompures ou blessures des parties interieures, car elle dissout le sang caillé & figé, & le fait sortir par les vrines, & consolide & guerit les blessures & playes.

## De la Goute ou Agoure de Lin.

## Chap. LVIII.

## LA FORME.

Goute de Lin est vne herbe merueilleuse, sans fueilles, & sans racine, cōme vn filet bien toulé ou entrelassé l'un en l'autre, se liant autour des hayes, buissons, & aucunes herbes. Ces filets sont maintenant rouges, maintenant blancs, auquelz sont attachés petis chapiteaux ronds, produis sans au premier petites fleurs blanches, puis apres vne petite graine.



## LE LIEV.

Ceste herbe croist en ce pais voluntiers sur les ronces, houblon, & sur le lin, & se trouue aussi sur aucunes autres herbes, principalement és pais chauds, comme sur le Thym, Thymbre, Tithymale, Chamedrys, Eringium, mais elle est fort petite & menue, & en ce pais és lieux secs sur le petit Genest, & sur l'Aloyne comme j'ay veu en mon iardin.

## LE TEMPS.

Pour la plus part ceste herbe se trouue en Iuillet & Aoust, & puis elle porte sa fleur & semence.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec καρόδα: en Latin *Cassiba*: és Boutiques *Cuscuta*: d'aucuns *Podagra Lini*, & *Angia Lini*: en François *Goute*, ou *Agoure* de *Lin*: en haut Aleman *fflitzkraut*, *fflachsffiden*, & *Todtern*: en bas Aleman *Scroste*, & d'aucuns *wange* & *Widtruyt*. La *Goute* qui croist sur le Thym, est appellée des anciens medecins Grecs & Arabez *Epirhymus*: & celle qui croist sur le Thymbre *Epirhymus*. Ainsi pareillement on pourra appeller de diuers noms celle qui croist sur les autres herbes, selon la diuersité d'icelles.

*Epichamedrys*, celle qui croist sur la Germandrée.

*Epirhymus*, celle qui croist sur le Tithymale.

*Eperingium*, qui s'enveloppe autour d'Eringium.

*Epigeniston*, qui se lie au tour du Genest.

*Epibaron*, qui croist sur les Ronces.

*Epilinnus*, qui croist au tour du Lin.

*Epibryon*, celle qui se lie avec le Houblon.

*Epabstition*, celle qui croist sur l'Aloyne. Et ainsi des autres.

## LE TEMPERAMENT.

Le temperament de ceste herbe se change, selon la qualité des herbes sur lesquelles elle croist, tellemēt que celle qui croist sur herbes chaudes comme Thym, Thymbre, & le Tithymale, est aussi fort chaude: celle qui croist sur les autres herbes, n'est pas si treschaude: toutesfois si est este de soy mesmes quelque peu chaude & seche.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La *Cuscuta* boulie en eauē ou vin & beue, ouure les oppilations du foye, de la vesie, du fiel, de la ratelle & rongnons, & des veines: & purge par le ventre & par les vrines les humeurs bilieuses.

Elle prouffite à vieilles fieures, & contre la iaulnisse, signamment celle qui croist sur le Houblon, & sur le Lin.

L'autre a semblables facultés que les herbes sur lesquelles elle croist.

## Du Houblon.

## Chap. LIX.

## LES ESPECES.

IL y a deux sortes de Houblon, à sçauoir le Domestique, & le Sauvage. Le Domestique & cultivé porte comme des sonettes. Le Sauvage n'en porte point, on s'il en porte elles sont bien petites.

## LA FORME.

Le Houblon domestique a les tiges houlues, enuironnées de petites espines poinctues, il croist fort haut, & se lie au tour des paux & perches, au pres desquelles il est planté. Les feuilles sont houlues, presque semblables aux feuilles de la Couleuree blanche, yn peu plus petites toutefois, moins dechiquetées, & de couleur plus brune. Au plus haut des tiges croissent entre les feuilles de chapiteaux ronds & longs, blancs, qui ne sont autre chose que plusieurs feuillettes blanches en iaulnissant, ou pales, amassées ensemble. Sous icelles est cachée la graine qui est platte. Ces clochettes ou chapiteaux sont de tresforte odeur quād ilz sont meurs: & les Brasseurs de ceruoise les amassent & cueillent pour donner goust à leur ceruoise. La racine se traîne le long de la terre, & est entrelasée, jettant en plusieurs endroits de nouveaux bourgeons & iettons.

Le Houblon sauvage ressemble fort au Domestique de feuilles & tiges, sinō qu'il ne porte nulz chapiteaux, ou s'il en porte, ilz sont bien petits & de nul vsage. La racine d'iceluy se traîne aussi, & iette en plusieurs endroits de nouveaux tendrons & s'parages, lesquels on mange en salade au s̄ qu'ilz aient faicelles, & sont vne viande bonne & saine.

*Cassiba.*  
Goute de Lin.



## LE LIEV

Lupus salictarius.

Houblon.

1 On plante le Houblon domestique en ce pais aux jardins & champs à ce dediez, & se trouue au cunefois aussi au bord des champs & hayes.

2 Le Houblon sauvage croist es hayes & buissons au bord des champs & des jardins à la porée.

## LE TEMPS.

Les chapiteaux du Houblon viennent en Aoult & sont meurs en Septembre.

## LES NOMS.

Aucuns Modernes appellent le Houblon en Grec *Σέλιον*; en Latin *Lupulus salictarius*, ou *Lupus salictarius*; es Boutiques *Lupulus*; en haut Aleman *Hoppfen*; en bas Aleman *Hoppe* & *Hoppcreupt*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Houblon, & les fleurs principalement, est chaud & sec iusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPER.

A La decoction du Houblon beue, desoppile le foye, la ratelle, & les rongnons, & purge le sang de toutes humeurs corrompues, les faisant sortir avec l'urine: D'auantage elle prouffite à ceux qui sont trauaillés de gratelle, rongne, ou ont autres semblables defects, & qui sont d'un sang gros & corrompu.

B A ce mesme valent les tendrons qui sortent en Mars & Auril, mangés en salade.

C Le ius de Houblon lasche le ventre & chasse hors les humeurs bîlieuses & coleriques, & purge le sang de toutes immundités.

D Iceuluy distillé aux oreilles, les nettoyé de leur ordure & en oste toute puanteur.



## De la Feuchiere.

## Chap. L X.

## LES ESPECES.

L A Feuchiere est de deux sortes, comme dit Dioscoride, à sçauoir le Masle, & la Femelle, lesquelles ressemblent fort l'une à l'autre de feuilles.

## LA FORME.

1 La Feuchiere masle a les feuilles grandes, lógues, aucunefois de la longueur de deux pieds, esten dues à chasque costé comme des zelles, incisées iusques au nerf du milieu, & crenées tout à l'entour comme vne sieu dessous desquelles on void plusieurs petites taches lesquelles avec le teps deuiennent noires, puis tombent. La racine est grosse & noire par dehors, iettant beaucoup de feuilles, & de petites masses ou asperges qui sont commencement de feuilles.

Ceste espee de Feuchiere ne porte ne fleurs, ne graine, si ce n'esloit qu'on voulut prendre pour semence ces taches noires qui croissent au dos des feuilles, lesquelles aucuns amassent, & en pensent faire merueilles, toutesfois à la verité ce ne sont que fraiques & moqueries.

2 La Feuchiere femelle, n'a aussi nulles fleurs, ne semence, mais elle a de longues tiges, nues, verdes, sur lesquelles croissent mout de feuilles à chacun costé, incisées & crenées tout à l'entour, fort semblables aux feuilles de la Feuchiere masle, vn peu plus petites toute fois. La racine de ceste Feuchiere est longue & gresse, noire par dehors, se trainant le long de la terre.

## LE LIEV.

1 La Feuchiere masle croist bien pres par tout en lieux rudes & mal rabotés, & en terre humide & sablonneuse, le long des bords de champs bas.

2 La femelle se trouue aux bois & montaignes.

## LE TEMPS.

Les feuilles sortent en Auril, & perissent en Septembre.

Felix mas.

Feuchiere male.

Felix femina.

Feuchiere femelle.



## LES NOMS.

- 1 La premiere espece de Feuchiere se nomme en Grec *ῥίγισ*, à *ῥίγιον*; en Latin *Felix mas*, c'est à dire en François Feuchiere male; en haut Alemā *waldesfarin mensele*; en bas Alemā *Dare münchen*.
- 2 La seconde espece s'appelle en Grec *ῥίγις*, & d'aucuns *ῥίγις*; en Latin *Felix femina*; en François Feuchiere femelle; en haut Alemā *waldesfarin weiblich*, & d'aucuns *Gross farnkraut*; en bas Alemā *Daren wifhen*.

## LE TEMPERAMENT.

- o Toutes les deux Feuchieres sont de temperament semblable, chaud & sec jusques au second degré.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- 1 La racine de la Feuchiere male prise au poids de demy once avec hydromel, tue & pousse A hors les vers.
- 2 Celle cuite en vin, est fort utile contre duresses & oppilations de ratelle. B
- 3 La racine de la Feuchiere femelle, prise en mesme sorte que celle du male, fait sortir les vers C larges & les ronds.
- 4 Les feuilles de tous les deux Feuchieres mises sous la paille du lit, en chassent les punaises, & D toutes telles vermines.

## LES NVISANCES.

L'usage de la Feuchiere est d'agerieux aux femmes, principalement à celles qui sont enceintes.

## De la Feuchiere aquatique. Chap. LXI.

## LA FORME.

Cette espece de Feuchiere ressemble bien pres à la Feuchiere femelle, sinon que ses feuilles ne sont point crenées; Elle a la tige triangle, droite, menue, d'environ vne coudée & demy de haut, ayant à chaque costé de grandes feuilles estendues comme ailes, & incisées comme le Polyode. Au sommet d'aucunes tiges croissent à l'entour de petits grains rudes & ronds qui ressemblent à semence. La racine est grande & grosse, amassée de plusieurs petites racines entrelacées, ayant au milieu quelque peu de blanc lequel on appelle le cuer d'Ofunda.

## LE LIEV.

Ceste espece de Feuchiere croist és bois & en lieux humides & ombrageux.

## LE TEMPS.

Elle fort en Auni avec les autres Feuchieres, & perit sur la venue de l'uyver: la racine tou tesfois demeure en la terre.

## LES NOMS.

Ceste Feuchiere est appellée des Herboristes modernes en Latin *Osmunda*, *Filix aquatica*, d'aucuns *Filix aquastram*: des Alchimistes *Lunaria maior*: en François *Osmonde*, ou *Feuchiere aquatique*: en Aleman *water Darsen*, ou *wilsd Darsen* & d'aucuns *Sinte Christoffe so cruyt*.

## LE TEMPERAMENT.

*Osmunda* est chaude au premier degré, & se che au second.

## LES VERTVS ET OPER.

A Le milieu de la racine d'*Osmunda* est bon contre contusions, lourdes cheutes, rompures tât exterieures qu'interieures, ou quelque blef sure que ce soit & dislocation. Pour ceste cause plusieurs experimentateurs le meslent en leurs breunages qu'ilz font pour playes le faist bou lir avec les autres herbes: Aucuns aussi le meslét en leurs emplatres consolidatifz.

## Du Polypode. Chap. LXII.

## LA FORME.

LE Polypode a les fueilles d'enuirõ vne paulme de lóg, tendues, & incisées iusques à la coste du milieu, nõ pas toutesfois crenées à l'entour. La racine est bien pres de la grosseur d'vn doigt, & sort lóg, se trainant par terre, produisant be aucoup de fueilles, brune par dehors, & ayant plusieurs fibres & par dedés herbacée. Il ne porte aussi ne tiges, ne fleurs, ne semence. LE LIEV.

Le Polypode vient aux bors des chãps qui sont hauts, aux racines & pied des arbres, & principalement des cheffes. Aucunesois aussi sur vieux saules, & sur toits & vieilles murailles.

## LE TEMPS.

Le Polypode garde ses fueilles æté & yuer, mais il en produit de nouvelles en Auni.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *καλυπάριον*: en Latin *Filicula*, & *Polypodium*: en François *Polypode*: en haut Aleman *Engelstuss*, *Baumfarn*, & *Wopff-touretzen*: en bas Aleman *Boombaren*, & d'aucuns *EyehensBaren*. LE TEMPERAMENT.

La racine de Polypode est seche iusques au second degré. LES VERTVS ET OPER.

A La racine du Polypode lasche le ventre, & purge les humeurs melicholiques, grosses, & phlegmatiques: d'auantage elle vaut mout cõtre la colique, c'est douleur de ventre, contre dureffes & oppilations de ratelle, & contre fieures quartes, principalement en y adioustant de l'*Epithimum*.



Polypodium. Polypode.



Il la faut bouillir au brouet de chair de mouton, ou de quelque chapon, ou en eauſe avec des Maulues, ou de la Totte, & quelque peu d'Anis, puis la boire: ou la prendre ſechée & miſe en pou dre avec hydromel, c'eſt eauſe miſcée.

La poudre d'icelle miſe ſouvent au nez, oſte & guerit la chair ſuperſue qui croiſt aux naſeaux C que lon appelle Polype.

LE CHOYS.

La racine du Polypode qui croiſt au pied des Cheſnes, eſt la meilleure & plus cōuenable pour vſer en medecine: & ſe nomme Polypodium quercinum.

Du Dryopteris. Chap. LXIII.

LES ESPECES.

ON trouue maintenant deux fortes de Dryopteris. L'vne blanche, & l'autre noire, leſquelles ne ſont guere differentes l'vne à l'autre.

*Dryopteris candida.* Dryopteris blanche.

*Dryopteris nigra.* Dryopteris noire.



LA FORME.

Le blanc Dryopteris ne reſemble pas mal à la Feuchiere maſle, beaucoup toutesſois plus petite, non excédant vne paulme de haut, ne portant auſſi ne tige, ne fleurs, ne ſemence. Les ſucilles ſont blanches, tendres, fort decouppées, & crenées tout à l'entour, plus dru & menu, que les ſucilles de Feuchiere maſle, & ont auſſi au deſſous des petites taches. La racine eſt eſpeſſe, noiratre ayant pluſieurs racinettes ioinctes, preſſées enſemble, & entrelaſſées l'vne en l'autre.

Ce blanc Dryopteris perd ſes ſucilles en vyer comme la Feuchiere.

Le Dryopteris noir à les queues des ſucilles noires, les ſucilles brunettes, leſquelles ne ſont pas ſi grandes, ne ſi longues, ne ſi fort & menu incilées, que les ſucilles du Dryopteris blanc, au reſte ſemblables, & ſemées auſſi au deſſous de petites taches. Les ſucilles de ceſuy cy ne periſſent pas en vyer, mais demeurent en leur verdure.

LE LIEV.

Toutes les deux eſpeces de Dryopteris croiſſent éſvoyes couuertes, & ombreufes, au pied des Cheſnes, toutesſois elles ne ſe trouuent pas par tout.

LE TEMPS.

Le Dryopteris blanc prouiſt en Auriſ avec la Feuchiere.

Le noir produit ſes ſucilles au meſme temps.

## LES NOMS.

Ceste espece de Feuchiere se nomme en Grec *δρυοπίτις*, *Dryopteris*; en Latin *Filix querna*, c'est à dire en François Feuchiere de chesne; en Aleman *Eychen Baeren*.

Le blanc se nomme és Boutiques *Adiantum*, & pour iceluy est il vsuré au grand detrimēt des malades.

Le noir n'est guere cognu és Boutiques, toutesfois là ou il est cognu ilz l'appellent aussi *Adiantum*.

## LE TEMPERAMENT.

Le *Dryopteris* blanc est chaud, acré, & fort absterfif. Le noir est de pareille qualité que *Salvia vita*, ou Rue de marsilles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La Feuchiere de chesne blanche qui est le vray *Dryopteris*, a telle & si forte vertu, qu'elle fait tomber le poil, & depile la peau. Mais pour ce faire, il la faut (ce pendant qu'on est aux estrées) broyer avec sa racine bien menu, & l'appliquer sur le lieu, iusques à ce qu'elle face bien suer, puis il la faut oster, & en remettre de la nouvelle iusques à deux ou trois fois, comme disent *Dioscoride* & *Galen*.

B Du noir on en peut vser au lieu d'*Adiantum*, c'est à dire du Cheueu de Venus.

## De la Langue de cerf.

## LA FORME.

LA Langue de cerf a les fuicilles longues, estroictes, d'environ vne paulme de long, vnies & polies d'un costé & à l'autre costé qui regarde vers la terre, semées de longues traches velues, qui ressemblent à petis vers. La racine est noire, cheuelue, serrée en vn. Elle ne porte aussi ne tiges, ne fleurs, ne semence.

## LE LIEV.

La Langue de cerf ayme lieux ombrageux, & valées humides & pierreuses, pres d'aucunes fontaines, puy, & vieilles murailles humides.

## LE TEMPS.

Elle commence à produire nouvelles fuicilles en Aueil.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *φυλλίτις*, & en Latin *Phyllitis*; és Boutiques *Scelopendria* & *Lingua ceruina*; en François Langue de cerf; en haut Aleman *Siefsung*; en bas Aleman *Sierstonghe*, & à la difference de *Bistorta* laquelle ilz appellent aussi *Sierstonghe*, *Steenstonghe*. Ce n'est pas *Hemionitis*, comme aucuns pensent.

## LE TEMPERAMENT.

La Langue de cerf est de nature fort sèche & adstringente.

## LES VERTVS ET OPER.

A La decoction des fuicilles de la Langue de cerf beuë, est vtile contre morsures de serpens, arreste le flux de ventre, & guerit la dysenterie.

## De Hemionitis.

## Chap. LXV.

## LA FORME.

**H**emionitis est aussi vne herbe non fructifere, comme les Feuchieres susdites, & la Langue de cerf, sans tige, sans fleurs & semence, portant fuicilles asses grandes, larges par bas & au commencement agues par le bout, non guere differentes, tesmoing *Dioscoride*, aux fuicilles du second *Draunculus*, lesquelles sont vnies d'un costé, & de l'autre ont aussi de lignes velues comme la Langue de cerf. Elle a pour racine beaucoup de fibres.

## Chap. LXIII.

## Phyllitis.

## Langue de cerf.





## LE LIEV.

Cette herbe vient en lieux ombreux, humides, pierreux, & frais, & se trouve à present aux ruines de Rome, & en aucuns endroits d'Italie, principalement plantée és jardins des Herboristes. En ce pais elle est encores estrangere.

## LES NOMS.

Elle s'appelle en Grec *ἡμιονίτις*, *κρῖς ἀσπληνίου*: en Latin *Hemionitis*, *Splenium*, & de *Gaza Mala herba*: incognue és Boutiques.

## LE TEMPERAMENT.

Hemionitis est assez chaude & seche de complexion. LES VERTVS ET OPER.

- A Hemionitis prinse avec vinaigre, ouure & guerit la ratelle en durcie & stoppée. Est si pour la plus part vne souveraine medecine pour les maladies & accidens de la ratelle.

Du *Lonchitis aspera*. Cha. LXVI.

## LA FORME.

*Lonchitis aspera* ressemble aux autres Feuchieres, elle ne porte ne tiges, ne fleurs, ne semence. Les fueilles sont longues, d'environ vne paulme de long ou d'un pied, non guere differetes aux fueilles de *Polypode*, plus estroites toutesfois, parties & couppees en plus de crenes. La racine est brunatre & espelle, ressemblant à la racine de *Dryopteris*.

## LE LIEV.

Elle croist aux bords des fossés, és bois & heux bas & humides de terroir sec.

## LE TEMPS.

Elle dure tout l'hyuer, & produit nouvelles fueilles en Aupil.

## LES NOMS.

Cette espece de Feuchiere se nome en Grec *λογχίτις τρυπητή*: en Latin *Lonchitis aspera*, d'aucuns *Longina*, & *Calabrina*, & des Modernes aussi *Splenium magnum*, & *Splenium sylvestre*: en haut Aleman *Spicant*, & *Grosz milzhrant*: en bas Aleman *Grachsbaren*.

## LE TEMPERAMENT.

*Lonchitis* est chaude au premier degre, & seche jusques au second.

## LES VERTVS ET OPER.

- A *Lonchitis* prouffite grandement contre du resse, oppilations, & enfleures de la ratelle, quod on la boit avec du vinaigre, ou appliquée par dehors avec du vinaigre sur l'endroit de la ratelle.


- B Cette herbe est aussi fort bonne pour appliquer sur playes, car elle les preserue d'inflammation & apostemes.

Du *Ceterach*, ou *Scolopendrie* vraye.

## LA FORME.

Le *Ceterach* a les fueilles petites, bien pres de la longueur d'un doigt, incisées aux deux costés jusques à la coste du milieu, & griffantes & verdes d'un costé, & de l'autre de dessous, velues,

Hemionitis.



Lonchitis aspera.



Chap. LXVII.

## 278 Du Ceterach, ou Scolopédrie vraye. Ch. LXII.

housues & rougeâtres, ou de couleur brunâtre. La racine est petite, noire, velue, fort entrelassée. Ceste herbe n'a pas aussi de tige, de fleurs, ne de semence.

LE LIEU.

Ceste herbe croist en lieux ombreux, pierreux, & on en trouue souuent és puyz aups de Namur & lieux circonvoisins.

LE TEMPS.

Ceste herbe demeure verde tout l'hyuer. Et produit nouvelles fucilles en Avril.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ἀσπληνον*, & d'au cús *σκαλοπιδριον*, *κμαίσιον*, ή *πυρίσι*: en Latin *A sple num* ou *A splemum*: és Boutsques *Ceterach*: en François *Scolopendrie vraye*: en haut Aleman *Streitfaru*, & *Streitstrant*: en bas Aleman *Streitbæren*.

LE TEMPERAMENT.

Le *Ceterach* est téperé en chaleur & froideur, & est de parties subtiles, & vn peu desiccantif.

LES VERTVS ET OPER.

- A Les fucilles de *Ceterach* prinſes avec vinaigre par l'espace de quarante iours, guerissent la ratelle endurcie & oppilée, & prouffissent cõtre sieurs quartes. Pareille vertu ont elles broyées en vin, & appliquées sur le costé gauche.
- B Icele est aussi fort vtile contre strigurie, chaudepisse, & contre la pierre en la vesie: elle appaise le hoquet, & ouure les oppilations du foye, & on la donne vtilement à ceux qui ont la jaunisse.

Des Cheueux de Venus.

LES ESPECES.

Les Herboristes de maintenant reduisent sous ce nom de *Capillus Veneris*, deux herbes, nõ guere semblables l'vne à l'autre: dont l'vne estrangere est le vray *Capillus Veneris*, appellé des Anciens *Adiantum*. L'autre est fort commune, & on l'vsurpe icy pour *Capillus Veneris*, laquelle sucús appellét *Rata mararia* en Latin, & sucús *Salsia vita*.

*Adiantum*. Cheueux de Venus.



*A sple num*.

*Ceterach*.



Chap. LXVIII.

*Rata mararia*. Rue de mur.



## LA FORME.

1 Le vray Capillus Veneris a les queués des fueilles fort menues, noirâtres, reluisantes: Les fueil les petites, tendres, crenées tout à l'entour, & bien pres semblables aux premieres fueilles de Co riandre, plus petites toutesfois. La racine est tendre.

2 La seconde espece appellée Rue de mur, a pareillement les fueilles assises sur courtes queués & menues, lesquelles ressemblent aucunement aux fueilles de la Rue domestique, plus petites toutes fois & vn peu crenées à l'entour, vnies & glissantes d'vn costé, & de l'autre costé chargées de pe tis poinçts ou taches. La racine est tendre & cheuelue. Elles sont aussi toutes deux sans fleurs, & se mence, comme les Feuchieras.

## LE LIEU.

1 Adiantum croist és murs, & lieux pierreux & ombrageux, aupres des eaués & fontaines, & sen trouue en grand quantité en Italie & Prouence. Il ne croist pas en ce pais, mais on l'apporte sec d'Italie.

2 La Rue de mur est fort vulgaire en ce pais, car on la trouue bien pres sur toutes vieilles murail les qui sont humides, & nō illustrées du soleil, comme sont les murailles des temples.

## LE TEMPS.

Elles durent toutes deux tout l'an, & ont en Auril nouuelles fueilles.

## LES NOMS.

1 La premiere espece se nomme en Grec ἀδίατον, πολύτριχον, καλλίτριχον, ἰβανότριχον: en Latin Adiantum, Polytichum, Callitrichum, Cincinastis, Terre capillus, Superillum terre. A pulcie l'ap pelle aussi Capillus Veneris, Capillariss, & Crinita: és Boutiques de France & d'Italie Capillus Veneris: Elle est pour la plus part incognue és Boutiques de ce pais: en François Cheueux de Venus: en haut Aleman *frantzenhar*: en bas Aleman *frantzenhar*.

2 La seconde espece se nomme és Boutiques de ce pais Capillus Veneris, & est d'aucū tenue pour Adiantum: és Boutiques de France *salais vira*: des sçauls modernes *Rue muraria*, c'est à dire Rue de mur: en haut Aleman *Marranten* & *Stichtanten*: en bas Aleman *Stichtante*.

## LE TEMPERAMENT.

Ces deux herbes sont sèches, & temperées en chaleur & froideur.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La decoction du Capillus Veneris faicte en vin & beuë, donne allegeance à ce ux qui ont cour te aleine, & aux asthmatiques, à ce ux qui sont trouués d'vne toux difficile, car elle faict meuir & cracher les phlegmes.

Elle prouoque l'vrine, rompt la pierre, esmeut les fleurs aux femmes, tire hors la secondine, B desoppile le foye & la ratelle, & est fort bonne contre maladies de la ratelle, & la iauinisse.

Le Capillus prins en vin, reserue le ventre, & arreste le flux de sang: & proufite contre fluxions C d'estomach, & contre morsures & piqures de bestes venimeuses.

Le Capillus Veneris encores verd, pilé & appliqué sur morsures de bestes venimeuses, de chiefs D enragés, y proufite grandement. Et induit sur la teste, il faict reuenir le poil és lieux de la teste pelés.

Il digere aussi les tumeurs du gozier qu'on appelle strumes, principalement aux icunes enfans, E quand il est pilé verd & appliqué dessus.

La lexieue ou iceluy a trempé ou bouly, est fort bonne pour en lauer la tigne de la teste, car elle F la guerit, & oste le fon de la teste.

Vn chappeau de Capillus Veneris mis sur la teste, guerit la douleur d'icelle, comme dit Plin.

Les fueilles d'Adiantum, meslées avec quelque peu de silpêtre dedas l'vrine d'vn petit enfant, G puis en lauer le ventre des femmes apres auoir enfanté, cela oste les rides & fronces.

On vse és Boutiques de ce pais de la Rue de murailles au lieu de Capillus Veneris, en toutes H I medecines: & on a trouué quelle proufite moult és froides maladies de la poiçtrine.

## Du Trichomanes.

## Chap. L X I X.

## LA FORME.

TRichomanes est vne petite herbe, d'environ vne paulme de haut, sans fleurs & semence, & a les queués des fueilles fort delées, brunes, luisantes, & vnies, & vnies, chargées à deux costés de fort petites fueilles & rondes, chacune fueille de la grandeur d'vne lentille, semées au costé qui regar de la terre de mout de petis poinçts comme la Rue de muraille. La racine est petite & noirâtre.

## LE LIEV.

Il ayme lieux humides, ombreux, & croist pres des eaux, signamment sur rochers humides, sur vieilles murailles, & s'en trouve beaucoup en ce pais.

## LE TEMPS.

Il demeure tousiours verd, comme le Capillus Veneris, & la Rue de murailles.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *τριχομανές* : en Latin *Fidicula capillaris*, & aussi *Trichomanes* : es Boutiques *Polytrichon* : en haut Aleman *widerebot*, *Widerson* & d'aucuns *Roter streinbærch* : en bas Aleman *weder doot*.

## LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est seche & temperée en chaleur & froideur, de semblable nature q̄ le Capillus Veneris.

## LES VERTVS ET OPER.

Le *Trichomanes* selon Dioscoride & Galien, a les mesmes facultés que le Capillus Veneris, sil est prins en mesme sorte.

## De l'Hepatique. Chap. LXX.

## LA FORME.

L'Hepatique festend par terre, ayant les fucilles couchées l'une sur l'autre en forme d'escalles de poisson, & sont verdes au costé de dessus, & brunatres du costé qui regarde la terre. Entre les fucilles croissent de petites queues qui ont au sommet quelque petite chose en forme de petite estoille. Les racines sont petis filets menus, croissans sous les fucilles, par lesquels elle se fiche en la terre & aux rochers.

## LE LIEV.

Ceste herbe (si on la doit ainsi appeller) croist en terre humide, & lieux pierreux, & ombrageux, là ou le Soleil ne parvient guere.

## LE TEMPS.

En Juin & Juillet produit elle ses estoillettes.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *λεχη* : en Latin *Lichen* : es Boutiques *Hepaticæ* : en François *Hepatique* : en haut Aleman *Brunnenleberkraut*, ou *Stetseleberkraut* : en bas Aleman *Steenleuerkraut*, & *Leuerkraut*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Hepatique est de temperament froid & sec.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoction de Hepatique, appaise les inflammations du foye & ouvre les oppilations d'iceluy, & est tresutile contre fieures tierces, & toute inflammation de sang.
- B Ceste herbe, comme Dioscoride & Pline escriuent, broyée toute verde & appliquée sur les playes, arreste le flux de sang d'icelles, & les engarde d'inflammation & d'aposteme. (sus.)
- C Icelle guerit aussi toutes dartres, impetigines, & feu volage, & efface les cicatrices appliquée def
- D Icelle boullie en vin, & tenue en la bouche, arreste les catarrhes tombans du cerueau au gosier,

## De la Mouffe.

## Chap. LXXI.


## LES ESPECES.

Il y a plusieurs sortes de Mouffe, dont les vnes croissent sur les arbres, les aucunes es champs & bois ombreux & humides, & les aucunes sur les roches de la mer.

## LA FORME.

La premiere espece de Mouffe laquelle croist sur les arbres, & laquelle proprement on appelle Mouffe, n'est autre chose q̄ plusieurs fucillettes blanches dechiquetées & fort profond incisées, tiffues & entrelassées l'une en l'autre, sans racine, sans fleur ou semée, pendât & croissât sur les arbres.

*Trichomanes. Polytrichon des Boutiques.*




*Lichen.*

*Hepatique.*



*Pulmonaria.* Herbe aux poulmons.

Mufem. Mouffe.



- 2 La seconde espece croist aufsi autour des arbres, laquelle on appelle Herbe aux poulmons, elle ressemble aucunement à l'Hepatique, finon quelle est plus grande & plus large, ayant de grandes efcailles couchées l'une sur l'autre, bien verdes d'un costé & blanchatres sur l'autre.  
Grand & petit Polytrichon doré.



Ros Solis.  
Roufée de Soleil.



- A3 La tierce espece qu'on appelle Polytrichon doré a les tiges fort gresles, non pas longues d'une paulme, reueftues d'un poil court brunverd en isulniffant, lesquelles aucunesfois jettent & produisent de petites queués nues, ayans au sommet de petis grains.  
B De ceste sorte fen trouue il encores vne petite semblable à la susdite, finon qu'elle est beaucoup plus petite.  
4 La quarte espece appellée Rosée de soleil a les feuilles rougeatres, rondelettes, creufes, velues à longues queués, bien pres en façon de petis cuilliers, entre lesquelles prouient vne courte tige, courbée par en haut, & portant petites fleurs blanches. Ceste herbe est d'une nature fort estrangé & merueilleuse; car combien que le Soleil luise fort & long temps dessus, si est ce que vous la trourez toujours humide, & arrosée, & le poil d'icelle toujours chargé de petites gouttes d'eau. Et plus luit le Soleil chaudement sur ceste herbe, tant plus est elle mouillée & arrosée. Pourtant aufsi l'a on appellée Rosée de Soleil.

*Lycopodium.*

Patte, ou Griffes de loup.

*Muscus marinus.*

Mouffe de mer.



5 La cinquième espèce de Mouffe appellée Patte de loup, traîne & estend ses sarments bien & espes reueftus d'un poil verd en iaulnissant, se fichans & attachans en aucuns endroits avec des petites racinés. Ces sarments icy en iettent encore des autres fendus en trois ou quatre ayans aux extrémités de petites poinctes blanches en forme de griffes ou d'ongles, bien pres semblables aux griffes d'un loup, & produisent aucunes tiges droictes, menues, blanchatres, lesquelles ne font point si reueftues comme les sarments, se coulans par terre, & portans de petits espis blancs, pleins de petites fueillettes qui ressemblent à petites fleurs blanches.

6 La sixième espèce de Mouffe appellée Mouffe de mer, a plusieurs petites tiges menues, dures & pierreuse, diuisées en beaucoup de ioinctures, plusieurs fortans ensemble d'un meisme chapitre pierreux, par lequel elle est attachée aux rochers.

7 La septième espèce est la Mouffe de laquelle parle Theophraste. C'est vne plante sans tiges, portant fueil les verdes, frongées, & larges, nō guere differentes aux fueilles d'aucunes Lactues, plus ridées toutesfois, lesquelles sortent plusieurs ensemble, & croissent sur les rochers.

LE LIEV.

1 La première espèce de Mouffe croist sur les arbres, principalement là ou il y a mauuaix fond.

2 L'Herbe aux poulmons croist sur arbres mouffeux & en lieux humides sablonneux & ombreux.

3 Le Polytrichon doré, la Roïée du soleil, & les Griffes de loup croissent és landes seches, & aquatiques, & pareillement és champs qui sont en friche, & en aucuns bois ombreux. Le Polytrichon doré est fort commun.

6 La Mouffe de mer croist sur rocs & roches dedans la mer.

LES NOMS.

1 La première espèce de ces plâtes s'appelle en Grec *Σείον*, & d'aucuns *απλόχινον*; en Latin *Muscus*, de Serapio & és Boutiques *Vstrea*; en François *Mouffe*; en haut Aleman *Moss*; en bas Aleman *Mossch*; La meilleure & plus conuenable en medecine est celle qui croist sur le Cedre, puis celle qui croist sur le Peuplier.

2 La seconde espèce s'appelle à present *Pulmonaria* en Latin; Herbe aux poulmons en François; en haut Aleman *Fungentkraut*; en bas Aleman *Longshenkrout*.

3 La tierce s'appelle en haut Aleman *Gulden widdertodt*; en bas Aleman *Gulden toedertodt*, cest

*Muscus marinus Theophrasti.*

c'est à dire Polytrichon doré, & d'aucuns Jung frato Jar. Au cuns la tiennent pour Polytrichon d'Apuleie, combien que toutesfois ilz ayent bien petite semblance l'un avec l'autre. Car le Polytrichon d'Apuleie, est le vray Trichomanes de Dioscoride.

- 4 La quatriesme espece s'appelle en ce pais, *Ros séis*, c'est à dire Rosée de Soleil: en Aleman *Bon dauu*, & d'aucuns *Sindam*, & *Sopich cruyt*.
- 5 La cinquiemesme espece s'appelle en haut Aleman *Ber sap*, *Gurtesherat*, *Beishrat*, *Sarscher*, *Teuffel clamm*: en Brabant *wolfe clamm*, & d'aucuns *winscrup*: en aucunes Boutiques *Spica celtica*, & pour icelle vsurpée des indoctes, au grand detrimēt des malades. Quel nom elle a en Grec ou en Latin, il nous est incognu, pourtant hay'ie appellée selon le nom vulgaire *λυκοπόδιον* *Lycopodium*, c'est à dire *Pes lupi* en Latin, & *Pied de loup* en François.
- 6 La sixiesme espece est appellée en Grec *ῥόον θαλάσσιον*: en Latin *Muscus marinus*, c'est à dire *Mouffe marine*: en Aleman *Zee mosch*: és Boutiques elle s'appelle *Coralina*, c'est à dire herbe de Coral, & de quelques vns indoctes *Soldanella*, avec laquelle elle n'a nulle semblance.
- 7 La septiesme est aussi appellée de Theophraste *ῥόον θαλάσσιον*: & en Latin *Muscus marinus*, c'est à dire en François *Mouffe marine* à larges fueilles: en Brabant *Zee mosch*. Il semble que ce soit la premiere espece de *φύς*, c'est à dire *Fucus* ou *Alga* duquel Dioscoride parle au 2. liure.

## LE TEMPERAMENT.

- 1 La Mouffe est seche & astringente, sans chaleur ou froideur manifeste.
- 2 L'Herbe aux poulmons ressemble à la precedente, sinon qu'elle refroidit d'atantage.
- 4 Le Polytrichon doré, la Rosée de Soleil, & le Pied de loup, sont fecs, & temperés en chaleur & froideur.
- 6 La Mouffe marine est froide, seche, & astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 La decoction de la Mouffe faicte en eau, est bonne pour luer les femmes qui ont par trop A abondamment leurs fleurs, & mise au nez, elle arreste le flux de sang: bref on la mesle fort vilement parmy onguens, & huiles astringentes.
- 2 Les Medecins modernes louent fort l'Herbe aux poulmons contre maladies des poulmons, B principalement contre inflammations & vlcères d'iceux, si on la reduit en poudre & boyt avec de l'eau.  
On dit aussi qu'icelle cuiète en vin & beuë, arreste le cracher sang, pissier sang, & les fleurs des C femmes, & quelle guerist flux de ventre.  
Icelle reduite en poudre & espandue aux playes, les guerit & arreste le saigner d'icelles. D
- 4 La Rosée du soleil est aussi estimée fort bonne & vile pour fortifier le corps qui se seche & de E uient ethique, & guerir les poulmons blessés. Pour ceste cause on donne l'eau d'icelle distillée (laquelle est iaulne) à gens phthiſiques, travaillés de toux, asthmatiques, & qui ont quelque accident aux poulmons.
- 3 Le Polytrichon doré & le Pied de loup, semblent auoir pareille faculté, mais on n'en vsé F point.
- 6 La Mouffe marine est de faculté fort astringente & preseruatue, pourtant on la met vilement G sur commencemens de phlegmons, & toutes gouttes qui desrent ralfreschissement.  
Icelle est aussi fort bonne contre les vers, reduite en poudre, & donnée à prendre, car elle les H tue & fait fortir d'hors vaillamment.

## Du Ranunculus, ou Grenoilette. Chap. LXXII.

## LES ESPECES.

IL y a selon Dioscoride & Galien quatre especes de Ranunculus. Dont la premiere espece est de quatre fortes: l'une ayant grâdes fueilles & charnues, laquelle on appelle Grenoilette aquatique: La seconde a les fueilles blanches, & est appellée Grenoilette blanche: La tierce a les fueilles noirâtes: La quarte a les fleurs perſes, au reste semblable à la tierce: Ces quatre sont comprises sous la Premiere espece par Apuleie. La seconde espece a les tiges & fueilles velués. La tierce est petite à fleurs iaulnes. La quarte a les fleurs blanches.

## LA FORME.

- A La Grenoilette aquatique a les tiges blanchâtres en verdoiant, creuses, vnies, sur lesquelles croissent fueilles profond incisées, bien pres semblables aux fueilles de l'Ache, plus blanches toutesfois, plus douces, & plus espesses, fort chaudes & bruslantes à la bouche. Les fleurs sont pales, formées comme les fleurs du Bassinet: Lesquelles peries, viennent en leur lieu de ronds

*Ranunculus palustris.*

A Grenoilette aquatique.

*Ranunculus albus, sine echinatus.*

B Grenoilette blanche, ou herissonnée.

*Ranunculus auricomus.*

C.D Grenoilette dorée

chapiteaux, qui ressemblent bien pres aux asparages des Asperges. Elle a pour racine beaucoup de grosses filandres.

B La Grenoilette blanche a pareillement les tiges blanchâtres, vnies, sur lesquelles croissent feuilles blanchâtres, fort & profond incisées, principalement celles d'en haut, pres semblables aux feuilles de Coriandre. Elle a les fleurs semblables à la susdicte, & quand elles sont tombées, en lieu de chacune fleur il y vient quatre ou cinq graines rondâtres, plates, herissonnées. La racine est fibreuse comme celle de la deuantdicte.

C La Grenoilette dorée a premierement les feuilles rondâtres, puis apres fort incisées & fendues, brunes en verdoiant, & semées au milieu de taches larges, noirâtres, ou noires, tirans sur couleur de feu. Les fleurs sont de belle couleur iauue comme or, & reluisantes: puis suruiennent de ronds chapiteaux, plus rudes que ceux de la Grenoilette aquatique.

D De ceste espece il sen trouue encores vne, comme Dioscoride & Apuleie tesmoignent, portât fleur purpurée, au reste semblable à la Grenoilette dorée. Elle est encores incognue.

Elle





2 Elle a les tiges velues, les feuilles dechiquetées & fort menu decouppées, aucunement houssues, & se couchent communement par terre: au sommet des tiges croissent fleurs purpurées en brun, bien pres en forme de petites cymbales, ayans au dedans de menus filets iaulnes comme la Rose. Et quid les fleurs sont tombées, il y vient vn chapiteau rond, reuestu d'vn poil gris & brunatre.

3 La tierce espeece de Grenoilette est fort petite, d'odeur forte & mal plaisante, & porte fleurs belles, iaulnes comme fin or, & reluisantes, laquelle est encores incognee.

4 La quarté espeece porte trois feuilles incisées & decouppées comme les fleurs des autres Grenoilettes, au dessus desquelles croist la fleur de couleur du tout blâche, ou palle. La racine est gresse, ayant à costé de petites fibres, par lesquelles elle se fiche en terre. - LE LIEV.


A La Grenoilette aquatique croist és fosses & estings, aucunesfois aussi és prés & lieux bas & sablonneux, signamment és années humides.

B La Grenoilette blanche, & la Dorée croissent és prés & és champs humides. Ces trois espees sont communes en ce pais.

2 La seconde espeece de Grenoilette ayme terre siblonneuse & sèche, & qui demeure en friche, on la trouue en plusieurs endroits de France & d'Allemagne: en ce pais les Herboristes la plantent en leurs iardins.



RANUNCULI QVARTVM GENVS.  
Grenoilette de bois.



## 286 Du Ranunculus, ou Grenoilette. Ch. LXXII.

La Grenoilette de bois croist aux bois & le long des fosses, & en lieux ombreux & aquatiques: elle se trouue en plusieurs endroits de ce pais. **LE TEMPS.**

La premiere espece de Grenoilette qui est de trois sortes fleurit en Avril iusques en Juin, ou encorés plus tard. *Apium risus* fleurit en Mars, & aucun fois aussi en Avril.

La Grenoilette de boys fleurit en Avril, & incontinent apres peit.

### LES NOMS.

La Grenoilette se nomme en Grec *Βαρραχίον*: en Latin *Ranunculus*, d'Apuleie *Herba feletrata* en haut Aleman *Hanensfuss*: en bas Aleman *Hanensboet*, c'est à dire Pied de coq: on l'appelle aussi *Basinet*.

A La premiere de la premiere espece est appellée *draucus* en Grec *δράκων ὄστρον*, & *δράκων ὄστρον* en Latin *Apium pulstre*, & *Ranunculus palustris*: en François Grenoilette aquatique, ou *Basinet d'eauë*.

B La seconde s'appelle maintenant en Latin *Ranunculus echinatus*: en François Grenoilette herif sonnée: en haut Aleman *wicfs Hanensfuss*, *Zcherhanensfuss*: en Brabant *witte Hanensboet*, c'est à dire *Basinet blanc*.

C La tierce est appellée *Ranunculus auricomus*: en François Grenoilette dorée: en haut Aleman *wisen Hanensfuss*, *schwarz Hanensfuss*, & *geelb Hanensfuss*: en bas Aleman *Supaceto clamen*, & là selon aussi en Latin *Pes leopardi*, d'aucuns *Pes cornicis*, ou *Pes corni*, c'est à dire *Pied de corbeau*.

La seconde espece se nomme *Herba sardon*, *Apium sylvestre*, *Apium rusticum*, *Apiastrum*, & *Apium risus*, duquel nom il est aussi connu en aucunes Boutiques, d'aucuns *Pulsarille*: en François *Pisse fleur*: en haut Aleman *Kuchenschelle*: en bas Aleman *Lueckenschelle*.

La tierce espece, Constantin l'Empereur l'appelle aussi *Chrysanthemum*.

La quatrieme s'appelle *Ranunculus paruis*: en François Grenoilette petite ou de boisen haut Aleman *wicfs Apulle blamen*, *halsiner Hanensfuss*, *waldthense*: en bas Aleman *cleps Hanensboet*, ou *Apulische Hanensboet*. **LE TEMPERAMENT.**

Toutes les Grenoilettes sont chaudes iusques au quatrieme degre: & principalement l'*Apium risus*, lequel est le plus chaud.

### LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Les feuilles ou racines de *Ranunculus* pilées & appliquées sur quelque endroit du corps, font vlcération de la peau & de la chair, & esleuët pustules, cloches, croultes & vloeres: D'auitage on les applique vtilement sur ongles mauuais & verrues.

B On peut vser aussi des feuilles de *Ranunculus* contre mauuais gratelle, & la tigne, & gale, & pour effacer cicatrices, si on l'applique bien broyée: mais il ne les y faut pas long temps laisser, ains oster incontinent.

C Pareillement la racine du *Ranunculus* sechée & puluerisée, & mise au nez, fait esterneuer.

### LES NUISANCES

Toutes les Grenoilettes sont nuisibles, domageables & tuent, principalement *Apium risus*, lequel prins par dedans, oste le sens & entendement, & re tire tellement les nerfs de la face, qu'il semble q' ceux qui en ont mangé rient, & meurent tous rians.

### De la Grenoilette d'Apuleie.

#### Chap. LXXIII. LA FORME.

Ceste herbe est aussi vne espece de Grenoilette, elle croist enuiron à la hauteur d'vne paulme ou deux. Les feuilles sont fort decouppées, semblables aux feuilles du *Basinet*. Les fleurs sont belles, isulnes. La graine croist par ronds chapiteaux comme au *Basinet*. La racine est blanche, ronde comme vn petit naueau, aucun fois de la grosseur d'vne noix, ayant des fibres par dessous.



LE LIEV.

Cette herbe croist es prés sablonneux & secs, & semblables lieux herbus.

LE TEMPS.

Elle fleurit en Avril & en May.

LES NOMS.

Apuleie appelle ceste herbe *Βαρβαχισ*, & la separe des especes de *Ranunculus*. On la nomme en bas Aleman *Sint Intfuertis rarpfen*, c'est à dire Naueau de saint Anthoine.

LE TEMPERAMENT, VERTU, ET NUISANCE.

Ceste herbe est de semblable faculté & temperament que le *Ranunculus*, & il nuit fort aussi de le prendre par dedans, comme le *Ranunculus*.

Du Baisinet.

Chap. LXXIII.

LES ESPECES.

LE Baisinet est de deux fortes, Simple & Double, ou Domestique & sauvage. Le Simple est le sauvage, & le Double est le domestique.

*Polyanthemum simplex.*  
Baisinet simple.

*Polyanthemum multiplex.*  
Baisinet double.



LA FORME.

1 Le Baisinet a les tiges grêles, nues, & les feuilles noirâtres, decouppées, non guere différentes, aux feuilles de *Ranunculus*, plus larges toutesfois, & non si fort incisées. Les fleurs sont jaunes comme fin or, du tout semblables aux fleurs de la Grenoilette dorée. La racine est fibreuse.

2 Le Baisinet double ressemble du tout au Baisinet simple de feuilles, tiges, & racines, sinon qu'il a les fleurs fort doubles. Brief, le Baisinet ressemble fort à la Grenoilette, principalement à la dorée, sinon qu'il n'a pas de taches noires aux feuilles, & aussi qu'il ne brulle point à la langue comme la Grenoilette.

LE LIEV.

Le Baisinet croist es plaines herbues, & aux jardins là ou on le plante.

## LE TEMPS.

Il fleurit depuis le mois d'Auril bien pres tout l'esté.

## LES NOMS.

Pline appelle ceste herbe en Grec *πρωάνθηδος*, & en Latin *Polyanthemum*, & est descrite au lib. 27. chap. 12. Aucuns l'appellent aussi *Batrachion*, c'est à dire *Ranunculus*, pour ce qu'il ressemble au *Ranunculus*: en François *Basinet*: en haut Aleman *Schmalstysblum*: en bas Aleman *Bostersblum*.

## LE TEMPERAMENT.

Le *Basinet* est de qualité chaude & seche, non pas toutesfois si chaude que *Ranunculus*.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

On n'vse point du *Basinet* en Medecine, sinõ qu'en aucuns lieux d'Allemagne, selon que Hieronime Bouc escrit, on la melle avec les autres herbes es tourteaux aux creuz.

## De la Flammule aquatique.

## Chap. LXXV.

## LA FORME.

## Flammule.

Ceste herbe a les tiges rougeastres, creuses, fort genoillées, sur lesquelles croissent longues feuilles & estroictes, bien pres semblables aux feuilles de Saulx, plus longues toutesfois, & quelque peu crenées tout à l'entour, principalement celles d'enbas. Les fleurs sont jaunes comme or, & vn peu velues par le milieu, de figure & couleur du tout semblable à la Grenoilette dorée. Et icelles peries elle a des chapiteaux comme la Grenoilette dorée. La racine est fibreuse.

## LE LIEV.

Elle croist es prés humides & lieux aquatiques, & eaux croupies.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en May, & bien tost apres elle liure sa semence.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle maintenant en Latin *Flammule*, c'est à dire, Flamme ou Herbe au feu, pour ce quelle est fort chaude & brulante comme flamme. Les Alemans la nomment *Egelcoosen*, pour ce que les brebis qui mangent ceste herbe, en ont le Egel, c'est à dire in inflammation & exulceration du foye. Quel nom elle a eu des Anciens, ie n'en scay encores rien, si ce n'est que soit l'herbe que Octavius Horatianus appelle *Cleoma*, lequel croist aussi en lieux humides & est de temperament fort chaud.

## LE TEMPERAMENT ET OPERA.

Elle est chaude & seche iusques au tiers degré, & brulante & exulcerante le corps comme le *Ranunculus*, auquel elle ressemble de temperament & vertus.

## LES NVISANCES.

Ceste herbe n'est pas seulement nuisible à l'homme, mais aussi aux bestes, & les tue & vne & l'autre. Les Brebis qui la paissent, sont tormentées d'une grande inflammation & meurent, par ce que le foye d'icelles est enflammé & gâté.



## De l'Herbe Paris.

## Chap. LXXVI.

## LA FORME.

LE Raisin de Renard a la tige ronde, vnie, d'environ vne paulme de haut, sur laquelle croissent quatre feuilles, situées l'une contre l'autre en maniere de croix. Entre icelles croist vne belle fleur estroillée, au milieu de laquelle fort vne baye brune. La racine est longue & greffe, se vntant ça & là.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist es boys obscurs & ombrageux, comme au boys de Soignie pres de Bruxelles là ou elle croist en grande abondance.

LE TEMPS.

Cette herbe croist en Avril, & la graine est meure en May.

LES NOMS.

Cette herbe s'appelle maintenant en Latin *Herba Paris*, & d'aucuns *Vna lupini*, & *Vna versa* en François *Raisin de renard* : en haut Aleman *wolfsbeer*, *Eisbeer* : en bas Aleman *wolfsbeste*.

LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

A Le fruit & la graine de ceste herbe, sont fort vti les contre toute poison, principalement à ceux qui par auoir prins du poison sont deuenus fols & insensés : Tellement qu'ilz gueriront si on le leur donne par vingt iours du matin, comme premier a escrit Baptista Sardus, puis apres luy le tresçauant Andreas Matthiolus.

De l'Aconit. Chap. LXXVII.

LES ESPECES.

A *Aconitum* est de deux sortes, comme Dioscoride escrit : L'un se nomme *Aconitum pardalianches*, c'est à dire Aconit qui tuë les Leopards : & l'autre *Aconitum lycoctonum*, c'est à dire Aconit tuë loup duquel nous parlerons au chap. ensuyuant.

LA FORME.

La premiere espeece d'*Aconitum*, appellée *Pardalianches*, a trois ou quatre fueilles rondatres & vn peu houlues, lesquelles ressemblent aux fueilles du Concombre sauuaige, comme dit Dioscoride, plus petites toutesfois. La tige croist d'vne paulme de haut. La racine semble à la queue d'vn scorpion, & est blanche, luisant comme Alabastr.

LE LIEV.

Cette herbe ayme lieux ombrageux & syluestres. Elle ne se trouue pas en ce pais. Pourtant n'auons nous sçeu bailler autre pourtraict d'icelle, sinon celuy que nous auons tiré hors du Dioscoride du tresçauant Matthiolus.

LES NOMS.

Cette espeece se nomme en Grec *ἀκόνιτιον παρδαλιανχης*, *μυσοκτόνον*, *βιολιφόρον* & *καίματος* : en Latin *Aconitum pardalianches*, *Myoctonum*, *Theliphonum*, *Cantuarium* : incognue es Boutiques & du Vulgaire.

LE TEMPERAMENT.

L'*Aconit* est chaud & sec iusques au quatriesme degre, & fort nuisible à la nature de l'homme, & de fait tuë la personne.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

On dit que si on approche ceste herbe du Scorpion qu'il peert sa force, & le resout, & demeure en tel estat, iusques à ce qu'il aye touché les fueilles d'Hellebore blanc, par lesquelles il reprend ses forces.

LES NVISANCES

*Aconitum* prins par dedans, tuë les hommes, les loups, les pourceaux, & toutes bestes priuées & sauuaiges.



*Aconitum pardalianches.*



*Lycostomum primum*. Tueloup premier.*Lycostomum cornutum*Tueloup à  
fleur bleue.

## LES ESPECES.

**L**ETueloup est de trois sortes, selon Dioscoride. La premiere qui a fleurs semblables aux fleurs de l'Hellebore noir bastard. La seconde qui les a bleues. La tierce les a jaunes.

## LA FORME.

**1** Le Premier a les tiges genouillées, de pied & demy de haut, & d'auantage, sur lesquelles croissent fucilles, parties en six ou sept fucilles crenées tout à l'entour comme vne sic, bié pres semblables aux fucilles de l'Hellebore noir bastard, plus petites toutesfois. Les fleurs sont petites, pales, & quand elles tombent produisent de petites siliques; qui contiennent la semence. La racine est ligneuse, courbe & fort fibreuse.

**2** Le Tueloup bleu a aussi de grandes fucilles des couppees, non guere differentes à celles du dessus dict, plus grandes toutesfois, plus d'echiquetées, & de couleur beaucoup plus brune. Les tiges croissent trois ou quatre pieds de haut, & produisent au sommet de belles fleurs bleues, velues par dedans, & faictes en forme de Coqueluché, ou heaulmie, de cinq fucillettes, dont les deux d'enbas sont estroictes, celles des costés vn peu plus larges, celle d'enhaut grande & creuse, cōme vne cappe ou coqueluchon couurant les fucilles qui sont à costé, de-

dans

*Lycostomum Ponticum*  
Tueloup Pontique.

dans lequel croissent deux petits penicilles courbes, vn peu gros par le bout en forme de massue de foel, au milieu desdictes fleurs y amout des filets menus & velus, au bout desquelz y a de petits poinctz verds, tirans sur le iaune. Quand les fleurs tophent, il vient en leur lieu trois ou quatre si liques ensemble, contenans vne graine dure, noire, & anguleuse. La racine est espesse & noire, formée comme vne poyre & a beaucoup de fibres.

- 3 Le Tueloup à fleur iaune a les feuilles larges, noires, decouppées, bien pres semblables aux Basinetz, beaucoup plus grandes toutesfois. Les tiges sont rondelletes, d'environ deux pieds de haut ou d'auantage: au sommet desquelles croissent des fleurs palles, de telle forte bien pres, que les fleurs du Lin sauage, apres lesquelles ensuyuent de petites filiques, contenans vne graine noire, & anguleuse. La racine est noire & fort fibreuse.

LE LIEV.

Ces trois herbes venimeuses se trouuent en ce pais plantées es jardins des Herboristes, & le Bleu est fort commun en plusieurs jardins. Les deux dernieres on les trouue en Alemaigne & au tres pais es valées profondes, & bois obscurs & sauages. La premiere se trouue aux montaignes & lieux pierreux.

LE TEMPS.

Ces trois herbes fleurissent en Auri, en May, & en Iuin.

LES NOMS.

Ceste espede d'Aconitum se nomme en Grec ἀκόνιτον λυκοκτόνον, & λυκοκτόνον en Latin Aconis iuni hecstonam, & d'aucuns Luparia: en François Tueloup.

- 1 La premiere espede se nomme en haut Aleman *Seufstaut*: en bas Aleman *Suystruyt*, cest à dire Herbe aux pouds. Ce n'est pas vne espede de Hellebore noir comme aucuns modernes enseignent & escriuent tresmal.

- 2 La seconde s'appelle en haut Aleman *Blawolffswurtz*, *Ysenshut*, & *Blowenshutst*: en bas Aleman *Blawolffswurtz*, & d'aucuns *Blunchy capieno*, pourtant l'appelle on en Latin *Caeculus monachi*, ou *Cappa monachi*, cest à dire Chapperon ou Coqueluchon de moyne.

- 3 La tierce est appelée de Dioscoride ἀκόνιτον ποικίλον, & λυκοκτόνον ποικίλον: en Latin *Lycostomum* *Perian.* *Rofage.*

en haut Aleman *wolffswurtz*, & *Seel wolffswurtz*: en bas Aleman *Seel wolffswurtz*.

LE TEMPERAMENT.

Tous ces trois Tueloups sont chauds & secs iusques au quatriesme degré, & de qualité fort venimeuse.

LES NVISANCES

Le Tueloup prins par dedans, enflamme le cueur, brulle les parties interieures, & tue la personne, come on a veu, n'y a pas long temps, en la ville d'Anuers, ou quelques vns ayans mangé en saladade la racine de Tueloup à fleur bleue, au lieu de quelque bone herbe, moururent soudainement. Ces espedes de Tueloup ne tuent seulement les homes, ains aussi les loups, chiens & telles bestes, si on leur donne à manger avec de la chair.

Du Rofage, ou Rofagine. Cha. LXXIX.

LA FORME.

Le Rofage est vn arbrisseau, porté feuilles plus grâ des, plus longues, plus espesses, & plus rudes que les feuilles de l'Amandier. Les fleurs sont de belle couleur rouge, parties en cinq feuillettes, non guere differentes à vne petite rose. Le fruit est de la longueur d'vn doigt, plein par dedans d'vne graine houlue & velue, comme les filiques d'Aclepias.

LE LIEV.

Le Rofage croist en aucuns pais pres des riuieres, & au bord de la mer, en lieux plaisans comme escrit Dioscoride. En ce pais il se trouue es jardins des Herboristes.

LE TEMPS.

Il fleurit en ce pais au moys de Iuin.



## LES NOMS.

Cette plante se nomme en Grec *ῥοσάγινος*, *ῥοσάγινος*, *ῥοσάγινος*, Nicander l'appelle aussi *Neris*: en Latin *Laurus rosea*, & *Rosea arbor*, c'est à dire Arbre rosier: es Boutiques Olander: en François Rosage, ou Rosagine: en Aleman *Wanderboom*.

## LE TEMPERAMENT.

Il est aussi de temperament fort chaud & sec.

## LES NUISANCES.

Le Rosage est fort nuisible à l'homme, mais principalement aux brebis, cheures, vaches, chiens, ânes, mulés, chevaux, & toutes bestes à quatre pieds, & que plus est, les tue, car toutes celles qui boyent l'eau dans laquelle le Rosage a trempé, elles meurent soudain, comme Dioscoride, Plin & Galien escrivaient.

## Du Paoüt.

## Chap. LXXX.

## LES ESPECES.

Il y a trois sortes de Paoüt, comme dit Dioscoride, dont la premiere espece est blanche & domestique, & les deux autres de noires sauvages.

*Papaver sativum.*  
Paoüt cultivé.

*Papaver hians.*  
Paoüt sauvage.



## LA FORME.

- A Le Paoüt cultivé blanc porte vne tige droite, vnie, d'environ la hauteur de quatre ou cinq pieds de haut, & là dessus fueilles longues, larges, blanches, lesquelles sont crenées à l'entour inégalement: au sommet de la tige croist vn bouton rond, lequel s'ouvre en vne fleur grande & blanche, composée de quatre fueilles, laquelle a au milieu moult de filets, & vn rond chapiteau, lequel devient gros & l'oguet: là dedés est cōtenue vne graine blanche, laquelle est fort vile en medecine.
- B De ceste espece il s'en trouue encores vn, duquel les fueilles des fleurs sont crenées & déchiquetées, au reste du tout semblable au deuantdict.



A<sup>1</sup> La seconde espece de Pavot a les tiges & faucilles fort semblables au Blanc, mais les fleurs sont de belle couleur rouge, & les chapiteaux sont plus ronds & non longs. La graine est noiretre.

B De ceste espece s'en trouue aussi vn qui a les fleurs crenées & dechiquetées, au reste du tout semblable à l'autre.

3 La tierce espece de Pavot est pareille aux deux autres en faucilles, & tiges, si nō qu'elle est beaucoup plus petite & porte plus de fleurs & de chapiteaux. Les fleurs sont d'une couleur entre rouge & blanc tirant sur le noir, ayans des taches noires à chacune faucille en bas. Les chapiteaux sont vn peu languets, beaucoup plus petits que les chapiteaux des autres, li ou y a vne semence noiretre. Et quand la graine est meure ces chapiteaux s'ouurent par haut, dessous hécaille qui couure lesdicts chapiteaux. Et puis tombe la graine hors facilement, ce qui n'aduient aux autres deux Pavots, desquelz les tesses demeurent tousiours fermées.

Il coule du Pavot vne liqueur blanche comme lait, quand les chapiteaux sont blessés, laquelle on appelle Opium, & on la recueille & met secher, & garde es Boutiques pour puis s'en seruir en Medecine: quand ceste liqueur est seche, elle est de couleur de chastaigne.

LE LIEU.

Toutes ces especes de Pavot on les seme en ce pais aux vergers. La tierce espece est fort commune, tellement qu'on la seme en plusieurs champs pour le prouffit & usage qui vient de la graine. En la Pouille & Espagne & autres pais chauds on recueille le ius qui est l'Opium, duquel on vse en ce pais en Medecine.

LE TEMPS.

Le Pavot florit le plus souuent en Iuin.

LES NOMS.

Le Pavot se nomme en Grec *μυσαυ*: en Latin & es Boutiques *Papauer*, d'aucuns *Oxytonon*, *Prosopon*, *Leber*, *Leibusa*, & *Onitramen* haut Aleman *Magasamen*, *Moer*, *Magle* & *Wsmag*: en bas Aleman *Suel*, & d'aucuns *Manrop*.

Le ius du Pavot s'appelle en Grec *οπιουμ*: en Latin, & es Boutiques *Opium*.

1 La premiere espece s'appelle en Grec *μυσαυ λευκον*: en Latin *Papauer sativum*, d'aucuns *Tbylas eiris*: es Boutiques *Papauer album*: en François Pavot cultivé & blanc; en Aleman *witten Suel*, & *tammen Suel*.

2 La seconde espece Dioscoride la nomme *μυσαυ ερυθρον*, & *Papauer sinestre* & *erraticum*, aucuns aussi *Psibitinis*: es Boutiques *Papauer nigrum*, *magnum*, des indoctes *Papauer rubrum*, & là selō en François Pavot rouge: en Aleman *roden Suel*.

3 La tierce espece est aussi tenue pour vne sorte de Pavot sauvage & s'appelle es Boutiques *Papauer commune*, & *Papauer nigrum*, c'est à dire Pavot commun & Pavot noir: en Aleman *Suel*, il semble que ce soit vn *Papauer Rheas*, c'est à dire fluide & tombant, car la graine d'iceluy s'escoule quand elle est meure, ce qui n'aduient aux autres, comme dessus est dict.

LE TEMPERAMENT.

Tous Pavots sont froids & secs bien pres iusques au quatriesme degré.

Opium est froid & sec iusques pres du quatriesme degré.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

La decoction des faucilles & chapiteaux du Pavot faicte en eau, & beuë, faict dormir. Elle a pareille vertu si on s'en laue la teste ou les mains.

Des chapiteaux boullis en eau, on en faict vn Syrop lequel faict aussi dormir, & est fort bon contre catharrhes subtils qui tombent du cerueau sur les poullmōs, & contre la toux ayant prins son origine de telles humeurs subtiles.

La graine du Pavot noir beuë en vin, arreste le flux de ventre, & le desordonné flux menstrual: & si on la desinele en eau, & induict sur le front, elle faict aussi dormir.

On faict vn emplastre des chapiteaux encores verts auant qu'ilz sont meurs avec farine d'Orge rostie, lequel est fort vilement appliqué sur feu volage, phlegmons & viceres qu'on veut refroidir.

Opium, c'est le ius de Pavot seché, prins enuiron à la quantité d'une vesse appaisé toutes douleurs interieures, faict dormir, guerit la toux, & serue le ventre.

Iceluy induict avec huile rosat, adoucit douleurs de teste: Et avec huile d'amandes douces, *Myrrhe* & *Saffran*, guerit douleur d'oreilles.

On l'induit vilement avec vinaigre sur feu volage, & toutes inflammations; & miec lait de G femine & du Saffran, il appaisé douleurs de gouste.

Iceluy mis au fondement en forme de suppositoire, faict dormir.

Brief, Opium vsurpé en quelque maniere que ce soit par dedens, ou par dehors, fait dormir, appaise douleurs, il en faut toutesfois vsfer avec discretion.

## LES NVISANCES.

L'vsage du Pauot est fort dangereux & mauuais, principalement celuy d'Opium, lequel pris par trop excessiuement, ou trop lonuement induit par dehors, ou autrement sans meure deliberation, il fait par trop dormir, comme si on estoit en letharge, il induit resueries, il corrompt le sens & entendement, induit paralytie aux membres, & en la fin tue aussi la personne.

## LA CORRECTION.

Quand en cas de necessité il faut vsfer d'Opium, on y melle ra du Saffra parmy, car il empesche & retarde vn peu la mauuaistie de l'Opium, de forte qu'il ne peut si facilement nuyre comme sil nry auoit pas de Saffran adiousté.

## Du Coquelicoc, ou Ponceau.

## Chap. LXXXI.

## LES ESPECES.

IL y a deux sortes de Coquelicoc, le Grand & le Petit, differens en fueilles, mais de fleurs fort semblables l'vn à l'autre.

*Papauer Rhoeas.*  
Petit Coquelicoc.

*Papauer Rhoeas altissim.*  
Grand Coquelicoc.



## LA FORME.

Le petit Coquelicoc a les tiges grestes, velues: les fueilles longuettes, crenées tout à bentour, & non guere differentes aux fueilles de l'autre Pauot, sinon qu'elles sont beaucoup plus petites, & non vniés, mais vn peu velues. Les fleurs sont de belle couleur rouge, non differentes en figure aux fleurs du Pauot, ayans au milieu de filets noirs. Apres les fleurs tombées il y vient des telles beaucoup plus petites que celles du Pauot, & de figure plus longue, esquelles est contenue vne graine noire. La racine est longue & isulnatre.

Le grand Coquelicoc a de grandes fueilles fort incisées, semblables aux fueilles du Senecé blanc

# Du Pauto cornu. Chap. LXXXII. Li. 3. 295

blanc bien pres, plus longues toutesfois, & plus houlfues. Les tiges, fleurs, & testes, ressemblent au petit Coquelicoc. La racine est aussi grosse, plus blanche toutesfois q̄ celle du petit Coquelicoc.

## LE LIEV.

Le Coquelicoc croist entre le Bled, Seigle, Auoyne & Orge. Le petit est le plus commun.

## LE TEMPS.

Le Coquelicoc florist en May, & de là en auant iusques à la fin de l'isté.

## LES NOMS.

Ceste espece de Pauto sauvage s'appelle en Grec *ἰσκαὸν ῥοδόεν*: en Latin *Papauer erraticum*, *Papas pauer fluidum*, & *Papauer Rhodae*: en quelques Boutiques *Papauer rubrum*: en François Coquelicoc, ou Ponceau: en haut Aleman *Klappertosen* *Kornrosen*: en bas Aleman *Clappertosen*, & *roodden huet*, ou *wilden huet*. Et non sans cause est à doubter si le second Coquelicoc est vne espece d'Argemone, ou non.

## LE TEMPERAMENT.

Les Coquelicocs refroident, rafraichissent aussi, & sont de temperament fort semblable au Pauto.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

Cinq ou six testes de Coquelicoc boulies en vin & beuës, sont dormir. Pareille vertu a la graine A ne prinle avec miel.

Les fueilles avec les chapiteaux verds broyées, sont fort vtilement appliquées sur tous vlcères B malings & enflammez, & sur erysipeles, comme le Pauto.

# Du Pauto cornu.

## LA FORME.

# Chap. LXXXII.

*Papauer cornutum.* Pauto iaulne, ou cornu.

1 LE Pauto cornu a les fueilles fort dechiquetées & fendues, non guere dissemblables aux fueilles de l'autre Pauto, plus rudes toutesfois, & houlfues comme les fueilles du Coquelicoc. Les tiges sont rudes, & aussi quelque peu velues, sur lesquels les croissent fleurs iaulnes, composées de quatre fueilles, lesquelles perissans produisent de longues siliques étroictes, vn peu courbées, dans lesquelles la graine est contenue. La racine est grosse & espesse, & dure l'uyer, produisant tous les ans de nouuel les fueilles, & tiges.

On trouue encores deux autres sortes de ce Pauto, selon le tesmoignage d'aucuns sçauans, lequel les sont fort communes en Espagne.

2 Lvn a les fueilles, les tiges, & aussi les siliques du tout semblables au deuant dict, sinõ que les fleurs ne sont pas iaulnes, mais bien rouges, au reste de figure semblable aux fleurs iaulnes.

3 Le second ressemble aussi aux autres, sinon qu'il est beaucoup plus petit de fueilles, tiges, fleurs & siliques. Et les fleurs ne sont ne iaulnes ne rouges, mais de belle couleur persviolette, parties aussi en quatre fueilles.

## LE LIEV.

4 Le Pauto cornu croist de soymsme en lieux rudes, enuirõ le bord de la mer, cõme dit Discorde. En ce pais les Herboristes le semēt en leurs jardins.

4.3 Les deux autres especes se trouuent en Espagne loing de la mer, entre les Bleds & pres des voyes.

## LE TEMPS.

Le Pauto cornu fleurit en Iuillet & Aouët.

## LES NOMS.

Ceste espece de Pauto s'appelle en Grec *ἰσκαὸν κεραιριν*: en Latin *Papauer cornutum*, & d'aucuns Apothicaires ignorans *Memtha*, avec lequel il n'y a aucune similitude: en François Pauto cornu: en haut Aleman *Geshornere magstamen*, & *Geshornagen*: en bas Aleman *Geshen huet*.



## LE TEMPERAMENT.

Le Pauot cornu est chaud & sec iusques au tiers degre.

## LES VERTVS. ET OPERATIONS.

- A La racine du Pauot cornu boulie en eau iusques à la moitié, prouoque l'vrine, desoppile le foye, & on la donne vtilement à boire à ceux qui rendent leur vrine grosse & espesse, à ceux qui ont quelque vice au foye, & qui ont douleur de reins & de hancé.
- B La graine de ce Pauot prinle à la quantité d'un cuillier, lache le ventre tout doucement, & purge le phlegme.
- C Les fucilles broyées avec les fleurs, puis appliquées, mondifient vieux vlcères & pourris.

## De la Mandragore.

## Chap. LXXXIII.

## LES ESPECES.

LA Mandragore est de deux sortes, selon Dioscoride, Blanche & Noire. La Mandragore blanche se nomme Mandragore masse, laquelle est assez cognue. La Noire est appellée Mandragore femelle, laquelle n'est guere encores cognue.

## L'FORME.

Mandragora mas.

Mandragore masse.

La Mandragore blanche à ses fucilles grandes, larges, verdes en blanchissant, charnues, vnies, est due sur la terre, n'og guere differentes aux fucilles de la loete, entre lesquelles viennent sur petites courtes qucués & vnies, de belles pommes iaulnes, rondes, de forte odeur, non mal plaisante toutesfois. La racine est grosse & blanche, non guere dissemblable à la racine d'un Raifort, diuisée en deux ou trois parties, lesquelles aucunes fois croissent l'une sur l'autre come les deux jambes d'une personne.

La Mandragore femelle ou noire, n'a point aussi de tige esleuee. Elle a aussi les fucilles espandues sur la terre, plus estroictes & plus pctites que les fucilles de Lactues, & d'odeur ingrate. Les pommes sont pallees, de la figure d'une sorbe ou corme, la moitié moindres que celles du Masle. La racine est noire par dehors, blanche par dedans, fendue en deux ou trois, couchée l'une sur l'autre, & plus petite que la racine du Masle.

## LE LIEV.

La Mandragore croist voluntiers en lieux obscurs & ombreux. Elle ne croist point en ce pais de soy mesme, mais on la trouue aux iardins des Herboristes, lesquels la plantent en lieux exposés au Soleil.

## LE TEMPS.

Les pommes de Mandragore sont en ce pais meures en Aoust.

## LES NOMS.

La Mandragore s'appelle en Grec *μανδραγορα*, & en Latin *Mandragoras*, d'aucuns *Circa*, & *Animalum*, de Pythagoras aussi *Antropomorpos*, pour ce que les racines de ceste herbe ressemblent à la partie inferieure de l'homme.

La premiere espece s'appelle *Mandragora mas*, d'aucuns comme dit Dioscoride, *Norion*: en François Mandragore masculine haut Aleman *Alesun mirnulin*, en bas Aleman *Mandragora manchen* ou *Aleupn manchen*.

L'autre s'appelle *Mandragora femina*, d'aucuns *Thridactis*: en François Mandragore femelle: en Aleman *Alesun weiblin* & *Mandragora weiblin*.



## LE TEMPERAMENT.

La racine de Mandragore, signammet l'escorce, est froide & seche iusques pres du quatriesme degre. Le fruit n'est pas si froid, & a quelque humidite adioincte.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les ius tirees des racines de Mandragore fresches, & bien seche, prins en bien petite quantite, A purge par le ventre le phlegme, & les humeurs melancholiques violement, comme la racine d'Hellebore noir.

Il est bon aussi de le mesler parmy les Collyres mitigatis des douleurs des yeux: & applique B par bas en forme de pessus, il tire hors la seconde & le fruit mort.

Vn suppositoire fait d'iceluy, mis au fondement, fait dormir.

Les feuilles verdes & nouvelles de Mandragore broyees avec farine d'orge rostie, sont vtile- D ment appliquees sur tous phlegmons & vicerés, & ont vertu de dissoudre toutes tumeurs & ap- ptemes, si on les en frotte tout doucement, & applique dessus.

Il est bon aussi de mettre la racine sur chauds vicerés & tumeurs: & avec huile & miel, sur mor E fures de bestes venimeuses.

Le vin auquel on a mis tremper ou cuire la racine de Mandragore, fait dormir, & appaise tou F tes douleurs, parquoy on la donne prouitablement à ceux, susquelz on veut couper, fier, ou bruler quelque partie du corps, à fin qu'ilz ne sentent la douleur.

La saueur des pommes fait dormir, mais beaucoup mieux le ius d'icelles prins au dedans. G

## LES NVISANCES.

Il est tresdangereux de prendre le ius de la racine, car si on le prend vn peu plus grande quan- tite qu'il ne faut, il tue la personne. Les feuilles & fruit sont aussi mauuaises, elles font dormir profondement avec refueries, comme l'Opium.

## Des Verangenes.

## Chap. LXXXIII.

## LES ESPECES.

IL y a deux sortes de Verangenes, l'une porte les pommes purpurées, & l'autre blanchâtres, ou palles, au reste elles sont pareilles l'une à l'autre de facon, de tiges, de feuilles & fleurs.

## LA FORME.

Cette plante a la tige ronde, d'environ vn pied de haut, portant feuilles larges, brunâtres, bien pres semblables à celles du Solanum mortel, vn peu plus rudes toutesfois, entre lesquelles croissent sur courtes queues les fleurs, qui se tournent puis apres en vn fruit gros, rond, & long, bien pres de la forme d'une pomme, plein par dedans d'une graine comme les Concombres, par dehors de couleur aucune fois brunâtre, & de couleur de chaltaigne, aucune fois blanche ou iaulnatre. La racine est fibreuse.

## LE LIEV.

Les Verangenes ne croissent pas d'eiles mesmes en ce pais: mais les Herboristes les plantent & cultiuent en leurs iardins, comme Concombres & Courges, avec lesquelles elles sortent & perissent tous les ans.

## LE TEMPS.

Cette plante fleurit en Aoult, & en Septembre a son fruit meur.

## LES NOMS.

On appelle maintenant en Latin ces pommes *Malainfana*: en François & bas Aleman *Verilgenes* en haut Aleman selon le nom Latin *Verilanzan*, & *Doll spffel*, c'est à dire Pommes de rage.

*Malainfana.**Verangenes.*

## LE TEMPERAMENT.

Ces pommes sont de temperament froid & humide comme les Courges.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A On n'vse point des Veranges en Medecine, mais aucuns les acoustrent avec huile, poyure, sel & vinaigre, puis les mangent. C'est toutefois vne viade mal saine, faisant croistre au corps plein de mauuais humeurs.

## Des Pommes d'amours.

## Chap. LXXXV.

## LES ESPECES.

Ces Pommes estrangetes sont aussi de deux sortes, Les vnes sont rouges, Les autres iaulnâtres au reste se ressemblent du tout, de tiges, fueilles, & croisson.

## LA FORME.

Pomme amoris.

Pommes d'amours.

Ces Pommes ont les tiges rondes, de couleur cédreuse, houlues, trois ou quatre pieds de haut, bien branchues, & les fueilles grandes, larges, & longues, estendues à chacun costé, & profond incisées, bien pres semblables aux fueilles d'Aigermoine, beaucoup plus grandes toutesfois, & plus blâches. Les fleurs sont iaulnâtres, croissans sur courtes queues, cinq ou six ensemble, & quand elles tombent viennent en leur lieu de grosses pommes, plattes, & esleuées par costes, de couleur maintenant rouge, maintenant blanchatre, maintenant iaulne, comme Oranges, ou Mandragores, esquelles est contenue la semée: Toute hierbe est d'odeur puante & estrange, & la faut tous les ans semer comme les Concombres.

## LE LIEV.

Ceste herbe est vne plante étragete, & ne se trouue point en ce pais, sinon es jardins de quelques Herboristes, là ou elle est semée.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en Iuillet & Aoust. Et les pommes sont meures en Aoust & Septembre.

## LES NOMS.

Ceste plante estrangere s'appelle maintenant en Latin *Pomum amoris*, *Pomus amoris*, & d'aucuns *Pomum aureum*: en François Pommes d'amours: en haut Aleman *Golt oppel*: en bas Aleman *Gulden appelen*, c'est à dire Pommes dorées.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

Le temperament, faculté & vertus de ceste plante, ne sont encores cognez, mais selon que nous pouons iuger hors du goust, elle est de nature froide, principalement les fueilles, aucunement semblable à la Mandragore, & pourtant aussi dangereuse pour en vser.

## De la Pomme de Perou, ou espineuse.

## Chap. LXXXVI.

## LA FORME.

LA Pomme de Perou a la tige ronde, d'environ deux pieds de haut, les fueilles grâtres, bien pres semblables aux fueilles de Solanum, plus grandes toutesfois, principalement celles d'en bas aupres de la racine. Les fleurs sont blanches, rondes & creuses comme vne cloche, d'odeur plaisante comme le Lys blanc, & quand elles sont tombées, suruiuent le fruit, rond comme vne pomme, de couleur verte, ayant tout autour mout d'espines, pourtant l'appelle on Pomme espineuse, pleine de graine par dedans comme les Veranges. La racine est fibreuse, entrecassée, & tissue l'vne en l'autre.



## LE LIEV.

La Pomme de Perou est aussi vne plante estrangere, laquelle ne se trouue sinõ es jardins des Herboristes, & encores bien peu souuent.

## LE TEMPS.

Ces Pommes florissent en May & en Iuin.

## LES NOMS.

Cette plante estrangere s'appelle des Italiens *Stramonia* & *Pomum hiosum*, d'aucuns *Corona regis* A Venize *Melospinus*, & *Paracoult* en Frãçois Pomme de Perou, ou *Péne espineuse* en haut Aleman *Stech oppfel*, *Kanch oppfel*, & *Stechend oppfel* en bas Aleman *Dozen appel*.

## LE TEMPERAMENT.

Le temperament vertus & faculté de ceste plante sont encores à present incognues.

## De la Merueille. Chap. LXXXVII.

## LES ESPECES.

PAR le nom de Balsamine, il faut entendre maintenant deux sortes de Pommes ou de fruiç, fort differens l'un à l'autre en figure & croisson. L'un s'appelle Balsamine male, & l'autre Balsamine femelle.



*Cherania.* Merueille male.

*Balsaminus.* Merueille femelle.



## LA FORME.

La premiere espece de Merueille a les sarments longs & gresles, à petis capreoles, par lesquels elle s'attache aux hayes, arbres, estaches, & treilles, contre lesquelles elle est plantée. Les feuilles sont larges, decouppées tout à l'entour, bien pres semblables à celles de Vigne, plus petites toutesfois. Les fleurs sont pales. Le fruit rond, poinctu par le dehors & rude comme le fruit du Concombre sauvage, verd au commencement, puis rouge. En ces pommes est contenue vne graine large, rude & noiratre. La racine produit plusieurs branches esparties deçà delà.

La seconde espece a la tige grosse, rougeatre comme le Pourpier, enuiron vn pied de haut, ou d'auantage. Les feuilles sont longues, estroictes, non guere dissemblables aux feuilles de Saub, vn peu crenées à l'entour. Les fleurs sont belles, de couleur incarnée tirant sur le pers, ayans vne queue recoquillée, non guere differentes aux fleurs de la Consouide royale. Le fruit ou pomme est rond, aigu par le bout & houlé par dehors, verd au commencement, puis apres iaulne en pallisant, lequel s'ouure quand il est meur, & la graine tombe dehors laquelle ressemble asses à la vesle. La racine ressemble à la dessusdicté.

## LE LIÈV.

On trouue ces deux Herbes estrangeres en ce pais aux iardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

Ces plantes fleurissent en Iuillet & Aoust, & le fruit est meur en Aoust & Septembre.

## LES NOMS.

La premiere espece de ces herbes s'appelle en Italien *Charantia*, *Balsamina*, *Momordica*, & en aucuns endroits *Pomum Hierosolymitanum*: en France *Pomum mirabile*: en François Merueille male.

L'autre espece s'appelle *Balsaminum*, & n'est pas vn *Charantia*, *Balsamina*, ou *Momordica*, comme aucuns pensent. Les hauts Alemans l'appellent *Bassam oppel weislin*, c'est à dire Merueille femelle.

## LE TEMPERAMENT.

Le temperament de ces pommes selon aucuns est chaud au premier degré, & secusques au second.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

On trouue par escrit que la Merueille appelée *Charantia* a les vertus ensuyuantes.

- A Les feuilles de *Charantia* prises en vin, guerissent toutes douleurs tant au dedans du corps qu'au dehors, & confortent la force de ceux qui la prennent, de telle sorte que nulle douleur ne leur peut auenir.
- B Icelles mises en poudre & beuës en vin, consolident & guerissent toutes playes interieures, voire des entrailles, & proufissent grandement contre la Colique.
- C Les ius des feuilles seulement induict sur les dents, guerit la douleur d'icelles.
- D L'huile qu'on tire du fruit d'icelle au Soleil, reforme toutes playes, donne allegeance à toutes douleurs, & oste toutes conuulsions, induict sur les playes, douleurs, & conuulsions.
- E Icelle vaut aussi contre vlcères du thorax, & contre douleurs de la matrice: faisant sans grandes angoisses & legerement deliurer d'enfant si on l'induct sur le ventre.
- F Icelle guerit tous vlcères, bleffures, & scabfès de la matrice, jettée dedans icelle avec instrument propre à ce.
- G Elle mise au fondement avec du coton, guerit les hemorrhoides, & appaise toutes douleurs d'icelles.
- H On en guerit aussi rompures quand on l'induct sur icelles, mais il faut boyre aussi avec du vin les feuilles puluerisées.
- I L'huile de Merueille faicte comme dessus, efface aussi les cicatrices & taches, induict dessus.
- K On ne trouue rien par escrit des facultés de la Merueille femelle, pour ce quelles sont incognues.

## De la Morelle.

## Chap. LXXXVIII.

## LA FORME.

LA Morelle a les tiges rondes, d'enuiron vn pied de haut, fort branchues: les feuilles noiratres, larges, molles & pleines de ius, semblables aux feuilles de Basilic, mais beaucoup plus grâdes. Les fleuriettes sont blanches, & pendent trois ou quatre pres l'une de l'autre. Apres quelles sont passées, il y vient en leur lieu des bayes pendans ensemble comme le fruit de L'yerre, de couleur communement noire quand elles sont meures, aucunesfois bien rouge, & souuent aussi iaulnes. La racine est blanche, & fort fibreuse.



## LE-LIEV.

La Morelle est fort commune en ce pais pres des vieilles murailles, fous les bayes, pres des voyes, es chemins profonds & carrieres, aux bors des champs & es iardins à la porée.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit depuis le mois de Juin le long del'été, & ce pendant liure aussi sa graine.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec  $\sigma\epsilon\upsilon\chi\tau\omicron$ , &  $\tau\epsilon\upsilon\chi\tau\omicron$ , &  $\sigma\epsilon\upsilon\chi\tau\omicron$  κικαίον: en Latin *Solanum*, & *Solanum hortense*: es Boutiques *Solanum*, & d'aucuns *Morella*, *Vua lupina*, & *Vua vulpis*: en François *Morelle*: en baut Alemā *Dachschad*: en bas Aleman *Daschayr*, & *Dachschade*.

## LE TEMPERAMENT.

La Morelle est froide & seche iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPER.

- A Les fueilles verdes de Morelle, broyées avec farine d'Orge rostie, induictes sur feu volage & sur viceres rongeurs & toutes inflammations, y prouffissent à merueille. Pour les mesmes effectz on fait vn vnguent du ius d'icelle avec huile rofat, ceruse & esume d'argent.
- B Icelles broyées à part, & appliquées, appaisent douleurs de teste, & prouffissent à l'estomach chareux, & toutes chaudes intemperies des yeux, des oreilles, du foye, de la ratelle, & vesie, appliquées sur l'endroit d'icelles par dehors.
- C Icelles avec du sel, dissoluent les tumeurs & apostemes qui viennent derriere & aupres des oreilles, appliquées dessus en forme d'emplastre.
- D Le ius de Morelle meslé avec le blanc d'vn œuf, est vilement induict sur le front cōtre inflammations, rougeurs, fluxions & toutes autres maladies des yeux.
- E Iceluy distillé aux oreilles, appaise la douleur d'icelles, & appliqué avec cottō en forme de pessaire en la matrice, arreste le flux desordonné des femmes.
- ¶ Brief la Morelle est propre, comme dit Galien, pour toutes maladies & accidens, ou est besoing de refroidir & restraindre.



## Du Halicacabon.

## Chap. LXXXIX.

## LA FORME.

- 1 LE Halicacabon commun porte les tiges gresles, auxquelles croissent fueilles semblables à celles de la Morelle, plus larges toutesfois, & plus grandes. Les fleurs sont palles, plus grandes & moins blanches que les fueilles de la Morelle, & quand elles perissent elles produisent de follicules ou vesies rondes, creuses, fermées, verdes au premier, puis rouges, dedans lesquelles croissent rondes bayes, rouges, pleines d'vne graine platte & isulnatre. La racine est gresle, se trainant, & jectant de nouveau tous les ans en plusieurs endroits de nouveaux tendrons & tiges.
- 2 Par dessus ceste espeece, on en trouue encores vne autre estrange qui est tenue aussi pour Halicacabon. Laquelle a les tiges gresles, tendres, les fueilles longatres, crenées & profond incisées tout à l'entoul. Les fleurs sont blanches comme neige, produisant de vesies ou follicules ronds, verts au commencement, puis apres noiratres. Là dedans croissent de bayes noires, d'environ la grosseur d'vn pois. La racine est gresle & fibreuse.

## LE LIEV.

Le Halicacabon croist en ce pais en aucuns bois, & pres des hayes en lieux bassiers & humides

*Vesicaria vulgaris.*  
Halicacabon commun.

*Vesicaria peregrina.*  
Halicacabon estrange.



des: on le plante aussi bien souvent aux jardins.

#### LE TEMPS.

Les follicules & fruit de ceste Plante sont meurs en Aoust & Septembre.

#### LES NOMS.

Le Halicacabon se nomme en Grec  $\sigma\upsilon\chi\alpha\tau\omicron\upsilon$  &  $\alpha\lambda\iota\alpha\kappa\alpha\gamma\omicron\upsilon$ , en Latin *Vesicaria*, de Plin aussi *Vesicula*, d'aucuns Callionés Boutiques *Alkakangi*: en François *Alquequanges*: en haut Aleman *Bechluten*, *Bobesellen*, *Juden hirszen*, *Teuffels hirszen*, *Jude Hutlin*, & *Kot nachschab*: en bas Aleman *Crischen Van ouer see*, c'est à dire *Cerises d'outre mer*.

L'autre estrange s'appelle des Modernes *vesicaria peregrina*, & *Vesicarianigra*: en François *Halicacabon estrange*: en haut Aleman *Buncho copflin*, *schwarte Bechluten*, & *welch Bechluten*: en bas Aleman *Bemde Crischen Van ouer see*, & *swerte Crischen Van ouer see*.

#### LE TEMPERAMENT.

Les feuilles d'Alkekangi sont froides comme la Morelle. Le fruit n'est pas si tresfroid, avec ce il est de parties subtiles.

Le Temperament du Halicacabon estrange est encores incognu.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Les feuilles d'Halicacabon seruent à toutes les choses auxquelles les feuilles de Morelle sont propres.

B Les cerises ou fruit d'iceluy, ouurent les oppilations du foye, & des rongnons, nettoyens la vesie, & prouoquans l'urine, pourtant sont elles fort bonnes contre iaulnise, douleur & mal de reins, & de la vesie, contre difficulté ou acrimonie d'urine, & contre la pierre & grauelle.

LA FORME.

Cette plante mauuaise & mortelle est tenue pour vne espece de Solanum, pource qu'elle luy ressemble aucunement. Elle a les tiges rondes, noires, de deux ou trois pieés de haut, ou d'auantage, sur lesquelles croissent grandes feuilles & larges, vn peu velues, plus grandes, plus larges, & plus noires que celles de la Morelle. Les fleurs sont de couleur brune, formées en façon de petites clochettes creuses, apres lesquelles suruiennent de grosses bayes rondes, chacune sur sa queue à part, d'enuiron la grosseur d'vne cerise, verdes au commencement, puis quand elles sont meures, de belle couleur noire & luisante, dedans lesquelles est enclose vne petite graine brunatre. La racine est grande, retenant de nouveau tous les ans, & produisant beaucoup de nouvelles tiges.

LE LIEV.

Cette herbe se trouue en quelques endroits de ce pais es bois & hayes, & es jardins des Herboristes.

LE TEMPS.

Le fruit ou les bayes de ce Solanum venimeux sont meures en Aoust.

LES NOMS.

Cette herbe s'appelle à present *Solanum lethale*: es Boutiques *Solanum mortale*: en François *Solanum mortel*: en haut Aleman *Wolffraut*, *Bruhraut*: en bas Aleman *groote Dastoye* & *Dulcruyt*, ou *Dulfe besten*. Ce n'est pas *Solanum manicum*, ne *Solanum somniferum*, ny aussi *Mandragoras morion*, lequel Dioscoride décrit. Mais semble plus tost que ce soit le spec de *Mandragore*, de laquelle parle Theophraste au liure 6. chap. 2. Pourtant on la peut bien appeller aussi *Mandragoras Theophrasti*.

LE TEMPERAMENT.

Les feuilles & fruit de ceste herbe sont fort froids iusques au quatriesme degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les feuilles verdes & nouveau fruit de ce Solanum mortel, pourroient estre appliquées par A debors; comme les feuilles de la Morelle, sur feu sacré, & semblables inflammations, & ce avec grand aduis, attendu que ce Solanum refroidit bien plus fort que la Morelle vulgaire.

LES NVISANCES.

Le fruit de ce Solanum est mortel, & fait venir à ceux qui l'ont mangé vn profond somme, avec rage & fureur, lequel ne les delaisse point iusques à ce qu'ilz meurent, comme on la veu par experience tant en Alemaigne qu'à Malines en aucuns enfans qui auoyent mangé ce fruit, ne pensans point quil fut mauuais. Parquoy chacun doit bien regarder de ne pas planter, ou auoir en son iardin telles herbes venimeuses, principalement celles qui portent vn beau fruit & plaisant, comme cestuy cy: ou filz en veult tenir, que pour le moins ilz les gardét si soigneusement & enserment, que personne n'y puisse entrer, qui pour la beauté du fruit fust incité à le manger, comme souuent aduient à femmes & petis enfans.

Du Solanum dormitif & furieux. Chap. XCI.

Le Solanum mortel, duquel est escrit au chapitre precedent, me fait souuenir d'encores deux autres especes de Solanum, ou Morelle, descrites par les anciens & Dioscoride: vne desquels les est appellée *Solanum somniferum*, cest à dire *Solanum dormitif*; l'autre *Solanum manicum*, cest à dire *Solanum furieux*.

*Mandragoras Theophrasti.* } *Solanum mortel.*  
*Solanum lethale.* }



## LA FORME.

Solanum somniferum, c'est à dire Solanum dormitif a les tiges grosses, dures, sur lesquelles croissent grandes feuilles & larges, bief pres semblables aux feuilles du Coignier. La fleur est grande & rouge. Le fruit aulne comme Safran, contenu dedans les follicules. La racine est longue, reuesue d'une escorce rouge.

L'autre Solanum appellé Manicum, c'est à dire Furieux, a les feuilles de Seneué, plus grandes toutesfois, & vn peu semblables aux feuilles de la vraye Branche vrsine, appellée en Latin *Acans abus*, laquelle sera descrite au cinquiesme Livre. Il produict d'une racine dix ou douze tiges, hautes de deux ou trois pieds, au sommet desquelles croist vn rond chapiteau de la grosseur d'une olive, & housu comme le fruit de Platanus, c'est Plane, plus grand toutesfois, & plus long. La fleur est noire, & quand elle perit elle produict vne petite grappe de dix ou douze grains, comme le fruit du Lyarre, plus doux, comme grains de Raisin. La racine est blanche, epesse, creuse par dedans, & longue d'une coudée. Avec icelle semble auoir quelque similitude ceste espece estrange de Mauue qu'on appelle Malua Theophrasti, & Alcea Veneta, laquelle sera descrite au XXVII. Chap. de la cinquiesme Partie.

## LE LIEU.

Le Solanum somniferum croist selon que Dioscoride dict, en lieux pierreux situés non guere loing de la mer.

Le Solanum manicum croist sur hautes montaignes, bien exposées au Soleil.

## LES NOMS.

La premiere espece de ces deux herbes s'appelle en Grec  $\sigma\phi\chi\upsilon\ \delta\ \dot{\iota}\pi\nu\alpha\tau\alpha\delta$ : en Latin *Solanum somniferum*, c'est à dire en François *Solanum dormitif*, d'aucuns aussi *Halicacabon*, *Dirion*, *Apollinaris minor*, *Viticana herba*, & *Opfego*.

La seconde s'appelle en Grec  $\sigma\phi\chi\upsilon\ \delta\ \mu\alpha\kappa\iota\kappa\iota\varsigma$ : en Latin *Solanum manicum*, c'est à dire Solanum furieux, d'aucuns *Persion*, *Thryon*, *Antydon*, *Pemadryon*, & *Enoran*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Solanum dormitif est froid iusques au tiers degre bien pres aprochant du temperament d'Opium, mais beaucoup plus debile.

La racine de Solanum manicum, principalement l'escorce, est seche iusques au tiers degre, & froide iusques au second, comme escrit Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le fruit du Solanum dormitif fait vriner, & est fort bon aux hydropiques, mais il n'en faut pas prendre plus de douze pour vne fois, car si on en prend d'auantage, ilz nuisent.
- B Le ius du fruit est bon pour mesler parmy les medecines, qu'on donne pour appaiser, & mitiger douleurs.
- C Iceluy cuict en vin & tenu en la bouche, appaise douleur de dents.
- D La racine du Solanum furieux, principalement l'escorce, est fort vtilement frottée ou appliquée en forme d'emplastre sur feu volage, & sur vlcères chauds, malings, & rongeurs.
- E Il n'est pas bon de prendre de ce Solanum par dedans.

## LES NVISANCES.

Si on prend plus de douze fruits de Solanum somniferum, ilz font les gens fozlz & insenséz, bien pres comme l'Opium.

La racine de Solanum manicum prise à la quantité d'une drachme en vin, fait reuesies & imaginations: & à la quantité de deux drachmes, induit phrenesie & rage qui dure par trois iours: & si on en prend quatre drachmes, elle tue.

## Du Iusquiame.

## Chap. XCII.

## LA FORME.

Le Iusquiame noir a les tiges grosses, douces: Les feuilles grandes, larges, douces, molles, Janu-gineuses, grisâtres, decoupées & fort incisées, principalement celles qui sont au bas de la tige & pres de la racine: car celles qui croissent sur les tiges sont plus petites, & plus estroictes & pointues. Les fleurs sont brunes par dedans, tirant sur les pers, lesquelles ressemblent à petites cloches & quand

*Hyoscyamus niger.* Jusquiamé noir.*Hyoscyamus luteus.*

Jusquiamé iaulne.

*Hyoscyamus albus.* Jusquiamé blanc.

& quand elles tombent, s'enfayuent de ronds ca-  
licules comme de petits pots, couuerts de petites  
couuertes, en clos dedans de petites peaux ve-  
lues, ouuertes par haut, & ayans cinq ou six poin-  
tes aigues. Ces calyces sont poséz l'un sur l'autre  
le long des tiges, dedans lesquels est contenue  
vne graine brune. La racine est longue, aucune-  
fois de la grosseur d'un doigt.

Le Jusquiamé iaulne a de fucilles larges, blan-  
châtres, & douces, non crenées, ne decouppées,  
bien pres semblables aux fucilles du Solanum  
mortel, plus grandes toutesfois, plus blanches, &  
plus douces. Les fleurs sont palleiuines & ron-  
des, lesquelles passées vient en leur lieu de ronds  
calyces, bien pres comme petits pots, non guere  
differens aux calyces du Jusquiamé noir. Ces pe-  
tis pots croissent, & sont aussi enclos dans vne  
peau røde, mais elle est douce & ne pique point.  
La racine est tendre. Ceste espece de Jusquiamé  
apres auoir liuré sa graine, meurt sur l'hyuer, &  
la doit on semer tous les ans.

La tierce espece de Jusquiamé appellée Jus-  
quiamé blanc n'est guere disssemblable au Jusqua-



me noir, sinon que ses feuilles sont plus douces, plus blanches, plus lanugineuses & beaucoup moindres. Les fleurs sont aussi plus blanches, & pareillement la graine, qui est enclosé dedans petits calyces, comme la graine du Noir, mais la peau qui couvrent les calyces est douce & ne pique point. La racine de ceste espece n'est aussi guere grosse. Elle meurt aussi sur l'hyver, & da fait semer tous les ans de nouveau.

## LE LIEU.

Le Jusquiamé croist en ce pais abondamment pres des voyes, & lieux sablonneux & mal vuis.

Les deux autres, les Herboristes les sement en leurs jardins, dont le blanc croist de soy-même, & comme dit Dioscoride, es lieux maritimes sur les fumiers.

## LE TEMPS.

Ces trois especes de Jusquiamé florissent en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ἰσχυρίων*, & *ἰσχυρίων*; en Latin *Hyoisycamus*, *Aspularis*, & *Faba suilla*, d'aucuns *Diosycamos*, id est, *tousis faba*, *Fabulonia*; & *A pulcra* *Symphonica*, *Calicularis*, *Rentennia*, *Faba lupina*, *Mania*: des anciens Romains & Hetrufques *Fabulum*: des medecins Arabes *Altercum*, & *Altercumgenam*: de Mattheus Sylvaeticus *Dent Caballina*, & *Cesilago*: de Iacobus Manlius *Herba pinale*: d'aucuns autres *Canicularis* & *Caniculata*: en François Jusquiamé, ou Hanchane: en haut Aleman *Bisfambaut*, *Seuobon*, & *Wolfsaut*: en bas Aleman *Bissen* & *Bissencrupt*.

La première espece s'appelle, à cause des fleurs brunes & noires, *Hyoisycamus niger*, c'est à dire Jusquiamé noir.

La seconde se nomme *Hyoisycamus luteus*, c'est à dire Jusquiamé jaune, pource quelle porte fleurs jaunes.

La tierce qui a les feuilles & fleurs blanches, s'appelle *Hyoisycamus albus*, c'est à dire Jusquiamé blanc.

## LE CHOYS.

Le Jusquiamé blanc est le plus convenable pour vser en medecine. Les deux autres ne sont pas si propres, principalement le Noir, lequel est le plus nuisible.

## LE TEMPERAMENT.

La semence de Jusquiamé blanc, & les feuilles, sont froides jusques au tiers degré. Les deux autres sont encorés plus froides, presque jusques au quatriesme degré, fort nuisibles à la nature de l'homme.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le jus tire hors des tiges & feuilles de Jusquiamé encorés verd, & puis seché au Soleil, est fort vilene et meslé parmy les collyres propres contre chaleurs, fluxions, & humeurs des yeux, & aux douleurs d'iceux, & des oreilles, & de la matrice.
- B Iceluy induict avec farine de froment, ou d'orge rostie, prouffite grandement contre phlegmons & apostemes chaudes des yeux, des pieds, & autres parties du corps.
- C La graine de Jusquiamé est bonne pour la toux, defluxion de catarrhes subeils tombans sur les yeux, ou sur le thorax, contre toutes douleurs grandes, flux de fordonné des femmes, & tout flux de sang, prinse au poids d'un obole avec hydromel, c'est à dire eau mielée.
- D Icelle adoucit douleurs de goutte, guerit enflures des genitoires, & appetisse les mammelles engrossies apres l'enfantement, si on l'applique dessus broyée en vin: On la peut aussi mesler parmy tous emplastres anodyns.
- E Les feuilles à part pilées avec farine d'orge rostie, ou meslées parmy autres vngües, emplastres ou medecines, appaissent aussi toutes douleurs.
- F Si on lave les pieds de la decoction de Jusquiamé, ou si on la donne en clystere, elle fait dormir. Pareille vertu a la graine induict avec huile ou quelque autre liqueur sur le front, & si on faire beaucoup l'herbe & ses fleurs.
- G La racine de Jusquiamé cuict en vinaigre, puis tenue en la bouche, appaise douleurs de dents.
- H Brief, les feuilles, tiges, fleurs, graine, racine & jus de Jusquiamé, resroident toutes inflammations, font dormir, & appaissent toutes douleurs: toutesfois cest refroidement ne prouffite pas tousiours: car par iceux qui se font d'herbes fort froides comme Opium, Jusquiamé, Cigue, & semblables, la maladie ou douleur n'en est pas ostée, mais le corps & partie douloureuse est seulesment

ment, endormie & amortie, & par ainsi ne sentent pas la douleur. Mais quand ilz reuient à leur sentiment, la douleur est plus grande que deuant, & la maladie pire à guerir, par le fort refroidement de ces herbes, lesquelles induisent aux malades (principalement à ceux qui sont de froide complexion) de fortes conuulsions. Pourtant il ne faut vser de ces herbes pour appaiser douleurs, si ce n'est en cas de grande necessité, quand la douleur est grande & intolérable.

## LES NVISANCES.

Les fueilles, graine, & ius, du Iusquiamo noir principalement, lequel est fort commun en ce A pais, prins seul, ou avec du vin, induit rage, & long somme, bien pres comme yurongnerie, laquelle dure long temps & en la fin tue la personne.

Les fueilles ou ius prins en trop grande quantité, ou par trop longue espace de temps, ou appliqués sur quelque partie qui n'en a besoing, estaindent la chaleur naturelle d'icelle, & amortissent & rendent ledit membre noir & le font en la fin pourrir & tomber; & de fait font aucuns fois cause de la mort de celuy qui en vse.

## De la Cigue.

## Chap. XCIII.

## LA FORME.

Cicuta.

Cigue.

LA Cigue a vne tige haute, & longue, de cinq ou six pieds de haut, fort genouillée, grosse, creusée par dedans, comme la tige du Fenouil, herbacée par dehors, & semée de petites taches rouges, bien pres comme la tige de la grande Serpentaire. Les fueilles grandes, dru & menu déchiquetées, bien pres semblables aux fueilles du Chervueil, beaucoup plus grandes toutesfois, de forte odeur & mal plaisante. Les fleurs sont blanches, croissans par esmouchettes, lesquelles se tournent en graine blanche & platte. La racine est courte, & peu creusée par dedans.

## LE LIEV.

Cette herbe mauuaise & dangereuse croist en lieux incultivés, sous les hayes & pres des buissons en l'ombre & à la fraîcheur.

## LE TEMPS.

La Cigue fleurit pour la plus part en Iuillet.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *κάρτερ* : en Latin *Cicuta* : en François Cigue : en haut Aleman *Schiesling*, *wutzerling*, *wundtscherling*, & weterichien bas Aleman *Scherling*, & *Dul* & *heruel*, ou *Dulle petreselle* : d'aucuns Apothicaires indoctes *Hamel*, lesquels combien qu'ilz ayent esté par plusieurs fois admonestés de mout de gens sçauans, comme de *Leoniceus*, *Manardus*, & plusieurs autres, ilz ne veulent toutesfois laisser leur erreur, mais demeurent obstinés en leur ignorance, vsans encores iournellement, au lieu de la graine de Rue, appellée en Grec *Hamel*, de la graine de Cigue (laquelle ilz tiennent peruersement pour *Hamel*) & la meslans iournellement en leurs medecines.



## LE TEMPERAMENT.

La Cigue est fort froide, ataignant bien pres le quatriesme degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Cigue appliquée sur les testicules de ieunes enfans, les fait demeurer en vn estat, sans deuenir plus grands. Pareillement appliquée sur les mammelles de ieunes pucelles, les fait demeurer petites, toutesfois elle rend ceux qui en vsent, maladiex & debiles tous les iours de leur vie.
- B Icelle induicte & appliquée en forme d'emplastre sur feux sacrés & inflammations, appaise la douleur, & oste la chaleur, comme le Iusquisme & Opium.

## LES NVISANCES.

La Cigue est fort mauuaise, dangereuse, nuisible & venimeuse, tellement que celuy qui la prend en meurt, si n'est qu'il boiue apres de bon vin & bien vieil: car tel vin bon, apres auoir prins de la Cigue, surmonte le venin & gucrit la personne. Mais si on prend le vin & la Cigue ensemble, la vertu du venin en est rendue plus grande, & tue incontinent, tellement que celuy n'est aucunement secourable qui a prins de la Cigue avec du vin.

Fin de la Tierce partie de l'Histoire des Plantes.



# LA QUATRIESME PARTIE DE L'HISTOIRE DES PLANTES, TRAI- TANT DES ESPECES, FORME, NOMS, VERTVS & Operations du Blé, Legumes, Chardons, & de leur semblables.

PAR REMBERT DODOENS.

Du Blé, ou Froment.

Chap. I.

## LES ESPECES.

**L**es Anciens ont fait & décrit diuerses sortes de Blé, selon les pais & lieux desquelz on rap-  
portoit à Rome, & aux autres grandes villes. Mais ceux qui ne se foucient de tant de diffé-  
rences, comme Columella & Pline, ilz diuisent seulement le Blé en trois especes : dont l'vne est  
appellée Robus : l'autre Siligo, lesquelles deux font fruct d'yuer : & la tierce Setanium, qui est  
Blé d'axté. Toutesfois à la verité ce n'est qu'vne espece, & la difference consiste seulement en ce-  
là, que l'vn est vn peu plus noir ou plus blanc que l'autre : & que l'vn est semé deuant, & l'autre  
apres l'yuer.

### LA FORME.

Tout Blé a le festu ou chaulme rond & haut, souuent plu-  
sieurs sortans d'vne racine, ayant trois ou quatre ioinctures ou  
neuds, plus grand & plus haut que le festu de l'Orge, couuert  
de deux ou trois fueilles estroictes & herbuës, au sommet du-  
quel croist l'espi bien haut par dessus les fueilles, qui contient  
les grains sans aucun ordre, bien amassés, & non barbus. La ra-  
cine est grosse & fibreuse. **LE LIEV.**

Le Blé croist en ce pais aux champs les plus gras & meilleurs

### LE TEMPS.

Le Blé d'yuer, on le seme en Septembre ou Octobre. Le Blé  
d'axté en Mars, & meurissent tous deux en Iuillet.

### LES NOMS.

Le Froment se nomme en Grec *τροπιον* : en Latin *Triticum* : en  
haut Aleman *weyffer*, & *weyzen* : en bas Aleman *Terwe*.

La premiere espece qui est tenue de Columella pour la meil-  
leure, & ne croist pas en ce pais, s'appelle Robus, & de Pline aus-  
si *Triticum*.

La seconde espece, qui est plus legere & plus blanche, est ap-  
pellée en Latin *Siligo* : en Grec d'Hippocrates *Strygis*, & icelle  
est nostre commun froment qui croist es pais de deça, comme  
plus à plain nous auons déclaré en nostre *Historia Frugum* La-  
tine, là où nous auons aussi démontré que nostre Seigle vulgai-  
re n'est pas le *Siligo* lequel Columelle & Pline ont décrit.

La tierce espece s'appelle en Grec *τροπιον*, & *σπαρταριον* : en  
Latin *Setanium*, & *Trinitre triticum* : en François Blé de Mars : en  
bas Aleman *Zoomer terwe*.

### LE TEMPERAMENT.

Le Froment appliqué par dehors come medecine, est chaud  
au premier degre sans humidité manifeste. Mais le pain qu'on  
fait d'iceluy, est plus chaud & a plus grande vertu de meurir,  
de attirer, & digerer. L'Amydon qui est fait du Froment, est froid & sec, & vn peu astringent.


### LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Blé crud maché & appliqué est bon contre morsures de chiens enragés.

Le Blé entier prouffite à douleurs de goutte, quand on se plonge dedans iusques aux genoux  
come on trouue en Pline que Sexte Pompeie a fait, lequel en aynt ainsi vſé, fut gueri de sa goutte.  
La farine de Froment est vilement induicte avec ins de Iusquisme sur les nerfs, contre deslu-  
xion d'humours tombant en iceux.

*Triticum.*

Froment



- D** Icelle induicte avec vinaigre miellé appelé Oxymeli, oste & efface toutes lentilles & cicatrices du visage.
- E** La farine du Blé de Mars induicte avec vin & vinaigre, prouffite contre morsures de bestes venimeuses.
- F** Icelle cuiſte en forme de bouillie & leſchée, arreste le cracher ſang, & cuiſte avec burre & Menthe, est de grande efficace contre la toux, & rudesses du gozier.
- G** La fleur de farine du Froment cuiſte avec miel & eauë, ou avec huile & eauë, dissout toutes tumeurs.
- H** Le son du Froment cuiſt en vinaigre, guerit mauuaise gratelle, & appaise commencement de phlegmons.
- I** Iceluy bouly en decoction de Rue, adoucit & fait desenfler les mammelles dures & enſées.
- K** L'eau ſaiſt de farine de froment, tire les eschardes & espines dehors, des plâtes des pieds principalement. Il ouure, meurit & ſaiſt rompre toutes tumeurs & apostemes appliqué avec du ſel.
- L** Pain de Froment bouly en eauë miellée, rafreſchit & appaise tous phlegmons, principalement en y adioustant d'autres bonnes herbes.
- M** Pain frais & nouvellement cuiſt trempé en ſaulmure, guerit & efface toute rongne blanche enuieillie, & mauuaise gratelle.
- N** Amydon ſaiſt de Froment, est bon contre defluxions tombans sur les yeux, appliqué deſſus, & remplyt & guerit viceres cauerneux & playes.
- O** Amydon beu, arreste le cracher ſang, & mellé avec laiſt, adoucit les rudesses du gozier, & du thorax, & ſaiſt cracher.

## De l'Espeautre.

## Chap. II.

## LES ESPECES.

**E** Speautre est de deux sortes. L'une a communement deux grains enclos comme en vne peau, L'autre n'a qu'un grain.

## LA FORME.

L'Espeautre est de chaulme, de neuds & espiz fort semblable au Froment, sinon que le grain d'icelle n'est pas nud comme celui du Froment, mais est enclos en vne petite peau, de laquelle on ne le peut facilement purger, si ce n'est par moulin ou autres instruments. Quand les grains d'icelle sont ainsi nettoyez de leur pail le, ilz ressemblent fort au grain de Froment, en figure, & aussi de temperament, tellemēt que au bout de trois ans l'Espeautre ainsi purgée, se tourne en beau fromēt quand elle est semée, comme Pline, Theophraste, & plusieurs autres anciens escriuent.

## LE LIEV.

L'Espeautre requiert terre grasse, fertile, & bien labourée, & croist es champs hauts & descouuerts: par cy deuant on la trouuoit seulement en Grece, mais à present elle croist en plusieurs endroits d'Italie, de France, d'Allemagne, & aussi en ce pais bas.

## LE TEMPS.

On la seme comme le Froment en Septēbre & Octōbre. En Iuillet elle est meure. LES NOMS.

Ce grain s'appelle en Grec Ζυα: en Latin Zea: & des anciens Romains Semen: à present Spelta: en François Espeautre: en haut Alemā Speltz, & Winckelhorn: en bas Aleman Spette. LE TEMPERAMENT.

L'Espeautre est de pareil temperament au Froment, vn peu plus froid tout eſois, aprochant de la nature de l'Orge, & quelque peu deficcatif.

## LES VERTVS ET OPER.

- A** La farine d'Espeautre avec vin rouge, profitte grandement contre piqures de scorpions, & à ceux qui crachent ſang.

Zea. Espeautre.



Icelle avec beurre frais & non salé, ou avec suif de cheure, adoucit rudesses du gozier, & appaise la toux.

Icelle cuicte en vin & nitrum, guerit vlcères par trop humides, & purulents, la gratelle blanche de tout le corps, & douleur d'estomach, des pieds & des mammelles des femmes.

Brief l'Espeautre est de facultez fort semblable au Froment, & est vne bone nourriture tant aux hommes, qu'à toutes bestes, selon Theophraste.

Le Pain d'icelle n'est guere different au Pain de froment, mais il nourrit moins.

## De Olyra.

## LA FORME.

Olyra, selo que dit Dioscoride, est vne espece d'Espeautre, & ressemble aussi au Froment de chaulme de neuds & de croisson, sinon que les espiz ne sont pas nuds comme au Froment, mais sont velus, & ont plusieurs barbes poinctues comme les espiz de l'Orge. Le grain est aussi enclos en petus follicules come l'Espeautre, & estant nettoyé, & purgé de sa peau, il est fort semblable au grain de Froment.

## LE LIEV.

Ce Blé croist en plusieurs lieux d'Allemagne.

## LE TEMPS.

On le seme aussi deuant l'hyuer, & on le sive en Juillet.

## LES NOMS.

Ce grain s'appelle en Grec *ὄλυρα*, Olyra; en Latin de Pline au li. 18. chap. 10. *Aryseta*; en haut Aleman *Am-melhorn*.

Il ne s'appelle point en Latin *Siligo*, comme aucuns pensent, lesquels ont mal traduit ce mot Grec Olyra, en Latin *Siligo*, comme plus à plain nous auons déclaré en nostre *Historia Frugum*.

## LE TEMPERA. ET VERTVS.

Comme ce grain est vne espece d'Espeautre, ainsi aussi luy ressemble il fort de Temperament & de vertus, estant au milieu du Froment & de l'Orge, conuenable à tout ce à quoy l'Espeautre est bonne.

Le Pain fait d'iceluy, ressemble aussi aucunement au Pain de Froment, comme Galien escrit au premier de Alimentis.

## Du Meteil.

## Chap. IIII.

## LA FORME.


Ce Grain ressemble fort à Olyra, telement que Mnesitheus, selon que Galien raconte, a tenu ce Blé & l'Olyra pour vne mesme espece. Il a le chaulme, les neuds, & les espiz barbus comme Olyra, sinon que ses espiz sont plus barbus, plus poignans, plus ronds, & plus amassés en vn. La semence est aussi couuverte d'vne petite peau, au reste semblable au grain de Froment. Et si on le seme nettoyé de sa peau & paille comme l'Espeautre, il se tourne aussi en bon Froment en dedens trois ans comme l'Espeautre, ainsi que dit Pline.

## LE LIEV.

Ce Blé ne croist pas par tout, & n'est guere commun, mais il se trouue en aucuns lieux d'Alsace pres des montaignes & forests, là ou communement repairent les Pores sangliers: & les payzans le sement tout expressement pour les Sangliers, car ilz viennent bien peu souuent paistre ce Blé à cause de ses espiz fort barbus & piquans, qui leur nuisent, comme escrit Hierosime Bouq.

## LE TEMPS.

Ce Blé est semé & sive comme l'autre Froment & Espeautre.



## LES NOMS.

Ce Grain se nomme en Grec  $\tau\upsilon\phi\alpha$ ; en Latin *Typha*, de Ruellius *Typha cerealis*; en Aleman pour ce que c'est vn Grain estrange, & non guere commun ne s'esché voyer, *Römische Ceter*, c'est à dire Blé d'Italie; en François Meteil.

Il y a aussi vne autre plante sauvage croissant entre les roseaux en lieux humides, appelée aussi *Typha* de Dioscoride, laquelle nous descrirons cy dessous au Chap. L. IIII. à la difference de laquelle Ruellius a appellé ceste espee de Grain *Typha cerealis*, comme dessus est dict.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

A Le Meteil n'est guere different en temperament & facultez à Olyra, il n'est pas toutesfois si bon, ne si conuenable.

B Le Pain d'iceluy n'est pas si bon que celui qui est fait d'Olyra, signamment quand il est vieil cuit, car quand il est nouvellement cuit & encore chaud, il est meilleur & plus sauoureux que Pain d'Olyra: il ne demeure pas toutesfois long temps bon, car incontinent qu'il est froid & fenuieillist, il deuiet mauuais, comme Galien au premier de Alimentis escrit.

## Du Zeopyron. Chap. V.

## LA FORME.

Zeopyron est vn Blé estrange fort semblable à l'Espesautre de festu, de neuds, & d'espi: le grain toutes fois a semblable nature que le Froment, car il n'est pas enclos de paille comme le grain d'Espesautre, mais sort hors en le battant comme le Froment: il a la couleur brune tirant sur le iaulne, ainsi que le froment.

## LE LIEV.

Ceste espee de Blé croist aussi en aucuns endroits d'Allemagne.

## LE TEMPS.

On le seme & s'aye comme les autres Bleds.

## LES NOMS.

Ce Blé comme escrit Galien au premier de Alimentis a esté en Bithynie par cy deuant appellé en Grec  $\tau\epsilon\omicron\pi\upsilon\gamma\omicron\upsilon\gamma$ , *Zeopyron*, lequel nom est composé de *Zea*, c'est à dire Espesautre, & *Pyros* c'est à dire Blé, lequel luy cōvient fort bié, pour ce qu'il a similitude avec tous deux, & est comme vn moyen entre iceux. Les Cappadociés l'ont aussi appellé *Gymnorithos* c'est à dire Orge mondé ou pelé. Les Alemans l'appellent *Kern*, *Drinckethern* & *Kernsamen*.


Ce n'est pas vne espee de Far, comme aucuns pensent, veu que le grain d'iceluy sort facilement de sa paille car toutes especes de Far demeurēt encloses en leurs pellicules comme l'Espesautre, ainsi que plus amplement nous auons declairé en nostre *Historia Frugum*.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

A *Zeopyrum* est de mesme temperament que l'Espesautre, ou non guere different.

B Le Pain d'iceluy est meilleur q̄ le pain de Bryza, & est cōme milieu entre Froment & Bryza, tesmoing Galien

De Bri-



## LA FORME.

BRIZA ressemble aussi au commencement à l'Espeautre, sinon qu'elle a les espiz & festus plus petis, plus courts, & plus menus. Les espiz sont barbus, les barbes aigues comme celles de l'Orge. Le grain est couvert d'une peau comme l'Espeautre. Toute la plante avec chaume, espiz & grain est de couleur brune en rouge, & on en fait du pain bis, de goût fort estrange & mal plaisant.

## LE LIEU.

Ce Blé aime lieux rudes, & n'a que faire de pais plat. Il a esté trouué par cy deuant de Galien en Macedoine & en Thrace; maintenant il croist en aucuns endroits d'Allemagne là premierement apporté de Thrace comme est facile à coniecturer, laquelle les Turcs appellent à present Romanie, dont la ville capitale est Constantinoble. Il croist aussi sur les frontieres de France en Picardie comme au tour de Bethune. LE TEMPS.

On le seme en Septembre, & on le sève en esté come autres fruis semblables. LES NOMS.

Ce Blé a esté par cy deuant appelé *Βριζα*, Briza, en Thrace & Macedoine; à present en Allemagne il s'appelle le *Bischen*, *Sant Peters hout*, & *Sinhou*, c'est à dire, Simple grain. Il semble bien à voir que ce soit le Blé qu'on appelle en François Locar, & Froment rouge, duquel on fait du pain fort bis ainsi que dit Ruellius, lequel il appelle *Fruentum locale*, & pense que ce soit une espece de Far, ce qui n'est vray semblable, car les espiz de Far n'ont nulles barbes (comme nous dirons plus à plain en autre endroit) & les espiz de ce Blé sont du tout barbus.

Ce n'est pas aussi un Zea, ou Espeautre, comme aucuns pensent. Car de toutes les especes d'Espeautre on en fait du beau pain, fort semblable au pain de Froment, comme deuant est dict, mais de ce Blé on en fait pain fort bis, & mal saoureux.

## LE TEMPERAM. ET VERTVS.

Quel usage ce grain a en Medecine, n'a esté décrit, ne meisme esprouvé de personne que ie sache. Le pain d'iceluy est fort pesant, nourrit mal, & est mal sain.

## Du Seigle. Chap. VII.

## LES ESPECES.

Comme le Froment décrit au premier chapitre, a difference selon le temps auquel il est semé, aussi a le Seigle; car l'un est semé deuant l'huyver, & l'autre apres l'huyver.

## LA FORME.

Le Seigle produit d'une racine, six ou sept, aucune fois aussi d'auantage de festus, longs, gresles, à quatre ou cinq nœuds, lesquels en terre fertile & grasse croissent à la hauteur de six pieds ou d'auantage, semblables au festu du Froment, plus tendres toutesfois, plus gresles, & plus longs. Au sommet des tiges croissent longs espiz barbus à barbes poignantes, comme les espiz de l'Orge, non pas toutesfois si barbus ne si poignans, lesquels quand le grain est meur, pendent en bas, là dedés est le grain plus estroict & beaucoup plus noiratre que le Froment, & moindre q' l'Orge, & n'est pas couvert de petites peaux, mais fort facilement. D'iceluy on fait du pain fort bis.



L'autre Seigle ressemble du tout au precedent, sinon qu'il a les festus & espiz plus petis.

## LE LIEV.

Le Seigle croist par tout le pais bas, on le trouue aussi en plusieurs autres regions, il ayme terre maigre, seche & sablonneuse, là ou nulz autres Blés ne grains peuuent croistre, comme es lades de Brabant, & autres semblables lieux secs. Toutesfois le meilleur est celuy qui croist en terre grasse & fertile.

## LE TEMPS.

On seme le premier en Septembre, & l'autre en Mars, & meurisent tous deux en Iuillet.

## LES NOMS.

Ce grain s'appelle en Latin de Pline *Secale*: en François Seigle: en haut Aleman *Rochen*: en bas Aleman *Rogge*: en Italien *Segala*: d'ancuns *Asta*, des autres *Farrago*, combié que ce ne soit le vray *Farrago*, car *Farrago* n'est autre chose qu'Orge, vesles & semblables grains mellés ensemble & semés pour soufrage des bestes, lesquels on s'aye auant qu'ils soient meurs, pour en paistre les beufs, vaches, cheuaux & semblables bestes.

Que ce ne soit point *Silligo*, nous l'auons bien au long & amplement demonsté en nostre *Historia Frugum Latine*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Seigle appliqué au dehors du corps, est chaud & sec iusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La farine de Seigle mise en sachet sur la teste, guerit douleurs de teste enuieillies, & seche le cerueau.
- B Leuain fait d'icelle, tire hors les espines & eschardes, & meurit & rompt toutes tumeurs & apostemes. De fait il a plus grande vertu en cela, que le Leuain de farine de Froment.
- C Pareille vertu a aussi pain de Seigle avec du beurre, non pas toutesfois si forte que le leuain.
- D Le pain de Seigle est pesant & mauuais à digerer, seulement conuenable à ceux qui travaillent, & sont bien peu en repos, ou à ceux qui ont fort estomach.

## De l'Orge. Cha. VIII.

## LES ESPECES.

ORge est de deux sortes, grã de & petite. La grande ou grosse se seme deuant l'hyuer. La petite au Printemps.

## LA FORME.

- 1 L'Orge a le chaume comme le Froment, plus court toutefois, & plus fragile, ayant six neuds ou d'auantage. Les espiz sont longs & fort rudes, couverts de fort longues barbes poinctues, là ou les grains sont situés par ordre, aucunesfois en quatre ou plus de lignes, le grain ressemble au Froment, & est bien couuert de sa peau comme l'Espeautre.

- 2 L'Orge qu'on seme au Printemps ressemble fort à l'autre, si nō que l'espiz n'a q̄ deux ordres.

## LE LIEV.

L'Orge est fort commun en tous pais, & ayme terre grasse & fertile.

## LE TEMPS.

- 1 On seme la grosse Orge en Septembre, & on la s'aye en Iuillet, aucunesfois aussi en Iuin.

- 2 La petite Orge on la seme au Printemps, & est meure en Aouust

LES

*Hordeum polystrichum.*  
Grosse Orge.



*Hordeum distichum.*  
Petite Orge.



LES NOMS.

- L'Orge s'appelle en Grec *κριθή*; en Latin *Hordeum*; en François Orge; en Aleman *Gerste*.  
 1 La grosse Orge s'appelle *μαυριχη*; en Latin *Hordeum catharticum*; en haut Aleman *Groß gerst*; en bas Aleman *winter Gerst*.  
 2 La petite s'appelle *δυσιχη*, & *Galinum hordeum*; en haut Aleman *frude gerst*; en bas Aleman *Zoomez gerst*.

LE TEMPERAMENT.

L'Orge est froid & sec jusques au premier degré.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

La farine d'Orge cuïste avec figues en hydromel, dissout phlegmons & œdemes, Et amollit A & meurit toutes tumeurs avec poix, résine, & siente de pigeon.

Icelle meslée avec poix liquide, huile, cire, & urine d'un ieune enfant, digere & amollit les escrou B elles du col.

Icelle avec Melilot & testes de Psaut, fait cesser douleurs de costé, & meslée avec semence de C Lin, Fenugrec, & Ruë, est utilement appliquée sur le ventre contre douleurs & ventosités des boyaux.

Orge avec myrte, ou vin, ou poyses sauvages, ou roïces, ou escorce de pomme de Grenade, D arreste flux de ventre.

On fait vn cataplasme de la farine d'icelle contre mauuaise gratelle & galle. E

Icelle meslée avec vinaigre ou avec coings, appaise douleurs podagriques. Et si on la fait F cuire avec vinaigre & poix, & appliquée au tour des ioinctures, garde que les humeurs ne descendent en icelles.

On en use aussi és viandes, & on en fait du pain, lequel ne nourrit pas si bien que le Froment G ou Espeautre.

Du Mil, ou Millet.

Chap. I X.

LA FORME.

Mil a les festus velus, à sept ou huit neuds: les fuicllés longues & arundineuses; au sommet des festus viennent les espiz fort dursés comme le plumace du Roseau, bien pres comme vne espouffette, là ou croist la semée, fort vnie, bien pres semblable au Lin, sinon qu'elle n'est pas si noiratre.

LE LIEV.

Le Mil ayme terre humide & argilleuse, il croist en abondance en Italie & en Espagne.

LE TEMPS.

On le seme au Printemps, & meurit en esté, on le peut garder long temps, tellement qu'il dure bien cent ans bon sil est gardé en lieu là ou le vent ne frappe point.

LES NOMS.

Ceste plante s'appelle en Grec *κλῆμα*; en Latin, & pareillement és Boutiques *Milium*; en François Mil ou Millet; en haut Aleman *shisen*; en bas Aleman *stro*, ou *stisse*.

LE TEMPERAMENT.

Le Millet est froid au premier degré, & sec bien pres jusques au tiers, & de parties subtiles.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Le Mil rosty & tout chaud mis en vn sachet, puis appliqué sur le ventre, donne allegeance aux trenchées & douleurs d'iceluy, & appaise toutes douleurs de toutes parties, principalement des nerfs: & sert bien à secher tout ce qu'il conuient secher, estant fort propre pour secher le cerueau & le conforter.

B En defaut d'autre Blé on peut faire aussi du pain de Millet, lequel serre le ventre, & prouoque l'vrine, mais il nourrit bien peu, & est fort maigre:

Milium. Millet.



## LES ESPÈCES.

**B**Lé de Turquie est d'une, & de plusieurs sortes. On n'en trouve en ce pays qu'une espèce qui est à la figure & croisson, mais quant à la couleur du grain il est fort divers, car l'un porte le grain brun, l'autre rouge, le tiers jaune, & le quatrième blanc, laquelle couleur demeure aussi à l'épi & à ses fleurs.

## LA FORME.

Ce Blé est une plante fort étrange, ne ressemblant à aucun autre grain : car il produit sa graine ailleurs que là où il porte ses fleurs, ce qui est contre la nature des autres plantes qui portent leur fruit là où elles ont porté la fleur. Ce Blé porte le chaume ou festu haut, & fort long, rond, gros, ferme, & en bas auprès de la racine brunâtre, ayant plusieurs neuds d'où dependent longues feuilles & larges, comme feuilles de Roseau : Au sommet des tiges croissent les épis vuides de grain, & qui portent seulement la fleur, qui est tantost brune, tantost rouge, maintenant jaune, & quelque fois blanche, selon la couleur du fruit qui sort après. Les épis croissent à costé des tiges entre les feuilles, lesquels sont gros & espés, revestus de plusieurs feuilles, tellement qu'on ne les peut voir, portans au sommet plusieurs longs filets qui sortent par le bout des feuilles courans l'épi, & se montrent jusques à ce que l'épi soit meur. Le grain qui croist aux épis est d'environ la grosseur d'un pois, de couleur au dehors maintenant brunâtre, maintenant rouge, maintenant blanche, blé par dedans & doux en saveur, croissant au tour des épis par ordre en neuf ou dix rangées.

## LE LIEU.

Ce Blé croist en Turquie, là où il est en usage quand il y a cheroté, de là est venu en ces pays, & les Herboristes le sement en leurs jardins pour chose nouvelle. Il croist aussi à l'Inde, d'où premièrement il a été apporté à Rome du temps de l'Empereur Nero, selon qu'écrivit Plin.

## LE TEMPS.

On le sème en Avril, & est meur en Aoust.

## LES NOMS.

Plin appelle ce Blé *Milium Indicum* : maintenant on l'appelle *Fruentum Turcicum*, & *Fruentum Astaticum* : en François Blé de Turquie ou Blé Sarrazin : en haut Aleman *Turcken horn* : en bas Aleman *Toschesosen*.

## LE TEMPERAMENT ET VERTUS.

- A** On n'a pas encore certainement expérimenté le Temperament & Vertus de ce Blé.  
**B** Le pain fait d'iceluy est sec & dur, contenant en soy bien peu de gresse, parquoy on peut facilement iuger, qu'il nourrit fort peu, qu'il est mauvais à digérer, & qu'il n'a aucune comparaison avec le pain de Froment, comme aucuns ont faullement pensé.

## Du Phalaris.

## Chap. XI.

## LA FORME.

**P**halaris a le chaume rond, à trois ou quatre neuds, & feuilles estroictes & herbuës, ressemblant à l'espeautre & Froment, plus petit toutes fois & plus court, sur lequel croist un épi court, gros, & amassé, produisant la graine de couleur palle, comme le Mil, ressemblant en figure à la semence du Lin.

## LE LIEU.

Ce grain croist en Espagne, & à l'Isle de Canare. Il est semé en ce pays seulement des Herboristes.

Miliun Indicum.

Blé de Turquie.





# Du Panic. Cha. XII.

## LE TEMPS.

Il meurt en ce pais en Juillet & Aoust  
LES NOMS.

Ce grain se nomme en Grec *παράσις*  
en Latin aussi *Phalaris*; en Alemán *Spätsch*  
fact, & *Saet Van Lanarien*; c'est à dire:  
Grain d'Espagne & de Canare. Aucuns  
Apothicairens le vendent pour Millet.

## LE TEMPERAMENT.

Il est de nature fort semblable au Millet.

## LÉS VERTUS ET OPER.

- A Le jus de Phalaris beu avec eauë, pros-  
fitte cõtre douleurs de vesie. A ce mes-  
me vaut la grainë diceluy mis en pou-  
dre, & prins plein vn cuillier avec eauë.

# Du Panic. Chap. XII.

## LA FORME.

- Panic prouient comme le Millet, mais  
ses feuilles sont plus poinctues & ru-  
des. Il a le festu rond & plein de neuds,  
bien souuët dix en vn festu, & à chascue  
neud vne feuille longue & estroicte. Les  
espiz sont ronds, & penchent vn peu en  
bas, ausquelz croist vne grainë petite, nõ  
guere differente à la semence de Millet,  
de couleur tantost blanche, tantost iau-  
ne, & aucunes fois brunatre.

Phalaris.



Panicum. Panic.



Sorgho.

Panic d'Inde.



Il se trouue encore vne herbe semblable au Panic, laquelle aucuns tiennent aussi pour vne espece de Panic, les Italiens l'appellent *Sorgho*. Ce grain estrige a quatre ou cinq tiges hautes, grosses, noueuses, & brunatres, recoustues de suelles longues & aigues, non guere differentes aux suelles de Roseau. Au plus haut des tiges croissent espiz gros, brunatres, plus grands & plus espes que les espiz du Panic, lesquels produisent au premier vne fleur iaulne, puis apres vne graine ronde & rougeatre, de la grosseur d'une Lentille, & vn peu poinctue.

## LE LIEV.

Le Panic n'est guere cognu en ce pais, il croist en aucuns lieux d'Italie & de France, & il s'yme le grauer & terre sablonneuse, il ne demande guere de pluye ou d'humidite, car quand il puet be auouer, il laisse pendre ses suelles, comme escrit Theophraste.

Le Panic d'Inde, est aussi vn grain estrange, & ne se trouue en ce pais, sinon es iardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

On seme le Panic au Printemps, & on le s'aye quarante iours apres es pais chauds. Les Gascons le sement apres qu'ilz ont s'aye l'autre Blé, toutesfois encores est il meur auant l'hyuer, come dit Ruelle. En ce pais quand on le seme en Aueil, il est meur en Iuillet.

On seme aussi le Panic d'Inde au Printemps, & est meur à la fin de l'esté.

## LES NOMS.

Le Panic s'appelle en Grec *Σοργός* de Theophraste aussi *μαλινός*: en Latin *Panicum*: en Italie à present *Melica*: en haut Aleman *ffraich*, *femich*, & *Syrdespenst*: en bas Aleman *Panichosen*.

Le Panic d'Inde est pour le present appelle des Italiens *Sorgho*, & à selon des Alemans *Sorgsamen*, & des Brabançons *Sorgsfaet*. Il semble que ce soit vne espece de *Panicum*, & nō de *Far*, come aucuns cudent. Ainsi que nous auons plus amplement declaré en nostre *Historia Frugum*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Panic est de temperament froid & sec.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La graine de Panic beuë au ec du vin, guerit la dysenterie, & prinse deux fois le iour boulye en lait de cheure, arreste le flux de ventre, & appaise trenchées.
- B On en fait aussi du pain comme du Millet, mais il nourrist moins, & serre moins que le pain de Millet.
- C Le Panic d'Inde ressemble au Panic en Temperament & fa cultés.

## De l'Auoyne.

## Chap. XIII.

## LA FORME.

Auoyne comme dit Dioscoride ressemble aucunement au Froment de suelles & festu noueuses. Au plus haut des festus viennent les espiz partis en plusieurs queuës, estendues loing l'une de l'autre, desquelles la graine depend poinctue, & tousiours deux ensemble, bien couuerte de la peau.

## LE LIEV.

L'Auoyne est commune en ce pais, & on la seme par tout es champs.

## LE TEMPS.

L'Auoyne se seme au Printemps, & en Aouit est elle meure & s'ayée.

## LES NOMS.

L'Auoyne s'appelle en Grec *Σοῦρον*: en Latin *Avena*: en haut Aleman *Sauer*: en bas Aleman *Sauer*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Auoyne seche fort, & est de temperament aucunement froid comme recite Galien.

## LES VERTVS ET OPER.

- A L'Auoyne est bonne dedis tous emplistres & cataplasmes ausquelz l'Orge est bonne, on peut aussi vser de la farine d'Auoyne au lieu de la farine d'Orge, attendu que l'Auoyne, come me recite Galien, deseche, & digere sans mordication & acrimonie.



La farine d'icelle trempée en vinaigre, oste les lentilles & taches du visage.  
Icelle prise en viandes, arreste flux de ventre.  
Le pain d'icelle nourrist bien peu, & n'est guere conuenable à la personne.

## De la Dragée aux cheuaux.

## LA FORME.

LA Dragée aux cheuaux a les tiges rondes, striées, rougeatres, enuiro deux pieds de haut ou d'auantage: les fueilles larges, poinctues par le bout non guere differentes aux fueilles de L'yerre, ou du Lizeron commun. Il vient à costé, & au sommet des tiges de courtes queués, sur lesquelles croissent beaucoup de fleurs blanches, amassées ensemble, & puis vient la graine, qui est triangle & grise, enlosé dedans vne petite pellicule, comme la graine du Lizeron noir, décrit en la Tierce partie.

## LE LIEV.

On la seme en terre maigre & seche, & est fort commune en la Champagne de Brabant.

## LE TEMPS.

On la seme au Printemps, & en esté, apres que le Blé est sayé, & est meur neuf ou dix semaines apres.

## LES NOMS.

Ceste Plante & sorte de Grain s'appelle en François Dragée aux cheuaux: en haut Alemā s'heydent hoist: en bas Aleman Hochweydt, selon laquelle appellation nous l'auons nommée Tragorophon, Au cuns autres Fagotrisium. Quelle n'est Ocimum décrit par Columella, nous l'auos amplement déclaré en nostre Historia Frugum, là ou nous auons aussi démontré, que elle n'a pas esté cognue des Anciens.

## LE TEMPERAMENT.

Ce grain est sans faute nulle chaud, & non guere sec.

## LES VERTVS ET OPER.

De la farine de Dragée aux cheuaux on en fait de la boulie avec eau, & des gâteaux qui sont de legere digestion, lachent legerement le ventre, & prouquent l'urine, toutesfois ilz ne nourrissent guere.

Le Pain qu'on en fait est humide, & aigueux, sans donner grande nourriture.

Elle n'a autre vertu que ie sache, sinon qu'on donne l'herbe encores verte pour fourrage aux bestes, & la graine aux pouilles qui en peu de temps s'en engressent.

## Chap. XIII.

## Tragorophon.

## Dragée aux cheuaux.



## De l'Yuraye, ou Gasse.

## Chap. XV.

## LA FORME.

L'Yuraye est vne peste du Blé, principalement du Froment, & ressemble au Froment de chaume noueux & de fueilles, sinon que les espiz sont autres que ceux du Froment ou du Seigle, car ilz sont partis en mout de petis espiz, croissants à costé de la tige au plus haut, ou le grain est contenu, de la figure d'un grain de Froment bien pres, beaucoup toutesfois plus petit.

## LE LIEV.

L'Yuraye croist souuent entre le Froment, & se trouue aussi aucunesfois entre l'Orge, principalement en terre grassie, & là ou il y a premier eu du Blé.

## LE TEMPS.

Il meurit avec le fromét, & autre Blé.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ἀρακά*, *ἀρακά* en Latin *Lolium* des Arabes *Zizania* en François Yuraye, ou Gasse.

## LE TEMPERAMENT.

L'Yuraye est chaude jusques pres du tiers de degré, & seche jusques au second.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La farine d'Yuraye induicte avec du sel, & la racine de Raifort, reprime vices rongeurs, malings & pourris.
- B Icelle avec soulfre & vinaigre, guerit le feu-volage, & mauuaise graille, induit este dessus.
- C Icelle cuicte en vin avec fiente de pigeon & huile de semence de Lin, & appliquée en forme de Cataplasme sur tumeurs & tumeurs, elle les refout & guerit.
- D Elle tire hors aussi toutes eschardes & espiens, & fait meurir & ouvrir les tumeurs, & apostemes.
- E Icelle avec hydromel, ou comme dit Pline avec Oxymel, appaise douleurs de goutte, & sciaticque induicte dessus.
- F On l'applique sur le front avec gresse d'oyson, pour oster & guerir douleur de teste.
- G On a aussi experimenté que l'Yuraye mise en la bierre, trouble le cerveau & enyure.

## De Aegilops.

## Chap. XVI.

## LA FORME.

- A Egilops est une herbe sterile, ayant le festu & les facilles semblables à l'autre Blé, principalement non guere differente au Seigle, car le chaume d'icelle est plus menu que celui du Froment ou Orge. Au sommet duquel croissent espiz espanis, bien pres semblables à ceux de l'Auoyne, lesquels contiennent une graine menue, gristre, enclose dedans petites peaux, blé amassée ens semble au bout des queues de l'espi, laquelle est beaucoup moindre, plus menue, & plus espes amassée q la graine d'Auoyne

On

Lolium.


Yuraye.



Aegilops.

Melampyrum.

Blé noir.



1 On peut bien mettre avec ceste herbe, celle que les Brabançons appellent *Prestbœmen*, cest à dire Fleur de cheual, laquelle a esté descrite au second liure entre les fleurs sauuages qui croissent volontiers entre le Blé: car sa graine ressemble aussi au grain de Froment, & est vne peste du Blé, principalement du Froment, comme dit Galien aux liures de Alimentorum facultatibus.

LE LIEU.

On en trouue beaucoup entre le Seigle, souuent aussi entre le Froment & l'Orge.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *ἀγίλωπος*: en Latin *Agilops* & *Festuca*: en haut Aleman *Dorf*: en Brabançon *Drauisch*.

LE TEMPERAMENT.

Le *Agilops* est chaud selon le tesmoignage de Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les feuilles verdes induictes avec farine de la graine d'*Agilops*, guerissent les fistules, celles A principalement qui sont aux coings des yeux, appellées *Agilops*.

Icelle cuicte en la biere, fait aussi pesanteur de teste, & vne maniere d'yurogenie, comme B l'yursye, & la graine de celle que les Brabançons appellent *Prestbœmen*.

De Vstilago.

Chap. XVII.

LA FORME.

*Vstilago.*

Brullure.

V *Vstilago* est vne maladie qui vient aux fruiçts qui portent espi, principalement entre l'Auoine. Elle est, auant que produire l'espi, fort semblable à l'Auoine, mais quand elle commence à produire l'espi, au lieu d'un bon espi il y vient un espi noir, chargé de poudre noire.

LE LIEU.

Elle croist pour la plus part entre l'Auoine comme dit est, aucunes fois aussi entre le Froment.

LE TEMPS.

Elle se trouue le plus souuent en Auri, quand le Soleil luit bien chaud, & que puis vne pluye ensuyt.

LES NOMS.

Ceste herbe sterile s'appelle maintenant *Vstilago*, cest à dire Brullure: en haut & bas Aleman *Draut*.

LE TEMPERAM. ET FACVLTEZ.

*Vstilago* n'a aucune propriété en Medecine, & ne sert à rien, mais nuit plustost à toutes semences.

De la Feu.

Chap. XVIII.

LES ESPECES.

1 Il y a deux sortes de Feu, Domestique & Sauuage. La Domestique est derechef de deux fortes, Grande & Petite.

LA FORME.

1 La grande Feu domestique a la tige quarrée, droicte, creuse. Les feuilles croissent sur courtes queuës, & sont à chacun costé l'une contre l'autre, longues, & espesses. Les fleurs viennent à costé des tiges, blanches, ayans vne tache noire ou brune: Apres lesquelles passées sur viennent de longues siliques, grosses & rondes, douces par dedans, & velues, ou sont encloses les Feuës, de couleur blanche pour la plus part, aucunes fois brunatre, plates, bien pres semblables à l'ongle de la main ou du pied d'une persone.

2 La petite Feu domestique, ressemble à la deuandicté de tiges, feuilles, fleurs, & siliques lanugineuses, sinon qu'elle est de tous points beaucoup moindre. Le fruiçt n'est pas aussi si plat, mais plus rond, & beau coup moindre.

3 La Feu sauuage a aussi la tige quarrée, & creuse, comme la Feu domestique. Les feuilles ressemblent aux feuilles de la Feu, sinon que le pedicule ou les feuilles croissent, a au bout des clauicules, comme la feuille des Pois. Les fleurs sont purpurées. Les siliques plates, douces aussi par dedans, & lanugineuses, non pas si fort toutes fois comme celles de la Feu domestique. Le fruiçt est tout rond, fort noir, & non pas plus grand qu'un Pois cõmun, de saueur fort ingrate, & quand on le mache, emplissant la bouche de grande puanteur.



*Phaselus sativus.*  
Feue commune.



*Phaselus sylvestris.*  
Feue sauvage.



#### LE LIEV.

La Feue domestique croist és jardins & champs là où on la plante. La Grande est la plus commune. La Sauvage se trouue chez les Herboristes.

#### LE TEMPS.

On plante les Feues en Avril, & elles sont meures en Juillet.

#### LES NOMS.

Les Feues se nomment en Grec *Φασόλιον*, de Dioscoride aussi *Phasolion*; en Latin *Feseli*, maintenant és Boutiques & du commun *Fabe*; en haut & bas Aleman *Boonen*.

La Grande s'appelle en Latin *Phaselus maior*, ou *Feselus sativus maior*; en Alemá *Groote Boonen*.

L'autre se peut bien appeller *Feseli minores*, c'est à dire Petite feue; en Brabant *Zeeusche Boon* & *Peerde Boonhens*; Que ceste Feue commune ne soit le Legumen appellé des Anciens *Cyamos* & *Faba*, a esté démontré en nostre *Historia Frugum*.

La Sauvage se peut bien nommer en Latin *Feselus sylvestris*, & *Feselus niger*, c'est à dire Feue sauvage, & Feue noire; en Aleman *Wilde Boonen*, & *swerte Boonen*, ou *Woonhens*, comme aussi aucuns l'appellent. Ceste est, peut estre, le Legumen appellé *Cyamos* & *Faba*.

#### LE TEMPERAMENT.

Les Feues encores verdes sont froides & humides, mais quand elles sont seches, elles ont vertu de fecher & de restraindre.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Feues encores verdes, auant qu'elles soient meures, mangées, lachent le ventre tout doucement; mais elles enflent & excitent ventositez comme dit Dioscoride. Ce que le Vulgaire sçait bien, car pourtant mengent ilz les Feues avec du commun.
- B Les Feues seches ferront le ventre, principalement quand on les menges sans leurs peaux; & elles nourrissent moyennement comme dit Galien.

La farine de Feues appliquée par dehors en forme d'emplastre ou cataplasme, refout les tumeurs. Et est grandement prouffitable aux vicerés de mammelles de femmes, & aux accidens & inflations des genitoires.

La Feue sauuage n'a aucun vsage en Medecine, ny en viandes que ie sache.

## Des Phafeoles.

## Chap. XIX.

## LA FORME.

## Phafeolm.

## Phafeoles.

Les Phafeoles ont les tiges longues, menues; croissans fort haut, & grimpans quand elles peuvent estre soustenuës de quelque estache, ou long baston, autour desquelles elles s'enueloppent cōme le Houblon, car autrement se couchent par terre, & ne portent point de fruit. Les feuilles sont larges, bien pres semblables aux feuilles de Lyarre, & croissent communement trois à trois comme le Trefle. Les fleurs sont tōst blanches, tantost rouges, apres lesquelles passées vient en leur lieu de longues filiques qui par soes sont courbes, là ou le fruit est contenu, plus petit que la Feue commune, au reste plat & formé bien pres comme vn rognon, de couleur maintenāt rouge, maintenant iaulne, tantost blanche, tantost noire & aucunes fois griuolé & semé de diuerses couleurs. Ce fruit est bon & plaisant à manger, & de fait auant qu'il soit meur on le met cuire avec sa filique, & on le mange ainsi.

## LE LIEV.

En ce pais on plante les Phafeoles aux iardins, ilz ayment terre fertile, & lieux boë exposés au soleil.

## LE TEMPS.

On les plante en Auril, apres que les gelées & grandes froidures sont passées: car à leur premier sortir ilz ne peuvent nullement souffrir le froid. Ilz sont meurs en Aoult & en Septembre.

## LES NOMS.

Ceste espèce de Feues s'appelle en Grec φακή αλεξάνδρεια, καὶ σιμίδαζ κισσάια: en Latin *Fascolus*, *Dolichus*, & *Suilax horreſis*: Les filiques ou fruit s'appellent λήβοι, c'est en Latin *Siliqua*, & *Lobia*: de *Serapio Lobia*: en François Phafeoles: en haut Aleman *wessch Bomen*: en bas Aleman *Roosfische Boonen*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Phafeoles sont de temperament quelque peu chaud & humide, selō les Medecins Arabes.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les Phafeoles donnent assez louable nourriture, sans exciter ventosités, comme aucuns autres Legumes, & lachent tout doucement le ventre, ainsi que Hippocrates & Diocles escriuent.

Les filiques avec le fruit, auāt qu'elles soient meures, cuictes & mengées, prouoquent l'vrine, & sont songer songes turbulents, comme dit Dioscoride.

## Du Pois.

## Chap. XX.

## LES ESPECES.

Il y a trois sortes de Pois, Grands, Moyens, & Petis, lesquels se ressemblent de tiges, de feuilles, de fleurs, & filiques, mais non de fruit, comme on pourra apercevoir cy apres.

## LA FORME.

Les Pois ramiers ne sont guere cognus en ce pais. Ilz croissent, quād ilz sont soustenus de quelques rameaux, estaches, ou autre chose, à la hauteur d'un homme, ou d'auantage. Les tiges sont rondes, creuses, vn peu anguluses, grosses d'un doigt, sur lesquelles croissent à chacun neud deux feuilles soit ioinctes ensemble, comme si elles n'estoient qu'une feuille. Entre les feuilles viennent petis pedicules, lesquels ont quatre ou cinq feuilles charmes l'une à l'opposite de l'autre, & au bout trois ou quatre capreoles, par lesquels le Pois se soustient & s'attache par tout. Ioignant les

Ec ij dictes



Pisum.

pois ramiers.

Ervilia  
blanchis.Pois sa-  
uages.

dictes queues des feuilles y en vient encore d'autres nues, sur lesquelles croissent belles fleurs perles ou purpurées. Apres lesquelles surviennent longues siliques, rondes, unies, & glissantes, pendans en bas, dedans lesquelles couchent les pois, lesquels encore verds, sont rōdatres & blēchātres, mais apres qu'ilz sont secs, ilz sont anguleus & gris.

2 La seconde espece, ce sont les Pois vulgaires, est fort semblable à la dessusdicte, sinon qu'elle a les feuilles & tiges plus petites. Ils ne croissent pas si haut, encores qu'ilz soient soutenez de brāches & rameaux. Les fleurs sont pour la plupart blanches. Le fruit rond & blanc, demourant rond combien qu'il soit sec.

3 La tierce espece, qui est la plus petite ressemble à la seconde, sinon qu'elle est beaucoup plus petite de feuilles, tiges, siliques & fruit. On la laisse communement coucher sur terre aux champs, sans qu'elle soit soustee nue d'aucunes branches. Le fruit d'icelle est aussi rond, de couleur maintenant blanche, maintenant verde, aucun efois grise ou noiratre.

4 Outre les dessusdictes, il y a encore vne espece de





de Pois, laquelle semble sauvage. Elle a les tiges plattes, les feuilles longues avec des clavicules par le bout, entieres par bas, & au sommet de la tige, se fendans en deux ou trois petites feuilles estroites, pres semblables aux feuilles de Cicercula. Les fleurs sont blanches, apres lesquelles surviennent siliques rondes, plus petites que celles des Pois, là dedans croist le fruit rond, semblable au Pois, sinon qu'il est plus petit, de goust amer, quand il est encores verd, & fort dur quand il est sec.

## LE LIEV.

1 Les Pois ramiers sont plantés aux jardins: mais on plante & sème le moyen & le petit en chāps fertiles, ilz sont fort communs en ce país.

4 Les Herboristes sement le Sauvage en leurs jardins.

## LE TEMPS.

On les plante en Mars & Avril, & font meurs en Aoust.

## LES NOMS.

1 Les Pois ramiers s'appellent en Grec  $\pi\acute{\iota}\sigma\upsilon\sigma, \eta\gamma\epsilon\acute{\iota} \lambda\acute{\iota}\nu\omega\delta$ : en Latin *Pisum*: en Brabant *groote Erwtten*, *Roomische Erwtten*, & d'aucuns *Stoch Erwtten*. Cette espee est le vray *Pisum* descrit de Plin & des Anciens. Nous avons aussi déclaré en nostre *Historia Frugum*, que ce n'est pas *Faselus* ou *Dolichus*.

2,3 Les deux autres especes s'appellent en Grec  $\alpha\gamma\gamma\acute{\alpha}\rho\epsilon\upsilon$  en Latin de Plin *Erullia*: en François *Pois*: en haut Aleman *Erwysfen*: en bas Aleman *Erwtten*: en Itaben *Roviglione*: à Venize *Pisarelli*.

4 La quatriesme semble bien estre vne espee sauvage de Pois, principalement celle que *Hernonius Barbarus* appelle *Erullia sylvestris*, c'est à dire *Pois sauvages*.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

1 Les Pois ramiers mangés nourrissent moyennement, ilz enflent, non pas tant, toutesfois que le Legume appelé *Faba* des Anciens.

2 Les autres Pois ronds communs sont meilleurs, & nourrissent mieux que les Pois ramiers, & bāchent aussi doucement le ventre.

## De Cicercula.

*Lathyrus cicercula.*

## Chap. XXI.

*Lathyrus sylvestris.*

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Cicercula, Grande & Petite.

## LA FORME.

Cicercula a les tiges plattes & anguleuses: Les feuilles longues, estroictes, toujours deux ensemble, dressées bien pres comme deux oreilles de Lieure, ayans de clavicules par lesquelles elle s'attache aux pallis & branches contre lesquelles elle est plantée. Les fleurs sont blanches, semblables aux fleurs des Pois ramiers, puis apres vienēt de siliques plattes, larges, cōtenis vn fruit blanc, large, plat & anguleux inegalement, ayt biē pres la saveur de Pois. La racine est tēdre & fibreuse.

Le petit Cicercula ressemble au dessusdict, de tiges, feuilles & siliques. Les fleurs sont rougeâtres. Le fruit aussi plat, anguleux inegalement comme le Grand, sinon qu'il est plus petit, plus dur, & de couleur plus brune tirant sur le noir.

Il se trouve encores vne espece sauvage de ce Legume fort semblable au deuant dict de tiges plattes, & feuilles longues, & estroictes. Laquelle porte aussi fleurs rougeâtres, & puis siliques estroictes, ou est cōtenue vne petite graine brune, ronde & dure. La racine est grosse, ligneuse & espesse, sans mourir, mais iettant tous les ans de nouveau. LE LIÈV.

Ces Legumes se trouvent en ce païs chez aucuns diligens Herboristes. Le Sauvage croist és hayes, & aux bords des champs, en terre fertile. Il sen trouve grand' quantité autour de Louvain & de Bruxelles.

## LE TEMPS.

Ces Legumes florissent en Iuin & sont meurs en Iuillet & Aoust.

## LES NOMS.

La premiere & plus grande espece s'appelle en Grec *κόκκος*, Lathyrus de Columella & Palius Cicercula. La seconde s'appelle en Grec *ἀρακός*, Aracus: en Latin Cicera, Elle n'a pas de nom en François ny Alemā que ie sçache, ny pareillemēt és Boutiques, car elle leur est incogne.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La premiere espece a sēblable qualite q̄ les Pois, & nourrit moyennemēt le corps cōme dit Galien.  
 B La seconde ressemble aussi à la premiere tesmoing le mesme Galien, sinon quelle est plus dure, pourtant à elle besoing d'estre plus long temps cuicte.

## Des Pois Cices.

## Chap. XXII.

*Cicer sativum*

Pois cice cultivé.

*Cicer Arisium*. Cices de Belier.



## LES ESPECES.

Il y a trois sortes de Cices selon Diofcoride, Domestique, Anguleux, lequel on appelle Arietinum, & le Sauvage. L'Arietinum est de deux sortes, Blanc & Noir.

## LA FORME.

1 Le Pois cice cultiué est vn petit Legume, bien pres semblable à la Lentille, il a quatre ou cinq tiges, & là dessus de petites fueilles estroictes & dinisées, non guere differentes aux fueilles de la Lentille. Les fleurs croissent sur courtes queués, petites & vn peu blâchâtes. Apres lesquelles sur uient de petites silques rondes, ou sont communement contenus trois ou quatre pois ronds, ayans vne petite eminence d'vn costé, non guere different au Pois cice de Belier, beaucoup toutesfois plus petit, & non si dur, mais de goust amer aussi.

2 Le Pois cice de Belier a les tiges gresles, dures, bien branchues, ayans les fueilles rondes, crenées tout à l'entour, comme à la Lentille ou Vesce sauuage, croissans l'vne à l'opposite de l'autre. Les fleurs sont blanches ou purpurées produisans de courtes silques rondes, enfilées comme de petites vesies, dedans lesquelles croissent deux ou trois pois, anguleux, & formés bien pres comme la teste d'vn Belier, de couleur aucunesfois blanche, aucunesfois noire.

3 Les Cices sauuages ressemblent au Cultiué de fueilles, mais ilz sont de forte odeur, & le fruit autre que celui du Cultiué comme dit Diofcoride.

## LE LIEU.

Les Pois cices se trouuent plantez és iardins des Herbiers.

## LE TEMPS.

Tous les Cices meurissent en Aoust comme les autres Legumes.

## LES NOMS.

Le Pois Cice s'appelle en Grec *ἰσίδιον*, en Latin *Cicer*; en François Cices ou Pois cice.

1 La premiere espee s'appelle *Cicer satiuum*, *Columbolum*, *Venerium*; & en Grec *ἰσίδιον*, *Orobion*, c'est à dire en Latin *Cicer crullum*; incognu és Boutiques. Ce n'est pas *Eruum* comme plusieurs modernes pensent, lequelz le meslent pourtant parmy la Theriaque & autres medecines.

2 La seconde espee s'appelle en Grec *ἰσίδιον*, *κρίον*; en Latin *Cicer Arietinum*, c'est à dire Pois cice de Belier; és Boutiqs *Cicer*; en haut Alemā *Zyferis* & *Zyferis crmoyssin*; en bas Alemā *Licet*.

3 La tierce espee s'appelle *Cicer syluestre*, c'est à dire Cices sauuages.

## LE TEMPERAMENT.

Le Pois cice est chaud & sec iusques au premier degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Le Pois cice cultiué fait vriner, & accroit le lait aux mammelles des nourrissees, il oste la mau A uaise couleur, & fait bon teint.

Iceuy bouly avec Orobe, appaise & guerit les enflures des couillôs appliqué dessus. On l'ap- B plique aussi vtilement en mesme sorte sur vlcères coulans, & vlcères de la teste, & maunaise tigne.

Iceuy meslé avec miel & farine d'Orge, prouffite contre vlcères malings & rongeurs, & con- C tre chancres appliqué dessus.

2 Le Cicer Arietinum prouoque l'vrine, & desoppile la ratelle, le foye, & les rongnons; la deco- D ction d'iceuy beuë rompt la pierre & grauelle.

Briefles Cices consomment, nettoient, & subtilient toutes froides & grosses humeurs, & sont E bons contre toute gratelle, pareillement contre parotides.

Ilz nourrissent aussi asses, mais ilz engendrent mou de ventositez. F

## LES NVISANCES.

L'usage des Cices n'est pas bon à ceux qui ont quelque vlcere aux rongnons, ou en la Vesie, car ilz sont trop absteruis, & rendent l'vrine trop acre.

## Des Lupins.

## Chap. XXIII.

## LES ESPECES ET DIFFERENCES.

1 Les Lupins sont de deux sortes, Cultiué ou Blanc, & le Sauvage. Le Sauvage est aussi de plusieurs loites, car il a aucunesfois la fleur iaulne, aucunesfois bleue, aucunesfois rougeatre.

## LA FORME.

1 Le Lupin cultiué a les tiges rondes & dures fesseleuans sans ayde de branches ou polliz, & se par- tissent apres auoir ietté les premieres fleurs en trois rameaux, desquels chacun à part se diuise au- si en trois, apres auoir fleury, moiennant que le froid ne leur nuise. Les fueilles sont coupées en cinq, six, ou sept parties. Les fleurs croissent au plus haut des tiges plusieurs ensemble, apres lesquelles viennent les silques, qui sont logues, & vn peu velues par dehors. Le fruit est blanc, plat, & de goust fort amer.

Lupini sativi.

Lupins cultivez.

Lupini silvestres.

Lupins sauvages.



Le Lupin sauvage à fleurs jaunes ressemble fort au précédent, sinon que les feuilles & tiges sont beaucoup plus petites, & que les fleurs ne sont pas blâches, mais bien jaunes, & le fruit n'est pas blanc, mais tacheté.

Le Lupin sauvage à fleurs bleues & rouges est encore plus petit que le jaune, le fruit est aussi si marqueté, & est le plus petit des Lupins.

## LE LIEU.

Les Herboristes plantent les Lupins en leurs jardins.

## LE TEMPS.

En temps & pais chauds le Lupin fleurist trois fois : La premiere fleur vient à la fin de May, puis croissent les trois branches, lesquelles florissent environ le commencement de Juillet : lesdits rameaux produisent encore chacun trois autres rameaux florissans en Aoust, quand ilz sont bien exposez au Soleil. Le fruit de la premiere & secon de florisson deviennent bien meurs en ce pais, mais le tiers se meurt avec grande difficulté, si ce n'est quand l'année est chaude.

## LES NOMS.

Cette espece de Legume s'appelle en Grec *βίανος* : en Latin & es Boutiques *Lupinus* : en François *Lupin* : en haut Aleman *ffigsonen* : en bas Aleman *supinen*, & *Vijchboonen*.

La premiere espece s'appelle *Lupinus sativus*, c'est à dire *Lupin cultivez*.

Les trois autres se nomment *Lupini silvestres*, c'est à dire *Lupins sauvages*, & ceux icy ne sont pas vsurpez en Medecine.

## LE TEMPERAMENT.

Le Lupin cultivez est chaud & sec jusques au second degré, il a vertu digerente, subtiliante, & absterfiue.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La farine de Lupins prinse avec miel, ou avec eau & vinaigre, tue & pousse hors par bas toutes sortes de vers. Pareille vertu a la decoction de Lupins quand on la boit. A ce meisme on applique que les Lupins pilés sur le nombril des petis enfans, à jeun.

On donne à boire la decoction d'iceux boullis avec Rue & Poyure, pour ouvrir les oppilatōs B du foye & de la ratelle.

Vn pessus fait de Lupins, myrre, & miel meslez ensemble, esmeut le flux menstrual des fem- C mes, & tire l'enfant mort hors du ventre.

La decoction de Lupins embellit le tainct de la face, & efface toutes taches & Lentilles. De pa D reille efficace est la farine d'iceux, trempée en eauë induicte dessus.

Farine de Lupins avec farine d'Orge rostie & eauë, appaise les apostemes. E

Icelle avec vinaigre, ou cuicte en vinaigre, adoucit la sciaticque, digere, consume & refout les F strumes, & ouvre les charbons, & absces de la peste.

On peut manger les Lupins quand ilz ont trempé si long temps en l'eauë qu'ilz sont adoucis, G car préparés en ceste sorte, ilz ostent la volenté de vomir & font bon appetit. Toutefois c'est vne nourriture qui engendre gros sang, & grosses humeurs. Car les Lupins sont difficiles à digerer, & descendent fort mal assement par bas, ainsi que dit Galien.

13 Les Lupins sauuaiges ont pareille vertu que le Cultiué, voire encore plus forte. H

## Des Ers. Chap. XXIII.

## LA FORME.

Les Ers sont encores à present incognus, pourtant n'en pouōs nous dōner autre description, sinon autant qu'on en trouue en Dioscoride & Galien. Iceux disent que les Ers sont vne pe- petite plante, portant son fruiēt en siliques, rond, de couleur blanche ou iuinatre, de gouſt estran- ge, & mal plaissant, tellement qu'ilz ne sont conuenables pour manger sinon aux bestes, lesquelles encores ne les mangent pas silz n'ont premieremēt si long temps trempé en eauë, que leur mau- uais gouſt soit osté : par lesquelles choses il est facile à cognoistre que les Pois plats appellés en Grec *Lathyri*, descris au chap XXI. de ce liure, ne sont point *Eruum*, comme aucuns cuident, Car lesdicts Pois plats ont semblable saueur que les Pois communs, comme nous auons escrit.

## LES NOMS.

Ce Legume est appellé en Grec *ἔρως* : en Latin *Eruum* : & là selon en François des Ers : en Aleman *Eruen*, car c'est vne plante à present incognee.

## LE TEMPERAMENT.

Les Ers sont chauds au premier degré, & secs au second.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Farine d'*Eruum* lechée souuent avec du miel en forme de looth, nettoye le thorax, & incise A & meurit les grosses, & gluantes humeurs tombans sur les poulmons.

Elle fait auoir bon ventre, prouoque l'vrine, & fait auoir bonne couleur quand on n'en préd B pas par trop grande quantité, car prinse en abondance elle nuit.

Elle efface les lentilles avec miel, & toutes taches & cicatrices de la face, & de tout le corps. El- C le arreste viceres ambulatifz : Elle amollit dureſſes de mammelles, & rompt les carboncles & apostemes.

On applique vtilement iceux trempéz en vin, sur morsures de chiens, des hommes, & de be- D ſtes sauuaiges.

La decoction d'iceux, appaise la demangeſon, & guerit mules à talon, si on les en laue. E

*Eruum* ne doit estre aucunement receu entre les viandes des hommes, mais il engreſſe les F Beufs.

## LES NVISANCES.

L'*Eruum* ou Orobe fait douleur & pesanteur de teste, & si on en prend excessiuemēt ou trop souuent, il fait piſſer sang, & fait sortir le sang avec les excremens du ventre.

## De la Vesce. Chap. XXV.

## LA FORME.

LA Vesce a les tiges asses grosses, quarrées, d'enuirō trois pieds de haut, ayant les fuſilles esten- dues, compassées de plusieurs fueillettes situées l'vne à l'opposite de l'autre: au bout d'icelles y a des capreoles par lesquels elle se souſtient & attache. Les fleurs sont purpurées de la forme des fleurs de la Feue, puis apres suruiennent longues siliques & plattes, contenant les Vesces qui sont plattes, & de couleur noiratre.

## LE LIEV.

On sème la Vesce en ce pais par les champs pour fourragé des cheuaux.

## LE TEMPS.

Elle meurist en Iuillet & Aoult.

## LES NOMS.

Ce Legume se nomme en Grec *βίσις* : en Latin *Vicia* d'aucuns *Osmundi* : en François *Vesce* : en haut Aleman *wischen* : en bas Aleman *Ditfen*. Et que ce ne soit *Bruun*, il appert asses par ce qui en est escrit au chapitre precedent.

## LA CAUSE DV NOM.

La Vesce s'appelle en Latin *Vicia*, comme dit Varro, pour ce qu'elle se lie d'elle mesme autour des Grains. Car *Vincere* en Latin (d'ou ce mot *Vicia* est descendu) signifie lier.

## LE TEMPERAM. ET VERTVS.

On n'vse pas de la Vesce en Medecine, & n'est pas mengée des homes, mais on la donne à manger aux cheuaux & autres bestes, ce qu'aussi d'icelle escrit Galien.

## De la Vesce sauuage. Chap. XXVI.

## LA FORME.

- 1 **A**rachus ressemble fort à la Vesce de tiges, feuilles & siliques, beaucoup toutesfois plus petite en toutes sortes. Les tiges sont tendres, gressées, anguleuses. les feuilles estendues comme celles de la Vesce, parties au bout en deux ou trois capreoles. Les fleurs sont petites, incarnées, & croissent sur la tige mesme, comme aux Feuës & Vesce cultivée. Les siliques sont petites, longues & estroictes, dedans lesquelles sont enclos six ou sept grains, noiratres, durs, plus petis que Vesces.

- 2 De ceste sorte sen trouue encore vne autre, laquelle ressemble fort à la susdicte de feuilles & tiges, mais elle est plus petite. Elle a de petites fleurs blanches, croissans par amas au bout de lōgues queués, bien pres comme à la secōde Vesce sauuage, lesquelles se tournent en petites siliques, amassées aussi ensemble, plus petites que les siliques de Lentille, dedans lesquelles y a seulement deux grains, durs, rōds, griuolés & noiratres, semblables en figure & saueur à la Vesce sauuage.

## LE LIEV.

Ces deux especes de Vesce sauuage croissent par les champs entre le Seigle & Auoyne & autres semblables Grains.

## LE TEMPS.

Elles meurissent toutes deux en Iuin.

## LES NOMS.

Ceste plante est appellée de Galien au premier de Aliment. facult. ἀραχὺ & *Arachus*, lequel nom s'escrit par. ch. en la derniere syllabe, à la difference de l'autre ἀραχὺ *Arachus* escrit seulement avec vn. c. duquel auons parlé cy dessus. On l'appelle en François *Vesle* ou *Vesce sauuage*; en Brabantson *Croch*.



Arachus ne conuient pas à l'homme, mais sert seulement de fourrage aux beufz & cheuaux, A  
aufquelz on donne l'herbe entiere.

De la seconde espece de Vesce sauvaige.

Chap. XXVII

Seconde espece de Vesce sauvaige.



LA FORME.

1 Ceste espece de Vesce sauvaige ressemble fort à la Vesce sauvaige descrite au Chap. precedent, de tiges, fueilles & capreoles, sinon que ses fleurs ne croissent point de la mesme sorte, mais croissent par amas autour de longues queues, bien pres en forme d'epi, de couleur purpurée en bleu, lesquelles passées, suruieniēt de petites filiques plates, ou est la graine fort semblable à la graine de la Vesce cy dessus escrete.

2 On pourroit bien ioindre à ceste espece de Vesce sauvaige, certaine herbe, non guere differente à la dessusdicte de fueilles & de croisson, laquelle porte filiques rudes & espineuses & bossues: Elle ne croist pas en ce pais communement, mais on la trouue plantée seulement aux iardins des Herboristes. Ceste espece de Plante a les fueilles semblables à l'autre, vn peu plus estroictes toutesfois, plus blanches & plus douces. Ses fleurs croissent aussi sur longues queues par amas, pour la pluspart d'vne couleur clair rouge, apres lesquelles passées y vient de filiques plates, espineuses, bossues & rondatres, aucune fois aussi formées en façon de petit herisson, qui n'est autre chose que la semence.

LE LIEV.

1 La Vesce sauvaige croist aux bords des champs, es prés, & souuent en lieux humides & autour des ruisseaux.

2 L'autre espece est pour nouuelité plâtée es iardins des Herboristes de ce pais. On dit quelle croist en abondance sur le bord de la mer, sur les digues & semblables lieux.

## LE TEMPS.

Ceste espece de Vesce sauvage fleurit le plus souvent en Juin, & peu apres liure elle ses filiques & graine. L'autre fleurit en Juillet, & s'ouvent liure aussi sa semence.

## LES NOMS.

La premiere espece est sans faute nulle aussi vne sorte de Vesce sauvage, & se peut bien appeler aussi *Arachus*, & peut estre tenue pour vne espece d'*Arachus*: en François Vesce sauvage: en haut Aleman *wilder wischien*; en ce pais *wilde Bissen*.

L'autre est tenue d'aucuns pour *visbeuycer*, *Onobrychis*.

## LE TEMPERAMENT VERTVS ET OPERAT.

- A Ceste espece de Vesce sauvage n'est pas meilleure que celle qui est descrite au Chap. precedent, pourtant sert elle seulement de fourrage aux bestes, comme les autres herbes inutiles.
- B Si la seconde est *Onobrychis*, on trouura les facultez descrites au chap. d'*Onobrychis*.

## De Aphace.

## LA FORME.

**A** Aphace a les tiges longues, tendres, quarrees, plus longues & hautes que les tiges de la Lentille, bien pres croissant aussi haut que le Blé, ou les autres plâtes entre lesquelles elle croist. Les feuilles sont tédres, petites, rondelettes, tousiours deux l'une contre l'autre, prouenans d'une jointure, entre lesquelles sortent de petis caprooles, & autres petites queues, sur lesquelles croissent les fleurs. Apres les fleurs viennent les filiques, vn peu larges & plus lógues que les filiques de la Lentille, dedans lesquelles sont enclós cinq ou six grains noirs, dars, plus petis que les grains de la Lentille.

## LE LIEV.

Aphace croist aux champs, & se trouue en ce pais en terre grasse entre le Froment & Seigle.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en ce pais au moys de May. En Juin & Juillet est la graine meure avec ses filiques.

## LES NOMS.

Ceste espece de Legume se nôme en Grec *ἀφάκη*; en Latin *Aphace*: incognue es Boutiques.

## LE TEMPERAMENT.

La graine d'Aphace est temperée en chaleur, de semblable nature que la Létille, mais plus seche.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La graine d'Aphace a vertu de restreindre comme la Lentille, voire plus grande, avec ce arreste le flux de ventre, & desèche l'humidité de l'estomach.
- B Brief Aphace a les vertus fort semblables à la Lentille.
- C On souloit aussi par cy deuant donner à manger ce Legume, tesmoing Galien, il est toutesfois plus dur & difficile à cuyre & digerer, que la Lentille.

## Du Pied d'oyseau.

## Chap. XXIX.

## LA FORME.

**P**ied d'oyseau ressemble à la Vesce sauvage, plus petit toutesfois. Il a les tigettes gresles, tédres, & les feuilles petites en forme de plume, rondelettes. Les fleurs sont petites & iaulnâtres, croissant sans bien serrées ensemble sur petites queues, lesquelles flestries, suruient en leur lieu de filiques





## De la Lentille. Ch. XXX.

Ornithopodium. Pied d'oyseau.

333

ques menuës & courbées, cinq ou six ensemble, les quelles jointes semblent le pied fermé d'un petit oiseau, là dedens est enclôse la graine, non guere différente de figure à la graine de Nauveau.

### LE LIEV.

Le Pied d'oyseau croist en aucuns champs, & se trouue aussi en quelques hauts prés, & voyes herbus & seches & eslandes. Celuy qui croist es prés & le long des chemins herbus, est beau coup plus petit que celuy qui croist entre les Bleds.

### LE TEMPS.

Le Pied d'oyseau fleurit en Iuin iusques en Septembre, & aucunes fois liure aussi sa semence.

### LES NOMS.

Ceste herbe sauuaige s'appelle en Brabant *Dogstoeet*, c'est à dire Pied d'oyseau, pour ce que ses filiques ressemblent au pied d'un oysillon, & là selon on la peut bien aussi nommer *épidon d'oy*, *Ornithopodium*, car elle n'a autre nom Grec ne Latin que ie sache, si ce n'estoit le *Polygala de Dioscoride*, comme on pourroit à present l'appeller.

### LE TEMPERA. ET. VERTVS.

Ceste herbe n'est vsurpée ny en medecine ny au commun vsage de l'homme, mais est tresbonne pasture pour les cheuaux & vaches.

## De la Lentille. Chap. XXX.

### LA FORME.

LA Lentille a les tiges gresles, tédres, d'environ vne coudée de haut. Les fauilles fort petites, lesquelles sont asises deux à deux sur petites queues, ou pedicules, & qui se finent aucunes fois en capreoles, par lesquelles elle s'attache & tient ferme.

Les fleurs sont petites, de couleur brunatre entremeslée de blanc. Les filiques sont plattes. Le fruit est rond & plat, de couleur tantost noiratre, tantost blanche, tantost brunatre.

### LE LIEV.

La Lentille n'est guere connue en ce pais. On la trouue semée es jardins des Herboristes.

### LE TEMPS.

La Lentille fleurit & meurt aussi en Iuillet & Aoust.

### LES NOMS.

Ce Legume est nommé en Grec *φασις*, & *φασις* en Latin *Lens*, & *Lenticula*, sous lequel nom elle est connue es Boutiques: en François Lentille; en haut & bas Aleman *linsen*.

### LE TEMPERAMENT.

La Lentille est seche iusques au second degré, au reste temperée.

### LES VERTVS ET OPER.

A La premiere decoction de la Lentille lasche le vêtre.

B Si apres auoir ietté la premiere decoction, on la cuyt derechef en autre eau, elle reserre, desèche, & est prouffitabile contre flux de ventre & dysentere, & aux femmes qui ont leurs fleurs par trop abondément. Elle fera mieux son operation, & reserrera plus



Lens. Lentille.



plus fort si on y adioust du vinaigre, de la Cichorée, Pourcelaine, ou Bete noire, ou Myrtilles, ou escorce de Grenade, ou Roses seches, ou Nesses, ou sorbes, ou poyres non meures, ou pommes de Coing, ou Plantain.

- C L'escorce de la Lentille a pareille vertu, & de fait elle reserre plus fort que la Léntille entiere,  
 D La viande qui est preparée de Léntille sans son escorce, seche l'estomach, mais elle ne serre point & est de difficile digestion, & engendre gros sang & mauvais.  
 E On aualle trente grains de Lentille desnués de leur escorce contre dissolution, & subuersion d'estomach.  
 F Lentille cuicte avec farine d'Orge rostie & induicte, appaise douleurs podagriques.  
 G La farine de Lentille avec miel, mondifie vlcres pourris, & les remplit de nouuelle chair.  
 H Iceille cuicte en vinaigre, dissout duretes & strumes.  
 I Avec Mellot, ou Pomme de Coing & huile rosat, donne allegeance aux phlegmons des yeux & du fondement. Et avec eauë marine, est bonne contre crispetes, & semblables maladies.  
 K La Lentille cuicte en eauë de mer ou salée, appliquée, sert de remede contre lait grumelé aux mammelles, & consume le lait qui est par trop abondant en icelles.

## LES NVISANCES.

La Lentille est de difficile cuysson, elle engendre ventosités, & inflations en l'estomach & le subuertit, elle fait resuer & songer choses terribles, elle nuyt aux poulmons, aux nerz & au cerueau. Et si on en mange trop souuent esourditi la veue, & fait les gens encourir châtre & ladrerie.

## De Securidaca.

## Chap. XXXI.

## LA FORME.

## Hesysaron.

## Securidaca.

1 Securidaca a les tiges gressles, sur lesquelles croissent fueilles estédues, semblables aux fueilles de Vesce sauvage, plus petites toutesfois, & plus rondes. Les fleurs croissent amassées ensemble, apres lesquelles passées viennent de longues filiques, rondes & gressles, croissans l'une contre l'autre, courbées en forme de cornes, dedans lesquelles est contenue vne graine platte, à quatre angles come vne petite coignée. La racine est gresse & tendre.

2 La seconde Securidaca mise par le tresçavant Matthioli, ressemble asses de fueilles à la susdicte, toutesfois ses filiques sont plus longues & non courbées: & pour ceste cause non guere'apochant à la description de Securidaca faite par Dioscoride.

## LE LIEV.

Securidaca selon Galien croist en aucuns endroits entre la Lentille, ou selon Dioscoride entre l'Orge, & entre le Blé, incogne en ce pais, & ne se trouue sinon es jardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

Securidaca fleurit en ce pais en Juillet & Aoust, puis apres en est la semence meure.

## LES NOMS.

Ce Legume s'appelle en Grec *ἡσυσάρον* en Latin *Securidaca*, d'aucuns aussi *Pelecion*: en haut Aleman, François, ny bas Aleman, elle n'a point de nom que ie sache.



## LE TEMPERAMENT.

La graine de Securidaca est chaude & sèche de complexion.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine de Securidaca ouure les oppilations du foye, de la ratelle, & de toutes les parties intérieures, & est fort bonne à l'estomach à cause de son amertume.

De pareille vertu font aussi les fueilles nouvelles, & tendrons d'icelle, comme escrit Galien Prince des Medecins.

## De Galega.

## Chap. XXXII.

## LA FORME.

Galega.

Ceste herbe ne ressemble pas mal aussi à la Vesce sauuaige de tiges & fueillesuel le a les tiges rondes, dures, & là dessus les fueilles espâduës, composées de plusieurs fueillettes, comme les fueilles de la Vesce sauuaige, plus grâdes toutesfois, & plus longues. Les fleurs sont de cler bleu, ou blanches, & croissent amassées ensemble en forme d'espi, comme à la Vesce sauuaige, puis apres ensuyuent de siliques, longues, gressles & rondes, dans lesquelles est contenue la graine. La racine est asses grande, & ne meurt facilement.

## LE LIEV.

Galega croist en aucis pais, comme en Italie aux bords des champs. En ce pais on ne le trouue sinõ semée es iardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

Galega fleurit en Iuillet & Aouist, & souuent en est meure la graine.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appellée des Herboristes modernes en Latin Galega, d'aucis For negræcum syluestre. Et aucis la tiennent aussi pour Giaux ou Polygala, toutesfois selon nostre opinion, elle n'a aucune similitude avec icelle.

## LE TEMPERAMENT.

Galega est de tẽperament chaud & sec.

## LES VERTVS ET OPER.

Galega, comme escrit Baptista Sardus, est vne tresbonne herbe contre tout venin & poison, par reillement contre les versles tuant & pouissant hors, quand on donne à boire le ius d'icelle aux petis enfans.

Elle est de pareille vertu rostie en huile de Lin, & liée sur le nombril de l'enfant.

On donne à boire le ius d'icelle aux petis enfans contre Epilepsie, enuiron vne cuillerée tous les iours.

Elle est estimée auoir grand' efficace, boulie en vinaigre, & beuë avec quelque peu de Theriaque, pour guerir la peste, quand on la prend en dedans douze heures.

## Du Gland de terre.

## Chap. XXXIII.

## LA FORME.

LE Gland terrestre a trois ou quatre tigettes, ou branchettes tendres, vn peu rougestres par bas aupres de terre, ayans de capreoles, par lesquelles elles sattachent aux hayes & à tout ce quelles peuuent atteindre. Les fueilles sont petites & estroictes. Les fleurs sont de belle couleur rouge, d'o'odeur non mal plaissante. Apres lesquelles passées viennent en leur lieu de petites siliques, dedans lesquelles est contenue vne petite semence. Les racines sont longues & gressles, ausquelles sont attachés ça & là comme de petis longs Nauetz, bien pres en forme de Glands, de couleur de terre par dehors, & blancs par dedans, de goust doux bien pres comme les chastaignes.



L'autre espèce de Gland terrestre, appellée en aucuns lieux Petit Gland terrestre, sera descrite en la Cinquiesme partie au ch. XXIII. de Bunium

LE LIEV.

Le Gland terrestre croist abondamment en Hollande, & aucuns autres endroits, comme en Brabant pres de Berges sur le Zoom, entre les Bléds, & sous les hayes.

LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en Juin. Puis apres meurit la semence. On tire hors de terre en aucuns lieux la racine en May, & on la mange.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en haut Alemá Erdnuss, Eechelen, Erdfeigen, Erdamandel, Acher cycbel & Grund cycbel: en Brabanton Erdnoten, & d'aucuns Huysen met sic eten: des modernes en Grec *Χαμαβάλανος*, *Chamebalanos*: en Latin *Glandes terrestres*, c'est à dire Gland terrestre. Aus cuns sçavans la tiennent pour *Astragalus* descrit par Dioscoride, & aucuns pour *Apios*. Mais que ce ne soit point *Apios*, il est asses manifeste par le tiers chapitre de la Tierce partie de ce liure, auquel nous aués clairement descrit le vray *Apios*.

LE TEMPERAMENT.

Ce *Chamebalanos* est sec au second degré.

LES VERTVS ET OPER.

- A Les racines de *Chamebalanos* sont en plusieurs endroits de Hollande, & de Brabant boulyes & mangées comme *Naucaux*, ou *Paltenaden* & mangées en ceste sorte elles nourrissent asses bien, elles sont toutesfois plus difficiles à digerer que les *Naucaux*, & serrent le ventre, & arrestent le flux d'iceluy.
- B Si ceste herbe est le vray *Astragalus*, la racine prouoque l'vrine, & arreste tout flux de ventre cuicte en vin & beué.
- C Icelle prinse en mesme sorte, arreste aussi le flux menstrual par trop excessif, & les sueurs des femmes, & tout flux de sang non naturel.
- D Icelle racine d'*Astragal* sechée & mise en poudre, est trovétillement espandue sur vieux viceres, & sur playes fresches & nouvelles pour arrester le sang.



Fenum Grecum.

Fenugrec.



Du Fenugrec. Chap. XXXIII.

LA FORME.

LE Fenugrec à les tiges tendres, rondes, noires, & creuses, fort branchues. Les feuilles diuisées en trois, fort semblables à celles du Treffle. Les fleurs sont pales, blanchâtres, & plus petites que les fleurs du Lupin. Apres icelles passées il y vient de longues siliques, courbes & aigues, qui contiennent vne graine iaune. La racine est fort fibreuse.

LE LIEV.

Les Herboristes de ce pais le sement en leurs iardins.

## LE TEMPS.

Il fleurit en Juillet, & la graine est meure en Aoust.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *τίσις*: en Latin & és Boutiques *Fœnum Græcum*, de *Columella Si ligæ*: en François Fenugrec, ou Fenegrec: en haut Aleman *Wochstorn* ou *Kuhsorn*: en bas Aleman *Fenigesech*.

## LE TEMPERAMENT.

La graine de *Fœnum græcum* est chaude au second degré, & seche au premier, & a vertu d'ammollir & dissoudre.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

La decoction de la graine de Fenugrec, beue avec vn peu de vinaigre, pousse hors toutes mauvaises humeurs sèches és boyaux.

Icelle decoction cuite premierement avec dactes, puis avec vn peu de miel iusques à ce quel le aye consistance de Syrop, mondifie fort le thorax, & est fort bone en douleurs qui travaillent le thorax, moiennant que le patient soit sans fièvre & douleur de teste, car tel syrop n'est convenable à ceux qui ont fièvre ou douleur de teste.

Farine de Fenugrec cuite avec hydromel, elle digere, adoucit, & dissout cedemes, & tumeurs: Et pestrie avec nitrum & vinaigre, elle diminue & amollit la ratelle dure & enflée.

Il est bon que les femmes travaillées de quelque aposteme, vlcere ou oppilation de matrice, se baignent & estument dans la decoction d'iceluy.

L'espraintie & ius de Fenugrec demeslé avec gresse d'oyson, & appliqué par dessous en forme de pessaire, amollit & appaise toutes duretés & douleurs du col de la matrice.

Icelle decoction est bonne pour laver la teste, car elle guerit la tigne, & emporte les lendes & fufures.

Icelle induicte avec soulfre & miel, efface les rougeoles, dartres, & lentilles du visage, & guerit toute mauuaise gratelle, & corrige la puanteur des aisselles.

Le Fenugrec verd broyé avec quelq peu de vinaigre, profite aux membres imbecilles & vlcerés

On peut aussi méger la graine d'iceluy ainsi acous

strée côme les Lupins, elle est aussi de pareille vertu que les Lupins, & lasche le ventre tout doucement. On menge aussi les tendrons, se dit Galien, en salade avec huile & vinaigre, mais telle viande n'est pas saine, car elle subuertit l'estomach, & excite douleur de teste, quand on en prend par trop.

## De Cameline. Chap. XXXV.

Cameline a les tiges droictes, rondes, d'environ deux pieds de haut ou d'auantage, se fendans en plusieurs rameaux: les sucilles longues, estroictes, bis pres semblables aux sucilles de Garâce. Au plus haut des tiges, il y croist tout au long de petites fleurs, & puis apres de petis calices, semblables aux chapiteaux de Lin bien pres, plus plats toutesfois, dans lesquels est contenue vne petite graine iaulnatre, dont on fait de l'huile, en la battant & exprimant.

## LE LIEV.

Cette herbe croist en plusieurs lieux entre le Blé, & entre le Lin, & on la tient pour la plus part pour vne herbe inutile, toutesfois pour l'huile qui sort de la semence, on la seme en plusieurs endroits, comme icy, en Zeelande, & au pais de Liege.

## LE TEMPS.

On la seme en Mars ou Aueil, & meurt environ l'Aoust.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *μάργουρον*, de Theophraste *λίνον πυρινον*, d'aucuns aussi *μαράμωρον*: en Latin *Margaron*, *Linum triticum*, & *Mes laspyrum*: en François & bas Aleman *Cameline*,

Ff iij & d'au



& d'aucuns Camemise : en haut Aleman *fleschdotter, & scindotter,*

## LE TEMPERAMENT.

*Myagrum* est de chaleur temperée.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A L'huile de la semence de Cameline induicte sur le corps, esclarcist & nettoye le cœuy de toute rudesse.
- B On en vse à present pour acoüstrer viandes comme de l'huile de Naueaux, & on sen peut seruir pour bruller es lampes, comme escrit Dioscoride.

## Du Treffle.

## Chap. XXXVI.

## LES ESPECES.

IL y a diuerses sortes de Treffle, lesquelles seront pour la plus part descrites en diuers Chapitres. Mais ceuy duquel nous parlons à present, est le commun Treffle qui croist aux prés. Lequel est de deux sortes, l'un à fleurs rougeatres, & l'autre à fleurs blanches, au reste n'ont ilz grande diuersité.

## LA FORME.

*Trifolium pratense.*

## Treffle de prés.

1 Le Treffle de prés a la tige ronde, tendre : Les fueilles rondatres, tousiours trois ensemble assises sur vne queue. Les fleurs croissent au sommet des tiges, amassées ensemble, en façon d'un petit court espi, bien pres de couleur purpurée : Apres lesquelles passées y suruiuent vne semence ronde, enclose en petites siliques. La racine est longue & ligneuse.

2 Le Treffle à fleurs blanches ressemble fort au precedent, sinon qu'il a les tiges vn peu plus rudes & velues, les fueilles plus longues & plus estroictes, & au milieu de chacune fueille aucunes fois vne tache blanche, en forme de croissant. La fleur est blanche, au reste semblable aux fleurs de l'autre, & croissant de semblable sorte.

## LE LIEV.

Ces deux especes de Treffle croissent par tout ce pais aux prés, principalemet ceux qui sont haut situés.

## LE TEMPS.

Le Treffle fleurit en May & en Iuin, & souuent aussi tout l'zshé.

## LES NOMS.

Ceste espece de Treffle se nomme en Grec *τρίφυλλον ή χαρτανόπιον γερώνιον* : en Latin *Trifolium pratense* : en François Treffle de prés, ou Triolet : en haut Aleman *wissen hler, & fleytschblum* : en bas Aleman *Claweten, & ghemeyn Claweten.*

## LE TEMPERAMENT.

Le Treffle est froid & sec, comme facilement on peut cognoistre hors du goust d'iceluy.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le Treffle avec ses fleurs ou à part soy cuiët en hydromel ou vin, & beu, appaise & guerit dou leurs chaudes & mordantes des intestins. De pareille vertu est la decoctiõ d'iceluy faicte en eau, & iettrée dedans le corps avec vn chlytere.
- B La decoctiõ d'iceluy beuë en temps & lieu, arreste les fluxeurs blanches des femmes.
- C Les fleurs ou fueilles de Triolet cuiëttes en huile, appliquées en forme d'emplastro, meinent à maturité, phlegmons, & autres semblables tumeurs, & les rompent, voire aucunes fois les digerent & resouident.



LA FORME.

Lotus satius. Treffle odoriferant.

LE Treffle odoriferant a la tige ronde, creufe, d'environ deux pieds de haut ou d'avantage, fort bran- chue & ramue : Les fueilles croiffent toujours trois à trois cōme au Treffle vulgaire ou de prés, vn peu plus longues toutesfois & crenées tout à bentour en forme de fe. Au sommet des branches croiffent les fleurs amassées ensemble en forme d'espi, comme au Treffle vulgaire, finon que l'espi de cestuy cy n'est pas si tresgrand que celuy de l'autre. Apres icelles passées il y vient de petis chapiteaux poinctus qui contiennent la graine. Toute ceste herbe, principalement quand elle porte sa fleur, est de tresbonne odeur, laquelle, se- lon ce qu'on dit, perd sept fois le iour son odeur, & au- tant de lois la recouure, ce pendant qu'elle croist en- eore, car apres quelle est seche, elle retient toujours son odeur, laquelle est plus grande, quand le temps est humide & tenebreux, que quand il fait beau & clair.



LE LIEV.

Le Treffle odoriferant on le seme en ce país es iar- dins, Et là ou il est semé vne fois, il y croist facilement tous les ans de la semence qui tombe.

LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en Iuillet & Aouft, & ce pendāt meurt aussi la graine.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *λωτός ἴμας* : en La- tin *Lotus urbane*, & *Lotus satius*, d'aucuns *Trifolium*, à present *Trifolium odoratum* : en François Treffle odorif- erant : en haut Alemā *Sißen geyert* : & en bas Aleman *Siuen ghetjbe cruyt*, pour ce que sept fois le iour elle perd son odeur, & la recouure, com- me dict est.

LE TEMPERAMENT.

Le Treffle odoriferant est temperé en chaleur & froideur, & est participant de quelque peu de secheresse.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Treffle odoriferant appaise & meurt tous edemes appliqué dessus.

Le ius d'iceluy avec miel oste la maille des yeux, & esclarcit la veue mis dedans.

L'huile dans laquelle les fleurs du Treffle odoriferant ont trempé, consolide toutes playes fresches, & les rompures aussi, comme disent aucuns.

Du Treffle, ou Lotus sauage. Chap. XXXVIII.

LES ESPECES.

ON trouue communement en ce país deux fortes de Treffle sauage à fleurs iaunes, l'vne a fili- ques longues, & l'autre n'en a point.

LA FORME.

1 La première espece de Lotus sauage est vne petite herbe basse, se traînant le long de la terre. Les fueilles ressemblent aucunemēt aux fueilles du Treffle vulgaire, bien pres de couleur cendreu- se. Les fleurs sont belles & iaunes, formées comme fleurs de Pois, plus petites toutesfois. Lesquel- les passées prouiennent de siliques rōdes, pres l'vne de l'autre, trois ou quatre, dans lesquelles est contenue vne graine ronde. La racine est longue, & rougeatre.

2 La seconde espece a les tiges fort menues, rondes : les fueilles semblables au Treffle. Les fleurs iaunes, amassées par chapiteaux rōds, se conuertissans en semence noire, courbe, couuerte d'vne peau noire, laquelle croist autour des chapiteaux comme si elle estoit compassée dessus.

*Lotus fyluestris.*  
Trefle sauvage iaulne.

*Lotus fyluestris minor.*  
Petit Trefle sauvage iaulne.



## LE LIEV.

Ces deux especes de *Lotus fyluestris* croissent en ce pais en lieux secs, & le long des champs & des chemins.

## LE TEMPS.

Ces Trefles fleurissent depuis le moy de Iuin tout le long de l'asté, & ce pendant liurent leur semence.

## LES NOMS.

Ces Trefles s'appellent à present *Loti fyluestris*, ce ne sont pas toutesfois le *Lotus fyluestris* de Dioscoride, lequel croist fort haut, & a la graine semblable à celle du Fenugrec.

La premiere espece s'appelle en haut Aleman *wilden hlee*, *Steenhlee*, *Edel steenhlee*, *Vogels wicken*, *Vnser framwe schuchstlin*: en François Trefle sauvage iaulne: en Brabant *Steenclaueren*, & *geel Steenclaueren*, *wilde Claueren*, & d'aucuns *Vogels Bissen*. Aucuns l'estimét estre vne espece de *Melilotus*. Pourtât est elle aussi appellée en Latin *Melilotus fyluestris*, ou *Melilotus Germanica*.

La seconde s'appelle en François Petit Trefle iaulne: en haut Alem *Geel hlee*, *Kleiner Steen hlee*, & *Geel wicken hlee*: en bas Aleman *kleyn Steenclaueren*, & *kleyn geel clauere*. Il semble à voir que ce soit vne espece de *Medica*, de laquelle nous parlerons cy apres.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS

Ces herbes sont froides, seches, & astringentes, principalement la premiere, parquoy on en peut vser tant par dedens que dehors le corps en toutes maladies qui demandent refroidement & secheresse.

## Du Melilot.

## Chap. XXXIX.

## LES ESPECES.

Il se treuve à present deux especes de Melilot, l'vne qui est le vray Melilot, & l'autre qui est commun en ce pais qu'on appelle Melilot vulgaire.



*Melilotus Italica.*  
Vray Melilot.

*Melilotus Germanica.*  
Melilot vulgaire.



LA FORME.

- 1 Le vray Melilot a les tiges rōdes, les feuilles crenées tout à l'entour, non guere differentes aux feuilles de Fenugrec, toujours trois ensemble, comme au Trefle. Les fleurs sont jaunes, petites, amassées en un, lesquelles passées viennent en leur place beaucoup de petites filiques courbes, ou la graine est contenue. La racine est tendre & fort fibreuse.
- 2 Le Melilot vulgaire a les tiges rondes, d'environ deux ou trois pieds de haut, fort ramues. Les feuilles croissent toujours trois à trois, comme au Trefle, crenées tout à l'entour comme les feuilles de Fenugrec, ou du vray Melilot. Les fleurs sont jaunes, amassées ensemble comme petits espiz, lesquelles seistries suruient de petites filiques & courtes qui cōtiennent vne petite graine. La racine est longue. Toute l'herbe avec ses fleurs est de fort bonne odeur, signément quand elle est seche.
- B De ceste espee sen trouue il vne qui porte fleurs blanches, au reste du tout semblable à la precedente

LE LIEV.

- 1 Le vray Melilot croist abondamment en Italie, principalement en Campania pres de la ville Nola. En ce pais les Herboristes la sement en leurs jardins.
- 2 Le Melilot vulgaire croist en ce pais aux bords des champs & des prés, le long des fossés & ruisseaux.

LE TEMPS.

- Ces deux especes de Melilot florissent en Juillet & Aouft, pendant lequel temps, lient aussi leurs filiques & semences.

LES NOMS.

Melilot s'appelle en Grec *μυλίσκος* & en Latin *Melilotus* & *Serratia Campana*.

- 1 La Premiere espee de ces herbes est vsurpée à Rome & en Italie pour Melilot, pourtant s'appelle on *Melilotus Italica*, c'est à dire Melilot d'Italie, & en Aleman *Italiensische* ou *Roomsche* *Melilote*.

- 2 L'autre espee s'appelle és Boutiques de ce pais & d'Allemagne *Melilotus*, & pour iceluy est vsurpée,

vsurpée, de la vient qu'on l'appelle *Melilotus Germanicus* en François *Melilot* vulgaire; en bas Aleman *Chermeyne* ou *duyrtste* *de l'illote*. Aucuns l'appellent aussi *Saxifraga lutea*, c'est à dire *Saxifrage iaulne*, & en haut Aleman *Grosse steinher*.

## LE TEMPERAMENT.

Le *Melilot* est chaud, en partie alstringent, & en partie a vertu de digerer, resoudre, & meurir.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A *Melilot* cuit en vin doux, à part soy, ou avec le iaulne d'un œuf rosty, ou farine de Fenugrec, ou de semence de Lin, ou avec fine fleur de farine, ou avec Cichorée, appaise & amollit toutes sortes de phlegmons, signamment qui viennent es yeux, en la matrice, au tiege, & es genitoires, appliqués dessus.
- B Avec noix Galles, ou croye & bō vin induit, guerit la tigne & telles roignes iectans de la bouë.
- C Iceluy crud & beoyé, ou cuit en vin, appaise douleurs d'estomach, & resout les apostemes d'iceluy, appliqué dessus.
- D Le ius d'iceluy instillé dedans les oreilles, oste la douleur d'icelles, & induit sur le front avec huile rosat & vinaigre, guerit douleur de teste.
- E Le *Melilot* vulgaire est vsurpé & trouué bon, par tout où l'autre est conuenable: On en vŕe principalement pour felder & appaiser douleurs, comme des fleurs de Camomille.
- F Iceluy cuit en vin & beu, prouoque l'vrine, & rompt la pierre, appaise douleurs de rongons, de la vessie, & du ventre: & meurit & fait sortir hors du thorax les phlegmes.
- G Le ius d'iceluy instillé aux yeux, éclarcit la veue, il digere, efface, & oste la maille & tache en l'œil.

## De Medica.

## Chap. XL.

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes de *Medica*, lesquelles nous auons veu en ce pais. La premiere espece a les filiques plattes & tournoies, & l'autre l'es a longues, rudes & poinctues, au reste elles ressemblent fort l'une à l'autre.

## LA FORME.

*Medica.*

## Foin de Bourgoigne.

- 1 La premiere espece de *Medica* a plusieurs tiges rondes, tendres, lesquelles ne croissent pas en haut, mais s'espandent sur la terre, comme fait le *Trefle* vulgaire. Les fueilles ressemblent à celles du *Trefle* vulgaire. Les fleurs sōt petites, de couleur palle iaulne, & croissent communemēt toujours trois ensemble. Lesquelles passées y vient de filiques plattes, tournoies en vn comme la coquille des Escargots, dedans lesquelles est contenue la graine. La racine est gresse, & perit en ce pais, quand vne fois elle a porté semence.

- 2 La seconde espece de *Medica*, est fort semblable à l'autre de tiges, & fueilles: seulement les filiques ne sont pas si plattes, mais plus longues & poinctues, qui contiennent vne graine semblable à l'autre.

- 3 Outre ces deux, il y a encores vne autre espece de *Medica* ou *Trefle* estrange, lequel ne se couche pas sur terre, mais s'eleue iusques à pied & de my, ou deux pieds de haut. Il porte tiges dures, rōdes, diuisées en plusieurs braches, sur lesquelles croissent fueilles asses larges, gristres, & espesses, trois sur vne queue, bien pres semblables aux fueilles de *Trefle* ou Fenugrec, pl<sup>us</sup> petites toutesfois. Les fleurs sont blanches, entremeslées de couleur incarnée. Toute l'herbe tant tiges que fueilles, est blanchatre, & couuerte d'une laine deliée & douce.

## LE LIEV.

Cette espece de *Trefle* croist en Italie & Espagne. Elle ne croist point d'elle mesme en ce pais sinon semée es iardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

*Medica* fleurit en ce pais en Iuillet, & vn peu apres viennent les filiques tournoies.

La tier-



3 La tierce espece fleurit en ce pais à la fin de l'esté.  
LES NOMS.

1.2 Les deux premieres especes de ceste sorte de Trefle s'appellent en Grec *μυσθωι* en Latin *Medica* en incognue es Boutiques: en François Poin de Bourgongne: en Aleman *Jtsaliensche Klaueren*.

3 La tierce espece est tenue d'aucuns pour Glaux, & d'aucuns pour Anthyllis, des autres pour Polygala. Mais selon mon iugement elle semble avoir plus grande similitude avec l'Oxytriphylon, *ὄξυτριφύλλον*, que Scribonius Largus décrit au chap. 144.

LE TEMPERAMENT.

Medica est de temperament froid. LES VERTVS ET OPER.

A Medica est conuenable contre toutes maladies chaudes, & apostemes qui demandent d'estre refroidies & sechées. C'est aussi tresbon soufrage pour beulz & vaches, & pour ceste cause a elle esté par cy deuant semée des anciens Romains, & en grand vlsage.

Du Trefle puant, ou Bitumineus. Chap. XLI.

LA FORME.

Trifolium. Vray Trefle.

Entre tous les Trefles cestuy cy est le plus grand de fueilles que nous ayons encores veu. Il a les tiges grandes, rudes, hautes de pied & demy, ou de deux, sort brâchées, sur lesquelles croissent tousiours à vne queue trois fueilles ensemble, de couleur noiratre, & beaucoup plus grandes que celles du commun Trefle. Les fleurs croissent à costé des branches sur longues queues, plusieurs amassées ensemble, bien pres comme les fleurs de Scabieuse, de couleur cerulee. La graine est large & velue, poinctue par le bout. La racine est gresse. LE LIEV.

Les Herboristes de ce pais sement aussi en leurs iardins ceste espece de Trefle.

LE TEMPS.

Ce Trefle fleurit en ce pais au mois d'Aoust.

LES NOMS.

Ceste espece de Trefle se nomme en Grec *ῥιζοφυλλον*, *ῥιζοφυλλον*, *μυσθωις*, *ἀσφάλητις*, *κὴ* *ἀνθῆ* en Latin *Trifolium* & *Trifolium odoratum*, à present *Trifolii scetidam*, *Trifolium bitaminosum*: en François Vray Trefle, Trefle bitumineus & puant: en Aleman *Groote Klaueren*.

LE TEMPERAMENT.

Ce Trefle est chaud & sec au tiers degré.

LES VERTVS ET OPER.

- A Les fueilles & fleurs ou semence de ce Trefle beues en eaué, donnent allegiance à douleurs de costé, à difficulté d'vrine, au haut mal, aux hydropiques, & aux femmes qui sont travaillées d'estouffement de matrice, car prinse en telle sorte, elles prouoquent l'vrine, & esmeuent le flux menstrual.
- B Lesdictes fueilles prinsees en Oxymel, donnent secours contre morsures de bestes venimeuses. La decoction de ce Trefle avec ses racines est fort bonne à ce mesme, si on en laue les piqures & morsures desdictes bestes venimeuses.
- C D'auantage on mesle vtilement lesdictes fueilles ou racine parmy la Theriaque, Mithridat & semblables Antidotes qui se font contre poyson.
- D On dit aussi, que trois fueilles de ce Trefle beues avec vin auant l'accès, guerissent la fiure tierce: pareillement quatre fueilles, la fiure quarte.

Du Pied de lieure.

Chap. XLII.

LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Pied de lieure, Grand & Petit, au reste semblables l'un à l'autre de fueilles & figure.



## LA FORME.

**P**ied de lieure a la tige røde, velue: les fueilles fort semblables aux fueilles de Trefle commun. Les fleurs croissent au plus haut des tiges, dedis vn espi velu, fort ressemblant au Pied d'vn lieure. La racine est petite & dure.

## LE LIEV.

Le Pied de lieure, signamment le Petit, est fort commun en ce pais par tous les champs.

## LE TEMPS.

Le Pied de lieure se trouue avec la fleur le plus souuent en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *λαγώπους*: en Latin *Lagopus*: d'aucuns *Leporis erianum*: maintenant *Pes leporis*, & *Trifolium hamile*, c'est à dire en François Pied de lieure & Trefle bas en haut Aleman *hasen fusz*, *Katzenhlee*, *Katzle*: en bas Aleman *hasen post hene*, *hasen Bortkens*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Pied de lieure est sec iusques au tiers degré, & assez froid.

## LES VERTVS ET OPER.

**A** Le Pied de lieure cuit en vin & beu, arreste flux de ventre, & guerit la dysenterie.

## Du Pain de cocu ou Alleluja.

## Chap. XLIII.

## LA FORME.

**P**ain de cocu est vne herbe basse sans tiges: Les fueilles croissent de la racine sur courtes queues & à leur sortir sont ployées ensemble, puis apres elles s'espandissent & iont de belle couleur verte, & de figure bien pres semblable au Trefle, sinon que chacune fueille a au milieu vne fente profonde. Entre les fueilles croissent sur courtes queues sortans de la racine les fleurettes, bien pres formées comme de petites clochettes, de couleur blanche, ayant de veines purpurées tout du long, aucunesfois de couleur iaulnatre. Icelles tombées, il vient en leur lieu de calicules aigus, remplis d'vne graine iaulne. La racine est brun rougeatre & longue.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en ce pais es bois ombreux, aux racines de gros arbres, aucunesfois aussi sur le bord des fossés.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en Aueil, & au commencement de May.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appellée en Grec *έξίς*: en Latin *Oxyris*: es Boutiques *Alleluja*, d'aucuns *Trifolium aceto sum*, & *Pain euellien*: en François Pain de cocu: en haut Aleman *Saurethlee*, *Buechlee*, *Buchampffer*, *Buechot*, *Sauechlee*, & *Sauechgauerschlee*: en bas Aleman *Lorchcoecha* *hsoot*.

## LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est froide & seche, come l'Ozeille.

LES



Oxyr.

Pain de Cocu.



LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Pain de cocu est bon à ceux qui ont l'estomach debile & maladeux, car il seche & reforcist A l'estomach, & refuseille l'appetit.

Il est bon contre vlcères pourris & puants de la bouche, si on la lue de la decoction d'iceluy. B

Du Gramen. Chap. XLIII.

LES ESPECES.

ON trouue beaucoup de fortes de Gramen, lesquelles ressemblent asses l'vne à l'autre de chaulme & de fueilles, mais non d'espiç, car l'vn a l'espiç d'Orge, l'autre de Mil, l'autre de Panis, l'autre d'Yraye, ou d'autres herbes inutiles qui croissent entre le Blé, l'vn a l'espiç rude & piquant, l'autre du tout doux, & l'autre linugineux comme cotton, tellement qu'il y a fort beaucoup de fortes de Gramen, & diuerses. Desquelles nous ne voulons parler en ce lieu plus amplement, attendu que seulement nous voulons descrire le Gramen qui a esté vsurpé des Medecins anciens, & appellé particulierement *Agrostis* & *Gramen*.

LA FORME.

Le Gramen duquel nous parlons à ceste heure, a les fueilles longues, & rudes, bien pres semblables aux fueilles de Roseau, beaucoup plus petites toutefois, plus grandes neantmoins & plus larges que les fueilles du Gramen qui croist communement es prés. Les chaulmes gresles, d'enuiró vn pied ou deux de haut, séparés en cinq ou six iostures, au sommet de squez y croist des espiç doux, bien pres semblables aux espiç de Roseau, beaucoup toutefois plus petis, & plus gresles. La racine est longue, blanche, fort genoillée, se trainant ça & là, entrelassée en vn, & reiectant en plusieurs endroits, & à ceste cause, produisant ausi mout de fueilles & de tiges. LE LIEV.

Ce Gramen ne croist point es prés ou lieux bas comme l'autre, mais prouient es champagnes à Blé & au bord d'icelles. Et est vne plante mauuaise & domageable aux Bleds, laquelle les Paisans ne voyent guere volontiers sur leurs champs: Pourtant prennent ilz grande peine à l'arracher hors d'iceux.

LE TEMPS.

Il fleurit en Iuin, & bien pres tout le log de l'esté.

LES NOMS.

Ce Gramen est appellé en Grec *ἄγροσις*: en Latin *Gramen*: en François *Grame* ou *Dent au chien*: en bas Aleman *Sedgras*, & *Knoopgras*: & du Paisan *Pœn*. On deuroit vser d'iceluy es Boutiques.

LA CAUSE DV NOM.

Ce Grame est appellé en Grec *ἄγροσις*, *Agrostis*, pour ce qu'il croit par les champs à Blé, qui se nommēt en Grec *ἄγροι* *Agroi*, parquoy on peut facilement cognoistre que l'autre Gramen vulgaire n'est pas *Agrostis*. LE TEMPERAMENT.

Le Grame est froid & sec de temperature.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de Gramen cuicte en vin & beuë, appaise douleurs & trenchées de ventre, prouoque A l'vrine, & fait sortir la grauelle, & prouistte grandement contre difficulté d'vrine.

Icelle frefche broyée avec les fueilles, guerit playes nouvelles, & arreste le sang appliquée dessus. B

De Phenix.

Chap. XLV.

LA FORME.

PHenix est vne forte d'herbe inutile, semblable bien pres à l'Yraye d'espiç & de fueilles, plus petite toutefois & plus courte. Elle a les fueilles asses longues & larges, bien pres comme l'Orge, plus petites toutefois. Le chaulme est court, genoillé, & rougeatre. Les espiç croissent en mesme



façon que l'Yuraye, mais ilz sont separéz plus loing l'un de l'autre.

Il se trouue encore vne herbe fort semblable à la precedente, laquelle croist bien pres par tous les prés & iardins: Elle a toute fois les fueil les plus estroictes, les tiges pl<sup>us</sup> gresles, & iamais rouges, mais toujours de couleur verte obscu re, comme aussi toute la plante, parquoy on les peut facilement discernier l'une de l'autre.

#### LE LIEV.

Phoenix croist aux bors des champs, il s'en trouue grande quantité au pais de Liege. Et croist aussi selon Diof. sur le toict des maisons.

#### LE TEMPS.

Phoenix est meure en Iuillet & Aouft, come les Blés.

#### LES NOMS.

Cette herbe se nome en Grec φαινεξ: en Latin Phoenix, & d'aucuns Modernes Lotu rubrum.

#### LE TEMPERAMENT.

Phoenix desoche sans acrimonie, come escrit Galien.

#### LES VERTVS ET OPER.

- A** Phoenix prinse avec vin rouge, arreste le flux de ventre, le flux menstrual des femmes, & pareillement le par trop abondant flux d'vrine.
- B** On trouue aussi par escrit, q<sup>ue</sup> si ceste herbe ens uelopée d'us vne peau punicee est liée au corps d'une personne, qu'elle arreste tout flux de sang.

#### De l'Aueron. Chap. XLVI.

#### LA FORME.

Aueron est vne herbe inutile, fort semblable à l'Auoyne de fueilles, chaulme, & espiz, si nō qu'il a les fueilles pl<sup>us</sup> petites, le chaulme plus court & plus menu, & les espiz plus lōgs, plus se parez l'un de l'autre, plus rudes, & plus barbus.

#### LE LIEV.

Il croist aux bors des champs, & le long des voyes.

#### LE TEMPS.

On le trouue bien pres tout l'esté avec ses espiz.

#### LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec ἄβρουσεν Latin Bromus, & à la difference de l'Auoyne qui s'appelle ainsi, ἄβρουσεν, Bromus herba, & Aueron herba. Elle a trouué ce nom à cause de la similitude qu'elle a avec l'Auoyne: en François Aueron, ou Aueneron.

#### LE TEMPERAMENT.

L'Aueron est de temperament sec.

#### LES VERTVS ET OPER.

- A** Ceste herbe cuicte en eauë avec sa racine iusques à la consumptiō de la tierce partie, puis la dite decoctiō cuicte derechef avec miel iusqs à ce qu'elle deuiene espesse, est bōne pour oster la punaifc des vlcères au dedans du nez, mise dedans avec vne meche, principalement en y adioustant de l'Aloë.
- B** Celle boullie en vin avec des Roses seches, amende aussi la puicteur de la bouche, si on l'en laue à tout.


De Au-

Phoenix.



Bromus.

Aueron.



## LA FORME.

Ceste herbe a les tiges rondes, tendres, genoilées, couchées par terre, à chaque neud croissent deux feuilles l'une contre l'autre, dures, larges, & aigues par le bout. Les fleurs sont blanches, parties en cinq fucillettes. Et icelles tombées y croist de ronds chapiteaux, non guere differens aux têtes de Lin, dedans lesquels est la graine. Les racinettes sont grosses, noueuses, se trainans ça & là.

## LE LIEV.

Elle croist en ce país le long des chāps, & sous les hayes & buissons. LE TEMPS.

On la trouue en fleurs en Avril & May.

## LES NOMS.

Ceste herbe à grande similitude avec l'herbe appellée en Grec κραταγόμου, κραταίονον, και κραταίον. en Latin Cratogeomum, Cratæonum, & Cratæum: elle s'appelle en haut Alemá Augétrost gras, & là selon en Brabanton Dogentrostgras cest à dire Gramen confortant les yeux.

## LE TEMPERAMENT.

La graine de Cratogeomum seche & eschauffe.

## LES VERTVS ET OPERAT.

On escrit que si vne femme boit trois iours durans à ieu la graine de Cratogeomum, apres qu'elle est purgée de ses fleurs, que l'enfant quel le conceura en dedens xl. iours, sera male.

## De Bupleurum. Chap. XLVIII.

## LA FORME.

Bupleurum a les feuilles longues, estroictes, plus grandes, & plus larges que les feuilles de Gramen, au reste non guere dissemblable. Les tiges sont de trois, quatre pieds de haut, ou d'auantage, rōdes, droictes, espelles, fort genoillées, lesquelles se fendent en plusieurs branches, au sommet desquelles croissent par esmouchettes fleurs iaulnes, & puis apres la graine, qui est longuatre.

## LE LIEV.

Ceste herbe ne croist de soy mesme en ce país, mais les Herboristes la sement en leurs iardins.

## LE TEMPS.

Elle fleurit & produit sa semence en Iuillet & Aoast.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec βούπλευρον: en Latin Bupleurum: nous ne sçauons si elle a autre nom.

## LE TEMPERAMENT.

Bupleurum est temperé en chaleur & secheresse.

## LES VERTVS ET OPER.

A Ceste herbe a esté par cy deuant nombrée entre les Herbes à porée, & prisee d'Hippocrates pour vne viande conuenable, selon Plin.

B Les feuilles d'icelle pilées avec sel & vin & appliquées, digerent & effacent les strumes.

C Elle est aussi singuliere cōtre morsures de serpens, si celuy qui est mors, boit la graine d'icelle avec vin, & laue la morsure de la decoction des feuilles d'icelle.



Bupleurum.



## LA FORME.

Catnanace.

Ceste herbe ressemble aussi au Gramen, elle a feuilles estroictes & deliées, seblables aux feuilles de Gramen, plus petites toutesfois, lesquelles apres estre sechées, se courbent enuers terre. Les tiges sont tendres, gresles, & courtes, sur lesquelles croissent petites fleurs, & puis apres des siliques rondes, menues, & longues, dedas lesquelles est enclose vne graine rouillatre.

De ceste espeece s'en trouue il encore vne au tre, laquelle n'a pas les siliques rondes, mais larges, & plattes, au reste semblable à l'autre.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist aucunesfois par les chāps. Mais celle qui a les siliques plattes se trouue le plus souuent en la plage de la mer.

## LE TEMPS.

Catanance produit ses fleurs & siliques en Iuillet & Aoult, aucunesfois aussi plus tost.

## LES NOMS.

Ceste herbe a fort grande similitude avec celle que les Grecs appellent *καταναξ*, & les Latins *Catanace*. Et semble que ce soit la premiere espeece de Catanace descrite par Dioscoride.

## LE TEMP. ET OPERAT.

Catanance n'a iamais esté vsurpée en Medecine, & ne l'est encores maintenant que se sache.


## De Moly. Chap. L.

Moly Plinij.

Moly de Plin



Pseudo Moly. Moly bastard.





## LA FORME.

- 1 Moly selon Dioscoride a les feuilles comme Gramen, plus larges toutesfois, & couchées par terre. Les fleurs sont blanches, semblables en figure aux Gyroliées, mais plus petites. La tige est blanche, de quatre coudées de haut, au sommet de laquelle croist quelque chose en forme d'Ail. La racine est petite, & ronde comme vn oignon, ou bulbeuse.
- 2 Plloe au chap. 4. de son liure 25. fait mention d'encores vn autre Moly, lequel n'a pas la racine bulbeuse, mais longue & gresse. Il a aussi les feuilles gramineuses, couchées par terre, entre lesquelles prouient vne tige ronde, gresse, vnie, se partissant au sommet en plusieurs branchettes, sur lesquelles croissent fleurcettes blanches, nō guere differentes aux fleurs de Gyroliées, plus petites tous tesfois. Les racines sont longues & gresses & fort fibreuses.
- 3 On peut aussi nombrer entre les especes de Moly vne forte de Gramen croissant le long de la mer, lequel est fort tendre & petit, portant feuilles petites, estroictes, courtes, estē dues aussi pour la plus part sur la terre, entre lesquelles viennent tiges tēdres, courtes, & gresses, produisant au sommet leurs fleurs par bouquets, de couleur blanche en purpurée. Les racines de cestuy cy sont aussi tendres, gresses & longues.

## LE LIEU.

- 2 Le second Moly prouient selon que dit Pline en Italie, en lieux pierreux, les Herboristes de ce pays le plantent en leurs iardins.
- 3 Le Gramen croissant le long de la marine, se trouue en aucuns endroits de Zoelande, en lieux humides & es basieres.

## LE TEMPS.

- 2 Le Moly de Pline fleurit en ce pays en Iuillet.
- 3 Le Moly bastard fleurit le plus souuent tout l'istē.

## LES NOMS.

- 1 Le premier s'appelle en Grec μάλο, & en Latin Moly.
- 2 Le second est aussi vne espece de Moly, & se nomme Moly Plinij, cest à dire Moly de Pline.
- 3 Le Gramen croissant sur la marine s'appelle aussi ψευδομάλο, Pseudemoly, cest à dire Moly bastardice n'est toutesfois vne espece de Moly, mais plustost vne espece de Gramen.

## LE TEMPERAMENT.

- 1 Le vray Moly qui est la premiere espece, est chaud iusques au tiers degré, & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 La racine de Moly prinse, prouoque l'vrine, & appliquée en forme de pessus avec vnguentum A Irinum, ouure les opulations de matrice.
- 2 Le Moly est aussi singulier contre enchantemens, se dit Pline, disant que Mercure le monstra B & donna à Vlysses à fin qu'il fut exempt & libre de tous les enchantemens de Circe Nagicienne.

## Du Gramen de Parnafus.

## LA FORME.

Ceste herbe a des feuillettes rondes, non guere differentes en figure aux feuilles de Lierre, ou du Cabaret, beaucoup toutesfois plus petites, & de couleur non si obscure. Entre lesquelles prouienneot deux ou trois tigarettes gresses, d'environ vn pied de haut, & par bas rougeatres, portés au sommet de belles fleurs blanches, lesquelles passées y vient de rōds chapiteaux, qui contienent vne semence rouffatre. La racine est assez grosse, ayant mout de fibres.

## LE LIEU.

Ceste herbe croist en lieux humides, & se trouue en aucuns endroits de Brabant.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en ce pays en Iuillet, & bien tost apres liure elle fa semence.

## LES NOMS.

Pour la similitude que ceste herbe a avec le Gramen appelé en Grec ἀρωσις ἢ τῷ παρισσῷ γινωσκόμενον en Latin Gramen Parnasium: on l'appelle en ce pays Gramen de Parnasien: en bas Aleman Gress van Parnasuo.

Gg ij LE

## Chap. LI.

Gramen Parnasi.

Gramen de Parnasus.



## LE TEMPERAMENT.

La graine du Gramen de Parnafus est sèche, & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** La decoction de Gramen de Parnafus beuë, sèche, renforce l'estomach humide & débile, & les entrailles humides, serre le ventre, & oste l'appetit de vomir.
- B** Iceluy bouly en vin ou en eauë, prouoque l'urine, signamment la graine d'iceluy, laquelle ne prouoque pas seulement l'urine, mais aussi rompt la pierre & la pouffe hors, quand on la boit.
- C** Les feuilles nouuelles broyées & appliquées sur playes sresches, arrestent le saigner d'icelles, & consolident playes.
- D** Duius de ceste herbe on fait vn tresbon Collyre pour les yeux, lequel conforte fort la veuë, & esclarcist les yeux, si on y adiouste autant de vin que de ius, & à moytié autant de myrrhe, avec vn petit de poyure & encens. Pour conseruer long temps ledict collyre en sa boneté, il le faut garder en vne boytte de cuyure.

## Du Ionc.

## Chap. LII.

## LES ESPECES.

IL se trouue en ce pais quatre ou cinq especes de Ionc vulgaire.

## LA FORME.

Iancus.

Ionc.

Tous Ioncs ne sont autre chose q'longues vergettes, gresles, vnies, rōdes, sans feuilles, & la racine dont ilz sortent est large, & entrelassee. Les fleurs & graine croissent à costé au pl<sup>r</sup> haut des vergettes par bouquets.

- 1** La premiere espece est pleine de moelle blanche, la quelle tirée hors, resēble à filetz longs, blancs, & doux, & sert de brusler aux lāpes, mesme on en fait beaucoup de gentilleses.
- 2** La seconde espece est vn peu plus rude & dure au manier q'la precedente & contient fort peu de moelle dās soy, qui n'est pas serree ne ferme, tellemēt que rē ne demeure en la tirant hors, parquoy elle est inutile: mais le Ionc estant sec, est plus flexible, & meilleur à lier quelq' chose que nul autre.
- 3** Le tiers n'a pas aussi beaucoup de moelle, d'auantage, ilz ne croissent pas tous à part de la racine, mais beaucoup ensemble comme les racines du Glaieu, tellement q'vn Ionc fort de l'autre. De ceste espece sen trouue il aussi vne sorte fort petite, non plus haute d'vne paulme, de couleur grisatre, sans porter ne fleur ne semēces: on la trouue le plus souuent es landes seches, & terre sterile.
- 4** La quatriesme espece est grāde, de huit ou neuf pieds de haut, de la grosseur d'vn doigt, spōgieuse par dedāscōme les roseaux dequoy on fait les Nattes: Et d'icelle on fait des Nattes qui se nōment Nattes de Ionc.
- 5** Outre ces especes de Ionc cōmun, il y en a encores vn estrange odoriferant & aromātic, lequel ne se trouue pas en ce pais, sinon es Boutiques des Apothicaires sous le nom de Squinantum.

## LE LIEV.

- 5** Le Ionc croist en lieux bas & aquatiques. Le petit croist seulement en terre sèche, maigre & sablonneuse, & es landes, cōme dict est. Le Ionc odoriferant prouient en Arābie, Afrique, & Indes.

## LES NOMS.

- Les Ioncs se nōment en Grec *Χοιρον*: en Latin *lucē*: en haut Alemā *Bintzē*: en bas Alemā *Biesen*.
- 1** La premiere espece s'appelle en Grec *Χοιρον λευκον*: en Latin *Ioncū leuis*, de Pline *Strisear*: en bas Alemā *Wersch Biesen*, c'est à dire Ionc à Moelle.
- 2, 3** Le second est appellé en Alemā *Yseten Biesen*, & le Tiers *Strop Biesen*, lesquels semblent vne sorte

sorte de  $\alpha\lambda\upsilon\chi\alpha\iota\omega\varsigma$ . en Latin *Iuncus acutus*.

B Le petit semble bien aussi estre vn  $\alpha\lambda\upsilon\chi\alpha\iota\omega\varsigma$  & *Iuncus acutus*, principalement celuy qui est fertile.

4 Le quatriesme est appellé en Grec  $\lambda\alpha\lambda\alpha\chi\alpha\iota\omega\varsigma$ , & li selon en Latin *Holostichum* : en bas Alemaïn *Matten blösem*, c'est à dire Ionc à faire nattes.

5 Le Ionc estrange se nomme en Grec  $\chi\alpha\iota\omega\varsigma$ . en Latin *Iuncus odoratus*, & *Iuncus argutus*, la fleur duquel est appellée en Grec  $\chi\alpha\iota\omega\upsilon\varsigma$  en Latin *Ianei flor*, & *Scham anthos* : de là vient ce nom *Squamant* qui est le nom duquel on nomme ce Ionc es Boutiques.

LE TEMPERAMENT.

Le Ionc commun est de temperament sec.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine du Ionc commun rostie & beue avec vn trépis, arreste flux de vêtre & des fleurs rouges A des femmes, & prouoq lvrine. Toutefois prins en trop grâde quâité, il engêdre douleur de teste

Du Roseau à faire Nattes.

Chap. LIII.

LA FORME.

Papyri species. Roseau à faire Nattes.

Ceste espece de Papyr a les fueilles fort lógues, rudes, & bien pres triangles, pleines par de dens de moelle spôgieuse. La racine est dure, espesse, & blanche, ayant plusieurs fibres & aucuns ie cils à costé, à plusieurs ioinctures, d'ou sortênt nouvelles fleurs, & nouvelle plâte. Quand les racines sont bien seches, elles brulent fort bié & clair. LE LIEV.

Ceste espece de Glaieu croist le long des grandes riuieres, des grans flots, & viuiers, & on la trouue en ce pais en plusieurs lieux.

LES NOMS.

Ceste espece de Glaieu ou Roseau se nôme vulgairement Roseau à faire nattes: en bas Ale maïn *Mattē lisch*, pour ce qu'on en fait des nattes. Et semble q ce soit vne espece de la plante qui se nôme en Grec  $\pi\acute{\alpha}\pi\upsilon\varsigma$ , & en Latin *Papyrus*, leq̄l Strabo appelle aussi  $\beta\acute{\iota}\beta\lambda\omicron\varsigma$ , *Biblas*, le quel est vn tresgrâd Glaieu, portât fueilles fort larges, & la racine fort grosse, de la grosseur d'vn bras, & croist en Egypte en la riuere du Nil, duquel par cy deuit on faisoit du Papier pour escrire, côme on fait maintenant de vieux

linges, leq̄l s'appelle aussi papper, selô le papier des anciens. LE TEMP. ET VERTVS

A Ce Glaieu ressemble de temperament & de facultez au Papier, parquoy il seche sans acrimonie, signâment les cendres d'iceluy, le quel les pitteut aussi cōtre vlceres rongêts, principalement qui sont en la bouche, espâdnes dessus

B Avec les fueilles d'iceluy on ouuroit & elargiroit bien les fistules & playes estroictes, comme on faisoit par ty deuant à tout les fueilles du Papier: Mais les Chirurgiés modernes se seruent en cela d'esponges, & aucunesfois aussi de la moelle du Suseau ou Suyn.

C Des fueilles seches d'iceluy on en fait & tist les nattes pour mettre sous le liç, & sur les châbres & greniers. Et la racine est aussi aucunesfois brullée du poure home: côme la racine de Papyrus en Egypte.

Du Typha aquatique, ou Masses. Chap. LIIII.

LA FORME.

Ceste herbe a fueilles longues, estroictes, poinctues, fort semblables aux fueilles de Roseau. En tre les fueilles croist vne tige vnîe & nue, sans neuds, ou ioinctures, non creuse par dedans, & au plus haut elle produit vn espi gris, doux, espes, vni, qui ne semble autre chose que beaucoup de laine grisâtre fort serrée & amassée ensemble. Laquelle à la fin, prespi estat meur, s'en volle au vent. Elle est si tresdouce qu'en aucuns pais on en emplît les cousins & liçs, côme dit Leonhart Fuchs.



## LE LIEV.

Ce Typha croist en ce pais és estügs qui ne sont pas profonds, & eauës croupyes, & au bord des grandes Rivieres, & communement entre les Roseaux.

## LE TEMPS.

La Masse se trouue en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *τύφη*: en Latin *Typha*, & des Modernes *Typha palustris*, à la differenc de l'autre appellée *Typha cerealis*, qui est vne espece de Blé lequel a esté descrit au III. Chap. de ce liure. Draucuns est aussi appellée *Typha aquatica* & *Cestium morionis*: en François Marteau, Masses: en haut Aleman *Warrenhöben*, & *Sieshöpsen*: en bas Aleman *Sieshöbden*, & *Donfen*.

## LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est froide & seche.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La laine de ceste herbe incorporée avec sein de pourceau, guerit brulures appliquée dessus.

## De la Canne, ou Roseau. Chap. LV.

## LES ESPECES.

ON trouue mout d'especes de Roseau, cöme Diosc. & Pline escriuēt, dont la Sixiesme est commune, & biē cognue en ce pais. LA FORME.

- 6 Le Roseau vulgaire a la tige ou chaume long, fort genoillé, sur lequel croissent beaucoup de feuilles longues, rudes, & au sommet de grands espiz elpannis, lesquels se tournēt en laine douce, & fenuellent au vent, bien pres semblables à l'espi du Mil, plus grēds toutesfois. La racine est longue, blanche, & croist de trauers au fond de l'eauë.

- 7 Des especes de Roseau est aussi la Canne d'Inde, qui est fort haute, lögue, grosse & forte, de laquelle on vse aux Temples pour estaindre les chandelles.

- 8 Pareillement le Roseau ou Canne de la quelle on fait le sucre és Isles de Canare & aucuns autres endroits.

- 9 Outre toutes lesdictes especes, il y en a en core vn autre, odoriferant & aromatic, lequel est incognu en ce pais.

## LE LIEV.

Le Roseau vulgaire croist és eauës croupyes, & sur le bord des Rivieres.

## LES NOMS.


Ceste plante s'appelle en Grec *κάλανος*: en Latin *Horundo*, ou *Aranus*, & *Calamus*: en François Canne ou Roseau: en haut Aleman *Roh*: en bas Aleman *Kirt*.

- 1 Le premier se nome *ύος*, *Nell*, d'iceluy on faisoit au tēps passé les fleches & dards.


- 2 Le second s'appelle *κάλανος θύλης*, *Aranus do femina*, cestuy seruoit à faire des liquettes pour les Hautbois.

*Typha palustris.*

Masses.

*Horundo vellatoria.*

Roseau vulgaire.



- 3 Le tiers est nommé *συγγυϊας*, *Syngyias*, *Fistularis*, duquel on faisoit des flustes ou flageolz.
- 4 Du quatriesme on en escrivoit du temps passé, comme l'on fait à present des plumes d'oyson, lesquelles l'appellent pour ceste cause *Calami*.
- 5 Le Cinquiesme s'appelle *δ'ισαλ*, *Donax*, & *κάλαμος* *κύριος*, *Arundo Cypria*.
- 6 Le Sixiesme qui est nostre vulgaire Roseau s'appelle en Grec *κάλαμος* *φραγμαίτις*, c'est à dire en Latin *Arundo Vallatoria*, *Arundo Vallaris*, & *Arundo sepicularis*.
- 7 Le septiesme se nomme *κάλαμος* *ινδός*, & *Arundo Indica*: en François Canne: en bas Aleman *Kiet Van Indien*, & d'aucuns ausi *Kiet Van Spaengien*.
- 8 La Canne de sucre n'a point de nom particulier, sinon qu'on l'appelle à present *Arundo saccharata*, c'est à dire Canne de sucre: en Aleman *Sücher riet*.
- 9 Le Roseau odoriferant est nommé en Grec *κάλαμος* *αρωματικός*: en Latin *Calamus odoratus*, *Calamus aromaticus*, *Arundo odorata*, par tout incognu es Boutiques, car ce qu'ilz vendent pour *Calamus aromaticus*, n'est pas vn Roseau, ny racine de Roseau, mais est la racine d'une herbe semblable au Glaieu, laquelle est maintenant tenue pour le vray *Acorus*.

LE TEMPERAMENT.

Le Roseau est chaud & sec, se dit Galien.

- 9 Le Roseau odoriferant est aussi sec & chaud iusques au second de degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine du Roseau vulgaire bien pilée, tire hors les espines & eschardes, & meslée avec vinaigre, appaise la douleur des membres desnoués.
- B Les fueilles nouvelles & verdes bien broyées & induictes, donnent allegeance au feu volage, phlegmons & apostemes.
- C Les cendres du Roseau avec vinaigre guerissent la tigne de la tete qui fait tóber les cheveux.
- D Le Roseau odoriferant beu prouoque l'vrine, & cuict avec semence d'Apium, prouffitte contre strangurie, contre douleur de reins & de la vessie, & contre hydropisie.
- E Iceuy prins en quelque sorte que ce soit, est fort conuenable à toutes parties interieures, à les stomach, au foie, à la rate, & à la matrice, & contre rompures. LES NVISANCES.
- F La laine deliée de bespi de Roseau si elle tombe aux oreilles, elle les estoupe, & fait sourdesse difficile à guerir.

De Butomon. Chap. LVI.

LA FORME.

Ceste herbe a les fueilles lógues, estroictes, tailans à deux costez, & ayans le dos esléué, tellement quelles semblent bien pres triangles. Les tiges croissent entre les fueilles à la hauteur de trois ou quatre pieds, ou d'auantage, & portét au sommet, sur petites braches, de rudes testeliettes espineuses, d'enuiró la grosseur d'une noix. La racine est fort fibreuse. LE LIEV.

Elle croist en ce pais es prés humides, & aux bors des fossés & des Riuieres.

LE TEMPS.

Elle produict ses chapiteaux poinctz en Aouff.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *Βούτομος*: en Latin ausi *Butomum*: en bas Aleman *Kietgras*, pourtánt est elle tenue d'aucis pour l'espece de Gramé appelée de Dioscoride en Grec *καλαμώσπος*, *Calamogrostis*: en Latin *Gromen Arundinaceum*.

LE TEMPERAMENT.

Elle est de temperament froid & sec.

LES VERTVS ET OPER.

- A Aucis disent que les chapiteaux de ceste herbe cuictz en vin, pitent cogre morsures de bestes venimeuses, si on boit le vin, & qu'on en laue la morsure.

Du Cri-



## LES ESPECES.

IL y en a deux especes, l'une porte fleur rouge, & les feuilles fort menu déchiquetées. L'autre a les fleurs palles, & les feuilles longues & étroictes.

Alectorolobos.



Crista gallinacea.



## LA FORME.

La premiere a les feuilles fort menu decoupees, estenduees sur la terre: les tiges gresles, petites, & dont les vnes se trainent par terre, sur lesquelles croissent les feuilles: & les autres s'eleuent & croissent enuiron vne paulme de haut: sur icelles croissent les fleurs, depuis le milieu de la tige iusques en haut tout au tour, de couleur purpurée, aucunement ressemblans aux fleurs de l'Ortie morte. Lesquelles tombées, croist en leur lieu de filiques ou boursettes larges, ou la graine est contenue, qui est noiratre & platte. La racine est tendre & gresle.

La seconde espece a la tige droicte, atourée de feuilles estroictes, crenelées tout à l'enour. Les fleurs croissent tout à l'enour au plus haut de la tige, de figure semblable aux fleurs de la premiere, d'une couleur palle iusque toutesfois, ou blanchatre, apres lesquelles vient aussi de filiques ou boursettes larges, couuertes d'une peau platte, ouuerte par deuant, comme vne petite vesie. Là dedans est la graine, laquelle est platte, & brunatre. La racine est gresle & courte.

## LE LIEU.

Celle à fleurs rouges croist es prés humides, & nuit beaucoup à iceux.

Celle qui a fleurs palles ou palles croist en hauts prés, & pareillement par les champs, & est aussi vne herbe mauuaise.

## LE TEMPS.

Celle à fleurs rouges fleurit en May, & la semence est meure en Iuin.

L'autre fleurit en Iuin & Iuillet, voire bien pres tout le long de l'esté.

## LES NOMS.

La premiere est appellée de Pline en Grec  $\alpha\lambda\epsilon\kappa\tau\omicron\rho\alpha\lambda\acute{o}\beta\omicron\varsigma$ . Alectorolobos: en Latin Crista: en haut Aleman Rodel & Buan Rodel: en bas Aleman roode Ratsen. Elle s'appelle aussi des Modernes en Grec  $\phi\eta\sigma\iota\omicron\nu$ , Phezion: en Latin Pedicularis, c'est à dire Herbe aux pouds: en haut Aleman Buan leufshraut, pour ce que le bestail qui paist là ou elle croist abondamment, deuiet plein de pouds. Aucuns l'appellent Fiftularia.

L'autre espece est appellée des Modernes Crista gallinacea, & Crista galli, pour ce que de figure, &

de fleurs

de fleurs, & de boursettes, elle ressemble au Crista devant dict: en haut Aleman gref Kodes; en bas Aleman gref & wiste Katesen, & d'aucuns Hanchamm forme, cest à dire Creste de Coq.

LE TEMPERAMENT.

Elles sont toutes deux froides, seches, & astringentes.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La Creste rouge, se dit Pline, conforte la veue & eclairecist les yeux, quand on met la graine en A  
tiere de dans les yeux, car elle ne les blesse point, & attire à soy toute immondicité, puis l'enfle &  
deuient blanche, & en la fin tombe d'elle mesme hors des yeux.

Ceste herbe est aussi prisee des Modernes contre flux mestrual, & tout autre flux de sang bouil B  
lie en vin & beuë.

2 L'autre espee n'a aucune vertu particuliere que ie sache. C

Du Chamæleon. Chap. LVIII

LES ESPECES.

1 Chamæleon est de deux sortes selon Diofcoride, à sçauoir Blanc & Noir.

LA FORME.

1 Le Chamæleon blanc a les fueilles grandes, larges, espineuses, non guere differentes au Char-  
don sauuage, plus rudes toutesfois & plus aigues, lesquelles sont beaucoup plus grandes, plus for-  
tes, & plus grosses que les fueilles du Chamæleon noir; entre lesquelles fueilles sort de la racine yn  
rond chapiteau espineux, bien pres semblable aux testes des Artichaux, & porte fleur velue pur-  
purée. La graine est pres semblable à celle du Saffran bastard. La racine est logue, blanche par de-  
dens, d'un goust doux, & odeur aromatique.

2 Le Chamæleon noir a aussi les fueilles presque semblables aux fueilles de Chardon sauuage,  
plus petites toutesfois, & plus deliées, tachetées de rouge. La tige est rougeatre, ou brune en rou-  
ge, de la grosseur d'un doigt, & croist enuirs à la hauteur d'un picd, sur laquelle viennent de ronds  
chapiteaux ayans de petites fleurs poignantes de diuerse couleur, chacune dequelles n'est guere  
differente aux fleurs d'Isacynthe. La racine est grosse & ferme, noire par dehors, & jaunatre par de  
dens, acre & piquante à la langue, laquelle se trouue souuent entamee & morse.

LE LIEU.

1 Le Chamæleon blanc croist aux montaignes & semblables lieux incultiués, il ayme toutesfois  
terre grasse. On le trouue en Espagne au royaume d'Aragon le long des voyes.

2 Le Chamæleon noir croist en lieux secs, & lieux voisins de la mer.

LES NOMS.

1 La premiere espee s'appelle en Grec χαμακίον ή λιμός; en Latin Chamæleo albus, d'Apalein  
Cardus sylvaticus, d'aucuns aussi Eriofscerptum, ou Chrysofscerptum, Ixia, Cardus marianus, Cardus iri-  
nus, Cardus lacteus.

2 La seconde espee est appellée en Grec χαμακίον μέλας; en Latin Chamæleo niger, d'aucuns  
Pascarpion, Vlophonon, Cynometaron, Cynoxylon, Cynozolon, Oryzoides, Cnidius coccos, Cardus niger, Ver-  
nilago, Vbūlago, &c. Toutes les deux especes sont incognues en ce pais.

LE TEMPERAMENT.

Chamæleon est de temperament chaud & sec, signamment le noir, lequel est presque chaud  
iusques au second degré, & sec iusques au tiers.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La racine du Chamæleon blanc beuë avec vin rouge dans lequel ayt bouilli origan, tue & fait A  
fortir les vers larges.

Icelle cuiète en bon vin, est vile aux hydropiques, & contre difficulté d'vrine, car elle desenfle B  
les hydropiques, & euacue l'vrine.

Elle prouffite contre tout venin & poison que lon pourroit auoir prins. C

2 La racine du Chamæleon noir n'est guere conuenable à prendre au dedans, car elle à quelque D  
malignité occulte encluse en soy, comme dit Galien, pourtant a elle esté des Anciens seulement  
appliquée par dehors.

Icelle avec vn peu de couperose & suif de pourceau guerit la roigne, & en y adioustant du soul E  
phre & resine, elle guerit le feu volage, dartres, & toute mauuaise gratelle induicte dessus.

Icelle induicte au Soleil avec soultre seulement, efface dartres, taches blanches, & brulures du F  
Soleil qui sont en la face.

La decoction d'icelle faite en eau ou vinaigre, tenue en la bouche, guerit douleurs de dens. G  
Pareille vertu a aussi la racine broyée avec poyure & sel, & appliquée sur la mauuaise dent.

## LES ESPECES.


ON trouve en ce pais deux especes d'Eryngium, l'une s'appelle Grand Eryngium, ou Eryngium marin, & l'autre Eryngium simplement.

Eryngium marinum.

Eryngium marin.

Eryngium vulgare.

Eryngium vulgaire.



## LA FORME.

Le Grand Eryngium a les feuilles grandes, larges, blanchâtres, rondâtres, & espesses, un peu froncées par les bords, & espineuses çà & là, de goût aromatique: Les tiges sont rondes, & croissent environ à la hauteur d'un pied, de couleur rougeâtre par bas, sur lesquelles croissent ronds chapiteaux, espineux & poinçus, d'environ la grosseur d'une noix, semez-tout à l'entour de petites fleurs, pour la plus part de couleur celeste, en ce pais ayans de petites taches. Et droit loignant dessous les fleurs croissent cinq ou six feuilles poignantes tout au tour de la tige en forme d'estoil le, lesquelles avec le sommet de la tige sont aussi de couleur celeste en ce pais. La racine est de dix ou douze pieds de long, & souvent si tres ôgüe qu'on ne la peut avoir entiere, de la grosseur d'un doigt, genouillée par intervalles, & de saveur douce.

La secon de espece a les feuilles larges, froncées, de chiquetées, blanchâtres, & asourées de petites grandes espines. La tige est d'environ la longueur d'un pied, & a plusieurs branches, à la cime desquelles croissent petis chapiteaux ronds, rudes & piquans, semblables à ceux de l'Eryngium marin, beaucoup toutesfois plus petis, sous lesquels croissent aussi cinq ou six petites feuilles étroites & aigues, situées autour de la tige en forme d'estoilles. La racine est longue, simple, de la grosseur d'un doigt, noirâtre par dehors, & blanche par dedans.

## LE LIEU.

Eryngium selon Dioscoride croist en champs mal vnis & mal cultivez: on le trouve icy en Zee lande & Flandre sur les digues, & le long de la graue de la mer.

L'Eryngium vulgaire croist aussi en ce pais en semblables lieux. Il croist aussi en Allemagne le long du Rhin, & es landes seches, & le long des grands chemins: il y en a grand quantité au tour de Strasbourg.

## LE TEMPS.

Toutes les deux especes fleurissent en ce pais en Juin & Juillet.



LES NOMS.

La premiere espeece de ces Chardons se nomme en Grec *ερίγγιον* en Latin *Eryngium*. Plin e Paps pelle aussi *Eryng*. les Modernes *Eryngium maritimum*: les Arabes & Apothicaires *Irangu*: en Aleman *Cruffmoutte* & *Eindeloos*, & en anciens en droits de Flandres *Wetter mostete*.

L'autre espeece, en François Chardon à cent testes: en haut Aleman *Manstrem*, *Brachsen distel*, & *Krad distel*: en bas Aleman *Cruffdistel*: les Boutiques de maintenant aussi *Irangu*. C'est sans faus te nulle vne espeece d'*Eryngium* laquelle on peut bien appeller *Centamcapia*.

LE TEMPERAMENT.

*Eryngium* est temperé en chaleur & froideur, de parties toutesfois seches, & subtiles.

Le Chardon à cent testes est chaud & sec comme facilement on peut comprendre par le goust driceluy.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les premieres fucilles d'*Eryngium* sont bonnes à menger en salade, & les Anciens en ont ainsi A vsé, se dit Dioscoride.

Les racines d'iceluy cuites en vin & beues, prouffitent à ceux qui sont travaillez de la colique B & detrenchées de ventre, car elle les guerit, & chasse les ventositéz.

La mesme prise en ceste sorte, prouoque le flux menstrual.

Il est bon de boyre le vin auquel *Eryngium* a bouilly contre grauelle, & pierre, & difficulté d'vs D rine, car il prouoque l'vrine, il pousse hors la pierre, & guerit les accidens des rongnons, si on le boyt quinze iours durans.

Les mesmes racines prises en mesme sorte, sont vtils aux hepaticques, & à ceux qui sont mors E de quelque beste venimeuse, ou qui ont prins quelque venin, signamment quid on les boyt avec la graine de *Pastenade* sauvage.

Elle ayde aussi à ceux qui sont travaillez de conuulsion, & Epilepsie.

Icelle verde pilée, est vilement appliquée sur morsures de bestes venimeuses, & principalemēt G sur morsures de raines.

Les Apothicaires de ce pais font confire la racine d'*Eryngium*, pour donner à gens vieilles, & H autres qui sont secs & estropiez, pour les renforcer & nourrir.

*Carduus stellaris.*

Chaulsetrape.

La racine du Chardon à cent testes est aussi conficte en mesme maniere & donnée pour nourrir & renforcer, combien qu'elle n'approche à beaucoup pres de la bonté de l'autre.

Du Chardon estoillé. Chap. LX.

LA FORME.

C Hauffe trape a les fueilles velues, fort incisées: les tiges croissent enuiron pied & demy de haut, fort branchues, sur lesquelles croissent de petis chapiteaux ou testelettes comme aux autres Chardons, beaucoup toutesfois plus petis, & attourés d'espines piquantes en forme d'estoile, verdes au commencement ou brunatres en rouge, puis apres, palles ou blanches: quand les chapiteaux souuerent, ilz produisent vne fleur purpurée, & puis apres vne graine petite & en rondeur platte. La racine est longue, & brunatre par dehors. LE LIEV.

Ce Chardon croist en lieux mal cultiuez, & le long des voyes, il sen trouue grde quantité au tour de la marche de ville d'Anuers pres de l'Escault, & le long des nouvelles murailles de la Ville. LE TEMPS.

Ce Chard fleurit depuis le mois de Iuillet iusques en Aoust. LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle à present en Latin *Cardus stellaris*, & *Stellaria*, & *Chaulsetrape*: en François Chaulsetrape: en haut Aleman *Wassen distel*, Hh & Ra.



& Raden distil: en bas Aleman s'ertre distil. Que ce ne soit point vne espece d'Eryngium, il est assez manifeste, par ce qui en est escrit au chap. precedent.

## LE TEMPERAMENT.

Ce Chardō est aussi chaud de nature, cōme le goust de la racine dōne clerelement à cognoistre.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

On prise fort la graine d'iceluy puluerisēe & beuē en vin pour prouoquer l'vrine, pouffer hors la grauelle, & contre difficultē d'vrine.

## Du Chardon à carder. Chap. LXI.

## LES ESPECES.

Le Chardon à carder est de deux sortes, Le Cultiuē & le Sauvagē. Le Cultiuē les Foulons le sement pour s'en seruir. Le Sauvagē croist de son bon grē & on n'en vŕe point.

*Dipsacum satiuum.*

Chardon à carder cultiuē.

*Dipsacum syluestre.*

Chardon à carder sauvage.



## LA FORME.

Le Chardon à carder cultiuē a au commencement de longues fucilles & larges, crenelées tout à l'entour en forme de sie, entre lesquelles prouient vne tige creuse de trois pieds de haut ou d'auantage, à plusieurs branches, garnies de plusieurs espines poignantes & discernées par genicules, à chacun desquelz y croist deux grandes fucilles lōgues, lesquelles sont iomctes ensemble si trelbien au tour de la tige, que la pluye ou roufēe qui tombe dessus demeure là. Au sommet des branches y croist de longs chapiteaux rudes & piquans, reuestus de crochez, d'ou prouiennent de petites fleurs blanches cōtenuēs en cellules semblables à celles des Mouches à miel, dans lesquelles viēt apres la fleur, la graine semblable à graine de Fenoi, mais de goust amer. Les chapiteaux sont creus par dedens, & y croist communement de petis vers, lesquels on trouue en ouurant les chapiteaux. La racine est longue, vnie, & blanche.

- 2 Le Sauvage ressemble fort à l'autre, toutesfois les feuilles sont plus estroictes, & les fleurs purpurées, & les crochez de cestuy cy ne sont pas si sigus que les autres.
- 3 Il se trouve encore vne espeece de ce Chardon à carder, sauvage, laquelle croist le plus haut de tous, & a les chapiteaux non plus grands qu'une noix: quant au reste, elle ressemble bien pres à l'autre sauvage.

LE LIEU.

- 1 On sème en ce pais le Chardon cultiué en aucuns endroits de Flandre pour l'usage des Foulés & Drapiers.
- 2 Le Sauvage croist en lieux humides le long des Riuieres, & autres eaux.

LE TEMPS.

Le Chardon à carder fleurist pour la plus part en Iuin & Iuillet.

LES NOMS.

Ceste espeece de Chardon s'appelle en Grec *σι-λα-ξ*: en Latin *Dipsacum*, & *Labrum Veneris*, d'aucuns aussi *Chanelon*, *Crocodillon*, *Onocardion*, *Cneoron*, *Melera*, *Cinara rustica*, *Moreria*, *Cardus Veneris*, *Veneris laueram*, & *Sciaris*: és Boutiques *Virga pestoris*, & *Cardus subonius*: en François *Verge de berger*, *Chardon à foulon*, ou à carder: en haut Aleman *Kartz distel*, *Wabenstrel*, *wedertarten*: en bas Aleman *Caerden* & *Woltes caerden*.

- 1 Le Cultiué se nomme *Dipsacum satium* & *Dipsacum album*.
- 2 Le Sauvage se nomme *Dipsaca syluestris* ou *purpurea*.

LE TEMPERAMENT.

Le Chardon à carder, se dit Galien, est sec insques au second degré, & quelque peu absterisif.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de ce Chardon cuicte en vin, & puis après bien pilée insques à ce qu'elle soit redigée A en forme de vnguent, guerit les fendasses & fistules du fondement, Mais pour contregarder ledict vnguent, il le faut tenir en boytte de cuyure.

Les petis vers trouuez és chapiteaux du *Dipsacus* & pendus au col ou au bras, guerissent la B fièvre quarte, comme escrit Dioscoride.

De l'Artichaut.

Chap. LXII.

*Cynara.*

Artichaut.

*Cynara alia genus.*

Chardonnerette.



Hh ij

LES

## LES ESPECES.

Il se trouve maintenant deux especes d'Artichaut, l'un qui a les fueilles larges & non piquantes, qu'on appelle Artichaut, & l'autre qui a les fueilles poignantes & fort incisées, qu'on appelle Chardonnerette.

## LA FORME.

L'Artichaut a fueilles grandes, larges comme les fueilles du Chardon nostre dame, plus noires toutesfois, plus grandes & non piquantes, entre lesquelles prouviennent les tiges recueillues de fueilles semblables au deuant dictes, plus petites toutesfois, portans au sommet de testes grosses rondes & squammeuses, lesquelles produisent vne fleur purpurée quand elles fourrent, & puis apres liurent leur semece, semblable à la graine du Chardon nostre dame, plus grande toutesfois. La racine est longue & grosse.

L'autre espece appelée Chardonnerette a les fueilles grandes, longues, fort incisées à deux costez, & pleines d'espines pointues. La tige est longue, sur laquelle croissent de testes squammeuses, bien pres semblables aux autres.

Elles sont toutes deux d'une mesme espece, & ne sont tenues que pour vne, comme souuent de la graine de l'une en vient l'autre, signamment la Chardonnerette de la graine d'Artichaut. Ce que Palladius a bien aussi cognu lequel commande de rompre la pointe de la graine, à celle fin qu'il n'en vienne point la Chardonnerette.

## LE LIEU.

Ces deux especes ne croissent point en ce pais de leur bon gré, mais on les seme & plante es jardins.

## LE TEMPS.

L'Artichaut & la Chardonnerette produisent leurs chapiteaux en Aoust.

## LES NOMS.

Cette espece de Chardon, signamment la premiere, est appelée de Galien en Grec *κίναρα*; en Latin *Cynara*, *Cinara*, *Carduus*, & *Carduus sativus*, des Modernes à *roven*, *Aleopardin*, & *Artichaut*; en François Artichaut; en Italien *Articocco*; en haut Aleman *Stross*; en Brabant *Artichauts*, à Nimitation des François. Les chapiteaux se nomment *capitula*.

L'autre se nomme *Cynara arvensis*, en François Chardonnerette; en Brabant *Chardons*.

## LE TEMPERAMENT VERTVS ET OPERAT.

Les testes des Artichauts sont mal saines à manger, comme Galien escrit au liure de Alimentis, & de difficile digestion: parquoy engendrent mauuaises humeurs, signamment quand on les mange crues & encores dures, pourtant il vaut mieux de les manger boullies & bien preparées. Ilz n'ont pas d'usage particulier en Medecine.

Spina alba

Chardon nostre Dame.

## Du Chardon nostre dame. Ch. LXIII

## LA FORME.

Le Chardon nostre dame a les fueilles grandes, larges, blanchâtres, marquetées de mout de taches blanches, & atourées d'espines poignantes. Les tiges sont longues, grosses d'un doigt, au sommet desquelles croissent ronds chapiteaux à pointes agues, d'ou procedent belles fleurs purpurées & apres icelles aux mesmes chapiteaux croit la graine enclose dedâs vne laine, laquelle n'est guere differete de la graine du *Carthamus* sauuage, plus petite toutesfois, plus ronde, & plus nouratre. La racine est longue, grosse & blanche.

## LE LIEU.

Le Chardon nostre Dame croist de soy mesme en ce pais, bien pres par tous les jardins à la porée: aucunesfois aussi on le trouve en lieux mal cultuez.

## LE TEMPS.

Il fleurit en Iuin & Iuillet le mesme an qu'il est semé, & apres auoir liuré sa semence il perit.

## LES



LES NOMS.

Ce Chardon est appelle en Grec *ἄκανθα λαική*: en Latin *Spina alba*, d'aucuns aussi *Agriocinera*, *Donaicis*, *Erythrociprus*, *Spina regia*, & *Cardus Ramprarius*: des Medecins Arabes *Bedeguar*: en François Chardon nostre dame: en haut Aleman *Marier distel*, & *ffrautens distel*: en bas Aleman *Drifus Broumen distel*: es Boutiques *Cardus Maria*.

LE TEMPERAMENT.

La racine du Chardon nostre dame est seche & astringente. La graine est chaude & de parties subtiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine du Chardon nostre Dame beue en vin est vtile à ceux qui crachent sang, qui ont le A  
stomach debile, & ont le ventre trop relasché.

Icelle prinse en mesme sorte, prouoque l'vrine, & la pouffe hors.

Elle digere tumeurs froides, & molles induicte dessus.

Le vin ou elle a esté cuiçte appaife douleur de dens.

On donne vtilement à manger la graine aux enfans qui ont conuulsion de quelque partie, & à E  
ceux qui ont esté mors de serpens, ou autres bestes venimeuses.

Du Chardon estrange.

Chap. LXIII.

LA FORME.

*Spina peregrina.*

Chardon estrange.

CE Chardon a aussi les fueilles grandes, larges, de couleur verte obscure par dessus, & grises & velues du costé de dessous, fort profond incisées tout à l'entour, & pleines par les bors de petites poinçtes aigues. La tige est ronde, grosse d'un doigt, noiratre, d'environ quatre ou cinq pieds de haut, sur laquelle croissent belles testes rondes, rudes, portés tout autour beaucoup de petites fleurs blâchâtres, entremêlées de bleu. La racine est brunnate par dehors.

LE LIEV.

Ce Chardon est estrange en ce pais, & ne se trouue point sinon es iardins des Herboristes & Amateurs des herbes.

LE TEMPS.

Il fleurit en Juin & Juillet, vn an apres qu'il a esté semé.

LES NOMS.

Ce Chardon est appelle des Modernes en Latin *Spina peregrina*: en haut Aleman *wessch distel*, ou *Romisch distel*: en bas Aleman *Roomsche distel* & *Wesme distel*, c'est à dire Chardon Romain ou estrange. Comment il a esté appelle des Anciens nous n'en sçauons encore rien, si ce ne fust *Acanthus syluestris* avec lequel il semble auoir grande similitude.

LE TEMPERAMENT.

Ce Chardon estrange est chaud & sec, ce que facilement on peut cognoître par la forte odeur, laquelle on sent en hescachant entre les doigts, & par le goust acre d'iceluy.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Ce Chardon n'est pas en vsage que ie sache, sinon qu'aucuns escriuent que en Italie lon cuyt les testes d'iceluy avec la chair, puis on les menge comme les testes d'Artichaut.

De *Acanthium*.

Chap. LXV.

LA FORME.

*Acanthium* n'est guere different au Chardon nostre dame, Il porte fueilles grandes, larges, de couppees par les bords, & garnies d'espines poignantes, couuertes d'une laine douce & deliée. La tige est grande, grosse, couuerte d'espines piquâtes, sur laquelle croissent des chapiteaux rudes.

Hh ij sem.



semblables en figure & fleurs au Chardon nostre Dame. La racine est grande & grosse.

## LE LIEV.

Ce Chardon croist en ce pais, le long des voyes, aux bors des champs, & en lieux mal cultiuez & sablonneux.

## LE TEMPS.

Il fleurit depuis le moy de Juin iusques à la fin d'Aoult, ou encores plus tard.

## LES NOMS.

Ce Chardō se nomme en Grec *ακανθιον* en Latin *Acanthium*; en haut Aleman *weissy wege distel*, & là selon en bas Aleman *witte wech distel*, & *wilde* ou *grosse witte distel*; en François se peut nommer Chardon argentin.

## LE TEMPERAMENT.

Ce Chardon est chaud de nature.

## LES VERTVS ET OPER.

- A Dioscoride & Galien escriuent que les feuilles ou racines d'Acanthiū beuës, proufite à ceux qui sont trauaillez de cōuulsion en quelque membre.

De la Branche vrsine. Chap, LXVI.

## LES ESPECES.

LA Branche vrsine appelée en Grec *Acanthos*, est de deux sortes selon Dioscoride, à sçauoir la Domestique & Sauvage.

## LA FORME.

- 1 La Branche vrsine cultiuée a feuilles grādes, larges, de couleur verte obscure, charnues, vnies, profond incisées par les bords, comme les feuilles de Senecū blanc ou Roquette. La tige est longue, de la grosseur d'un doigt, couuerte de feuillettes longues & poignantes iusques au plus haut, entre lesquelles croissent belles fleurs blanches, & puis apres filiques larges, dans lesquelles est cōtenue vne graine isulnatre. Les racines sont visqueuses, rouges & longues.

- 2 La Branche vrsine sauvage ressemble au Chardō sauvage, rude & poignante, plus petite que la deuant dite se dit Dioscoride: Elle nous est encore in cogneue. Si ce n'estoit que le Chardon estranger duquel nous auons parlé cy deuant, fust l'Acanthus sauvage.

## LE LIEV.

La Branche vrsine croist par les Mrdins, & en lieux pierreux & humides selon Dioscoride. En ce pais on la trouue seulement es iardins des Herboristes.

## LE TEMPS.

La Branche vrsine cultiuée fleurit en ce pais en Iuillet & Aoult, & aucunes fois aussi plus tard.

## LES NOMS.

- 1 La Cultiuée s'appelle en Grec *ακανθιον* & *ακανθια*; en Latin *Acanthus* & *Acantha*, d'aucuns *Pederota*, *Herpacantha*, *Melampyridon*, *Topiaria*, *Marmoraria*, & *Crepula*; es Boutiques d'Italie & de France Brans

et vrs

Acanthium.



*Acanthus satiuus.* Branche vrsine cultiuée.



# De la Brâche vrsine bastarde. Ch. LXVII. Li. 4. 363

es vrsina, & là selon en François Branche vrsine: en haut Aleman *Bernhants*: en bas Aleman *Bees vrenhants*: elle est incognue és Boutiques de ce pais, & on y vſe au lieu d'icelle de l'herbe qui sera descrite au Chapitre ensuyuant.

- 2 La Sauvage est appelée de Dioscoride *Acanthus fylvestris*, c'est à dire *Acanthus* sauvage.

## LE TEMPERAMENT.

La racine d'*Acanthus* est sèche & tempérée en chaleur.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les racines d'*Acanthus* prinſes en breuuage font vriner, & serrent le ventre. Elles sont merueil A leusement vtils à gens surprins de conuulsion, rompus, & aux phtisiques, & ethiques.

Icelles verdes sont prouffitables aux brulures & dislocations, & on en fait vn bon cataplasme B contre podagres aux pieds & aux mains.

- 2 L'*Acanthus* sauvage est de pareille vertu que le Cultiué, comme escrit Dioscoride.

## De la Branche vrsine bastarde.

## Chap. LXVII.

### LA FORME.

*Branca vrsina Germanica.*  
Branche vrsine bastarde,

L'A Branche vrsine bastarde a les fueilles grandes, noïrâtres, rudes, fort fenduës & parties en cinq ou six fueilles. La tige est longue, ronde, creuse par dedans, genoillée, grosse d'vn doigt aucunes fois. Au som met des tiges croissent les fleurs par esmouchettes, qui sont blanches, & puis apres la semence qui est large & platte. La racine est blanche & longue.

### LE LIEV.

Ceste Branche vrsine croist au bord des champs, en lieux herbus & bas, & és prés.

### LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en Iuin & Iuillet, & liure ce pen dant sa semence.

### LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en haute & basse Alemagne *Branca vrsina*, & d'aucuns modernes *Pseudacanthus* ou *Acanthus Germanica*: en François Branche vrsine bastarde: en Alemâ *Teufsej Bernhants*, ou *Bernhants*: en Brabant *Bernhants*. On la tient maintenant pour l'herbe appelée en Grec *σποδύλιον*: en Latin *Spondylium*.

### LE TEMPERAMENT.

La Branche vrsine bastarde a vne chaleur manifeste.

### LES VERTVS ET OPER.

A La Branche vrsine bastarde digere & dissout les œdemes, broyée & appliquée dessus.

B Ceux de Pologne & de Lituanie font vn breuuage de la decoction de ceste plante avec du leuain ou quel que chose semblable, duquel ilz boyuent au lieu de Biere ou autre breuuage commun.



## De la Carline.

## Chap. LXVIII.

### LES ESPECES.

C'E Chardon est de deux especes, L'vne porte fleurs blanches sur vne tige de paulme & demy de haut ou dauantage. L'autre a belle fleur rouge sans tige.

### LA FORME.


La Carline blanche a longues fueilles, estroictes, rudes, & piquantes, profond incisées à chaque costé, lesquelles ont au milieu de costes rouges. Entre icelles vient la tige, d'environ paulme & demy ou dauantage de haut, portant pareilles fueilles, sur laquelle croist vn chapitre au

Leucocantha.

Carline blanche.

Spina Arabica.

Petite Carline.



plat en rōdeur, entourné tout au tour des pines piquées cōme le calyce de la chasteigne, lequel est large ouvert par le haut & milieu, & velu, & là autour de belles feuillettes blanches arangées, qui sont la fleur après la fleur passée, on trouve vne graine estroicte grise entre ce poil. La racine est longue, rōde, fendue communement par le milieu, d'odeur plaisante, & de goust acre & amer.

La seconde espece ressemble à l'autre de feuilles & racines, mais elle est plus petite. Les fleurs de couleur de Rose, bien rouges, & pousseient entre les feuilles, de la racine, sans tige, bien pres couchées sur la terre. La racine est rougeatre, & de forte odeur.

#### LE LIEU.

La Carline blanche croist en plusieurs lieux d'Italie, & d'Allemagne, sur hautes montaignes & rudes. Les Herboristes la sement icy en leurs jardins.

L'autre espece croist aussi en plusieurs endroits d'Italie & d'Allemagne, & en France cōme dit Ruelle, elle est incogne en ce pais. **LE TEMPS.**

Ces deux especes de Carline fleurissent en Juillet, & en Aoust.

#### LES NOMS.

La premiere espece de ce Chardō est appelleé en Grec *λευκοκανθα* (lequel nom est distingé de *Acantha leuce*, comme dit Dioscoride) d'aucuns *Polygonatum*, *Phyllo*, & *ischia*, & des Anciens Romains aussi *spina alba* maintenant on l'appelle *Carlina* ou *Carolina* à cause de Charlemaigne Empereur des Romains, auquel vn Ange mōstra ce Chardō comme lon dit, quand son exerceite fut surpris de soudaine maladie, ou Petite: D'aucuns aussi *Cardopodium*: en François Carline: en haut Aleman *Ebertwurty*, *Gepf ebertwurty*, & *welch ebertwurty*: en bas Aleman *Ewertwostele*, *witte Ewertwostele* & *Carlinum*.

L'autre espece est aussi vne sorte de Carline, & se nomme en François Petite Carline: en haut Aleman *hlein Ebertwurty*, & là selon en bas Aleman *chyn Ewertwostele*, & *eleyne Carlina*. Ce Char-



Chardon est tenu d'aucuns sçauans Cordeliers Romains pour le Chardon qui se nôme en Grec *ἀναβία ἀγροβία*, en Latin *Spina Arabica*, d'aucuns à *ambis*, & des medecins Arabes *Sachaba*: leur opinion me semble fort vray semblable, attendu que Dioscoride meisme escrit que *Spina Arabica* est fort semblable à *Spina alba*, c'est *Leucasantha*.

LE TEMPERAMENT.

La racine de Carline est chaude au premier degré, & seche iusques au tiers.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de Carline cuicte en vin, est singuliere contre vieilles douleurs de costé, & contre la A Sciaticque, quand on boit trois verres du vin auquel elle a esté cuicte.

Icelle prinse en mesme sorte, prouffite grandement à gens rompus & trauaillez de conuulsion. B A ce mesme est fort vtile de boyre le ius de la racine.

Icelle reduicte en poudre & prinse à la quantité d'une drachme, est de singuliere vertu contre C la Peste, car selon que lon trouue par escrit, tout l'exercice de l'Empereur Charlemaigne fut preserué de Peste par ceste racine.

Icelle tenue en la bouche, appaise douleurs de dens. D  
Icelle induite avec vinaigre, guerit de la galle & mauuaise gestelle. E

Si la Petite Carline est le Chardon appelle de Dioscoride *Spina Arabica*, & des Medecins Arabes *Sachaba*, elle arreste tous flux de sang, flux mensuel par trop abondant, & desfluxions de car- F  
tarthes tombans de la teste és parties basses, quand on la mengé.


De la Carline sauuage.

Chap. LXIX.

LA FORME.

CE Chardon a les feuilles longues, estroictes, profond incisées à chacun costé, & espineuses, fort semblables aux feuilles de Carline: au milieu desquelles croist vne tige droicte, ronde & menue, d'environ vn pied de haut, reuestue de pareilles feuilles, au sommet de laquelle croissent trois ou quatre chapiteaux ronds ou d'auantage, entourés d'espines piquantes comme le calyce des Chastaignes. Lesquelles fouurent bien large par le milieu, & produisent tout à l'enuirô de petites feuillettes pales en rouilissant qui est la fleur. Brief ces chapiteaux avec leurs espines, fleurs, & semence ressemblent fort aux chapiteaux de Carline, sinon qu'ilz sont plus petis & plus pales, tirant sur couleur saulne. La racine est gresse; & chaude à la bouche.

Carline *frustris*, Carline sauuage.



LE LIÉV.

Ce Chardon croist icy en lieux mal cultiuéz & pres des voyes.

LE TEMPS.

Il fleurit en Iuillet & Aoult.

LES NOMS.

Ce Chardon est appelle en haut Aleman *Dreydistel*, *frantzen distel*, & *Struu distel*, & à la selon en bas Aleman *Dreydistel*. Il semble que ce soit vne sorte & espece de Carline, pourtant l'auons nous appellée *Carlina frustris*, c'est à dire Carline sauuage.

LE TEMPERAMENT.

Ce Chardon est de temperament chaud. Mais quelle vertu & faculté il a, il nous est encores incognu.

Du Safran bastard sauuage.

Chap. LXX.

LA FORME.

CE Chardon n'est guere differét au Carthamus, c'est à dire Safran bastard. Les feuilles sont rudes & piquantes. Les testelettes sont garnies de force feuillettes estroictes, piquâtes & saignes par le

par le bout, d'ou procedent fleurs velues com  
me au Carthamus, de couleur palle en iaulni-  
fant, beaucoup pl<sup>us</sup> palles que les fleurs de Car-  
thamus. Les fleurs passées on treuve dedens  
lesdicts chapiteaux vne graine semblable à cel  
le de Carthamus, plus brunatre toutesfois.

**LE LIEV.**

Ce Chardon ne croist point de son bon  
gré en ce pais, mais les Herboristes le sement  
en leurs iardins.

**LE TEMPS.**

Ce Chardon fleurit tard en Aoust & Se-  
ptembre.

**LES NOMS.**

Ceste herbe se nomme en Grec *ατρακτιλις*,  
*και κρινος* & *αγρια*: en Latin *Atractilis*, *Sylus*  
*steris* *Cnicus*, *Fusus* *agrestis*, *Colus* *rustica*, d'aucuns  
aussi *Amyron*, *Aspidion*, *A pbedron* & *Prasopium*: à  
present *Sylvestris* *Carthamus*: en François Que-  
noille rustique, Safran bastard sauvage: en Ale-  
man wilde *Carthamus*: incognüe es Boutiqs.

**LE TEMPERAMENT.**

Le Safran bastard sauvage a vertu de secher  
& quelque peu digerer.

**LES VERTUS ET OPER.**

A Les cymes, fueilles, & semence de ce Cha-  
rdon bien broyées avec du poyure & du vin  
font vilement induites sur morsures de Scor-  
pions.

B On dict aussi, fescrit Dioscoride, que ceux  
qui ont esté piqués de Scorpions pendant le  
temps quilz tiennent ceste herbe en la main,  
ne sentent point de douleur, & soudain quilz  
l'ont lachée, que la douleur les empoigne.



*Atractilis hirsutior.*

Chardon benist.

**Du Chardon benist. Cha. LXXI.**

**LA FORME.**

LE Chardon benist a les fueilles longues, ve-  
lues, profond incisées de tous costez. Les  
tiges sont aussi houssues & velues, se trainans  
par terre, reueistes de semblables fueilles, pro-  
duisans de chapiteaux ou tesselettes, houssues,  
enironnées de longues fueillettes poinctues,  
d'ou les fleurs procedēt de couleur palle. Les-  
quelles passées se trouue en iceux vne graine  
longue, grise, entouillée parmy vne laine. La  
racine est longue, tendre, fort fibreuse.

**LE LIEV.**

Le Chardon benist est semé es iardins.

**LE TEMPS.**

Il fleurit en Iuin & Iuillet.

**LES NOMS.**

Ceste herbe est aussi tenue de Pline & de  
Theophraste pour vne espeece d'*Atractilis*, &  
pappelét *Atractilis hirsutior*. Elle sappele mains  
tenant es Boutiques *Cardus benedictus* & *Cars*  
*dobenedictus*, & là selon en François Chardon  
benist.



benist: est haut Aleman *Cardobenedict* & Bespigner distel: en bas Aleman *Cardobenedicus*.

LE TEMPERAMENT.

Le Chardon benist est de qualité chaude & seche.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

Le Chardon benist prins en viande ou breuvage, est bon contre grandes douleurs & tournoye A  
mens de teste, renforce la memoire, & est singulier remede contre fourdesse.

Iceluy bouilly en vin & beu tout chaud, guerit trenchées de ventre, fait suer, fait vriner, & pou- B  
se hors la gravelle, & esmeut les fleurs aux femmes.

Le vin dans lequel il a bouilly, nettoye & mondifie l'estomach infect, & est vtilement beu con- C  
tre fieures quartes.

La poudre d'iceluy beue en vin, digere & meurt la phlegme froide qui est en l'estomach, & D  
purgé & fait sortir celle qui est dedans le thorax, le mondifiant, & faisant longue aleine.

Prins en mesme sorte il est fort vtile à ceux qui commencent à secher & deuenir Phthisiques. E

On donne avec grand prouffit plein l'estaille d'une noix de la poudre de Chardon benist con- F  
tre la peste, tellement que si ceux qui sont frappez de ceste maladie prennent ladicte poudre com  
me dessus, en dedens xxiiij. heures, & puis apres suent, seront incontinent deliurez. Pareille vertu  
a le vin de la decoction d'icelle beu en dedans xxiiij. heures.

Le Chardon benist, ou ius d'iceluy prins en quelle sorte que ce soit, est singulier contre tout G  
venin & poison, tellement que quiconque aura prins du venin ne sera point endommagé, moienn  
nant qu'il prenne incontinent apres le Chardon benist, comme on a experimenté en deux ieunes  
personnes lesquelles on ne sceut guerir avec Theriaque, toutesfois furent gueris par l'usage du  
Chardon benist, ainsi que racompte Hierosme Bonq.

Le ius d'iceluy distillé és yeux, en oste la rougeur & chassieuseté. H

Le Chardon benist verd pilé, est appliqué vtilement sur toutes inflammations, erysipeles, & si- I  
gnamment sur fieures pestilenciales, & sur toutes morsures de serpens & bestes venimeuses.

Du Chardon sauuaige.

*Scolymus.*  
*Cardus hirsutis.* } Chardon sauuaige.

Chap. LXXII.

*Cardui hirsutis terriam genus.*  
Tierce espee de Chardon sauuaige.



## LES ESPÈCES.

IL se trouue en ce pais trois sortes de Chardons sauvages, croissans communement le long des chemins, & des bors des ch&ps, & des boys, lesquels sont cōprins sous ce nom Chardō sauvage.

## LA FORME.

La premiere espèce d'iceux Chardons croist environ pied & demy ou deux de haut, il a la tige ronde, fort branchue, & reuestue de feuilles poignantes, semblables aux feuilles d'Acanthia en figure, plus petites toutesfois, non lanugineuses, & de couleur plus noiratre. Au sommet de la tige croissent de ronds char dons garnis d'espines poignantes comme esguilles, lesquels quarts monstrent vne belle fleur purpurée, dedans laquelle croist la graine de figure semblable aux autres Chardons, plus petite toutesfois. La racine est longue & noiratre, fort fibreuse.

La seconde espèce croist à la hauteur de trois ou quatre pieds, & porté la tige ronde, non, avec bien peu de br&ches. Les feuilles ressemblent aux feuilles du preced&t, garnies de tous costez d'espines piquantes, plus petites toutesfois & non si larges. Les chapiteaux sont petis, longuetz, non guere aigus ou poignans, lesquels ouuerts, produient vne fleur purpurée. La racine est noire & longue d'un pied.

La tierce espèce de Chardon sauvage est haute de trois ou quatre pieds, ayant la tige droite, sans beaucoup de branches, mais reuestue de mout d'espines poignantes. Les feuilles ressemblent à celles de la seconde, plus étroictes toutesfois, & plus piquantes. Les chapiteaux sont moindres que ceux de la Seconde. Les fleurs sont purpurées. La graine blanche & fort petite. Et pour racine elle n'a que des fibres.

## LE LIEU.

Ces Chardons prouiennent par tout ce pais le long des chemins, & des champs. La Seconde & tierce se trouuent aussi souuent aux prés.

## LE TEMPS.

Ces Chardons fleurissent en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

Ces Chardons sont nommez *Cardi fistulifera*, c'est à dire Chardons sauvages, & les deux premiers sont l'espèce de Chardon sauvage appelée en Grec *σκόλυμος*, & de Pline en Latin *Carduus fistulifera*, & aussi *Limonium*, d'aucuns *φίρασσα* & *πυρακάνθα*, *Pherusa* & *Pyraacantha*.

Le tiers est aussi vn Chardō sauvage, toutefois ce n'est pas *Scolymus*, mais on le peut bien nommer *Carduus spinosus*, c'est à dire Chardon d'asne.

## LE TEMPERAMENT.

Le Chardō sauvage est chaud & sec iusques au second degré, comme escrit Galien.

## LES VERTVS ET OPER.

*Triënis aquaticus.* Chardon aquatique.

A La racine du Chardon sauvage; principalement celle de la seconde espèce qui est noire & longue, cuicte en vin & beuë, purge par les vrines & pousse hors toutes superfluites du sang, & fait l'urine puicte & de forte odeurs; d'auantage elle amende la puanteur des aisselles, & de tout le corps.

B Icele induicte avec vinaigre, guerit toute mauuaise gratelle & galle.

C Pline dit qu'on mengé ceste racine en aucuns pais, & pareillement les tegrons & nouueaux iettons auant qu'ilz soient ortis de terre, comme racompte Galien, mais elle nourrit fort peu & la nourriture quelle donne, est aqueuse & mauuaise.

## Du Chardon aquatique.

## Chap. LXXIII.

## LA FORME.

LE Chardon aquatique a les tiges gressles, longues, croissans depuis le fond iusques par dessus l'eauë, gressles par bas dessous l'eauë, ayés en aucuns endroits plusieurs fibres deliées, & par haut grosses, d'où sortent les feuilles sur longues



# Du Chardon aquatique. Cha. LXXIII. Li. 4 369

gues queués, larges & vn peu crenclées à l'entour. Entre & dessous les fueilles croissent les Noix, qui ont trois angles durs & aigus, ou espines, dans lesquelles est contenu vn noyau blanc, de goust bien pres de Chastaigne.

LE LIEV.

On trouue ceste Noix aquatique en aucuns endroits de ce pais, comme aux visiers & estangs, d'eau claire.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *Triphalos* & en Latin *Tribulus aquaticus*: en François Chardon aquatique, Macrés: en haut Alemã *Wasserhuf, Weichhuf, Stachelhuf, Spitzhuf*: en bas Alemã *Wasserhuf, & d'aucuns* *Wichpfer*.

LE TEMPERAMENT.

Le Chardon aquatique est de temperament froid, sec, & astringent.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les fueilles de *Tribulus aquaticus* sont vtilement appliquées en forme d'emplastre sur tous A phlegmons & vicerés chauds. Elles sont bonnes aussi contre inflammations & vicerés de la B bouche, pourriture des gencies, & contre strumes & enflures du gozier.

Le jus d'iceluy est proufitablement meslé parmy collyres & medecines des yeux.

On donne à boyre la poudre des noix d'iceluy avec du vin, à ceux qui pissent sang, & sont tra- D uaillez de grauelle.

On les menge aussi en cas de necessité, & par faute d'autre viande, mais elles nourrissent fort E peu, & serrent merueilleusement le ventre.

De la Garance.

Chap. LXXIII.

LES ESPECES.


LA Garance est de deux sortes. L'vne Domestique laquelle on seme & plâte, & la Sauvage qui croist par tout de son bon gré.

*Rubia fatina.*

Garance cultivée.

*Rubia sylvestris.*

Garance sauvage.



LA FORME.

La Garance cultivée a les tiges lógues, quarrées, rudes, fort genoillées, & à chaque neud enuironnées de fueilles verdes, estroictes, en forme d'estoille. Les fleurs croissent au sommet des tiges comme à la Garance sauvage, de couleur palle en iaulne, apres lesquelles y vient vne graine røde, verde

verte au commencement, puis rouge, & en la fin noire. La racine est fort longue, greffe, & rouge.

La Garance sauvage ressemble à la Cultivée, mais elle est plus petite & nō si rude. Les fleurs sont blanches. La racine fort menue, & tēdre, parfois aussi rougeatre. LE LIEV.

La Garance cultivée on la plante en Zeelande, Flandre, & en aucuns endroits de Brabant, auprès de Berghes en terre grasse & fertile. La Sauvage croist par tout de son bon gré le long des champs, sous les hayes & buissons. LE TEMPS.

Elles fleurissent toutes deux en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

La Garance est appelée en Grec *ῥαβία* & *ῥαβία*; en Latin *Rubia*; en Boutiques *Rubia tinctorum*: en haut Aleman *Krotte*; en bas Aleman *Krotte*, & le plus souuēt *Roer*, & la poudre de la racine *Roertrapp*.

La Sauvage se nomme *Rubia sylvestris*, Elle est tenue par aucuns gens sçauans pour *Abyssen*.

## LE TEMPERAMENT.

La Garance cultivée est chaude au second degré, & seche iusques au tiers.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de Garance cultivée cuictē en hydromel & beuē, ouure les oppilations du foye, de la ratelle, des rognons, de la matrice: dauantage profite contre iaunisse, & fait rauoir aux femmes leurs fleurs cēlées.
- B Icelle prinse en mēme sorte, prouoq̄ tresfort l'vrine de sorte q̄ prinse trop souuēt, fait pisser sang.
- C La decoction d'icelle beuē, ou bien la poudre d'icelle avec du vin, dissout le sang callē par dedans le corps, & prouffite à ceux qui sont tombez de haut, & qui sont rompus.
- D On donne à boyze le ius de la racine à ceux qui sont frappés de bestes venimeuses: & pareillement le vin dans lequel les fueilles & racines ont bouilly.
- E La graine d'icelle prinse avec oxymel, amoindrit la ratelle, & guerit les duresses d'icelle.
- F La racine mise dedans la matrice en forme de pessus, prouoque le flux menstrual aux femmes & pousse hors l'ariere faix & enfant mort.
- G La racine broyée bien menue, guerit toutes rognēs & gratelle, induictē dessus.
- H On n'vse point de la Sauvage en medecine.

## Du Grateron. Chap. LXXV.

Aparine.

Grateron.

## LA FORME.

Grateron a mout de petites tiges quarrées, rudes, houluses, fort genouillées, autour desquelles croissent à chacun neud de longues fueilles boētroictes, en forme d'estoille comme à la Garance: beaux coup moindres toutesfois, & plus houluses, de ces mēmes jointures croissent petites branches, portans fleurs blanches, & puis apres vne graine ronde, rude, pour la plus part deux sur vne queuē. Toute l'herbe avec tiges, fueilles, & graine, l'attache à tout ce qui la touche: Elle est si tresagre, que menée par la langue, elle la fait saigner.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist par tout, le long des hayes & buissons. LE TEMPS.

Elle fleurit & porte sa semence tout l'xistē.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *ἀπαρίνη*, & en aucuns *φράσιον*, & *ὀμφακίον*: en Latin *Aparine*: en François *Grateron*: en haut Aleman *Kieskraut*: en bas Aleman *Kieserunt*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Grateron est de qualité chaude & seche.

## LES VERTVS ET OPER.

- A On boyt le ius des fueilles & graine de Grateron contre morsures & piqures de bestes venimeuses.
- B Iceluy insillé aux oreilles, guerit douleur d'icelles.
- C Icelle pilée & appliquée, arreste le sang de playes nouvelles, & avec suif de pourceau, elle refout, & digere les strumes du col, appliquée dessus.

Du Pe-



LA FORME.

LE Petit Muguet a les tiges menues, vnies, rondes, & de petites fueilles estroictes cõpassees au tour de la tige en forme d'estoille, fort semblable au Graterõ, moindre toutefois, plus tendre & non aspre & rude, mais vni. Les fleurs sont iaulnes, & croissent par amas au sommet des tiges, comme à la Garance sauuage. La racine est tendre & fibreuse.

LE LIEV.

Ceste herbe croist en lieux mal cultiués, & montaigneux, cõme sur Roesselberch pres de Louvain.

LE TEMPS.

Il fleurit en Iuillet & Aouil.

LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec γαλλιόν, & en Latin Gallii: d'aucuns Galation & Galerium: en François Petit Muguet: en Aleman wassfress, & d'aucuns Zhergetraut.

LE TEMPERAMENT.

Le petit Muguet est chaud & sec de nature.

LES VERTVS ET OPER.

A Les fleurs de Petit Muguet broyées & appliquées sur brulures, en tirent hors la chaleur & inflammation, & consolident les brulures.

B Icelles mises sur playes ou au nez arrestēt le sang.

C Les fueilles de Gallion meslées avec huile rosat & mises au soleil, puis induictes sur membres trauaillez de labourer & lassés, les reconfortent.

Du Muguet. Chap. LXXVII.

LA FORME.

LE Muguet a moult de tiges quadrées, fort genouilées, à chascque ioincture ou genouil sont situées sept ou huit fueilles longues, estroictes, tout autour en forme d'estoille, bien pres semblables aux fueilles du Grateron, mais plus larges, & non aspres. Les fleurs croissent au sommet des tiges, de couleur blanche & plaisante odeur, cõme aussi est toute la plante. La graine est ronde & vn peu rude.

LE LIEV.

Le Muguet est en ce pais planté par tous les iardins, & ayme lieux ombreux, obscurs, & fayme au pres de vieilles murailles humides.

LE TEMPS

Le Muguet fleurit en May, & adonc a il meilleur odeur.

LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Latin *Affersula*, *Cordialis*, *Herbe stellaris* & *Spergula odorata*: en haut Aleman *Sperzsfreydt* & *wassmysser*: en bas Aleman *wassneeffer*: en François Muguet, par lequel nom elle est le mieux cogneue en plusieurs lieux de Brabāt. Aucuns en font vne Hepatique, pourtāt est elle appelée d'is ceux en Latin *Hepatica*, *Hepatica*, *tecoraria*, & en haut Aleman *Scherberaut*. Les Apothicaires ignorés de ce pais l'appellent *la muscata*, & en vident au lieu dicelle non sans grande erreur.

LE TEMPERAMENT.

Le Muguet est participant de quelque chaleur & secheresse, non guere different au Gallion.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Muguet est estimé fort bonne herbe à resoulder playes, vsurpée en mesme sorte que celles A qui sont descrites en la fin de la Premiere partie.

Aucuns afferment q̄ iceluy mis au vin q̄ lon boyt, resiouyt le cuer, & renforce le foye malade. B



## LA FORME.

**C**Ruciata est vne herbe verte, pallaistre, tirée bié pres sur couleur iaulne, reuestue d'un poil mollet, ayant plusieurs tiges quarrées, pleines de genoilz ou ioinctures. Les fueilles sont petites, larges, & courtes, tousiours croissans quatre ensemble, situées l'une contre l'autre en forme de croix, dessus lesquelles fortét des mesmes ioinctures mout de petites fleurs palles en iaulnissant, atourans la tige en forme de couronnes ou ghirlésdes, chacune desquelles est partie en quatre, & formée comme vne petite croix. Les racines ne sont autre chose que force petites fibres tendres. **LE LIEU.**

La Croysette croist voluntiers le long des fossés, & pres des ruyssaux, on la trouue aucunesfois sous les hayes. **LE TEMPS.**

La Croysette fleurit bien pres tout du long de l'isté, signamment depuis le moys de May iusques en Aoult.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée des Herboristes modernes en Latin *Cruciata*, c'est à dire Croysée : en haut Aleman *Golden wasensticker*, c'est à dire Muguét doré: en bas Aleman *Croysette*. **LE TEMPERAMENT.**

Elle est seche & astringente.

## LES VERTVS ET OPERAT.

**A** *Cruciata* est vne herbe fort bonne & propre à consolider playes, conuenable à toutes playes, tant exterieures qu'interieures, cuicte en vin & beuf.

**B** On donne le vin de la decoction d'icelle à gens rompus, & on applique l'herbe cuicte dessus le endroit de la rōpūre, comme aucuns expérimentateurs afferment. *Isopyrum.*

## De Isopyron. Chap. LXXIX.

## LA FORME.

**I**sopyrū à les fueilles larges, vnies, espesses, tousiours trois sur vne queue, fort semblables en figure, grandeur, espaisseur, & de façō aux fueilles de la Feue cōmune. La tige est gresse, de pied & demy ou deux de haut au sommet desquelles croissent des fleurs blanches, & puis apres de ronds chapiteaux, contenant vne graine iaulnatre en brunissant. La racine est longue, blāche, & pleine de neuds. **LE LIEU.**

Isopyrū croist en lieux bas & humides, és estangs, & aucunesfois aussi au bord des riuieres.

## LE TEMPS.

Il fleurit en May, & en Iuin est la semence meure. **LES NOMS.**

Ceste herbe est appelée en Grec *ισότροπον*: en Latin aussi *isopyrum*: en Brabant *Boepbonnen*, c'est à dire Feue de bouc, pour ce qu'elle ressemble de fueilles à la Feue cōmune: pourceit elle aussi est appelée d'aucuns Anciens (se dit Dios.) *Phasolis*, duquel nom Dioscoride appelle nostre Feue commune, cōme dessus est dict. **LE TEMPERAMENT.**

Isopyron est de cōplexion chaude & seche.

## LES VERTVS ET OPERA.

**A** La graine d'Isopyrō profite cōtre la toux, & autres maladies froides du thorax, prise avec hydromel. Elle est aussi vtile prise en mesme forte, à ceux qui crachēt sang, & aux hepaticqs.

FIN DE LA QUATRIESME PARTIE.





LA CINQUIESME PARTIE  
DE L'HISTOIRE DES PLANTES, LA  
QUELLE TRAITTE DE LA DIFFERENCE, FORME,  
Noms, Vertus & Operations des Herbes, Racines &  
Fruicts, desquels on vie iournellement es  
Viandes.

PAR REMBERT DODOENS,

Des Arroches ou Bonnes Dames.

Chap. I.

LES ESPECES.

Les Arroches, tesmoing Dioscoride, sont de deux fortes: Domestique, & Sauvage.

*Atriplex sativa.* Arroche domestique.

*Atriplex bluefrisa.* Arroche sauvage.



LA FORME.

- A<sup>1</sup> L'Arroche domestique a les tiges croissans droit, rondes par bas, & quarrées par haut, ayans plusieurs branches. Les fueilles sont longues & larges, de couleur blanche comme si elles estoient enfarinées, principalement estans encore nouvelles. Les fleurs croissent au sommet des branches amassées ensemble en grand nombre, petites & isulnes, apres lesquelles vient la graine qui est lizige, & couverte d'une petite pellicule. La racine a beaucoup de fibres.
- B On trouue encore vne autre espeece d'Arroche domestique, les fueilles, tiges, & fleurs de laquelle sont brunes en rouge, au reste du tout semblable de fueilles, tiges, & fleurs à l'Arroche blanche; soit en grandeur, soit en figure.
- A<sup>2</sup> L'Arroche sauvage a aussi la tige longue & anguleuse, ayant les fueilles non guere differentes à celles de l'Arroche domestique, vn peu plus petites toutesfois, & crenées à l'entour. Les fleurs

sont iaulnantes. La graine est dure, & croist amassée ensemble comme à la Domestique. La racine est fort fibreuse.

De ceste espee sauvage s'en trouue il aussi encores vne autre, laquelle ne croist pas fort haut, mais demeure basse, & se spand en moult de branches. Elle a les fueillettes longues & estroictes, non crenelées tout au tour. Les fleurs, semence, & racine ressemblent fort à la Sauvage décrite cy dessus.

## LE LIEV.

L'Arroche domestique croist aux jardins à la Porée.  
La Sauvage se trouue le long des champs & des voyes.

## LE TEMPS.

L'Arroche fleurit en Iuin & Iuillet, & bien pres tout l'esté.

## LES NOMS.

Elle se nomme en Grec ἀρρίπλεξ; en Latin *Arriples*, d'aucuns *Chrysolachon*, cest à dire en Latin *Aureum otus*; en François Arroches ou Bonnes Damos; en haut Aleman *Wolsten* & *Wiltten*; en bas Aleman *Wesde*.

L'Arroche domestique s'appelle en Grec ἀρρίπλεξ καυωρη; en Latin *Arriples sativa*, & *horreijensis*; en haut Aleman *Schymisch Wolsten zam Wolsten*, & *Garten Wolsten*; en bas Aleman *Camme Wesde*.

L'Arroche sauvage s'appelle en Grec ἀρρίπλεξ ἀγρια, & *Arriples sylvestris*; en haut Aleman *Wald Wolsten*, *Achermolsten*; en bas Aleman *Wald Wesde*.

La petite Sauvage s'appelle en haut Aleman *Schetsymitten*; en bas Aleman *deyn Wesde*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Arroche est froide au premier degré, & humide iusques au second, signamment la Domestique, laquelle est plus froide & plus humide que la Sauvage.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A L'Arroche mengée en potages comme les autres herbes, lache le ventre.  
B La graine d'Arroche prinse en hydromel, ouure & rafraichit le foye oppilé, & est bonne contre la iaulnisse.  
C L'Arroche verte escachée, est vtilement appliquée sur inflammations, & phlegmons. La Domestique au commencement des inflammations. La Sauvage sur la fin.  
D On l'applique avec nitrum, miel & vinaigre sur feu sacré & la goutte.

## LES NVISANCES.

Beaucoup manger d'Arroches, engendre plusieurs maladies, subuertit l'estomach, & fait venir plusieurs lentilles par tout le corps & au visage: Dauantage elle est malaisée à digerer, se disent Diocles & Dionysius.

## De la Blette. Chap. II.

## LES ESPECES.

Blette est de deux fortes, Grande & Petite: Derechef chacune d'icelles est diuisée en deux, car l'vne est blanche, l'autre rouge. Toutes deux communes en ce pais. LA FORME.

- A La grande Blette blanche croist deux ou trois pieds de haut, & porte les tiges griffres, rondes les fueilles nues, vnies, bien pres semblables aux fueilles de l'Arroche, non douces toutesoies, ne blanches ou enfarinées. Les fleurs croissent comme à l'Arroche, puis apres vient la graine enclôse en petites peaux plattes.  
B La grande Blette rouge, ressemble du tout à l'autre, sinon quelle a les tiges bien rouges, & les fueilles brunatres, tirans sur le rouge, pareillement aussi la semence.  
A La petite Blette a la tige verte, fort branchue, laquelle

Blisan. Blette.



quelle croist soudain. Les feuilles sont longues & estroictes, non guere differentes aux feuilles de la Jotte, beaucoup plus petites toutesfois. Les fleurs sont brunes, tirans sur le rouge. La graine croist par amas comme à l'Arroche. La racine est fort fibreuse.

**B** La Blette rouge petite a les tiges rouges comme sang, & les feuilles & racines, tellement que du jus de ceste herbe on en escrit d'aussi beau rouge, que de Rosette faicte de Bersil, au reste elle ressemble aux autres.

**LE LIEV.**

Ceste herbe croist en lieux mal cultiuez, & es iardins à la Porée, & là ou vnefois elle a prins racine, elle y reuient tous les ans, pourtant la tient on pour vne herbe inutile.

**LE TEMPS.**

On la trouue le plus souuent en fleur à la Myrtilé.

**LES NOMS.**

Ceste herbe se nomme en Grec *Σάκρ Τάγ* : en Latin *Blitum* : en François Blette : en haut & bas Aleman *Blaiter*.

**LE TEMPERAMENT.**

Ceste herbe est de nature froide & humide.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

La Blette mengée en potage, amollist le ventre, mais elle est contraire à l'estomach, & ne nourrit point.

**Du Pied d'oyson.**

**LA FORME.**

**L**E Pied d'oyson croist pied & demy, ou deux pieds de haut, & a la tige droicte, fort ramue. Les feuilles sont larges, profond incisées tout à l'entour, bien pres semblables au pied d'vn oyson, parquoy on l'appelle aussi Pied d'oyson. Les fleurs sont rougeatres & petites. La graine croist par amas, comme à l'Arroche. La racine est bien fibreuse.

**LE LIEV.**

Ceste herbe croist aussi en lieux mal cultiuez, le long des chemins & voyes, & est tenue pour herbe inutile.

**LE TEMPS.**

On la trouue en fleur en Iuin & Iuliet.

**LES NOMS.**

Ceste herbe est appelée des Modernes en Latin *Pes aserinus* : en haut Aleman *Genssfuss* : en François Pied d'oyson : en bas Aleman *Gansenboet*, d'aucuns aussi *Schweinstrod*, & *Seurod*, c'est à dire La mort aux pourceaux, pour ce que les pourceaux meurent quand ilz mengent ceste herbe.

**LE TEMPERAMENT.**

Ceste herbe est froide iusques pres du tiers degré.

**LES VERTVS ET OPER.**

Ceste herbe a les facultez fort semblables à celles de la Morelle, & peut estre appliquée par dehors, par tout où la Morelle est requise.

**De Vuluaria. Chap. IIII.**

**LA FORME.**

**C**este herbe ressemble aussi au cunement à l'Arroche, mais elle est en toutes sortes plus petite. C'est vne petite herbe, basse, & tendre, se trainant par terre avec plusieurs reinscaux. Les feuilles sont blanchatres, & semblét enfarinées, semblables aux feuilles de l'Arroche, mais beaucoup plus petites, & non guere plus grandes que les feuilles de la Mariolaine. La graine est petite, blanche, & croist par amas comme à l'Arroche fauuage. Toute l'herbe est d'odeur fort puante, comme de poisson pourri, ou de la teste punaise d'vn poisson, ou comme vn vilain bouc puant.



## LE LIEV.

Elle croist en ce pais pres des voyes & en lieux sablonneux. LE TEMPS.

On la trouue en fleur & en graine au milieu de l'esté.

## LES NOMS.

Ceste herbe n'a point de nom particulier en Latin, parquoy nous l'aons appellée à cause de son odeur estrange en Grec *τρυγίσιον*, & en Latin *Tragium*, c'est à dire Herbe de bouc. Et pour ce que lon trouue encore deux autres *Tragia* en Dioscoride, à la difference d'iceux nous auons appellé cestuy cy *Tragium Germanicum*. Aucuns l'appellent *Vulvaria*, duquel nom elle est cogneue entre les Herboristes de ce pais.

## LES VERTVS ET OPER.

La senteur d'icelle est bonne aux femmes qui sont trouuées de maladie d'amarry, & pareillement si on la met sur le nombril.

## De la Bete. Chap. V.

## LES ESPECES

Il y a deux sortes de Bete, Blanche & Rouge. La Rouge est aussi de deux sortes, l'une qui a les feuilles & la racine pareilles à la Bete blanche, & vne autre qui a la racine fort grande & grosse, laquelle est estrange.

*Beta candida.* Bete blanche.



*Beta nigra.* Bete rouge.



*Tragium Germanicum.*

*Vulvaria.*



## LA FORME.

1 La Bete blanche a les feuilles grandes, larges & vnies, & entre icelles vne longue tige striée ou canelée. Les fleurs croissent le long des tiges, vne dessus l'autre, de couleur palle en verd, comme petites estolles. La graine est røde, dure, & rude. La racine est longue, grosse, & blâche par dedâs.

2 La Bete rouge commune est fort semblable à la blanche de feuilles, tiges, semence, & racine, si non qu'elle n'a point les feuilles & tiges blanches, mais rouges en brunissant.

3 La Bete rouge estrangere, ressemble à l'autre Bete rouge vulgaire, de feuilles, tiges, graine, forme, & couleur, si non que la racine est beaucoup plus grâde & plus courte, assez semblable à vn naueau, bien rouge par dedans & plus douce que ne sont les deux autres.

*Beta nigra Romana.* Bete rouge estrangere.

## LE LIEV.

On seme la Bete es iardins à la Porée. La Rouge estrangere se trouue plâtée chez les Herboristes.

## LE TEMPS.

La Bete liure sa semence en Aoust, vn an apres quelle a esté semée.

## LES NOMS.

On l'appelle en Grec *γίγλαρ*, ή *σίγλαρ*; en Latin & es Boutiques *Beta*; en François Bete, Iotte, Porée; en haut Aleman *Wangolt*; en bas Aleman *Beete*.

1 L'espece blanche se nomme *Sicula*, ou selon aucuns *Sicelica* ou *Sicla*, des Modernes *Beta candida*; en François Bete blanche; en haut Aleman *weißeser Wangolt*; en bas Aleman *witte Beete*.

2 La commune Rouge s'appelle *Beta nigra*. en François Bete rouge; en Alemā *Roter mangolt*, & *Roo de Beete*.

3 La tierce est appelée *Beta nigra Romana*, c'est à dire Bete rouge Romane ou estrangere, & en Aleman *Roomfische roode Beete*, d'aucuns *Rapa rubra*, cōbien toutefois qe ne soit vne espece de Rauē.

## LE TEMPERAMENT.

La Bete est chaude, seche & absterfiue, signamēt la blâche, laquelle est plus absterfiue & mondifiante.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Le ius de la Bete blanche beu lasche le ventre, & mondifie l'estomach, mais il n'en fait par trop A vser, car il charge l'estomach.

Iceuy attiré par le nez, purge le cerueau, ouure les oppilations des narilles, & appaise douleur B de teste, signamēt quand on y adioulte du miel avec.

Iceuy mis es aureilles, appaise la douleur d'icelles, & en oste le bourdonnement. C

Les feuilles de Bete crues pilées, guerissent gratelle blanche induictes dessus, moiennant que la D gratelle soit au parauant frotée de Nitrum.

Icelles aussi crues & pilées, sont vilement appliquées sur vlceres rōgeans, & sur mauuaise tigne E qui saict tomber les cheueux.

On les applique aussi cūictes, en forme d'emplastre sur brulures, seu volage, & pustules fai- F gneuses.

La decoction de Bete nettoye la crasse & tue les lendes du chef, si on sen laue la teste, elle est G bonne aussi aux mules à talon, si on les estuue d'icelle.

La racine de Bete mise au sondement, amollit le ventre. H

La Bete prinse deuant manger, nourrit fort peu, mais elle est bonne à ceux qui ont mal en la ra I telle, car prinse en ceste sorte, elle ouure les oppilations du foye & de la ratelle.

2 La Bete rouge cūicte avec Lentilles, & prinse deuant manger, serre le ventre. K

3 La racine de la Bete rouge Romane ou estrangere cūicte & mengée avec huile & vinaigre L auant les autres viandes, ou aucunes fois aussi avec poyure cōme les Passenades cōmunes, est bone.

Des Choux




## LES ESPECES.

IL y a beaucoup de sortes de Choux, non guere semblables l'un à l'autre, tous lesquels sont presmierenment compris sous deux especes, dont l'une est Dome stique, & l'autre Sauvage. Ilz sont derechef diuisez en autres especes. Car les Domestiques ou cultiuez, sont mainte nist blancs, main tenant rouges, & encore chacun d'iceux est de diueres sortes.

*Brassica Trisiana, sine capitata.*  
Chou cabu blanc.

*Brassica Pompeiana, aut Cypria.*  
Chou flory, ou de Cypre.



## LA FORME.

La premiere espece de Chou blanc, est le Chou cabu blanc vulgaire, lequel a les feuilles grâdes, & larges, pleines de grosses veines ou nerfs, desquelles les premieres auant que le Chou se ferme, sont blanches en verdissant, & les autres de dessous, blanches comme neige, lesquelles croissent tant entassées l'une sur l'autre & se ferment tellement en vn, qu'elles ressemblent à vne grosse boudle ronde. Ces Choux apres l'hyuer passé, fougrent & produisent fleurs & semence comme les autres Choux.

La seconde espece de Chou blanc, est celuy qu'on appelle Chou de Sauoye. Il ressemble fort au Chou cabu blanc, & se ferme aussi, mais non pas si fort, & n'est pas si grand ne si rond que le susdict: mais demeure plus petit, & de figure plus longue. Ceste sorte de Chou ne peut endurer le froid, & meurt communemét, soudain qu'il commence à geler: toutesfois quand l'hyuer est doux, il produit apres l'hyer tige & belles fleurs blâches, & puis apres la graine en petites siliques comme les autres Choux.

La tierce espece de Chou blanc est fort estrange, & s'appelle Chou flory. Il a au cōmencement les feuilles grisâtres, cōme le Chou blanc, & puis apres au milieu d'icelles, au lieu de feuilles amassées ensemble, produit plusieurs tigettes blâches, grosses, & douces, ayans moult de courtes branches. Jesquelles croissent pour la plus part egalement en hauteur, & sont fort amassées: ces tiges ainsi croissans sont appellées la fleur de ce Chou.

La quatriesme espece a les feuilles grisâtres, cōme les autres Choux blancs, mais elles demeu-  
rent

rent sans se fermer, tellement qu'elles ne font point de teste, mais produisent un gros chapiteau rond comme une Raue, lequel croist droitement sous les feuilles sur la terre, blanc par dedans comme une Raue, & on le prepare & mange comme une Raue.

Sous les especes de Chou blanc est aussi comprise une sorte fort estrange, laquelle on appelle à present Chou noir. Il porte les tiges hautes & longues, & les feuilles grandes, larges, noires, lesquelles sont fort mal vnies & ridées. Les fleurs sont jaunes, La graine & les siliques ressemblent à celles des autres Choux.

## LA FORME DES CHOIX ROUGES.

*Brassica Comata sive rubra.*  
Chou rouge.

*Brassica Sabellica sive crispata.*  
Chou crepe.



1 La premiere espece de Chou rouge a les feuilles grandes, larges, vnies, brunatres, obscures, rougeatres en verdoit, ayans des veines rougeatres au trauers. Les fleurs sont jaunes. Les siliques longues, & gressles. La graine est petite, ronde, & brune par dehors, jaunatre par dedans, fort semblable à la graine de Raue ou Nauet, plus grande toutesfois.

2 La seconde espece au commencement ressemble de feuilles au dessusdict, mais puis apres les feuilles du milieu s'amassent & couchent l'une sur l'autre, comme au Chou blanc cabu, lesquelles sont de couleur rougeatre ou purpurée.

3 La tierce espece de Chou rouge, a les feuilles decouppées, au reste elle ressemble, & de couleur, & de fleurs & de semence au premier.

4 La quatrieme espece porte feuilles ridées & crespes, au reste semblable aux dessusdicts.

5 La cinquieme espece de Chou rouge, est le plus petit de tous, & bien pres comme Sauvage, il a les tiges & feuilles beaucoup plus petites que le Premier, au reste du tout semblable. On n'en vogue en viades, mais on le seme seulement à raison de sa graine, de laquelle on tire de l'huile qu'on vend journellement pour huile de Nauetz.

## LE LIEV.

Toutes ces especes de Choux, on les plante en ce pais aux jardins. Mais la Cinquieme espece rouge on la seme seulement par fois aux champs comme les Naueaux.

## LE TEMPS.

Les meilleurs Choux sont ceux qu'on sème en Mars, & replante en May. Ilz sont prests à manger en yuer, & quand ilz demeurent l'hyuer, ilz florissent en Mars & Auril, & la semence est meure en May. Les aucuns, signamment le Chou cabu blanc est aussi semé en Aoult, & replanté en Novembre, puis se sème en Juin, Juillet & Aoult, & de là en auant il est bon à manger.

## LES NOMS.

Les Choux cultiuéz sont appellez en Grec κράμβη ήμπερ: en Latin *Brassica sativa*: es Bouiques *Caulis*: en haut Aleman *Kölsen*: en bas Aleman *Koolen*.

La premiere espece du Chou blanc est appellée en Latin de Pline *Brassica trinitaria*, des Modernes *Brassica sessilis capitata*, & *Imperialis*: en François Chou cabu: en haut Aleman *Kappfshraut*: en bas Aleman *witte Schuythoolen* & *Cabuyshoolen*.

La seconde espece est appellée de Pline en Latin *Brassica lacustris*: en François Chou de Sauoye: en bas Aleman *Sauof hoolen*.

La tierce espece se nomme en Latin *Brassica Pompeiana*, des Modernes *Brassica Cypria*: en Italien *Caulis fiora*: en François Chou floy: en bas Aleman *Blomhoolen*.

La quatrieme espece est à present appellée *Raperculis*, c'est à dire Chou de Rau: en bas Aleman *Karpohoolen*.

La cinquieme se nomme *Caulis nigra*: en Italien *Negre caules*, c'est à dire Chou noien: en Aleman *Swaerte hoolen*.

La tierce espece de Chou rouge est appellée de Cato en Grec κράμβη μίση: de Pline en Latin *Brassica cumana*: en François Chou rouge & poly: en haut Aleman *Weyter roterhoolen*, en bas Aleman *Groote roo hoolen*.

La seconde espece s'appelle aussi *Brassica lacustris*: en François Chou cabu rouge: en bas Aleman *Koofhoolen*, & *Roode Schuythoolen*.

La tierce espece à feuilles de couppees est nommée en Grec σπιννοκέφαλος: en Latin *Brassica Apia*: en bas Aleman *Gheschafelde hoolen*, c'est à dire Chou à feuilles dechiquetées.

Le quatrieme Chou rouge s'appelle *Brassica Sabellia*, & des Modernes *Brassica crispis*: en François Chou crespuz: en haut Aleman *Krauser hoolen*: en bas Aleman *Ghescronchelde hoolen*.

La cinquieme espece qui est la plus petite, s'appelle en haut Aleman *Kleinender hoolen*, c'est à dire Petit Chou: en bas Aleman *Sloozen*. Cette espece est la tierce espece de Choux desirite par Cato, laquelle est proprement appellée en Grec κράμβη, *Crambe*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Choux sont chauds & secs au premier degré, & absterisifz, signamment les Rouges.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le ius de Choux prins à part soy, ou avec vn peu de nitre, amollit le ventre, & fait aller à selle.  
 Pareille vertu à la premiere eau ou les Choux ont bouilly.
- B Le ius de Choux beu avec du vin, profite contre morsures de Serpens.
- C Iceluy induict avec farine de Fenugrec, donne allegeance aux membres trauaillez de goutte.
- D Il guerit & nettoye les vlcères enuicillis & pourris.
- E Iceluy attiré par le nez, purge le cerueau & le chef.
- F Iceluy meslé avec vin & mis tiede dedans les oreilles, est bon contre sourdesse, & bourdonnement d'icelles.
- G Iceluy mis avec vn pessaire par dessus dedans la matrice, prouoque les fleurs aux femmes.
- H Iceluy cuyct avec du miel en forme de Syrop, & souuent leché, guerit l'enrouure & la toux.
- I Toute telle vertu à aussi la decoction des Choux, signamment la premiere, & celle du plus pourre Chou rouge qui soit, laquelle prinse seule, ou avec du sucre, lasche bien & legerement le ventre; & prouoque le flux menstrual des femmes.
- K La mesme decoction est aussi fort prouffitabile à toutes playes, car si on les en laue souuent, elle les mondifie & guerit.
- L Les feuilles, signamment les tendrös mengez avec vinaigre, cruds ou vn peu bouillys, laschent tout doucement le ventre, & prouffitent gradement ainsi mengées aux Splenetiques.
- M Icelles prinsees en mesme sorte apres le repas, guerissent yrongnerie, & douleur de teste qui en prouient.
- N Icelles seules, ou avec farine d'Orge rostie, sont vtilement induictes, sur suggillations & tous phlegmons.
- O Icelles cuites & appliquées avec miel, sont bonnes sur ylcères rongez, & pourris.
- P La graine de Choux prinse avec hydromel ou avec miellée, tue & pouffe hors toute sorte de vers.



Q Les tiges brûlées en cendre, & réduites avec vieil fuif de porc, donnent allégeance à douleurs de côté énuieillies.

R Les Choux mengex, engendrent gros sang & melancholique, principalement les Rouges. Les Blancs font meilleurs à digerer, & donnent meilleure nourriture & plus convenable, principalement quand ilz ont esté boullys par deux fois.

Du Chou sauvage. Chap. VII.

LA FORME.

LE Chou sauvage reséble fort de fucilles & fleurs au Chou cabu rouge, & au petit Chou, sinon que les fucilles & tiges sont plus blanches, & plus velues, & de goust beaucoup plus amer.

LE LIEU.

Ce Chou croist en lieux rudés & hauts au tour de la mer, selon Dioscoride. Il s'en trouve beaucoup en plusieurs endroits de Zeelande sur les hautes digues.

LES NOMS.

Cette espece de Chou se nomme en Grec *καρφη* & *καρφη*, & d'aucus *Hamirida*; en Latin *Brassica sylvestris* & *Brassica rustica*, cest à dire Chou sauvage, ou rustique en bas Aleman *Zee hoolen*, & *wilde Zee hoolen*, & là selon des Modernes *Caulis marinus*, & *Brassica marina*, comblen que ce ne soit le *Brassica marina* décrit par Dioscoride, duquel nous auons parlé au tiers Livre entre les Liferons.

LE TEMPERAMENT.

Ce Chou est fort chaud, & sec de complexion, & beaucoup plus fort que le Chou cultivé.

LES VERTUS ET OPERA.

A Le Chou sauvage a semblable vertu que le Cultivé, beaucoup toutesfois plus forte, & plus absteriue, pourtant ne vaut il rien en viandes.

B Les fucilles d'iceluy fraîchement broyées, guerissent & consolident les playes nouvelles, & resoudent les tumeurs induictes dessus.

Des Espinars. Chap. VIII.

LA FORME.

ESpinars ont la feuille longue, aigue par le bout, brunatre, douce, molle, pleine de jus, & fort fendue aux deux costez. La tige est ronde, creuse par des dens: le log de laquelle les petites fleurs croissent par amas, & puis apres la semence, qui est espineuse.

LE LIEU.

On les seme aux jardins à la porée.

LE TEMPS.

On seme les Espinars en Mars & Avril, & en dedis deux mois apres qu'ilz sont semez, ilz fleurissent & font en graine. On les seme aussi en Septembre, & du rent tout l'uyver sans porter semence iulques au Printemps.

LES NOMS.

Cette Porée est des Modernes appelée *Spinache*, *spinaches*, *spinachum olus*, & d'aucus *Hisp*

Kk nicant



Spinaches. Espinars.



nicam olas: de Ruellius & aucuns autres & uelomalache: des Arabes Hispanach: en François Espinars: en haut Aleman Spinet: en bas Aleman Spinsagie.

LE TEMPERAMENT.

Les Espinars sont froids & humides.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Espinars lâchent le ventre: Parelle vertu a aussi la decoction d'iceux.
- B Iceux inducés sur phlegmons, en ostent la chaleur, & refou dent la tumeur.

Du Lapathum ou Parelle.

Chap. IX.

LES ESPECES.

Dioscoride décrit quatre especes de Lapathum, sans la cinquiesme qui croist es fossés & es eaux, appelée Hippolapathum, laquelle nous descrirons aussi en ce Chapitre.

Oxylapathum.

Parelle.

Lapathum satium.

Patience.



LA FORME.

La premiere espece de Lapathum appelée Parelle, a les fueilles lógues, estroictes, dures, aigues par le bout, entre lesquelles croissent de tiges rôdes, genoillées, creuses, & brunatres, reuertes de fueilles semblables. Au sommet des tiges croissent moult de petites fleurs palles, l'une dessus l'autre, & puis apres la graine triangulaire, noiratre, enclose d'une peau deliée. La racine est longue, vnie, & iaulne par dedans.

La seconde espece appelée Patience, n'est guere differente à la fusdicte, sinon que les fueilles sont plus grandes, plus larges, plus douces, & non aigues par le bout. Les tiges sont longues & espesses, & croissent quatre ou cinq pieds de haut. Les fleurs sont iaulnatres. La graine triangle & rouge. La racine est longue, gresse & iaulne.

La tierce espece de Lapathum ressemble fort à la premiere, toutefois elle a les fueilles plus courtes, & beaucoup plus larges, couchées pour la pluspart & estendues sur la terre, bien pres semblables aux fueilles de Plantain, la tige ne croist point aussi si haut.

De ceste

**B** De ceste forte sen trouue vne espece qui est rouge, laquelle a belles tiges purpurées, & les fueil les brunes, pleines de veines rouges, desquelles sort vn ius rouge quand on les escache, au reste ele le ressemble à l'autre de tiges, fueilles, & semence.

Oxid. Ozeille.



Oxid persé. Petite Ozeille.



**A** La quatrieme espece appelée Ozeille, a les fueilles longues, estroictes, sigues par le bout & larges pres de la queue, de goust fort agre, bien pres comme vinaigre. La tige est ronde & gresse, sur laquelle croissent fleurs brunes enrouge, & petites. La graine est brune, triangle, fort semblable à la graine de Parelle. La racine est longue & isulne.

**B** De ceste forte sen trouue il aussi encore vne autre appelée Ozeille Romaine, laquelle a les fueilles courtes & presque rondes, vn peu anguleuses & blanchâtres, bien pres semblables aux fueilles de Lierre, plus petites toutesfois & non espesses ne dures. Les tiges sont tendres, sur lesquelles croist la semence telle qu'aux autres.

**C** Encores en trouue on vne autre espece petite & sauvage, laquelle on appelle Ozeille de brebis. Icelle ressemble fort à la grande Ozeille de fueilles, fleurs, tiges & semence, sinon qu'elle est beaucoup plus petite. Les fueilles sont fort petites, les tigettes gresses, d'environ vne paulme de haut, laquelle souvent on void toute rouge avec fleur & semence, & aucune fois avec les fueilles: on la trouue aussi par fois toute blanche comme neige. La racine est tendre & menue.

**D** La cinquieme espece qui croist és eaux, & és fosses, a les fueilles grandes, longues, dures, fort semblables aux fueilles de Parelle, mais beaucoup plus grandes. Les tiges sont rondes, & croissent quatre ou cinq pieds de haut ou dauantage, & portent telle graine comme la Parelle. La racine est grosse, & palle, tirant sur le rouge par dedans.

LE LIEV.

**1** La Parelle croist és prés humides & mouillés & és marez bas.

**2** On plante la Patience és iardins.

**3** La tierce espece croist en lieux secs & pres des voyes.

La Parelle rouge se trouue en aucuns iardins à la Porée.

On femo communement l'Ozeille es jardins, on la trouue toutesfois aussi en aucuns pres, & lieux obscurs.

L'Ozeille de brebis ayme lieux secs.

La cinquiesme espeece croist es fossés & eaux croupies, & se trouue en abondance en ce pais.

#### LE TEMPS.

Toutes ces espees de Lapathum fleurissent en Iuin & Juillet.

#### LES NOMS.

Toutes ces herbes sont cōprises sous vn nom en Grec *λάπαθος*: en Latin *Rumex*, & *Lapathum*: es Boutiques *Lapathium*.

La premiere espeece est appelée en Grec *εζυλάπαθος*: en Latin *Rumex acetosa*: es Boutiques *Lapathium acetosum*: en François Parelle: en haut Aleman *Wengschwartz*, *Wringenschwartz*, *Wretschwartz*, *Zleterswartz*: en bas Aleman *Patich* & *Predich*.

La seconde espeece est appelée *λάπαθος ημερου*: en Latin *Rumex sativus*, d'aucuns Modernes *Rhebarbarum monachorum*, de Galenus aussi *Hippolapathon*: en François Patience: en bas Aleman *Pattentie*.

La tierce espeece se nomme en Grec *λάπαθος αγρου*: en Latin *Lapathum syluestre*, cest à dire Parelle sauvage: en bas Aleman *Wilde Patich*.

La Rouge s'appelle en Latin *Lapathum nigrum*, & d'aucuns Modernes *Sanguis draconis*: en François Sang de dragon: en Aleman *Wahen blort*.

La quatriesme espeece se nomme en Grec *εξοξalis*: en Latin *Oxalis*: es Boutiques *Acetosella*: en François Ozeille: en haut Aleman *Sauer ampffer*: en bas Aleman *Surchel*.

La Romaine est sans doute aussi vne espeece d'Oxalis, & semble que ce soit celle de laquelle les Anciens ont vsé & escrit, & proprement appelée *εξοξalis*, *Oxalis*. Les Modernes la nomment *Oxalis Romana*, & *Acetosella Romana*: en François Ozeille Romaine: en Aleman *Koomsch Surchel*.

La plus petite de ces espees est appelée *Oxalis parua*: es Boutiques *Acetosella*: en François petite Ozeille, & Ozeille de brebis: en haut Aleman *Klein Sauer ampffer*: en Brabant *steerps Surchel*.

La cinquiesme espeece qui croist es fossés est appelée en Grec *επιωλάπαθος*: en Latin *Hippolapathon*, ou *Lapathum magnum*, ou *Rumex palustris*: en François gride Parelle, ou Parelle de marais: en haut Aleman *Wasser Ampffer*: en bas Aleman *groote Patich*, ou *water Patich*.

#### LE TEMPERAMENT.

Ces herbes sont asses temperées en froideur & chaleur, mais elles sont seches iusques bien pres au tiers degré, principalement la graine, laquelle est aussi astringente.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Les feuilles de toutes ces herbes boullies princes en viande, laschent tout doucement & amollissent le ventre. Pareille vertu a aussi la decoction d'icelles.

B Les feuilles verdes pilées avec huile rosir & quelque petit de Safran, digerent & resoudent les absces & tumeurs de la teste, induictes dessus.

C La graine de Parelle & Ozeille beuë en caue ou vin, arreste le flux de ventre & guerit la dysenterie, & fluctuations de l'estomach.

D Icelle proufite aussi grandement contre morsures & piqures de Scorpions, de sorte que celui qui a mengé ceste semence ne sentira nulle douleur, encore quil fut piqué d'un Scorpion.

E Les racines de ces herbes cuites en vin & beuës, guerissent la iaulnissie, prouoquent l'yrine, & les fleurs aux femmes, & rompent & pouffent hors la pierre & gravelle.

F Icelles cuites en vinaigre, ou broyées crues, guerissent la rongne & gratelle, & toute ordure exterieure du cuir, induictes dessus.

G La decoction d'icelles est aussi fort bonne contre demangeon & mauuais gratelle, si on en fait vn bain pour sen estauer.

H Le vin de la decoction d'icelles appaise douleur de dens, tenu en la bouche: & des oreilles distillé dedans.

I Les racines ainsi cuites, digerent & resoudent les strumies & tumeurs qui sont derriere les oreilles, appliquées dessus.

K Icelles pilées avec vinaigre guerissent & diminuent la ratelle endurcie, & pilées à part elles & induictes sur les parties honteuses des femmes, arrestent le flux, & les fleurs par trop abondantes.

L On trouue aussi par escrit qu'icelle peduë au col, guerit des escrouelles.

# De Lampfana. Chap. X.

## LA FORME.

Lampfana est vne Porée sauvage, ayant les feuilles larges, palles, tirans sur le verd, profond incisées à chascun costé, semblables aux feuilles de Navet, ou de la Tortelle, plus petites toutesfois. Les tiges croissent enuiron la hauteur de deux pieds, & se fendent en mout de petites branches: au sommet desquelles croissent plusieurs petites fleurs isulnes, bien pres semblables aux fleurs du petit Hieracion.

## LE LIEV.

Lampfana croist bien pres par tout, le long des voyes, signamment aux bors des iardins à la porée, & au tour de lieux humides.

## LE TEMPS.

Elle fleurit bien pres tout l'isté.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *λαμψάνη*: en Latin *Lampfana*, & d'aucuns *Napium*.

## LE TEMPERAMENT.

Lampfana est quelque peu absterfue.

## LES VERTVS ET OPER.

**A** Lampfana selon Galien, prinse en viandes, nourrit mal & engendre mauuaisés humeurs: Dioscoride toutesfois dit, qu'elle nourrit mieux, & est meilleure à l'estomach que *Lapathum*.

**B** Appliquée par dehors, elle nettoye & módi fie le cuir, pourtist elle bône contre gratelle.

# De la Toute bonne. Chap. XI.

## LA FORME.

Toute bonne a les feuilles larges, espesses, bien pres semblables aux feuilles d'Ozeille, plus courtes toutesfois & plus larges. La tige est grosse d'enuiron vn pied de haut, sur laquelle croist la graine amassée ensemble, bien pres comme aux Arroches. La racine est grande, longue, grosse & isulne.

## LE LIEV.

La Toute bône croist en lieux mal cultiuez pres des voyes & chemins, & autour des hayes.

## LE TEMPS.

On la trouue en fleurs en Iuin & Iuillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Latin *Tota bona*, & d'aucuns aussi *χρυσολάχων*, *Chrysolachmon*, cest à dire en Latin *Aureum olax*, pour sa grande vertu: en François *Toute bône*: en haut Ale man *Guter Heintich*, & *Schmerdel*: en bas Ale man *Goede Heyndich*, *Schmehens oore*, & d'aucuns *Algoede*.

## LE TEMPERAMENT.

La Toute bonne est seche & absterfue.

## LES VERTVS ET OPER.

**A** La Toute bonne prinse en viade ou potage, amollit le ventre & fait aller à selle.

Kk ij

La Tou

Lampfana.

385



Tota bona.

Toute bonne.



B La Toute bonne verde pilée, mōdifie vieux vlceres, & guerit playes fresches appliquée dessus & tué & fait fortir les vers engendrez en iceux.

## Del'Endiue &amp; Cichorée.

## Chap. XII.

## LES ESPECES ET DIFFERENCES.

ENDiue est de deux sortes selon Dioscoride, & les anciens Medecins: L'une est appelée Endiue ou Cichorée domestique & cultiuée: & l'autre Cichorée sauuage. La Cultiuée est derechef diuisée en deux, L'une a fueilles larges & blanches, L'autre les a estroictes & decoupees. Pareillement ausi la Sauuage, l'une a fleurs bleues, l'autre iaulnet.

*Intubum satiuum latifolium.*  
Cichorée blanche à fueilles larges.



*Intubum satiuum angustifolium.*  
Cichorée domestique à fueilles estroictes.



## LA FORME.

La Cichorée domestique à fueilles larges a les fueilles grandes, longues, larges, verdes en blanc chassant, douces, non guere differentes aux fueilles d'aucunes Laitues. La tige est ronde, reueue de fueilles semblables, laquelle croist soudain, & porte belles fleurs bleues pour la pluspart, aucunes fois ausi blanches, puis apres ensuyt la graine qui est blanche. La racine est blanche & longue, laquelle meurt, la semence estant meure.

La seconde espece de Cichorée domestique a ausi fueilles longues, estroictes, crenelées aucunes fois vn petit par les hors. La tige est ronde. Les fleurs bleues, semblables à celles de la precedente. La racine est blanche, longue, plane de ius, & ne meurt point facilement, encore qu'elle liure fleurs & graine.

La tierce espece appelée Cichorée sauuage, a les fueilles longues, verd obscures, & vn peu houlées, lesquelles sont aucunes fois distinguées de veines rougeâtres. La tige, les fleurs & semence ressemblent fort à la Cichorée domestique, & semblablement la racine, laquelle dure ausi long temps & ne meurt point facilement.

*Intubum sylvestre, Cichorium.*  
Cichorée sauvage.

*Hedypnois.*  
Cichorée iaulne.



- 4 La quatriesme espece, qui est la Cichorée sauvage iaulne, ressemble à la Cichorée de tiges & feuilles: elle a les tiges longues, d'une coudée de haut ou dauantage, fort branchues. Les feuilles sont longues, bien pres semblables aux feuilles de Cichorée sauvage, plus larges toutesfois. Les fleurs sont iaulnes, formées comme celles du Pissenlit, plus petites toutesfois. La racine est d'un pied de long, pleine de ius blanc, qui en sort quand elle est blessée.

LE LIEV.

- 12 La premiere & seconde espece est plantée en ce pais és iardins.  
3 La tierce on la trouue en lieux secs herbus, incultués, & aucunesfois aussi en lieux humides.  
4 La quatriesme croist és prés, & lieux humides & aquatiques, pres des fossés & des eaux.

LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent à la Myrte, aucunesfois aussi plus tost, signamment l'Endiue blanche, la quelle semée de bonne heure en Mars, fleurit aussi de bonne heure. Pourtant les Iardiniers, qui ne desirent point qu'elle florisse, mais seulement qu'elle deuienne grande & large, la sement sans plus en Juillet & Aoust, car quand elle est semée tard, elle ne fleurit point de ceste année là, mais deuiet large & grandeur l'hyer apres l'auoir tirée hors de terre, on la lie par le sommet, & on penfeuelit ioubs le sablon, & ainsi deuiet toute blanche, puis on la mengé en salade avec huile & vinaigre.

LES NOMS.

On appelle ces herbes en Grec *ορνιθιν*; en Latin *Intuba*, d'aucuns *πικνίς* & *Picride*.

- 1 La premiere espece s'appelle *Intubum satium laisifolium*, & d'aucuns *Endiua*: és Boutiques *Scario la*; en François *Scariole*, *Endiue*; en haut Aleman *Scarlos*; en bas Aleman le Commun vulgaire l'appelle *witte Endiue*, lequel cognoit mieux la vraye Endiue que les Apothicaires ignorans, qui au lieu d'Endiue, vsent de la Laitue sauvage.

- 2 La seconde espece est aussi vn *Intubum satium*, & est appelée *Cichorium satium & horrense*: és  
Kk iij Bouti-

Boutiques *Cicorea domestica*: en François Cichorée domestique: en haut Alemā *Zam węgwartem*, en bas Aleman *tamme Cicoreye*.

La tierce espece s'appelle en Grec *πικρίς*, & en Latin *Cichorium*, *Intubam sylvestre*, d'un-  
cuns *Ambubeta*: es Boutiques *Cicorea sylvestris*: en François Cichorée sauvage: en haut Aleman *wild Cicoreye*.

La quatriesme espece à fleurs jaunes est appelée de Pline *Hedypnois*: en haut Aleman *Geelweg*  
*wart*: en François Cichorée jaune: en bas Aleman *geel Cicoreye*.

#### LE TEMPERAMENT.

Ces herbes sont froides & seches, jusques bien pres au tiers de degré, signamment la Sauvage, qui est plus desiccative & absterfive.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Ces herbes menées, confortent l'estomach debile, & rafraichissent celuy qui est par trop chole-  
reux, signamment la Cichorée sauvage, laquelle est plus propre & convenable à l'estomach &  
B aux parties interieures. Icelles premierement cuites, puis menées avec vinaigre, arrestent  
le flux de ventre, qui vient de matiere chaude.  
C Le jus ou decoction de Cichorée beau, proufite au foye choleureux, & cõtre jaunisse, & fleurs  
chaudes, & tierces.  
D Les feuilles de Scariole & Cichorée broyées verdes, sont vtilles contre chaudes inflammations  
& absces de l'estomach, tremblement de cueur, goutte chaude, & grãdes inflammations des yeux,  
appliquées par de hors à l'endroit de la douleur.  
E Icelles appliquées avec farine d'Orge rostie, sont vtilles contre erysipeles & tous phlegmons.  
F Le jus des feuilles de Scariole & Cichorée induict avec huile rosat & vinaigre sur le front, ap-  
paife douleur de teste.  
G Iceluy avec cerusse & vinaigre, est propre à toutes tumeurs & apostemes & inflammations qui  
demandent refroidement.

#### De Sonchus.

*Sonchus sylvestrior, aspera.*

LaGeron.



#### Chap. XIII.

*Sonchus tenerior, non aspera.*

Palais au lieure.





## LES ESPECES.

**S**onchus est de deux sortes, l'un qui est plus sauage, plus houlfu, & piquant, appelé Laiçteron. L'autre, qui est plus doux, & non piquant, appelé Palais au lieure.

## LA FORME.

Le Laiçteron a les fueilles longues, larges, fort & profond incisées par les bors, munies de pointes & espines aigues. La tige est anguleuse, creuse par dedés, distinguée par ioinctures ou genoils, couuverte de semblables fueilles. Au sommet des tiges croissent fleurs iaulnes, doubles, de figure semblable aux fleurs de Pissenliçt, beaucoup toutesfois plus petites, lesquelles passées y vient de chapiteaux velus, qui s'en volent au vent. La racine est longue & iaulne, fort fibreuse.

Le Palais au lieure, ressemble fort au precedent de fueilles, tiges, fleurs, & semencemais les fueil les font vn peu plus larges, non tant profond incisées par les bors, & n'ont nulles espines ou pointes aigues, mais sont toutes vnies & non houlfues.

## LE LIEV.

Ces herbes croissent d'elles mesmes és iardins à la porée, & és champs, & sont tenues pour herbes inutiles.

## LE TEMPS.

Le Laiçteron, & le Palais au lieure florissent en Iuin & Iuillet, & le plus souuent tout l'asté.

## LES NOMS.

Ces herbes se nomment en Grec *σόνχις* : en Latin *Sonchi*, des Modernes *Cicorbite*, *Lactucelle*, *Lacteron* : de *Scrapio*, & és Boutiques *Taraxacum*.

La premiere espeeç s'appelle *Sonchus asperior* ou *superior* : en haut Aleman *Wensbüstel*, *Mossbüstel* : en Brabant *Wansbüstel*, & *Welchweye* : en François Laiçteron.

La seconde espeeç est appelée *Sonchus non asperus*, ou *Sonchus tenuior*, d'Apulcie *Lactuculeporina* : en François Palais de lieure : en haut Aleman *Häselhof* : en bas Aleman *Häsel lattoutur*, *Häsel stuych*, *Dauwbüstel*, *Caujmentcruyt*.

## LE TEMPERAMENT.

Ces herbes sont de temperament froid & sec, signammènt quand elles sont encores nouuelles, car estans seches, elles sont quelque peu chaudes, comme dit Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le ius de l'une de ces herbes beu, appaise douleur & mordicatiõs de l'estomach, prouoque l'urine, & rompt la pierre, & est souverain contre difficulté d'urine & la iaulnisse.

Iceluy aussi beu, emplit les mammelles des nourries de lait, & fait le lait bon & sain, tellement que les enfans en ont bonne couleur. Pareille vertu a la decoction de l'herbe beue.

Le ius de ces herbes donne allégeance & rafraichit la chaleur du fondement & des parties honteuses, appliqué dessus avec du coton semblablement des aureilles distillé dedans.

Les fueilles de Sonchus verdes, broyées & appliquées, sont conuenables sur tous phlegmons & apostemes, signammènt de l'estomach.

La racine pilée avec les fueilles, sont aussi vtilement induictes sur piqures de Scorpions.

## De Hieracium. Chap. XIII.

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Hieracium selon Dioscoride. Le grand & le Petit, dont le petit est de trois sortes.

## LA FORME.

Le grand Hieracium a la tige houlfue, rougeatre, creuse par dedans. Les fueilles sont longues, fort fendues à chacun costé, & ornées de pointes aigues, bien pres semblables aux fueilles du Laiçteron. A la cyme des tiges croissent longs chapiteaux, lesquels produisent fleurs iaulnes doubles comme celles du Laiçteron, lesquelles se tournent aussi en papillotes qui volent au vent. La racine n'est guere longue, & est fort fibreuse.


La premiere espeeç du petit Hieracium a fueilles longues, déchiquetées, bien pres semblables aux fueilles de Pissenliçt, non pas toutesfois si grandes, ne si profond incisées, touchées par terre. Entre icelles prouiennent tiges brunatres, nues, polies, produisans fleurs iaulnes & doubles, lesquelles se tournent aussi en papillotes volans au vent. La racine est longue, gresse, vnée & bliche.

La seconde espeeç du petit Hieracium ressemble au precedent de tiges & fleurs les fueilles couchent aussi estendues par terre, toutesfois elles sont plus petites, plus estroictes, & plus profond incisées que les fueilles des dessusdictes. Ce Hieracium n'a point la racine droite, mais semble rongée, comme celle de *Morsus diaboli*, de laquelle nous auons parlé au Premier liure, & est fort fibreuse.

Hieracium maius.

Hieracium minus primum.

Hieracium minus alterum.



La tierce est toute la plus petite des trois, & ressemble fort au premier Hieracium de feuilles, 4 fleurs, tiges, & racines: mais elle est beaucoup plus petite. Les feuilles sont du tout nues, & ne sont pas si brunâtres que celles du premier Hieracium. LE LIEU.

Ces herbes croissent en lieux mal cultivez, le long des prés, champs, & pres des voyes & fossés.

## LE TEMPS.

Ces Herbes fleurissent depuis Juin iusques en Septembre.

## LES NOMS.

Cette herbe se nôme en Grec *ἱεράκιον*, d'aucuns *σπυρίτης*: en Latin *Accipitrus*, c'est à dire Herbe d'espreuier, Apuleie la nomme aussi *Lactuca sylvatica*, *Picris*, & *Thridax agris*.

La premiere espece est appelée en Grec *ἱεράκιον τὸ μέγα*: en Latin *Hieracium magnum*, d'aucuns *Sonchites*, *Lampuca* ou *Sithreia*: en haut Aleman *Gross Habischkraut*, c'est à dire Grande herbe d'espreuier: en bas Aleman, *Stoot Haischkrout*.

La petite espece s'appelle en Grec *ἱεράκιον τὸ μικρόν*: en Latin *Hieracium parvum*, d'aucuns *levis* & *hum agreste*, ou *Lactuca minor*: en haut Aleman *klein Habischkraut*, c'est à dire Petite herbe d'espreuier: en bas Aleman *klein Haischkrout*.

La seconde petite est aussi appelée d'aucuns *Morsus diaboli*, *Cruffels abfisz*, c'est à dire Mors de diable: & ce à cause que sa racine est aussi rongée par dessous comme celle du Mors de diable.

## LE TEMPERAMENT.

Ces herbes sont de complexion froide & sèche.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Ces herbes ressemblent fort en vertus & operations au Sonchus, convenables à tout ce à quoy le Sonchus est bon, prises en mesme sorte.

B Elles sont aussi prouffitables aux yeux, & à la veue, quand on distille le ius d'icelles dedans, si gnamment de celle qu'on appelle Mors de diable.

# De Cirfion. Chap. XV.

## LA FORME.

Ceste herbe a les fueilles grandes, larges, plus grandes & plus larges que les fueilles de Bourrache, couvertes de petites espines, dentre lesquelles sort vne tige anguleuse, tendre, fragile, reueftue de fueilles semblables. Au sommet d'icelle croiffet mout de fueillettes amassées & serrées ensemble au tour de la tige, entre lesquelles prouiet vn chardon rude & rond, produisant vne fleur purpurée, laquelle fenouille aufsi au vent. La racine est grosse, courbe, ayant plusieurs fibres.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en ce país és prés, & lieux humides autour des eaux. **LE TEMPS.**

Ce Chardon fleurit en Aoust.

## LES NOMS.

On l'appelle en Grec *κάρδιον ή κάρδιον*; en Latin *Cirfium*, d'aucuns *Buglossum magnum*, & *Spina mollis*; en Brabant grotte *Diam distel*, incognue és Boutiques. **LE TEMPERAMENT.**

Il est froid & sec, & de vertu bien pres semblable au Sonchus. **LES VERTVS ET OPER.**

Andreas Herberier escrit q la racine de ceste herbe portée sur soy, appaise la douleur des varices, ou veines relaschées & emplies de gros sang.

Cirfion.

391



# De Condrilla. Chap. XVI.

Condrilla.

Condrilla altera.

Pissenlit.



## LES ESPECES.

Il y a deux fortes de Condrilla selon Dioscoride, Grande & Petite.

## LA FORME.

Condrilla ressemble aucunement à la Cichorée sauvage: Elle a les feuilles longues, grises, fort & profond incisées aux deux costez, la tige est gresse, enuiron vn pied de haut ou quelque peu dauantage, sur laquelle croissent chapiteaux ronds, qui apres estre ouuerts produisent belles fleurs, de forme & couleur fort semblables aux fleurs de Cichorée sauvage, plus petites toutesfois. La racine est longue & blanche comme la Cichorée.

Le Pissenliet a les feuilles longues, profond incisées à deux costez, semblables aux feuilles de la Cichorée sauvage, lesquelles pour la plupart sont espandues sur la terre. Entre les feuilles croissent tiges menues, vniés, & creuses, produisant de belles fleurs iaulnes, doubles, lesquelles passées se tournent en papillotes vullans au vent. La racine est gresse, longue, iaulnatre, & pécine de lait qui en sort quand elle est entamée.

## LE LIEU.

La grande Condrilla n'est point commune en ce pais, mais on la trouue es iardins des Herboristes.

La petite qui est le Pissenliet, croist par tout ce pais es prés & plaines herbaues.

## LE TEMPS.

La grande Condrilla fleurit en May & en Iuin. Le Pissenliet fleurit en Aüril & Aoult.

## LES NOMS.

La premiere espece de ces herbes est appelée en Grec *κονδριλλα*: en Latin *Condrilla*: de Plin *Condrillon*, & *Condrilla*: d'aucuns aussi *Cikberian* & *Seris*: des Modernes *Condrilla maior*: en ce pais *Condrilla*.

La seconde espece se nomme en Grec *κονδριλλα ὑγραι*: en Latin *Condrilla altera*: es Boutiques à Dens *leouis*, & *Rastrum porcinum*: en François *Pissenliet*: en haut Aleman *Koistkraut*, *Pfaffenköst*, *Pfaffen rosslin*: en bas Aleman *Papentkraut*, *Hornkrooslin*, *Cancherbloemen*, & *Sichor's bloemen*.

## LE TEMPERAMENT.

Ces herbes sont froides & seches, comme l'Endiue & la Cichorée.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le ius de la grande Condrilla prins à part soy, ou avec du vin, arreste le flux de ventre, signant ment quand il vient à raison de chaleur de foye.
- B Icelle broyée & mengée avec ses feuilles & racines, est fort bonne contre morsures de serpens venimeux.
- C La grande Condrilla renforce aussi l'estomach & fait faire bonne digestion, comme dit Dorotheus.
- D Le Pissenliet ressemble fort à la Cichorée en vertus & operations, & on en peut toujours vser, au lieu & en defaut d'icelle.
- E Il fait aussi tomber le poil renuersé des paupieres, & en fait croistre de nouveau, quand on induict souuent le ius d'iceluy dessus.

## Du Senefson.

## Chap. XVII.

## LES ESPECES.

Ombien que Dioscoride, & les Anciens n'ayent escrit que d'vn Erigeron, toutesfois les Modernes scauans en font deux especes, l'vn Grand & l'autre Petit: avec lesquelles en auons encores adioulté vne tierce. Parquoy Erigeron est maintenant de trois fortes.

## LA FORME.

Le grand Senefson a les feuilles blanchatres, velues, profond incisées, & crenées à deux costez, comme les feuilles de la Roquette. La tige est de deux pieds de haut ou dauantage: au sommet de laquelle croissent petis chapiteaux qui se tournent en petites fleurs iaulnes, lesquelles penitent soudain & se tournent en papillotes, comme les fleurs de Pissenliet, & senuellent au vent. La racine est fibreuse, & toute l'herbe est d'odeur estrange.

Le petit Senefson a les feuilles verdes, profond incisées aussi à deux costez, semblables en figure aux feuilles du grand Senefson, beaucoup toutesfois plus petites, plus verdes, pl' vniés, & moins velues. La tige croist enuiron vne paulme de haut, sur laquelle croissent fleurs iaulnes, lesquelles aussi soudain se tournent en papillotes velues, & senuellent. La racine est fibreuse. Il na point d'odeur singuliere.

Le tiers Erigeron ou Senefson a la tige gresse, droicte, purpurée en brun, reuestue d'vne laine molle.

*Erigeron primum & secundum.*  
Premiere & seconde espece de Seneflon.

*Erigeron tertium.*  
Tierce espece de Seneflon.



molle: Les feuilles longues & estroictes. Au sommet des tiges croissent de petis chapiteaux, d'ou fortent de petites fleurs pallees en iaulne, lesquelles incontinent apres estre ouuertes, se changent, & deuiennent si tost grises ou blanchatres, que, celuy qui n'y auroit prins garde, pourroit penser, qu'elles sont grises des leur sortir, car des le mesme iour, & aucune fois des la mesme heure qu'elles sont ouuertes, elles deuiennent grises, & peu apres les chapiteaux fouurent, & le gris poil avec la semence senuolle au vent. La racine est grosse, & fort tendre.

LE LIEV.

- 1 Le grand Seneflon croist en lieux sablonneux, le long des voyes & sentiers.
- 2 Le petit on le trouue souuent entre la Porée.
- 3 Le tiers croist en aucuns boys obscurs & és landes seches.

LE TEMPS.

- 1 Le grand Seneflon fleurit en Iuin & Iuillet.
- 2 Le Petit se trouue en fleurs tout le long de l'asté, & aucunes fois aussi en yuer, quand il ne fait par trop froid.
- 3 Le tiers fleurit aussi à la myxsté.

LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *ἀργύρεος*: en Latin *Senecio*, d'aucuns *Herbalsen* ou *Ercheites*: en François *Senecion* ou *Seneflon*: en haut Aleman *Gründstusant*.

- 1 La premiere espece est appelée *Senecio maior*, c'est à dire grand Senecion: en Brabant *groot Cruyscruyt*, & d'aucuns *Hilfson*.
- 2 La seconde est nommée en Latin *Senecio minor*, c'est petit Seneflon: en Aleman *Cruyscruyt* ou *cleyn Cruyscruyt*, laquelle est fort connue.
- 3 La tierce est aussi vn vray *Erigeron* & *Senecio*, signamment celuy qui est décrit par *Theophraste*, car, comme dessus est dict, ses fleurs deuiennent bien tost blanches & chenues, dont il a prins nom *Erigeron*.

LE TEMPERAMENT.

*Erigeron*, tesmoing *Paul*, refroidit quelque peu, & digere touttes fois.

- A Les feuilles & tiges de Senecion cuites en eauë ou vin doux, puis beues, guerissent douleur d'estomach prouenant de cholere.
- B Les feuilles & fleurs seules, ou pilées avec vn peu de vin, sont vilement appliquées sur phlegmons du siege & des genitoires.
- C Icelles mellées avec fine poudre d'encens, guerissent toutes playes, signäment celles des nerfs appliquées dessus.
- D Les papillottes des fleurs induictes avec vn peu de Saffran & d'eauë, prouffissent aux yeux couans & chassieux.
- E Icelles avec du sel digerent & resoudent les strumes du col.
- F Le petit Senelson est aussi mengé en salade avec huile & vinaigre, & n'est pas mauuaise viande ny mal saine.

## De la Laitue.

## Chap. XVIII.

## LES ESPECES.

LA Laitue est de deux sortes, Cultiuée & Sauvage, desquelles la Cultiuée est de plusieurs sortes.

*Lactuca sativa.*

Laitue cultiuée.

*Lactuca crispata.*

Laitue crespue.



## LA FORME.

La premiere espece de Laitue cultiuée, porte feuilles longues, vnies, nues & larges, lesquelles ne se ferment point: entre icelles croist la tige, pleine de ius blanc comme lait, d'environ deux pieds de haut, laquelle se fend au sommet en plusieurs branches, produisans petites fleurs iaulnes, lesquelles se tournent en barbe cheuue. La graine est blanche, longuatre & petite. La racine est longue & grosse, bien pres comme vne Pastenade, plus petite toutesfois.

La seconde espece de Laitue a les feuilles crespues, plyées & amassées ensemble comme bien pres

pres le mesentere d'un veau, qu'on appelle en France le Ventre de veau, au reste elle ressemble fort à l'autre de tiges, fleurs, graine & racines.

La tierce espece, est la plus belle & la plus blanche: Elle a grandes feuilles, & larges, lesquelles croissent fort amassées ensemble toutes d'une racine, tellement que celles de dessous s'estendent sur la terre, & celles du milieu croissent bien pres les vnes sur les autres, pommelées bien pres comme un Chou cabu: au reste elle ressemble aussi de tiges, fleurs, graine & racine à la première. Ceste espece est la plus amiable, & la plus commune en viandes.

On trouve tesing Columella, encores vne autre espece de Laitue, laquelle a les feuilles obscures & bien pres purpurées.

Encores s'en trouve il vne autre dont les feuilles sont rougeatres, vnies, & fort tendres, & saoureuuses: toutesfois ces deux especes sont incognues aux Modernes.

## LE LIEV.

On seme la Laitue es jardins à Porée en terre fertile & grasse, & la faut planter loing l'une de l'autre, autrement elle ne se peut élargir, ne fermer, ne se pommeler.

## LE TEMPS.

On seme la Laitue de bonne heure & tard, tout le long de l'année, mais principalement en Mars & Avril: & deux ou trois moys apres quelle est semée, elle porte fleur & graine, mais elle ne vaut rien adonques à manger.

## LES NOMS.

La Laitue cultiuée s'appelle en Grec *βραχάριον*, en Latin *Lactuca sativa*: es Boutiques *Lactuca*: en haut Aleman *Sattich*, ou *Sattuch*: en bas Aleman *Sartoum*.

La première espece de Laitue n'a pas de nom propre ou particulier, sinon que seulement on la nomme *Lactuca*, Laitue.

La seconde espece est appelée de Pline *Lactuca crispus*: en François Laitue crespue: en haut Aleman *kauser Sattich*: en bas Aleman *gherouche de Sartoum*.

Pline appelle la tierce espece *Lactuca laconica*, *Lactuca scaberrima*: Columelle *Lactuca betica*: les Modernes *Lactuca capitata*: en François Laitue pommée ou testue.

La quatrième espece est appelée de Columelle *Lactuca Cœciliana*.

La cinquième se nomme *Lactuca Cypria*, & de Pline *Lactuca Græca*.

## LE TEMPERAMENT.

La Laitue domestique est froide & humide iusques au premier ou second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Laitue cultiuée mengée en viandes, engendre meilleur sang, & est de meilleure digestion A que l'autre Porée, signamment quand on ne la menges pas crue mais cuicte.

Elle est bonne en viandes contre chaleur d'estomach, & fluctuations d'iceluy, elle estanche la B soif, & fait auoir bon appetit, signamment quand on la menges crue en salade.

Icele prinse en mesme sorte, fait bien & soueuement dormir, elle fait bon ventre, & engendre C abondance de lait: dauantage elle est fort bonne à ceux qui ne peuuent reposer, & aux nourrisles & femmes qui allaitent, qui n'ont guere de lait: mais à cela est elle meilleure auant quelle commence à faire tige: car quand elle iette sa tige, elle deuiet amere, & n'est point conuenable en viandes ou autrement.

Les feuilles verdes de Laitue pilées, sont vilement induictes sur bruslures fresches, aüst qu'elles D se seuent par cloches, & sur toutes inflammations & erisipeles.

La graine de Laitue prinse par long temps, seche la semence genitale & estainct l'appetit du E ieu d'amour.

Elle est aussi, tesmoing Pline, bonne contre piqures de Scorpions, beuë en vin. F

## De la Laitue sauage. Chap. XIX.

## LA FORME.

LA Laitue sauage a feuilles longues, profond incisées aux deux costez, blâchâtres, au dessous garnies de mout d'espines le long de la coste du milieu. La tige est ronde, logue, & croist plus haut que la Laitue domestique, aspre, couuerte d'espines poignantes, & de semblables feuilles: au plus haut de la tige croissent les fleurs ainsi qu'à la Laitue cultiuée: la semence est brunatre, au reste semblable à la semence de la Laitue domestique. La racine est petite.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist aux bors des chaps, le long des voyes, & semblables lieux incultiués aucune

fois aussi es iardins à la Porée. & là où vnefois elle est semée, elle y reuiet facilement tous les ans d'elle mesme.

## LE TEMPS.

70 Ceste Laitue fleurit en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

80 Ceste herbe est appelée en Grec *βούλιον* & en Latin *Lactuca sylvestris*: de Zoroastres *Pherumbrâtes* Boutiqs *Endiua*, combien toute fois que ce n'estoit la vraye *Endiue*: d'aucuns *Seriola*: en François *Laitue sauage*: en haut Aleman *wilder Lattich*: en bas Aleman *wilde Lattoume*.

## LE TEMPERAMENT.

\* La Laitue sauage est en partie froide & seche iusques au tiers degré, & en partie acre & absteriue, participante de chaleur.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le ius de Laitue sauage bou avec oxymel, purge par le ventre les humeurs aqueuses.  
 B Il fait dormir & appaise toutes douleurs: dauantage il est bon contre piqures de Scorpions & Phalanges.  
 C On l'induit aussi vtilement avec lait de femme sur brulures.  
 D Iceluy distillé aux yeux, esclarcit la veue, & en oste l'obscurité & brouillas.  
 E La graine de ceste Laitue estainct aussi l'appetit du ieu d'amour, & ressemble en vertus à la graine de la Laitue domestique.

*Lactuca sylvestris.*  
Laitue sauage.



## Du Pourpier.

## Chap. XX.

*Portulaca hortenſis.*

Pourpier cultivé.



*Portulaca ſylueſtris.*

Pourpier sauage.





LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Pourcelaine ou Pourpier, l'une Cultivée, l'autre Sauvage, & outre icelles s'en trouve aussi une tierce espece, laquelle prouient seulement en terre salée.

LA FORME.

1 Le Pourpier cultivé a les tiges grosses, charnues, rondes, & brunâtres, lesquelles fessent de la hauteur d'environ une poulme, ou davantage, & là dessus sont les feuilles charnues, espesses, longuettes & rondes par le bout. Les fleurs croissent entre les feuilles & tiges, & au plus haut des tiges, lesquelles sont fort petites & pales: icelles passées il y vient de petits ronds calcules fermés, dedans lesquelles est enclose la graine petite & noire. La racine est tendre & fibreuse.

2 Le Pourpier Sauvage a les tiges espesses, charnues, rondes, comme le Pourpier cultivé, plus tendres toutesfois, plus petites, & plus rouges, lesquelles ne fessent point, mais se traînent & estendent le long de la terre. Les feuilles sont moindres que celles de l'autre; mais les fleurs & graine sont pareilles. Ces deux Pourpriers sont plains de jus, & de goût aigre. On les mengent en salade en esté comme la Lactue.

3 La tierce espece, laquelle croist en terre salée, a mout de tiges grosses, dures, & ligneuses: Les feuilles espesses, grisâtres ou cendrées, fort semblables aux feuilles de l'autre Pourpier, plus blanches toute fois, & plus douces au manier, mais non si vives ne glissantes. Les fleurs croissent au sommet des tiges, amassées ensemble, comme à l'Arroche ou Blette. La racine est longue & ligneuse, & demeure avec sa tige & quelques feuilles tout l'hyver, sans mourir.

LE LIEU.

1 La Pourcelaine cultivée on la sème es jardins.

2 La Sauvage vient d'elle mesme es voyes & le long des jardins, & croist en aucuns endroits, es rochers & vignobles.

3 La Pourcelaine de mer croist sur les digues & lieux voisins de la mer il s'en trouve grande quantité en Zeelande.

LE TEMPS.

1, 2 La Pourcelaine cultivée & sauvage fleurissent depuis le mois de Juin jusques en Septembre, & ce pendant liurent aussi leur semence.

3 La Pourcelaine de mer fleurit en Juillet.

LES NOMS.

0 La Pourcelaine se nomme en Grec *αἰσάριον*: en Latin, & es Boutiques *Portulaca*: en François Pourpier ou Pourcelaine: en haut Aleman *Burgel*: en bas Aleman *Pöselcynne*.

1 La premiere espece est appelée *Portulaca sativa* ou *hortensis*: en François Pourpier ou Pourcelaine domestique ou cultivée: en haut Aleman *Heymisch Burgel*, ou *Burtzelsant*: en bas Aleman *Koomsche Pöselcynne*, ou *tamme Pöselcynne*.

2 La seconde espece est appelée des Modernes *Portulaca flustris*: en François Pourpier sauvage: en haut Aleman *wildt Burtzel*: en bas Aleman *ghemeyne*, ou *wilde Pöselcynne*. Ce n'est pas toutesfois le Pourpier sauvage qui est escrit en aucuns exemplaires de Dioscoride, lequel est de temperament chaud.

3 La tierce Pourcelaine est appelée des Modernes *Portulaca marina*: en François Pourcelaine de mer: en Aleman *yer Pöselcynne*. Il semble que ce soit l'herbe que les Grecs appellent *αἰσάριον*: les Latins *Halimol*, signamment la seconde espece descrite par Plin.

LE TEMPERAMENT.

1, 2 La Pourcelaine domestique & la sauvage sont froides jusques au tiers degré, & humides jusques au second.

3 La Pourcelaine de mer est manifestement chaude & seche jusques au second degré.

*Portulaca marina.* Pourpier marin.



## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** On mange le Pourpier cultivé & sauvage en viandes comme la Laitue, mais il refroidit le sang & le rend aqueux, & nourrit fort peu il est toutefois bon à ceux qui ont grande chaleur en l'estomach & intestins.
- B** Iceluy prins en mesme sorte, arreste toutes defluxions d'humours, proufite aux douleurs de vésie & des rongnons, & les guerit encore qu'ils fussent endominagés & irrités.
- C** La Pourcelaine conforte aussi l'estomach debile & enflamé, & colle les imaginations, songes & appetit du ieu d'amours.
- D** Le ius d'icelle a pareille vertu, dauantage il est vtile contre fieures chaudes, & contre veis qui naissent au corps de l'homme.
- E** Il proufite à ceux qui crachent sang, il arreste la dysentere, flux des morenes, & tout flux de sang. Semblable vertu a la Pourcelaine cuicte & mengée.
- F** Le ius d'icelle induict avec huile & vinaigre rosat, appaise douleurs de teste qui viennent d'auoir par trop long temps esté au Soleil.
- G** Iceluy iecté en la matrice par dessous, donne allégeance aux inflammations, & vicerations d'icelle, & par clystere, aux vlcères chauds des entrailles.
- H** Les feuilles de Pourpier meslées avec farine d'orge rostie, & induictes sur les yeux enflambez, donnent allégeance à iceux & en ostent l'inflammation en mesme sorte elles proufissent aussi au feu volage, chaleur & douleur de teste, & contre toutes inflammations & phlegmons.
- I** Iceluy maché crud, oste l'agassement des dens, & raffermist les dens eslochées.
- K** Brieu la Pourcelaine rafraichit tout ce qui est chaud: pourtant engarde elle les playes d'inflammation induicte dessus à part soy, ou meslée avec farine d'orge rostie.
- L** Le ius d'icelle, tué & pousse hors les vers, & arreste le flux de ventre.
- M** La Pourcelaine de mer, auens la mont confire en vinaigre passé, pour la manger en yuer en forme de capres ou salade: ainsi mengée elle reschauffe & renforce l'estomach, & fait venir bon appetit, & prouoque l'vrine.
- N** Si ceste Pourcelaine est Halimus, la racine d'icelle vaut contre conuulsions, rompures, & treuchées, bené au poid d'une drachme avec eau miellée. Elle fait aussi auoir abondance de lait.

## De Crithmum, ou Bacille.

## LA FORME.

**B**acille a plusieurs feuilles charnuës, espesses, larges, estroictes, bien pres comme le Pourpier. La tige est ronde, d'un pied, ou pied & demy de haut, laquelle porte esmouchettes rondes qui produisent fleurettes blanches, & puis vne graine semblable au Fenoil, mais plus grande. La racine est grosse & odoriferante.

## LE LIEV.

Cette herbe croist sur la plage de la mer, & en terre salée, & se trouue en grande abondance en plusieurs endroits d'Espagne, de France, & d'Angleterre, le long de la plage. En ce pais les Herboristes la plantent en leurs iardins.

## LE TEMPS.

Bacille fleurit icy aux moys d'Aoust & de Septembre, mais là ou elle croist d'elle mesme, elle fleurit plus tost.

## LES NOMS.

Cette herbe s'appelle en Grec *κρίθμυ*, *κρίθμυ*; en Latin *Crithmum* & *Bati*: és Boutiques *Crete marina*, duquel nom elle est cognue en Brabant: en François *Bacille*, *Crete marine*, & *Fenoil marin*.

## LE TEMPERAMENT.

La Crete marine est seche & absterfiue, & temperée en chaleur.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Les feuilles, ou graine, ou racines, ou toutes ensemble cuictes en vin & beuës, prouoquent l'vrine, & le flux menstrual: & aydent grandement contre la jaunisse.

## Chap. XXI.

Crithmum. Bacille.



**B** On vésict les fuilles en saulmure, & on les garde pour puis les menger comme cappres: car mengées en ceste sorte, elles prouffitent à l'estomach, & ouurent les oppilations du foye, ratelle, & rongnons.

## De la Berle. Chap. XXII.

## LA FORME.

**B**erle à les tiges charnues, rondes, bien bréchues: là dessus fuilles charnues, espesses, non guere differétes aux fuilles de Pourcelaine, plus rondes toutesfois, plus brunatres, & d'un noir plus obscur, lesquelles escachées rendent bonne odeur. Au sommet des tiges & des branches croissent plusieurs belles fleurs bleues, non guere differentes aux fleurs de Mouron. La racine est blanche & fibreuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist au bord des fossés, & des estangs, au cunefois aussi le long des riuieres, droict ioinant l'eau, tellement que souuent elle est inondée d'icelle.

## LE TEMPS.

La Berle fleurit en May & Juin.

## LES NOMS.

On appelle ceste herbe en Grec *κωραία*, & en Latin *Cepae*: d'aucuns Modernes se nomme *Anagallis aquatica* & *Be cabunga*: en François Berle: en haut Alemã *Wasserpungsthen*, *Bachpungsthe*, ou *Pungsthen*: en bas Alemã *Waterpungsthen*.

## LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est de temperament chaud, iusques bien pres au second degré.

## LES VERTVS ET OPER.

**A** Les fuilles de Berle beuës en vin, prouffitent contre difficulté d'vrine, & rongnes interieures de la vessie, si gnamment si on la prent avec la racine d'Asperges.

**B** On les mengé aussi avec huile & vinaigre, & sont vtils à ceux qui ont difficulté d'vrine, & sont trauaille de gravelle.

## De Bunium. Chap. XXIII.

## LA FORME.

**B**unium a les tiges vnies, anguleuses, de pied & demy de haut ou dauantage. Les premières fuilles ressemblent bien pres aux fuilles du Persil vulgaire, plus petites toutesfois, & plus menia dechiquetées, & celles qui croissent sur la tige ne sont guere differentes aux fuilles d'Aneth. Les fleurs qui sont blanches croissent par esmouchettes, comme à l'Aneth. La graine est petite, odoriferante, non guere dissemblable à la graine de Comm ou Fenoil, plus petite toutesfois. La racine est ronde, comme vn peson ou petite pomme ronde, brune par dehors, & blanche par dedans, d'un goust pareil aux Pastenades.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en plusieurs endroits de Hollande & Zeelande, aux champs à Blé & le long des voyes. Il s'en trouue aussi en quantité en Angleterre. En Brabant les Herboristes la plantent en leurs iardins.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit & liure sa semence en Juin.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nome en Grec *Βουνιον* en Latin *Bunium*



Bunium.



d'aucuns Aton Africain, & Anemophoron, de Galie aussi Arctium: en Zeelande s'appellent *Eerdsloten*, c'est à dire petite Noix de terre: des Modernes non sans grâde erreur *Aplos*, & des autres *Balbina*, d'aucuns aussi *Meum*.

## LE TEMPERAMENT.

Bunium est chaud & sec iusques pres du tiers degré, principalement la graine, laquelle est beau coup plus chaude que la racine.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.


- A La racine de Bunium on la menge en viandes en Zeelande, auquel lieu, elle n'est guere différente de goût & vertu aux Pastenades ou Carottes: elle prouoque l'urine, conforte l'estomach, nourrist moyennement, & est bonne à la vessie & aux rongnons.
- B La graine de Bunium reueille le flux menstrual des femmes, pousse hors la secondine, prouoque & pousse hors l'urine, & prouiffite grandement aux reins, rongnons, vessie & ratelle oppilées, car elle ouure toutes oppilations des parties interieures.
- C Le jus de l'herbe beu avec hydromel, a la mesme vertu, soit qu'il soit prins nouueau, ou sec.

De la Maulue.

Chap. XXIII.

## LES ESPECES.

Il se trouue plusieurs especes de Maulue, dont les vnes sont Cultiuées, les autres Sauvages, lesquelles sont aussi de diuerfes sortes. La Maulue cultiuée appelée R. ose d'outre mer est de plusieurs sortes, non diuerse en fucilles, tiges, ou croiffon, mais en figure & couleur des fleurs: Car l'une les a simples, l'autre doubles, maintenant blanches, maintenant incarnées, tantost d'un cler rouge, tantost d'un rouge obscur, tantost griuolées. La Maulue sauuaige est aussi de deux sortes, Grande & Petite.

*Malua sativa.* Maulue cultiuée.*Malua syluestris elatior.* Grande Maulue sauuaige.

## LA FORME.

La grande Maulue cultiuée laquelle porte la R. ose d'outre mer, a les fucilles grandes, rondes, & rudes, plus grandes, plus blanches, & plus inegales que les fucilles des autres Maulues.

La tige

La tige est ronde, & croist six ou sept pieds de haut ou davantage: elle porte belles fleurs grandes, de diuerses couleurs, semblables en figure à la Maulue commune: beaucoup toutesfois plus grandes, aucunesfois simples, aucunesfois doubles. Les fleurs tombées, vient la graine qui est par petits frommages. La racine est grosse & longue, & dure long temps, iettant tous les ans nouuelles fueil les & tiges.

La grande Maulue sauuaige a les fueilles rondates, charnues, vn peu crenées à l'entour, plus brunes, plus petites, & plus vnies que la fueille de la Cultiuée. La tige est ronde, de deux ou trois pieds de haut, sur laquelle croissent les fleurs, de figure semblable à celles de la cultiuée, mais beau coup plus petites, parties en cinq, de couleur incarnée, apres lesquelles vient la graine rôtée & plat te, formée comme de petits frommages. La racine est longue & d'assez bonne grosseur.

La petite Maulue sauuaige est fort semblable à l'au tre Maulue sauuaige, si ce que les fueilles sont vn peu plus rondes & plus petites: les fleurs plus pales, & les tiges non esleuées, mais se trainans par la terre. La ra cine est aussi longue & grosse.

LE LIEV.

La Maulue cultiuée, on la plante en ce pais és iardins.  
Les sauuaiges croissent en lieux mal cultiués, le long des voyes & des champs.

LE TEMPS.

La Cultiuée fleurit en Iuillet & Aoult. Les Sauua ges commencent à fleurir en Iuin, & demeurent fleu rillans iusques en Septembre, liurans ce pendant leur semence.

LES NOMS.

La Maulue est appelée en Grec *μαλάχη*: en Latin *Malua*: de Pythagoras *ἄβημα*, Antema: de Zoroastres *ἰαδύρωμα*, Diademe: des Egyptiens *Chocortis*, d'aucuns Vrins *marisien* François Maulue: en haut Aleman *garten Pappeln*, en bas Aleman *ἄβασιν*: és Boutiques *M. lue*.

La premiere espee de Maulues s'appelle en Grec *μαλάχη κακιστή*: en Latin *Malua sativa*: d'aucuns *Rosa vltra marina*, c'est à dire Rose d'outre mer, Maulue de iardin ou cultiuée: en haut Aleman *garten Pappeln*, en bas, ou *ἄβασιν*: en bas Aleman *winterroosen*.

La Maulue sauuaige s'appelle en Grec *μαλάχη ἀγρία*: en Latin *Malua syluestris*: en haut Alemā *germeyn Pappeln*: en bas Alemā *ἄβασιν* & *Keeshenscruyt*. Dont celle qui est esleuée & croist le plus haut, est appelée *Malua elatior*.

La seconde espee sauuaige qui est la plus petite, est appelée *Malua syluestris pumila*, ou *Malua pumila*, c'est petite Maulue: en Aleman *kleyn ἄβασιν*.

LE TEMPERAMENT.

Les Maulues sont temperées en chaleur & humidité, digerentes, & amollissantes.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La Maulue prinse en viandes nourrit vn peu davantage que la Laitue & amollit le ventre, tou tesfois elle est ennemie de l'estomach, pour ce quelle le relâche & amollit.

B Les fueilles de Maulue mengées crues avec vn petit de sel, donnent allégeance aux douleurs & exulcerations des rongnons & de la vesie.

C A ce mesme, & contre la grauelle & pierre vaut aussi la Maulue cuicte en eau ou vin, puis beue.

D La decoction d'icelle avec sa racine, est vtile contre tout venin & poison, si incontinent apres l'auoir beue, on la recoicte.

E Elle adoucit & amollit les tumeurs de la matrice, quand on se baigne dedans.

F Elle est bonne aussi à toutes exulcerations & rudesses ou aspreté de la vesie, de la matrice, & du siege, iettée dedans avec vn elytere.

G La graine de Maulue beue en vin, fait auoir abondance de lait, & prouffite à ceux qui ont



*Malua syluestris pumila.*  
Petite Maulue sauuaige.

douleur de vessie, & sont tormentez de la grauelle.

**H** La Maulue guerit piqures de mouches à miel & de guespes, & tire hors les espines, & eschardes induicte ou appliquée dessus.

**I** Icele crue ou cuicte, à partfoy broyée, ou avec sein de porc, adoucit, meurit & refout toutes tumeurs froides & chaudes.

**K** Les racines de Maulue cuictes sous les cendres, & broyées bien menu, sont vtilement appliquées en forme d'emplastre sur mammelles exulcerées.

LE CHOYS.

Pour manger, la Maulue de jardin est meilleure & plus conuenable que la Sauvage; mais pour medecine, pour amollir duresses, & refoudre tumeurs, la Sauvage est meilleure, & plus vertueuse que la Cultinée.


De la Guymaulue.

Chap. XXV.

*Althea.*

Guymaulue.

*Hesperis Theophrasti. Abutilon Asiaticum.*



LA FORME.

**G**uymaulue est fort semblable aux autres Maulues, beaucoup toutesfois plus blanche, & plus douce: elle a les feuilles rondates, blanches, douces, & bien pres velues, lesquelles en grandeur & figure ressemblent pres aux feuilles des Maulues vulgaires. La tige est røde & droicte. Les fleurs ressemblent en figure à celles de la Maulue sauvage, apres lesquelles vient la graine comme aux autres. La racine est grande & grosse, blanche par dedens, & visqueuse.

La seconde espece de Guymaulue descrite par Theophraste, a aussi feuilles rondates, blâches, & douces, & bien pres velues, comme l'autre Guymaulue, beaucoup toutesfois plus grandes, bien pres semblables en forme & en grandeur aux feuilles de la Courge. Les tiges sont longues, grosses, & fortes, sur lesquelles croissent entre les feuilles fleurs iaulnes, puis apres viennent de calyculles ployez qui contiennent la graine.

## LE LIEU.

1 La Guymaulue ayme terre grasse & humide, pres des eaux & foziez.

2 La seconde espece est estrangere en ce pais: parquoy on ne la trouue pas sinon chez quelques diligens Herboristes.

## LE TEMPS.

1 Elle fleurit avec les autres Maulues sauages.

2 La seconde on la seme en Mars ou Auril, & elle liure sa fleur & graine à la fin de l'été.

## LES NOMS.

1 Ceste espece de Maulues est appelée en Grec ἀλθαία: en Latin *Althea* & *Hibiscus* ou *ibiscus*: de Galien aussi *Anadendron*, d'aucuns *Ανισταίθηα*: és Boutiques *Bismalua*, & *Malsauiscam*: en François *Guymaulue*: en haut Alemā *Ybiffen*, oder *Eibisch*: en bas Alemā *witte Maluwe*, ou *witte hucmsf*.

2 La seconde espece est appelée de Theophraste en Grec aussi ἀλθαία, *ἢ μολύχου ἀγρία*: en Latin aussi *Hibiscus*, & à la difference de l'autre, *Hibiscus Theophrasti*: d'Auicenne elle est appelée *Abus sion*, sous lequel nom elle est cognüe des Herboristes.

## LE TEMPERAMENT.

La Guymaulue est aussi temperée en chaleur comme les autres, plus seche tou tefois, voire iusques au premier degré. LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La racine de Guymaulue cuicte en vin & beuë, est bone cõtre douleur de grauelle, & de la pierre contre dyfentere & sciõtique, à gens qui tremblët, qui sont trauaillez de conuulsion, & sont rõpus.

B Icelle cuicte en lait doux nouueau, guert la toux.

C Elle vaut aussi contre douleur de dens: car elle appaise la douleur, cuicte en vinaigre, & tenue en la bouche.

D Icelle cuicte en vin ou eauë miellée, & pilée bien menu, guert & meine à cicatrice playes nouuelles, refout & digere toutes tumeurs froides & autres, comme enflures, apostemes suruenantes derriere les aureilles, & aux mammelles: elle amollië les tumeurs, meurit & rompt apostemes enuuelliz & enflures, guert les fen dasses de son demët, & le trëblemët des nerfs & parties nerueuses.

E Icelle ainsi acouitree & broyée avec axiue de porc, ou gresse d'oyson, ou therebinthine, adoucit les apostemes & viceres de la matrice, & ouure les estouffemens d'icelle appliquée en forme de pessus.

F A toutes les maladies susdictes seruent aussi les fueilles d'icelle mises en ouure en mesme sorte, elles ne sont pas toutesfois si vertueuses que la racine.

G Les fueilles de Guymaulue appliquées avec huile, guerissent bruslures soit de feu, ou d'eauë chaude, & prouffitent aux morsures d'hommes & de chiens, & piqures de Guespes & Mouches à miel.

H La garine seche ou verde pilée & beuë, guert la di fentere, & arreste tout flux de sang, & du ventre.

I Induicte avec vinaigre, elle efface les taches noires & blanches du visage, mais il s'en faut frotter au lœcil ou en vn poisse chaud.

K Icelle cuicte en eauë, vinaigre, ou en vin est prouffitabile à boire à ceux qui sont piqués de Guespes & Mouches à miel.

Alcea. Guymaulue sauage.



## De la Guymaulue sauage. Cha. XXVI.

## LA FORME.

Guymaulue sauage est vne espece de Maulue sauage, tesmoing Dioscoride, toutesfois ses fueilles sont plus fendues & plus profond incisées, & diuisées en moult de parties, bien pres comme les fueilles de Veruaine, beaucoup toutesfois plus grandes. Les tiges sõt rõdes, droictees, hautes de deux ou trois pieds. Les fleurs sont de couleur cler rouge ou incarnée, semblables en figure aux fleurs des autres Maulues, apres lesquelles vient aussi la graine en forme de petits frommages. La racine est grosse, longue de deux pieds ou dauantage, blanche par dedans.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en lieux incultivez, le long des champs & des hayes, elle n'est guere commune en ce pais.

## LE TEMPS.

La Guymaulue sauvage fleurit à la myrte, comme la Maulue sauvage.

## LES NOMS.

Ceste herbe s'appelle en Grec *άλυα*, & pareillemēt aussi en Latin *Alcea*: incognue es Boutiques, d'aucuns *Herba Simonis* & *Herba Hungarica*: en haut Aleman *Sigmars kraut*, *Sigmundswurtz*, ou *Spochlenten*: en François Guymaulue sauvage: en bas Aleman *Sigmartis crupt*.

## LE TEMPERAMENT.

La Guymaulue sauvage est temperée en chaleur & froideur, & à quelque vertu desiccative.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine de Guymaulue sauvage cuicte en eau ou en vin & beue, arreste la dysenterie, & guerit & consolide les playes & rompures interieures.

## De la Guymaulue de Venise.

## Chap. XXVII.

## LA FORME.

*Alcea Veneta.* Guymaulue de Venise.

LA Guymaulue de Venise a les tiges rondes, tendres, bien ramues, les feuilles d'un verd obscur, charnues, fendues, & fort decouppées, non guere differentes à la Guymaulue sauvage. Les fleurs croissent au sommet des tiges, & sont les plus belles entre toutes les Maulues, biē pres semblables aux autres fleurs de Maulue, parties aussi en cinq feuilles, lesquelles par dehors sont blanches ou palles, & au milieu de la fleur purpurées, & ont au milieu vn pestel ou pilō iaine cōme or. Ces fleurs ne fouarent pas sinon trois ou quatre heures apres soleil leuē, vne heure ou deux ou dauantage deuant mydy, & quand elles ont demourē vne heure, ou heure & demy ouuertes, elles se refermēt derechef & perissent, lesquelles passées viennent en leur lieu de petites vessies contenans de chapiteaux ronds, houl fus, dans lesquels est vne graine noire. La racine est tendre & petite, & perit tous les ans, de sorte qu'il la faut semer d'an en an de nouveau.

## LE LIEV.

Ceste herbe est estrāgere, & ne se trouue pas sinon es iardins des Herboristes là ou elle est semée.

## LE TEMPS.

On la seme en Mars ou Auril, & elle fleurit en Iuin & Iuillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe est tenue des Modernes pour vne espeece d'*Alcea*, & s'appelle *Alcea Veneta*, cest à dire Guymaulue de Venise: d'aucuns aussi *Malu Theophrasti*: en haut Aleman *Venediger pappe* ou *wetter rosslin*: en bas Aleman *Venedische Malue*.

## LE TEMPERAMENT.

Ceste Guymaulue est chaude & humide comme la Maulue sauvage.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Attendu que ceste Guymaulue est chaude & humide, il est bien à presumer qu'elle a la vertu & faculté pareille à la Maulue vulgaire, toutesfois nous n'en auons point certaine experience.





Il y a deux sortes de Concombre, Domestique & Sauvage. Le Domestique est receu en viâdes. Le Sauvage n'est à cela conuenable, mais on s'en sert seulement en Medecine, lequel nous auôs décrit au Tiers liure.

LA FORME.

Le Concombre domestique & mēgeable a les tiges longues, rudes, se trainans par terre, sur lesquelles croissent fueilles rudes & rondatres, & des capreoles. Les fleurs croissent entre les fueilles & les tiges, de couleur palle iaulne, lesquelles tombées le fruit sensuyt long, semé par dehors de mout de taches, & long par le bout, verd au commencement, & puis apres iaulne, dedans lequel croist vne graine blanche, large. La racine est raisonnablement longue.

LE LIEV.

On seme les Concombres és iardins, & aymēt lieux exposés au soleil.

LE TEMPS.

Les Concombres sont en saison de manger en iuliet & Aouſt, & meurissent en Septembre.

LES NOMS.

Ceste espee de Concombre est appelée des Modernes en Grec *σκινός ἡμῶν*. en Latin *Cucumis sativus*, ou *Cucumer sativus*, d'aucuns *Cucumis anguinus*, ou *Angariatis*; és Boutiques *Cucumer*; en François Concombre; en haut Aleman *Cucumert*; en bas Aleman *Concommeren*, & semble que ce soit ce que Galien aux liures de *Alimentorum facultatibus* appelle *μυλοπέπων*, *Melopepon*.

LE TEMPÈRAMENT.

Le Concombre est de nature froide & humide, jusques bien pres au second degré.

LES VERTVS ET OPÉR.

Le Concombre prins en viandes, est bon à l'estomach & aux intestins par trop chalereux; mais il nourrit fort peu, & mal, tellement que si quelcun en mange par trop, les veines s'emplissent de mauuaises humeurs & froides, lesquelles (car elles ne se peuuent tourner en bon sang) engendrent en la fin de grosses fieures & grâdes maladies, tesmoing Galien.

La graine de Concombre beuë avec lait ou vin bien doux, lasche tout doucement le ventre, B & est fort vtile à la vessie exulcerée & eshouppée par dedans.

Les fueilles verdes d'iceluy pilées avec du vin, guerissent morsures de chiens appliquées dessus. C

*Cucumis sativus.*  
*Melopepon Galeni.* } Concombre domestique.



Du Pepon.

Chap. XXIX.

LES ESPÈCES.

PEpon est vne espee de Cōcombre, lequel est à present de diuerſes sortes, Grand, Rond, Plat; dont le Grand est aussi de deux sortes, Blanc & Verd.

LA FORME.

Le grand Pepon a les sarmens longs, ronds, gros, creux, rudes, garnis de courtes espines a quest les fueilles grandes, larges, bouffues, parties en quatre ou cinq crenes profondes, beaucoup plus grandes que les fueilles de la Courge; aupres desquelles viennent aussi des capreoles, par lesquels ce Pepon s'esleue & monte haut, s'attachant par tout. Les fleurs croissent entre les fueilles, fort grandes, creuses par dedens, crenées par les bors, de couleur iaulne. Le fruit est fort grand, gros, & long, l'vne sorte estant de couleur verdatre, & ayant plusieurs costes, & la peau fort dure, l'autre estant blanc couuert d'vne peau tendre & douce. Dedens le fruit est encluse la graine, large & blanche, & beaucoup plus grande que la graine de Concombre.

Pepones magni. Pepon grand.



Pepones rotandi.

Pepon rond.



Pepones lati.

Pepon large.



- 2 La seconde espece ayant le fruit rond a aussi les tiges & feuilles picquantes: les tiges toutes fois sont moindres, & se couchent par terre pour la plus part. Les feuilles sont aussi plus petites & n'ont si profond coupées. Les fleurs sont jaunes, semblables aux fleurs de l'autre Pepon. Le fruit est aucunement plat, l'un verd aussi, & l'autre blanc, dedans lequel croist la graine, plus petite que celle de l'autre Pepon, plus grande toutefois que la graine de Concombre.

- 3 La tierce espece de Pepons, ressemble fort à la seconde de tiges couchées, de feuilles & fleurs: les tiges toutefois ne sont pas si rudes. Le fruit est plat, large, & rond, couvert d'une pelure douce & menue, froncé par les bords comme un bouclier, dedans lequel est la graine, qui est blanche & ressemble aussi à la graine de Cocombre, plus grande toutesfois.

- 4 On trouve aussi une espece sauvage de Pepons, qui ressemble au Cultivé de tiges & feuilles houlues, mais le fruit est moindre & du tout amer comme la Colochinte, Courge sauvage, & Concombre sauvage, auquelz cette espece sauvage ressemble en faculté & vertus.

## LE LIEV.

On sème aussi es jardins toutes ces especes de Pepons, & sont recueus en vides, excepté le Sauvage

LE TEMPS.

Ce fruit est meur en Aoust, aucunes fois plus tost quand l'année est chaude & auancée.

LES NOMS.

On appelle ce fruit en Grec *κίτρινος*, & en Latin *Pepones*: de Gallie aussi *σκουροκίτρινος*, *Sicyopepones*, c'est à dire, *Pepones cucumerates*.

La première espèce est appelée en François *Pepons* ou *Poponsien* haut Alemā *Pfeber*: en bas Alemā *Peponen*: & des Modernes en Latin *Magni Pepones*, d'aucuns *Cucumeres Turcici*, & à l'ordonnance de Turquie, *Turchischje cucumeren*, & *Cochschje comcommeren*.

La seconde espèce de Pepon, s'appelle *Pepo*, ou *Cucumis maritimus*: d'aucuns *Zucconarin*: en François *Concombre marin*, ou petit *Pepon*: en Alemā *See Concommeren*.

La tierce espèce qui est le *Pepon large*, à ceste occasion appelée *Pepones lati*, *Grèce de Peponen*, est d'aucuns nommée *Melons de Turquie*, *Cochschje Pfeformen*.

LE TEMPERAMENT.

Les *Pepons* cultivez sont froids & humides, non toutes fois si humides que les *Concombres*.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

On ne mége guere en ce pais le fruit du *Pepon* cultive crud, mais bien cuit avec la chair, ou A en lait doux, car acoustre en ceste sorte, il est meilleur & moins nuisible que le *Concombre*, & est bon à ceux qui ont l'estomach chaleureux.

La chair des *Pepons* broyée menu, appaise & guérit inflammations des yeux induite dessus, B & appliquée sur le front arreste le flux des humeurs tombans sur les yeux.

La graine des *Pepons* poistrie avec farine & le jus d'iceux, embellit la face, & efface toutes taches, quand on s'en frotte au Soleil.

La racine d'iceux prinse à la quantité d'une drachme avec eau miellée ou hydromel, fait vomir.

Icele induite avec miel, guérit les rongnes de la teste qui sont pleines de boue.

Du Concombre citrin.

LA FORME.

**C**oncombre citrin est aussi vne espèce de *Concombre*, ayant les tiges rondes, houlues, pleines de capreoles par lesquels elles s'attachent aux seps & estaches. Les feuilles sont decouppées, fort semblables aux feuilles de *Colochinte*. Le fruit est rond & verd par dehors, dedans lequel croist vne graine noire & large, ressemblant à celle du *Pepon*, plus petite toutes fois.

LE LIEV.

Ceste herbe est aussi tenue aux iardins d'aucuns Herboristes.

LE TEMPS.

Le *Concombre citrin* meurt avec les *Pepons*, à la fin de l'été.

LES NOMS.

Ceste espèce de *Concombre* s'appelle *Cucumis citrinus*, d'aucuns aussi *Anguriazés Boutiqués Citrulus*: & à l'ordonnance d'Alemā *Utrussen*: en François *Concombre citrin*.

L'espèce sauvage de ce *Concombre* est la vraye *Colochinte* qui est descrite au Tiers liure.

LE TEMPERAMENT.

Le *Concombre citrin* est aussi froid & humide comme le *Pepon*.

LES VERTVS ET OPERA.

Le *Cōcombre citrin* ressemble fort au *Pepon* de vertu & operation, soit qu'il soit prins en viande, ou en medecine.

Chap. XXX.

*Cucumis citrinus.* Concombre citrin.



## LA FORME.

Cucumis Galeni &amp; Antiquorum. Melon.

LE Melon se traîne par terre cōme le Concombre, & a les tiges tendres, avec capreoles, & les feuilles rondes & houlles. Les fleurs sont iaulnes, comme celles du Concombre. Le fruit est long, bien pres aussi semblable au Cōcombre, plus gros toutefois, couuert d'vn poil bien delié par dehors, principalement estant encore nouveau, & iaulne par dedans. Dedis iceluy est enclōse la graine fort semblable à celle du Concombre.

## LE LIEV.

On seme aussi es iardins les Melons, & on les doit mettre en terre grassc & bien fumée, terre seche & bien illustrée du Soleil, car autrement il ne vient pas en ce pais.

## LE TEMPS.

Le Melon est meur en Aoust & en Septembre.

## LES NOMS.

Ce fruit est appelle en Grec *κίβω*, cest en Latin *Cucumis*, & est sans faute le Concombre des Anciens, dont le Cucumer asininus est l'espece sauuage. Des Modernes il est appelle en Grec *μολοπιπών*: en Latin *Melopepo*, d'aucuns *Melo*, & en aucuns endroits d'Italie aussi *Citrulus*, & *Cucumis citrulus*: en François Melon: en haut Aleman *Melconen*: en bas Aleman *Melconen*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Melon est pres de semblable temperament que le Pepon, mais non si humide.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A Le Melon est fort semblable en vertus au Pepō, toutesfois il n'engendre pas si mauuais sang, & ne descend pas si tost par le ventre, pourtant est il aussi meilleur que le Pepon.



## De la Courge.

## Chap. XXXII.

## LES ESPECES.

Courge est proprement de trois sortes, Grande, Petite, & Longue. Lesquelles ressemblent fort l'une à l'autre de feuilles & tiges, sans la Sauvage qui est descrite au Tiers Liure.

## LA FORME.

- 1 La Courge a les tiges longues, tendres, fort ramuës, & pleines de capreoles, par lesquelles elle fattachc & monte fort haut, au moins si elle est plantée pres de quelques perches, hayes, seps, ou arbres, autour desquels elle se puisse enuolopper, car sans ayde la Courge ne peut monter, mais faut quelle demeure couchée par terre, & ne peut aussi porter aucun fruit. Les feuilles sont rondes, blanchatres, douces, & bien pres velues, retirans en figure aux feuilles du grand Gleteron, plus petites toutesfois. Les fleurs sont blanches, chacune partie en cinq feuilles. Apres les fleurs croist le fruit, verd au commencement, & couuert d'vne laine douce, puis apres iaulnatre & bien pres chaulue. Celuy de la premiere espece est fort grand, gros, & large: Dedans lequel est contenue vne graine longue, & large, ayant deux angles au plus estroit bout.
- 2 La seconde espece ressemble à la premiere de tiges, feuilles, fleurs & femence, sinon que la graine est plus petite, en forme de rond flacon à col long, qui est la meilleure façon de Courge, Car on en vse souuent, principalement les Pelerins, au lieu de flacons, quand elles sont creuës.
- 3 La tierce espece est aussi pareille à la susdicte, sinon que le fruit n'est pas court & gros comme celuy des autres, mais souuent de trois ou quatre pieds de long, & d'environ la grosseur d'vn bras ou d'vne iambe: au reste il n'y a pas de difference.

# De la Courge. Ch. XXXII.

*Cucurbita canariensis maior*, Grande Courge.



*Cucurbita minor*, Petite Courge.



*Cucurbita anguina*, Courge longue.



4 Outre ces trois sortes de Courge domestique, il s'en trouve encore vne autre espèce, tesmoins quelques gens sçauis, le fruit de laquelle est fort court, & sans plus de la grosseur d'un doigt au reste de tiges & feuilles semblable à la fufidicte.

5 De ceste s'en trouve il aussi vne espèce Sauvage, dont est escrit au cha. de Colocinthe, au tiers liure.

## LE LIEU.

6 Les trois premières espèces, on les plante icy & en jardins.

4 La quatrième espèce croît en aucuns pays, en lieux rudes & pierreux.

## LE TEMPS.

La Courge meurt en ce pays en Aoust & Septembre.

## LES NOMS.

La Courge se nomme en Grec *κολοκυνθα* & *καλαμυθα* & *εσπεριου*; en Latin & es Boutsiques *Cucurbita*; en haut Aleman *Kurbis*; en bas Aleman *Lauwoiden*.

Les trois premières espèces sont appelées de Plin *Cucurbita canariensis*, d'aucuns aussi *Perricases*.

1 La première espèce est appelée des modernes *Cucurbita magna* & *maior* en François Grande Courge; en haut Aleman *Groß huerbe*; en bas Aleman *groote Lauwoiden*.

2 La seconde espèce s'appelle *Cucurbita minor*: en Mm *ij* Fran-

François petite Courge-en haut Aleman *hlein Kurbo*: en bas Aleman *clern Lauwoosden*.

La tierce espece se nomme *Cucurbita anguina*, & d'aucuns *Cucurbita oblonga*: en François Courge longue: en haut Aleman *lang Kurbo*: en bas Aleman *langhe Lauwoosden*.

La quatriesme espece, qui est encores en cognue en ce pais, est appelée de Pline en Grec *Cypé*, & en Latin *Cucurbita barbarica*, & *marina*.

#### LE TEMPERAMENT.

La Courge est froide & humide iusques au second degré.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Courge menagée crue & non preparée, est vn tresmauuaix menger, testnoing Galien, refroidant l'estomach, le chargeant, & excitant douleur en iceluy.
- B Mais menagée boullie, cuicte ou autrement preparée, elle n'est pas tant nuisible, & elle refroidit & humecte l'estomach chareux & seché, estanche la soif, & amollit le ventre: toutesfois elle nourrit fort peu.
- C Le ius tiré de la Courge entiere boullie, beu avec quelque peu de miel & nitrum, lasche le ventre sans grande douleur.
- D Pareille vertu a le vin qui a esté tenu vne nuict dedävsne Courge creusée, quäd on le boit à itru.
- E Le dedans de la Courge pilé appaise & adoucit les phlegmös & apostemes chaudes, les inflämatïons & rougeurs des yeux, & signammët la douleur de goutte chaude, appliqué sur le lieu dolët.
- F Le ius de la Courge avec huile rosat, appaise douleur d'oreilles, distillé de dans icelles.
- G Iceluy est aussi vtiement induict en la mesme façon ou à part foy, (sur brisures & feu volage) & sur toute eschauffure.
- H Les branchettes d'icelle beuës avec vin doux & vn peu de vinaigre, guerissent la dysenterie.
- I L'elcorce de la Courge bruslée en cendres, guerit & consolide les viceres causez par brulure, & pareillement aussi vieux viceres des genitoires, espandue dedans.
- K La graine de Courge a bien pres telle vertu que la graine de Concombre.

#### Du Naueau rond.

##### LA FORME.

1 LE Naueau rond a au commencement les feuilles grandes, rudes, larges, qui au costé plus estroit sont profond inciées & crenées à deux costez: & approchant luyer, il acquiert tige ronde, sur laquelle croissent petites fleurs iaulnes produisans vne graine brunatre en petites filiques, du tout semblables aux Choux, ausquelz le Naueau rōd retire fort de fleurs, filiques & semence. La racine est ronde, grosse, blanche par dehors & par dedans, & de la grosseur aucunesfois d'vne teste, aucunesfois d'vn poing, ou plus petite aussi.

2 Il se trouue encore vne espece de ce Naueau, nō pas celle qu'aucuns appellët Naueau rouge, laquelle le nous auons descrit sous la Bete: mais vne autre laquelle ressemble au Naueau susdit de feuilles rudes, tiges, fleurs, filiques & semence, & differe seulement en ce que ses racines ou Naueaux ne sont blancs, mais rouges, au reste semblables aux autres, cōme nous auons entendu d'aucūns Herboristes, lesquelz m'ont dict que le tresnoble & tresillustre Royne Dougerie de Hongrie & Boheme, faict esleuer de telz Naueaux en son tresplaisant & tresriche verger

##### LE LIEV.

Le Naueau rond ayme terre descouuerte, on le sème en aucuns lieux entre les vignobles, comme à Huygarden & lieux circonuoisins, lesquelz deuiennent fort gros, mais le plus souuët aux champs, principalement quand le Blé est meur, & ceux là ne deuiennent pas si gros.

#### Chap. XXXIII.

Rep<sup>4</sup>.

Naueau rond.



LE TEMPS.

On les sème au commencement de l'axté, lesquels peuvent deuenir gros: & en Juillet ou Aouft apres que le Blé est moissonné, & ceux là demeurent communement pens. Et en Auil quand l'axté approche, il produict tiges & fleurs. La graine est meure en May & Iuin.

LES NOMS.

Les Naeaux ronds se nomment en Grec γογγύλου καὶ γογγύλιδις: en Latin *Rapa*: en haut Ale man *Rußen*: en bas Aleman *Rapen*. LE TEMPERAMENT.

Le Naeau rond est chaud & humide.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Naeau rond prins en viadc, nourrit fort, quand on n'en prend pas par trop, & qu'il est bien A digéré, car ausement, si on en prend en trop grande abondance, ou si on ne digere pas bien ce qu'on a prins, il engendre au corps moult d'humeurs superflues & vétofités, principalement men gé crud, car adonc nuit il aussi à l'estomach & engendre ventolitez, enflures, & douleurs au ventre & intestins.

Iceuy cuit en lait, appaise douleur de goutte appliqué dessus.

Huile rotat cuit dedans vn naeau creulé & ainsi rosty sous les cendres, guerit les mules à ta C lons. A ce vaut aussi la decoction d'iceluy, si on s'en les laue, & pareillement le Naeau cuit appliqué dessus.

Les tendrös de Naeau mengex, prouoquent l'vrine, & profitent à gens trauaille de la gravelle. D

La graine d'iceluy est contraire à tout venin, poustant la met on dans la Theriaque (cest vn me E dicament duquel on vse contre venin & poison) signamment en celle qui est preparée pour appaiser douleurs.

L'huilc d'icelle graine, est aussi de semblable efficace, & pouffe hors les vers engédrez au corps F de l'homme, prinse crue.

Du Nauet, ou Naeau.

Chap. XXXIII.

LES ESPECES.

LE Nauet est maintenant de deux sortes: Domestique & Sauvage.

*Napus horrensifis.*

Nauet domestique.

*Napus glaucifris.*

Nauet sauvage.



## LA FORME.

Le Nauet cultivé a feuilles grandes & larges, bien pres semblables aux feuilles du Naucau rond, plus vnies toutesfois. La tige est ronde, d'envirō vne coudée de haut, sur laquelle croissent fleurs, siliques, & semence, comme au Naucau rond. La racine est fort longue & grosse, au reste semblable au Naucau rond.

Le Nauet sauuaige n'est guere different au dessusdict, sinon que ses feuilles sont plus incisées de puis bas iusques en haut, & la racine n'est pas si longue, mais plus courte, & plus ronde, bien pres semblable à vne poyre sauuaige.

## LE LIEV.

On seme le Nauet abondamment en France, s'ignamment autour de Paris.

Le Sauuaige croist en aucuns pais, le long des riuieres & ruisseaux, & semblables lieux froids.

## LE TEMPS.

Le Nauet fleurit au Printemps, comme le Naucau rond & le Chou.

## LES NOMS.

Le Nauet ou Naucau est appellé en Grec *Βουβίσις*: en Latin *Napi*: en haut Aleman *Stechrüben*: en Brabant *Stechrapen*, & Parisienne *Rapen*.

Le Nauet cultivé est appellé *Stapus satiuus*, & en haut Aleman *Teuchen Stechrüben*, c'est à dire Nauet sec.

Le sauuaige se nomme *Napus sylvestris*: & en haut Aleman *Dassylstechrüben*, c'est à dire Nauet huide.

## LE TEMPERAMENT.

Le Nauet, tesmoing Galien, est de semblable temperament que le Naucau rond.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Le Nauet prins en viande, nourrit moins que le Naucau rond, au reste il luy ressemble en facultez & vertus.

B La graine d'iceluy est aussi fort bonne contre venin, & on la met parcelllement es Antidotes.

## Des Raiponces.

## Chap. XXXV.

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Raiponces, Grande & Petite.

*Rapum sylvestre minus.* Petite Raiponce.

*Rapum sylvestre maius.* Grande Raiponce.





1 La petite & vulgaire Raiponce a au commencement de petites fleurs rondatres, bien pres semblables aux feuilles de Violette de Mars, & puis la tige ronde, dure, d'environ deux pieds de haut, reueſte de longues feuilles eſtroictes. Au ſommet des tiges croiſſent de belles fleurs, fort ſemblables à celles de l'Herbe aux cloches ſauuage (laquelle nous auons deſcrite au ſecond liure Chap. XXIII.) apres icelles viennent auſſi longues ſiliques anguleuſes, de dans leſquelles la graine eſt en cloſe, fort petite. La racine eſt longue, aucunes fois de la groſſeur d'un petit doigt, blanche, ayant bien pres le gouſt de NauEAU rond, laquelle on menſe ſur l'yuer en ſalades.

2 La grande Raiponce, qui n'eſt guere encore cognee, a au commencement les feuilles larges, & puis apres eſtroictes ſur la tige: elle a vne tige ou deux droictes, creuſes, ſur leſquelles croiſt vn beau gros eſpi, plein de petites fleurs longues, qui auant qu'elles ſ'ouurent, ſemblent de petites cornes courbes, & eſtans ouuertes, ſont parties en quatre petites feuilles eſtroictes, de couleur bleue, perſe, griſe, ou blanche. Les fleurs tombées, y ſuruiēt pluſieurs ſiliques rondes, ioignans l'vne l'autre, ſemblables aux ſiliques ou calyces de la Raiponce, plus petites toutes fois. La racine eſt groſſe, blanche, ſucculente, de figure & gouſt fort ſemblable à la racine de Raiponce.

## LE LIEV.

1 La petite Raiponce croiſt en ce pais le long des champs, ſous les hayes & buiſſons.

2 La grande Raiponce croiſt le plus ſouuent es boys, en terre argilleuſe, & autres lieux gras, humides, & obſcurs.

## LE TEMPS.

1 La petite Raiponce fleurit en Iuin & Iuillet,

2 La grande Raiponce fleurit en May.

## LES NOMS.

1 La Raiponce ſe nomme en Grec γαργύλι ἀγρία: en Latin *Rapa ſylueſtris*, c'eſt à dire NauEAU ſauuage.

2 La premiere eſpece eſt appellée des Modernes *Rapontium*, *Rapunculum* & *Rapunculum paruum*: en François Raiponce & petite Raiponce: en haut Aleman hlein *Rapuntzeſt*: en bas Aleman cſepne ou *gſemeyne* Raiponceſen.

3 La ſeconde eſpece eſt auſſi vne forte de Raiponce, pourtant l'appelle on grande Raiponce: en haut Aleman groſs *Rapuntzeſt*: en bas Aleman groote *Rapontzeſen*, c'eſt à dire en Latin *Rapunculum maius*. C'eſt ſans doute ἀλωπεκωρα, *Alopecuros*, & *Cauda vulpina* deſcrite par Theophraste,

## LE TEMPERAMENT.

1 La Raiponce a le temperament aucunement ſemblable au NauEAU.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La Raiponce menſée avec vinaigre & ſel, faiēt bon appetit, & prouoque l'vrine, ſignamment A quand elle a eſté au parauant vn peu boullie.

2 La Raiponce meſſée avec farine de Lupins ou d'Yuraye, nettoye & embellit la face & tout le B corps, induiēt deſſus.

3 Le ius des tiges & feuilles d'icelle, ſignamment de la petite, diſtillé aux yeux avec laiēt de fem- C me, eſclarcit la veuē.

## Du Raifort.

## Chap. XXXVI.

## LES ESPECES.

1 Ily a deux fortes de Raifort, Cultiuē & Sauuage, dōd le Cultiuē eſt auſſi de deux fortes: l'vn à racine ronde comme le Nauet, lequel ne ſe trouue guere en Brabant: & l'autre à racine fort longue, lequel eſt fort commun en ce pais. LA FORME.

2 Le Raifort cultiuē, c'eſt à dire le commun, a les feuilles grandes, larges, rudes, fort fendues à chiſque coſté, non guere differentes aux feuilles de NauEAU rond. Les tiges rondes, ſur leſquelles croiſſent moult de fleurs perſatres, chacune partie en quatre feuillettes, leſquelles tombées, viennent en leur lieu de ſiliques rondes, dans leſquelles eſt contenue vne graine ronde & brunatre. La racine de l'vn eſt longue de pied, ou pied & demy, blanche par dehors & par dedans, de gouſt acre. La racine de l'autre eſt courte, & groſſe comme vn Nauet, & de gouſt plus fort & plus acre que le long.

3 Le Raifort ſauuage a les feuilles ſemblables au Raifort cultiuē, plus petites toutes fois, & plus decouppées. La tige eſt d'environ vn pied de haut, ou dauantage, ſur laquelle croiſſent pluſieurs fleurs ſauines, & puis apres de petites ſiliques, dans leſquelles la graine eſt en cloſe bien petite. La racine eſt d'environ la groſſeur d'un doigt, de gouſt aſſez ſemblable à vn Raifort nouueau, voire auſſi plus forte.

*Radicula sativa.*  
Raifort domestique.



*Radicula sylvestris.*  
Raifort sauvage.



#### LE LIEV.

On sème le Raifort cultivé es jardins, & le fait tous les ans ressemer de nouveau.  
Le Raifort sauvage croist le long des fossés & des eaux croupies & courantes.

#### LE TEMPS.

On sème le plus souvent le Raifort cultivé en Juin & Juillet, & c'estuy là est en saison de manger en user, & fleurit seulement en Avril ou en May car celui qu'on sème en Mars, fleurit le mesme an en May ou Juin, & avec ce ne vaut rien à manger.

Le sauvage fleurit en Juin, & bien tost apres il liete la semence.

#### LES NOMS.

La premiere espece est appelée en Grec des Atheniens & autres Anciens *ραφανίς* ou *ραφανίς* ou *ραφανίς* en Latin *Radicula*, & *Radicula sativa*: d'aucuns *Raphanus*: es Boutiques *Raphanus minor*: en François Raifort: en haut Aleman *Krettisch*: en bas Aleman *Radljo*.

La seconde espece est appelée *ραφανίς* ou *ραφανίς*: en Latin *Radicula sylvestris*: d'aucuns *Radicula perulifolia*: en François Refort sauvage, ou Raifort d'eau: en haut Aleman *wilder Krettisch*: en bas Aleman *wilder Radljo* & *water Radljo*.

#### LE TEMPERAMENT.

Le Raifort cultivé est chaud au tiers degré, & sec jusques au second.

Le Raifort sauvage est plus fort & plus acre que le Cultivé.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A** On mange maintenant la Racine du Raifort cultivé avec autres viandes comme on faisoit du temps passé, elle est toutesfois plustost medecine que viande & nourriture, tesmoing Galien: car elle ne donne point ou bien peu de nourriture au corps, veu qu'elle est acre & piquante à la ligue.
- B** On peut aussi, selon ledit Galien, manger avec huile & vinaigre les nouveaux bourgeons du Raifort, ayans au paravant esté boullis, & nourrissent plus que la racine, combié qu'à la verité ilz ne donnent guere de nourriture.

# Du grand Raifort. Chap. XXXVII. Li. 5. 415

La racine de Raifort, selon Dioscoride, est saoureuse à la bouche, mais contraire à l'estomach: car elle engendre ventositèz, & appetit de vomir.

Icelle mengée deuant le repas l'oublieue la viande, & mengée apres le repas la fait abaisser. Il est bon de la manger auant le repas pour vomir, signamment l'escorce d'icelle, laquelle prin e se avec oxymel a plus grande efficace de faire vomir, & purge le phlegme visqueux, sans ce qu'elle aguise l'esprit & entendement.

La decoction de Raifort beut, prouoque l'vrine, & rompt la pierre, la faisant sortir. La mesme meurit les phlegmes visqueux dont l'estomach est chargé, & les fait cracher: outre ce elle prouitte contre toux enuieille, & chargement du thorax.

Le Raifort est vtile aux hydropiques, aux hepaticques, & à ceux qui ont douleur ou oppilation de reins. Et mengé avec vinaigre & moustarde, prouitte aux lethargiques.

Il est bon aussi à ceux qui se trouuent mal d'auoir mangé des Champignons, ou Jusquiame, ou autre venin, & à ceux qui ont tréchéés de vètre, & la Colique, tesmoing Platonius & Praxagoras.

Il resuaille aussi le flux mensrual des femmes, & selon que dit Pline, fait auoir abondance de lait. La racine broyée menu avec vinaigre, guent duresses de ratelle, appliquée dessus.

Icelle avec miel, arreste vlcères rongeurs & ambulatifz, guent la tigne, & remplit les places des nuées de poil.

Icelle avec farine d'Yrnye, efface meurtrissures, taches, cicatrices & lentilles du visage. La graine d'iceluy fait puissamment vomir, & prouoque l'vrine, & beué avec miel & vinaigre, tue & pouffe hors du corps les vers.

Icelle prinse avec vinaigre, diminue la ratelle, & refout la duresses d'icelle. D'elle cuicte en oxymel on fait gargarisme vtile contre la Squinancie.

Le Raifort sauage ressemble en vertus & operations au Raifort cultivé, mais il est totalement plus fort, & singulier pour faire vriner.

## Du grand Raifort.

### LA FORME.

Le grand Raifort a grandes feuilles & larges, etrans aux feuilles du grand Laphathum appelé Patience, plus grandes toutesfois & plus rudes. Les tiges sont tendres, courtes, & gressles, au sommet desquelles croissent petites fleurs blâches, & puis apres petites siliques, dans lesquelles la racine est cōtenue. La racine est longue & grosse, de goust fort acre, & mordant à la langue: Pourtant la pile on bien menu, pour la manger avec viandes, principalement avec poisson au lieu de moustarde.

### LE LIEU.

On le trouue pour la plus part planté es iardins, & là ou vnefois il est planté, ja demeure il par lôgues années sans perir.

### LE TEMPS.

Le grand Raifort fort en Auri, & fleurit en Iuin.

### LES NOMS.

Ceste herbe est appelée des Modernes *Raphanus magnus*, & *Raphanus montanus*: en François grand Raifort & Raphanus: en haut Aleman *Werrtsich*, & *Kren*: en Brabant pour la plus part *Raphanus*, d'aucuns aussi *Werrtsich*. Aucuns sçauans Modernes la tiennent pour le *βράσικον*, *Raphanus* des plus anciens Atheniens, lequel on dict auoir inimitié avec la Vigne, mais ce n'est pas le *βράσικον* de Theophraste, ou des autres Grecs leurs successeurs, lesquels tiennent pour *Raphanus*, le *Brasica* des Romains, qui est nostre Chou vulgaire. Aucuns autres cuydēt que ce soit le *Thlaspi* de Crateuas, mais leur opinion n'est guere vraysemblable.

## Chap. XXXVII.

*Raphanus magnus.*

Grand Raifort.



## LE TEMPERAMENT.

Le grand Raifort est chaud & sec infques bien pres au tiers degre, signamment la racine, dans laquelle est la principale vertu.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La racine du grand Raifort ressemble grandement en vertus aux autres Raifors, elle est toutefois plus chaude & plus forte, mais non si tresfort troublant l'estomach.
- B D'icelle pilée bien menu on s'en peut seruir au lieu de moustarde, ou d'autre fausse en mençoit du poisson: car ainsi prise elle eschauffe l'estomach, fait bon appetit, & digere le poisson.
- C On a aussi trouué par experience que le grand Raifort empêche la Vigne de croistre, & la fait perir planté aupres d'icelle, ce que les Grecs plus modernes ecriuent de Brasica.

## De la Pastenade. Chap. XXXVIII.

## LES ESPECES.

IL y a trois sortes de Pastenade, Jaune, Rouge, lesquelles deux sont domestiques & cultiuees: & la Sauvage, laquelle croist d'elle mesme.

Staphilium luteum. Pastenade iaulne.



Staphilium niger Pastenade rouge.



## LA FORME.

La Pastenade iaulne a les fueilles noirattes, fort decouppées, bien pres semblables aux fueilles de Cherueil, mais beaucoup plus brunes, plus grandes, & plus menu dechiquetées. Les tiges sont rondes, vn peu velues par dehors, & creules par dedans: sur lesquelles croissent de grandes esmochettes, portans la fleur blanche, puis apres la graine houlfue, no guere differente en figure à la graine d'Anis. La racine est grosse, longue, iaulne au dehors, & au dedans on la menge en viandes.

La Pastenade rouge ressemble à la deuant dicté de fueilles de chiquetées, tiges, fleurs & semences. La racine est ausi longue & grosse, mais purpurée en rouge par dedans & par dehors.

La Pastenade sauuage n'est guere differente aux domestiques, de fueilles, tiges, & fleurs, sinon que les fueilles sont vn peu plus houlfues, & moins dechiquetées, ou parties. Et au milieu de l'estomach.

mouchette, entre les fleurs blanches, y en croist vne ou deux purpurées. La graine est ausi pl<sup>e</sup> houlvue & la racine plus petite & plus dure.

## LE LIEU.

La Pastenade domestique on la seme és iardins. La Sauvage croist aux bors des champs, le long des chemins, & en lieux rudes & incultuez.

## LE TEMPS.

La Pastenade fleurit en Juin & Juillet: en Aouft est leur graine meure.

## LES NOMS.

Les Pastenades se nomment en Grec *σαφύλιου*: en Latin *Pastinaca*.

La premiere espece est appellée *σαφύλιον* & *Pastinaca sativa* des Modernes *Staphilinus lasurus*: en haut Aleman *zam Pastiney*, *sā Pastinacsen* & *geef Kusen*: en François *Pastenade iaulne*: en bas Aleman *geef Peen*, *Pooten*, & *Geef wostelen*.

La seconde espece est ausi *Staphilinus sativus*, & est appellée *Staphilinus niger*: en François *Pastenade rouge*: en haut Aleman *tot Pastiney*: en bas Aleman *Laroten*.

Et ces deux Pastenades domestiques semblent ausi si à voir le *δαύκον*, *Daucus* décrit par Theophraste au li. 9. cha. 15. & que Galien au sixieme des Simples appele *δαύκον* & *σαφύλιον*, c'est à dire *Daucus Pastinaca*.

L'espece sauvage s'appelle en Grec *σαφύλιον* & *ἀγριον*: en Latin *Pastinaca sylvestris*: és Boutiques *Daucus*, cōme nous auons dict au Secōd liure, d'aucuns ausi *Pastinaca rustica*, *Carota*, *Babyron*, & *Sicha*: en François *Pastenade sauvage*: en haut Aleman *wild Peestnach*, ou *wild Peestney*, & *wog chrest*: en bas Aleman *wogefo nest*, & *Leosthenes crupt*.

## LE TEMPERAMENT.

La racine des Pastenades est temperée en chaleur & secheresse. La graine d'icelles, & signamment de la Sauvage, est chaude & seche au second de gré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de Pastenade mengée en viandes, nourrit asses bien, & attendu que'elle est quelque peu aromatique, elle eschauffe ausi les parties interieures, quand on en mange avec discretiō: car mengée par trop souuent ou en trop grande quantité, elle engendre mauuais sang.

La racine des Pastenades, signamment celle de la Sauvage, prinse en quelque sorte que ce soit, prouoque l'vrine, & incite au ieu d'amours. Pourtant dict Orpheus, que ceste racine à vertu de layre aymer.

La racine de Pastenade sauvage reduicte en poudre, & beuë avec hydromel, ouure les oppilations du foye, & de la ratelle, des roignons & reins, & prouffite contre la iaulnisse & grauelle.

La graine de Pastenade sauvage esmeut les fleurs menstrualles, & est grandement prouffitabile contre suffocations ou estouffemens d'amarry, beuë en vin, ou appliquée par dessous en forme de pessaire.

Elle fait vriner & ietter la grauelle, & est fort vile à ceux qui ont difficulté d'vrine, aux hydropiques, & qui ont douleur de costé, de ventre & de reins.

Elle est contraire à tout venin, & est bonne contrē picqures & morsures de toutes bestes venimeuses.

On trouue ausi par escrit, que les femmes qei en vnt souuent, viennent fertiles.

Les feuilles de Pastenade broyées avec miel, & appliquées, nettoient vlcères immundes & Hrongeans.

La graine de la Domestique est de pareille vertu que la sauvage, mais nō du tout si forte: Mais la racine de la Domestique est meilleure & plus conuenable à menger.



## LES ESPECES.

IL y a deux fortes de Cheruys, Cultivé & Sauvage.

*Pastinaca vulgaris* Grand Cheruy cultivé,

*Elaphoboscum*.

Cheruy sauvage.



## LA FORME.

Le grand Cheruy cultivé, a les feuilles grandes, longues, de plusieurs feuilles assemblées sur vne queue, cōme celles de Gauguier ou Fresse, dont chacune à part soy est large, & croisetout à pentour. La tige croist aucunesfois à la hauteur d'un home, ayant mout de ioinctures & genoux, commela tige du Fenoil, au sommet de laquelle croissent esmochettes produisant fleurs jaunes, & puis apres la semence large, comme la graine d'Aneth ou plus grāde. La racine est grosse & longue, de saveur douce & fort convenable à manger.

Le Cheruy sauvage ressemble fort au Cultivé de feuilles, fleurs & graine, sinon que ses feuilles sont vn peu moindres, & les tiges aussi vn peu plus gresles, & la racine plus dure, plus petite, & nō tant propre à manger.

## LE LIEU.

On seme es jardins le Cultivé.

Le Sauvage croist en ce pais pres des voyes & lieux mal cultivéz.

## LE TEMPS.

Les Cheruys florissent en Juin & Juillet; mais en hyuer avant qu'ilz nyent fleury, sont les Cultivéz meilleurs & plus convenables à manger. LES NOMS.

Le premier est appellé es Boutiques de ce pais *Pastinaca*, & là selon en bas Aleman *Pastinachen*; en François grand Cheruy; en haut Aleman *Wortzen*, & *zam Wortzen*, & là selō aussi en bas Aleman; *fantzen Wortzen*. Aucuns le tiennent pour *σισανου*, *sisanum*, les autres pour vne espede de *staphylis* *mas* & *Pastinaca*. Et de fait il semble que ce soit le *σαφνλι*, c'est à dire *Pastinaca*, de Galien au 8. des Simples.

Le sauvage est appellé en aucunes Boutiques *Branca vrsina*, ou *Bonica*; en François Cheruy sauvage; en haut Aleman *wilda Wortzen*; en bas Aleman *wilde Wortzen*. Il est appellé en Grec *λαφιβοσκου* & d'aucuns, tesmoing Dioscoride *λαφικου*, *λεφριου*, *εφριου*, *εφικου*, *εφικου*, *εφικου*; en Latin *Elaphoboscum*, & *Cerui ocellus*.

LE TEMPERAMENT.

Le Cheruy est chaud & sec, signamment la graine, laquelle est plus chaude & plus seche que la racine.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La racine du grand Cheruy cultiué mengée en viandes comme la Pastenade, donne plus grande & meilleure nourriture que la Pastenade, & prouffite aux poulmôs, aux reins, & à la poictrine.

Elle fait aussi pîsser, appaise douleurs de colté, chasse les ventosités du ventre, & est bonne à gens soullez & rompus.

2 La graine du Cheruy sauuage est vtile contre tout venin, & guerit morsures & piqures de tous serpens & bestes venimeuses, beué en vin. Et de fait elle a en cela si grande vertu que lon trouue par escrit, que aux Cerfs ayans mengé ceste herbe nulle beste venimeuse ne peut nuire, ne endommager.

Du petit Cheruy cultiué.

LA FORME.

LE petit Cheruy a les tiges rondes, & les feuilles crenées tout à l'entour, plusieurs assises sur vne queue, non guere differétes aux feuilles du grand Cheruy, beaucoup toutesfois plus petites & plus nués. Les fleurs croissent par esmouchettes & sont blanches, apres lesquelles vient vne graine large. Les racines sont blanches, & longues d'environ vn doigt, plusieurs ensemble, de goust doux & saouureuses à manger.

LE LIEV.

On plante ces racines és jardins.

LE TEMPS.

En Mars on les tire hors de terre & on les menge, & puis les plus petites d'icelles on les replante, lesquelles sont bonnes l'année ensuyuante & en saison de manger. Mais quand on les laisse en terre sans replanter, elles fleurissent & sont en graine en iuliet & Aoult.

LES NOMS.

Ceste racine se nomme en Grec *σισάριον*; en Latin *Sisif* & *Sisarum*; & là selon d'aucuns est appelée *Sersillum*, *Sersilla*, ou *Cherrille*; en François petit Cheruy; en haut Aleman *Gertlin*, *Gierlin*, & d'aucuns *Sam Rapuntzet*; en bas Aleman *Suycher wort* *cherno* & *Serillen*.

LE TEMPERAMENT.

Les Escheruys sont chauds & secs iusques au tiers degré.

LES VERTVS ET OPÉRA.

A La racine de Sisaron cuycte est vtile à l'estomach, réueille l'appetit & fait vriner.

B Le jus de la racine beu avec lait de cheure, arreste le flux de ventre.

C Iceluy beu avec vin, chasse les ventositéz, & trenchées de ventre, & guerit le hoquet.

Chap. XL.

*Sisarum.* Petit Cheruy cultiué.



Du Persil de iardin.

Chap. XLI.

LA FORME.

LE Persil de iardin a les feuilles verdes, crenelées, & en plusieurs parties decouppées, crenées tout à l'entour comme vne sie. Les tiges sont rondes, sur lesquelles croissent petites esmouchettes, produisans fleurs palles en iaulne, & puis apres vne graine petite & ronde de goust acre, & de bonne odeur. La racine est blanche & longue comme la racine du Fenoi, mais beaucoup moindre.

LE LIEV.

Le Persil se seme és jardins à la porée, & ayme terre grasse & fertile.

## LE TEMPS.

Le Perfil vulgaire fleurit en Iuin, & la semence est meure en Iuliet, vn an apres qu'il a ellé semé.

## LES NOMS.

Le Perfil vulgaire est appelé en Grec σάλευρον & σαλευρον καρταϊον; en Latin Apium & Apium hortense; és Boutiques Perroselinum: & la selon en Aleman Peterzilgen, ou Peterlin; en bas Aleman Petersefle; en François Perfil, ou Perfil de iardin.

## LE TEMPERAMENT.

Le Perfil de iardin est chaud au second degré, & sec iusques au tiers, signammet la graine, lequel le eschauffe & seche plus fort que les fueilles ou la racine. LES VERTUS ET OPER.

- A** Le Perfil de iardin prins avec autres viades, est fort vtile & cōuenable à l'estomach, il fait faire digestion, donne bon appetit, & prouoque l'vrine.
- B** La decoction de la racine d'iceluy beuë, ouure les oppilations du foye, des rongnons, & de toutes les parties inteneures, elle fait vriner, & sortir la pierre & grauelle: & est contraire à tout venin.
- C** A ce mesme vaut ausi mout la graine d'iceluy, & est de plus grande efficace que la racine: car elle n'ouure pas seulement les oppilations, & est contraire à venin, mais refout ausi les ventosités & inflations Pourtāt la mesle on parmy les Antidotes.
- D** Elle est ausi singuliere contre la toux, mise dās tous Electuaires à ce conuenables.
- E** Les fueilles de ce Perfil broyées avec pain, guerissent enflures, & rougeur des yeux, & les maimel les exulcerées plaines de lait grumelé.



Eloselinon.

Ache.

## De l'Ache. Chap. XLII.

## LA FORME.

**A**che a les fueilles luisantes, de couleur verte obscure, fort diuisées & crenées à l'entour; beaucoup plus grides & plus grosses que les fueilles du Perfil vulgaire. Les tiges sont rondes, fort branches, sur lesquelles croissent esmouchettes produisins fleur blanche, & puis apres vne graine fort petite, semblable à la graine du Perfil vulgaire, mais plus petite. La racine est fort fibreuse.

## LE LIEV.

L'Ache croist de soy mesme en aucunes basieres humides. Et on la plēte beaucoup aux iardins.

## LE TEMPS.

L'Ache fleurit en Iuin, & liure sa graine en Iuliet & Aoust, vn an apres qu'elle est semée, cōme le Perfil de iardin. LES NOMS.

L'Ache est appelée en Grec ὑδρόσάλευρον; en Latin Apium pastre, & Pastapium, c'est à dire Perfil de marex; d'aucuns ὑδρόσάλευρον ἄγριον, Hydroselinon agrion, & Apium rusticum: és Boutiques Apium: en haut Aleman Epffiesch; en bas Aleman Joffroum merck; & d'aucuns suyués les Apothicaires Eppe.

## LE TEMPERAMENT.

L'Ache est chaude & seche cōme le Perfil de iardin.

LES





LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine & les racines de l'Ache ressemblent fort en faculté à la semence & racines du Persil A de iardin, selon Dioscoride.

Le jus d'Ache, mondifié & nettoyé les vicereis malings, signamment de la bouche & du gozier, B meslé avec autre matiere à ce conuenable.

L'Ache est aussi fort bonne, tesmoing Pline, contre le venin des Araignes. C

Du Persil de montaigne. Chap. XLIII.

LA FORME.

Sous les especes de Persil a esté descrite des Anciens vñ Persil, lequel ils appellent Persil de mon- taigne. Et (combien qu'il soit incognu) nous l'auons bien voulu icy descrite; à fin que men n'y manquaist de ce qui appartient aux especes de Persil, & aussi que nous. esperons, que ce Persil se pourra plus facilement trouuer, attendu que nous le baillerons à cognoistre par son nom. Ce Per- sil, tesmoing Dioscoride, a les tiges gresles, tendres, d'environ vne paulme de long, ayans petites branches chargées d'esmouchettes, comme la Cigue, beaucoup toutesfois plus petites, sur lequel les croist vne graine longuette, ressemblant à celle du Commin, menue, fort aromatique & acree à la langue

LE LIEV.

Cette espece de Persil croist en lieux mal cultiuez & pierreux sur montaignes hautes, pour la- quelle cause il a esté appelé Persil de montaigne. LES NOMS.

Ce Persil est appelé en Grec *επιφανωπε*; en Latin *A plum montanum*, cest à dire en François Per- sil de montaigne; en haut Aleman *Struch Epffich*; en bas Aleman *Struch Eppe*.

LE TEMPERAMENT.

Ce Persil est de pareil temperamēt aux autres, beaucoup toutesfois plus fort, desmoing Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine & racine du Persil de montaigne beqes en vin, sont fort vriner, & prouoquent le flux A menstrual aux femmes.

On mesle aussi vilemēt la graine avec les Antidotes; & medecines preparées pour faire pisser, & es B

Du vray Persil. Chap. XLIII. *Petroselinum Macedonicum.* Persil vray.

LA FORME.

CE Persil a les feuilles asses larges, parties en plu- sieurs pieces, lesquelles à chacun costé sont profond incisées & crenées tout à l'entour. Les tiges sont gresles, d'en uirō deux pieds de haut, sur lesquelles croissent petites esmouchettes à fleurs blanches, & puis apres vne graine brunatre, nō guere differen- te à la graine du Persil de iardin, meilleure toutes- fois, d'odeur plus aromatiq, & de goust plus acree. La racine est gresle, & soit hibreuse.

LE LIEV.

Ce Persil vray croist abondamment en Mace- doine, en lieux pierreux, rudes, & mal cultiuez, & pareillemēt en quelques semblables endroits d'A lemagne. Les Herboristes de ce pais le sement en leurs iardins. LE TEMPS.

Ce Persil fleurit en Juillet, & donne sa graine en Aouit.

LES NOMS.

Ce Persil estranger est appelé en Grec *πυρολι- λυμ*, & pour ce qu'il croist abondamment en Mace doine, *πυρολιλυμ μακεδονικον*, *Petroselinō Macedo nicō*. en Latin *Petrapium*, *Apili saxatile*, & *Petroselinū* cest à dire en François Persil de roches; en haut Ale man *stein Epffich*, ou *stein Petritsin*; en bas Alema *stein Eppe*. Il est aussi appelé d'aucuns Apothicai res ignorans *Amouzen*; en Brabant on l'appelle *Biz*; de *Peterfelle*, cest à dire Persil estranger; lequel est sans faute nulle le vray Persil nomé selō le lieu ou il croist plus abondamment, Persil de Mace doine.



## LE TEMPERAMENT.

Ce Persil est chaud & sec iusques pres du tiers de degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La graine de ce Persil esmeut le flux méstrual, prouoque l'vrine, & rompt & pousse hors la pierre & grauelle avec l'vrine.
- B Elle resout toutes vétôstitez, & dône allegeance aux douleurs & trenchées de l'estomach & du petit vétre. Elle est aussi tresutile cõte toutes douleurs froides de colté, des rongnõs, & de la vesse.
- C On la mesle aussi vtilement avec Antidotes, & medecines preparées pour faire passer.

## Du grand Persil, ou grande Ache. Chap. XLV.

## LA FORME.

Hypofoelinon.

Grand Persil.

Le grand Persil a grandes sucilles, larges, brunes, non guere differentes aux sucilles du Persil de jardin, mais beaucoup plus grâdes & plus noires, pres ressemblans aux sucilles d'Angelica. La tige est ronde, de trois ou quatre pieds de haut, au sommet de laquelle il produict rondes esmouchettes à petites fleurs blanches, & puis apres vne graine noire, longue, aromatique, & de goust amer. La racine est blanche, d'assez bonne lögueur, & grosseur.

## LE LIEV.

Ce Persil croist en aucunes regions en lieux bas & ombreux. En ce pais les Herboristes le sement en leurs jardins.

## LE TEMPS.

Ce Persil fleurit en Juillet: & en Aoult est la graine meure.

## LES NOMS.

Ce Persil est appelé en Grec *ἰπποφώλιον*: en Latin *Equapium* & *Olsarrum*, de Theophraste *σμάριον* *Smyrimum*: d'aucuns *ἀγριόριον*, cest à dire *Apium fylactre*: & des Modernes *Petrofoelinum Alexandrinum*: Es Boutiques non sans erreur *Petrofoelinum Macedonicum*, car il n'a nulle similitude avec le Persil de Macedoine: en François grand Persil, ou grande Ache, ou Alexandre: en haut Aleman gross *Eppich*, ou gross *epfisch*: en bas Aleman groote *Eppe*.

## LE TEMPERAMENT.

Ce Persil est de temperament chaud & sec comme les autres.

## LES VERTVS ET OPER.

- A La graine du grand Persil beue à part soy, ou avec hydromel, prouoque le flux méstrual des femmes, resout toutes ventositez, donne allegeance aux douleurs & trenchées de ventre, elle eschauffe les morfondus, & gens trauaillees de froidure & frisson: & proufite à ceux qui ne peuvent passer que goutte à goutte.
- B La racine du grand Persil rompt & pousse hors la pierre, fait vriner, & est vtile contre douleur de reins & de colté.
- C Brief le grand Persil est pareil en vertus au Persil de jardin, & en toutes choses meilleur, & plus conuenable que le Persil vulgaire.

## Du Persil sauuaage.

## Chap. XLVI.

## LA FORME.

Ceste herbe laquelle nous, suyans l'ancien Theophraste, auons appelée Persil ou Ache sauuaage, a les sucilles grandes, fort dechiquetées, fort retirans aux sucilles de la Pastenade de sauuaage, mais beaucoup plus grandes. Les tiges sont rondes, creuses, de quatre ou cinq pieds de long, brunes en rouge par bas apres de la terre, au sommet desquelles croissent rondes esmouchettes à fleurs blanches, apres lesquelles paroist la greine platte, houlsee, non guere differente à la graine d'Aneth, mais plus grande. La racine est partie en deux ou trois longues racines, lesquelles peu souuent croissent en bas, mais pour la plus part festendent de trauers çà & là, & sont chaudes & brullantes à la langue. Toute l'herbe entiere tant tiges que sucilles, est pleine de ius blanc comme les Tithymales, lequel en fort quand elle est entamée.

# De la Berle. Cha. XLVII.

## LE LIEU.

Cette herbesse trouue en ce pais en lieux humi des, au tour des estangs, & le long des fosses, toutesfois elle ne se trouue guere.

## LE TEMPS.

Le Persil sauuage fleurit en Iuin, & la semence en est meure en Iuillet. **LES NOMS.**

Cette herbe s'appelle en Grec  $\sigma\lambda\iota\sigma\upsilon\sigma\upsilon\alpha\iota\sigma$ , &  $\omega\delta\theta\omicron\upsilon\lambda\iota\sigma\upsilon\sigma\upsilon\alpha\iota\sigma$  en Latin *Apium silvestre*, c'est à dire en François Persil ou Ache sauuage: en haut Aleman *wilder Eppich* ou *Eppich*: en bas Alemā *wilde Eppē*. D'iceluy fait mention Theophraste au Liure 7. chap. IIII. disant que le Persil sauuage a les tiges rouges. Et Dioscoride au tiers liure chap. 67. En aucunes Boutiques de ce pais on Pappelle *Meum*: & visent des racines de ce Persil, au lieu des racines de *Meum*, non sans erreur manifeste. **LE TEMPERAMENT.**

Le Persil sauuage, & signamment la racine d'iceluy, est chaud & sec iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPER.

A La racine de ce Persil sauuage tenue en la bouche, & machée, appaise douleur de den: & tire abondance d'humours du cerueau.

*Apium silvestre.*

Persil sauuage.



*Laser minus.*

Petite Berle.

# De la Berle. Chap. XLVII.

*Laser Crassus.* Grande Berle.



## LES ESPECES.

ON trouue en ce pais deux especes de ceste herbe, vne Grande, & vne Petite, lesquelles different seulement en figure, pour la diuersité des lieux ou elles croissent, car l'une se transforme en l'autre, quand elle est transplantée d'un lieu à l'autre. C'est à sçauoir, celle qui croist du tout en l'eau, deuiant petite plantée sur terre, & au contraire, celle qui croist sur terre deuiant grande, plantée en l'eau, tellement qu'à la verité ces deux herbes ne sont qu'une ce qui n'aduient seulement à ceste herbe, mais aussi à plusieurs autres qui croissent en l'eau, ou près humides.

## LA FORME.

La grand' Berle a les tiges rondes, creuses, fragiles, vnies: & longues feuilles composées de plusieurs feuilletes situées à l'opposite l'une de l'autre, & estédues comme ailes, dont chacune à part est vnue, nue, & crenée à l'entour comme vne fic. Au sommet des tiges y croist des esmouchettes à fleurs blanches. La racine est fibreuse, & iette à costé plusieurs reinsaux. Toute l'herbe est de plus forte odeur & plus plaisante qu'aucune espece de Persil ou Ache, & a bien pres telle senteur que Petroleum, escachée entre les mains.

La petite Berle ressemble à la susdicte en odeur, ses tiges sont aussi creuses, mais plus petites. Les feuilles ne ressemblent pas à celles de la grande, mais retiennent plus aux feuilles de Cerueil, cōson qu'elles sont plus tendres, & plus dechiquetées. Les fleuriettes sont blanches, & croissent par petites esmouchettes, fort serrées & bien pres amassées. La racine est fibreuse, & iette aussi de soy plusieurs reinsaux, lesquels se tendent par la terre, & se fichent.

## LE LIEU.

La grand' Berle croist es fosses & estangs.

La petite croist en prés mouillez, bas & humides, guere loing des estangs, nō toutefois dedans.

## LE TEMPS.

La Berle fleurit en Iuin & Juillet.

## LES NOMS.

Ceste herbe semble vne espece de celle qu'on appelle en Grec *σάπις*: en Latin *Laur* & *Sium*, & signamment celui qui est décrit par Crateus, pourtant se peut il bien nommer *Sium Crateus*, & *Laur Crateus*, en François Berle: en haut Alemà *Wasser Espieth*: en bas Alemà *Water Epp*, cest à dire Persil ou Ache d'eau.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

Sans doute ceste herbe est de complexiō chaude & seche, & de pareille efficace q̄ l'autre Sium.

## De Smyrnion.

## Chap. XLVIII.

## LA FORME.

Ceste herbe tesmoing Dioscoride a les tiges comme l'Ache, & les feuilles fortes, penchantes en bas, d'odeur aromatique & plaisante avec quelque acrimonie, de couleur tirant sur le iulne, plus grandes & plus charnues que les feuilles d'Ache: au sommet des tiges croissent petites esmouchettes comme à l'Aneth, ayans les fleurs iulnes, & puis apres vne petite graine noire, comme la graine de Choux, acre & amere en saueur comme la Myrrhe. La racine est de bonne longueur, douce, pleine de ius, odoriferante, de goust acre, noire par dehors, & verte ou blanche par dedes.

## LE LIEU.

Smyrnium, se dit Dioscoride, croist en Cilicie sur le mont Amanus, & terre pierreuse, rude & seche. Maintenant aucuns diligens Herboristes d'Italie le sement en leurs iardins.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *σάμιον*: en Latin *Smyrnium*: en Cilicie aussi *Petroselin*, & d'aucuns tesmoing Galien *Hippocelin* agrete.

## LE TEMPERAMENT.

Smyrnion est chaud & sec iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les feuilles & racine de Smyrnion appaisent la toux enuieillie, & difficulté d'aleyne, elles referent le vêtre, & sont fort viles contre morsures & piqures de bestes venimeuses, & contre difficulté d'vrine. Les feuilles de Smyrnion induictes, dissoluent nouueaux edemes, phlegmons & durellés, elles sechent les vlcères & exulcerations, & referment les playes.
- C La graine est bonne contre maladies & oppilations de la ratelle, des rognons, & de la vessie, elle esmeut le flux menstruel, & pousse hors la secondine.
- D Elle vaut contre la sciaticque, c'est douleur de hance, beué avec vin.
- E Elle fait cesser les ventosités & enflures de l'estomach, prise en mesme sorte que dessus.
- F Elle prouoque aussi la sueur, & ayde grandement aux hydropiques, & contre le retour des fleurs de l'aisantes par interualles.

## LA FORME.

**C**aulicis est vne herbe velue, & quelque peu hoüffue, non guere differete à la Pastenade sauuage. Les fucilles sont pres semblables aux fucilles de Coriandre, plus dechiquetées toutefois. Au sommet des brâches y croist des esmouchettes rondes à fleurs blanches qui ont les plus grandes fucilles au dehors. La graine est longue & hoüffue comme la graine de la Pastenade sauuage, plus grande que la graine de Comyn. **LE LIEV.**

Ceste herbe se trouue en ce pais le long de la Meuze és champs. **LE TEMPS.**

Elle fleurit en Iuin, & peu de temps apres en est la graine meure. **LES NOMS.**

Ceste herbe se nomme en Grec *καυλικός*, & aussi en Latin *Caulicis*, d'aucuns *Sauis*, & c'est à dire *Daucus foliostri*: incognue és Boutiques. **LE TEMPERAMENT.**

Caulicis est chaude & seche

## LES VERTVS ET OPER.

- A** Caulicis fait vriner cōme le Daucus, auquel Caulicis ressemble fort quant aux facultez, telmoing Galien.

## De Cerfueil. Chap. L.

## LA FORME.

**C**erfueil a les fucilles grisâtres, tendres, & fort dechiquetées, vn peu velues & d'odeur plaisante. Les tiges sont rondes, gresles & creuses, sur lesquelles croissent de rondes esmouchettes à fleurs blâches, & puis apres vne graine aigue longue & brune. La racine est blanche & petite.

## LE LIEV.

Le Cerfueil est commun en ce pais, & on le seme par tous les iardins à la porée.

## LE TEMPS.

- B** Le Cerfueil qu'on seme en Mars ou Aueil, fleurit de fort bonne heure & liure sa graine en Iuin ou Iuillet: Mais celuy qu'on seme en Aoult, dure tout l'huyler & ne fleurit pas deuit le moys d'Aueil.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée de Cohumella *Cherophyllum*, & *Cherophyllis*: des Modemes & Apothicaires *Cerfolium*: en François Cerfueil: en haut Aleman *Kerfstrant*, ou *Kerfstrant*: en bas Aleman *Keruel*. **LE TEMPERAMENT.**

Ceste herbe est chaude & seche de complexion.

## LES VERTVS ET OPER.

- A** Le Cerfueil mengé avec autres viâdes, est profitable à l'estomach, donne bonne saueur aux viâdes, & réueille l'appetit.
- B** Il est aussi fort bō à ceux qui ont difficulté d'vriner, cuiēt en vin: le vin beu, & l'herbe boullie appliquée sur la vessie.
- C** Il ayde grandement à gens amortis & enuieillis, car il les resioit & renforce.

De Gin-



Cerfolium, Cerfueil.



## LA FORME.

**G**ingidium ressemble de feuilles, fleurs, tiges & noullées, & figure à la Pastenade sauvage, sinõ que ses feuilles sont plus tẽdres, & plus dru, & me nu dechiquetees, & les tiges plus gressles, & plus vnies, & toute l'herbe n'est pas houffue ou velue, comme la Pastenade sauvage, mais vnie & nuẽ, de goust amer. Les fleurs blanches croissent par esmouchettes, cõse à la Pastenade sauvage. Apres icelles vient la graine, laquelle estant meure, les queues avec les esmouchettes deuiennent dures du tout, comme petis bastons, & avec icelles curent leurs dens les Italiens & Espagnolz. La racine est blanche & amere.

## LE LIEV.

Ceste herbe prouient d'elle mesme en Espagne: & selon le tesmoignage de Dioscoride en Syrie & Cilicie. On ne la trouue pas en ce pais sinon chez quelques Herboristes.

## LE TEMPS.

Ceste herbe fleurit en ce pais en Aoust, & liure fa semence en Septembre.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appellée en Grec *γινγίδιον*: en Latin *Gingidium*: en Syrie *Lepidion*: d'aucuns aussi, tesmoing Dioscoride, signamment des Romains *Bisacram*: parquoy elle est encores pour le iour d'huy appellée en Espagne *Vifnaga*: incogneẽ & Boutiques tant d'Alcmaigne que de ce pais.

## LE TEMPERAMENT.

Gingidium, tesmoing Galien, n'est pas si trefchoud, mais est sec au second degre.

## LES VERTVS ET OPER.

- A** Gingidium mangẽ crud, ou cuiẽt avec autres viades, est fort bon pour l'estomach, ainsi que dit Dioscoride, pour ce quil le seche & conforte, se dit Pline.
- B** Iceluy cuiẽt en vin & beu, est vtil à la vessie, pro uoẽ l'vrine, & est bon contre la grauelle & pierre.
- C** Les queues dures des esmouchettes sont bonnes pour nettoyer les dens, attendu qu'elles sont dures, & peuuent facilement oster toute ordure des dens sans blesser les genciues: dauantage elles laissent vne bonne saueur en la bouche.

## De l'Aiguille de berger. Chap. LII.

## LA FORME.

**C**este herbe n'est guere differente en grãdeur, tiges, feuilles, & fleurs, au Cersueil, mais elle n'a point l'odeur plaisante. Les tiges sont rondes, & dures. Les feuilles semblables aux feuilles de Cersueil, plus grandes toutesfois plus dechiquetees, & plus brunatres. Les fleurs qui sont blanches, croissent par esmouchettes, apres lesquelles vient vne graine longue, fort semblable à petites eguilles à paquer. La racine est blanche, longue d'un doigt.

Gingidium.

Vifnaga.



Scandix.

Aiguille de berger.



LE LIEV.

On la trouue en ce pais en champs gras & fertiles.

LE TEMPS.

L'Aguille de berger fleurit en May & Iuin, & peu de temps apres elle liure sa semence.

LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *αγιός* ; en Latin *Scandix*, *Herba scaria*, *Aeus pastoris*, ou *Acula*, pour ce que sa graine ressemble à vne aguille, pourtât l'auons nous appelée en François Aguille de berger; & en bas Aleman *Wærdensheruel*.

LE TEMPERAMENT.

*Scandix* est chaude & seche iusques au second degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

*Scandix* mengée, est vtile & conuenable à l'estomach & au ventre, & a esté par cy deuant vne herbe commune entre les Grecs, mais de petite estime & valeur, & tenue seulement pour vne porée sauage. A ceste occasiō a iadis Aristophanes reproché à Euripides que sa mere n'estoit point Venderelle de porée, mais seulement reuen derelle de *Scandix*, témoing Pline.

Icelle cuicte & beuë, ouure les oppilations du foye, des rongnōs, & de la vesie, & profite grandement aux parties nobles.

De la Cicutaire.

LA FORME.

**M**YRRHIS ressemble aucunement de fueilles & tiges à la Cigue: elle a les fueilles grandes, larges, lort dechiquetées, & parties en plusieurs picces, ayans au cunefois de taches blanches. Les tiges sont rondes, de deux ou trois pieds de haut: au sommet desquelles croissent rondes esmouchettes, produifans fleurs blanches, & puis apres vne grande & longue semence. La racine est longue & ronde, non guere differente en saueur à la Pastenade. Toute l'herbe, signamment les premieres fueilles sont reuestues d'un petit poil, & s'ot d'odeur & saueur fort semblables au Cerfueil, pourtjnt est elle appelée des bas Aleman *Wilde Keruel*, c'est à dire Cerfueil sauage.

LE LIEV.

Ceste herbe prouient d'elle mesme en aucūns prés d'Allemagne: En ce pais les Herboristes la semēt en leurs jardins.

LE TEMPS.

La Cicutaire fleurit en May, & la semēce est meuree en Iuin.

LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *μύρρις*, & en Latin *Myrrhis*, d'aucuns ausi *μύρρις*, *Myrrha*; & des Modernes *Cicutaria*, pource quelle ressemble aucunement à la Cigue qui est appelée en Latin *Cicuta*: en François Cicutaire, ou Persil d'asne: en haut Aleman *Wilder Kossel*; en bas Aleman *Wilde Keruel*.

LE TEMPERAMENT.

*Myrrhis*, signammēt la racine, est chaude iusques au second degré, & de parties subtiles.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La racine de *Myrrhis* beut avec du vin, prouoque le flux menstrual, fait sortir l'arrierefais & pensant mort, & purge & nettoye bien les femmes acouchées.

Icelle prinse en mesme forte, fait vriner, & est bonne contre morsures de Phalanges, & sembla bles bestes venimeuses.

Chap. LIII.

Myrrhis.

Cicutaire.



C Icelle cuicte en brouet de chair, nettoye le thorax de phlegmes & immunditez, & est tresvile à gens amaigris & languoureux.

D On dict quil est bon de la boire cuicte en vin, en temps de peste, & que celui qui boyt trois ou quatre fois de ce vin, ne fera point frappé de la peste.

## Des Asperges.

## Chap. LIII.

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes d'Asperges, le Cultivé, & le Sauvage.

Asparagus.

Asperge.

Corrada.

Asperge sauvage.



## LA FORME.

L'Asperge cultivée iette premierement de longs bourgeons vnis, ronds, sans feuilles, d'environ la grosseur d'un doigt, charnus, ayés la poincte mouste, lesquels puis apres s'espendent en plusieurs branches, portans sueillettes comme cheueux. Le fruit croist sur les branches comme rondes bayes verdes au commencement, & puis apres palles en rouge, bien pres de la couleur de Coral, dans icelles est contenue vne graine noire. Les racines sont gresles & longues, & sont entrelasées l'une en l'autre.

L'Asperge sauvage, ressemble fort de nouveaux iettons, & de fruit au cultivé : mais au reste du tout rude & piquant, car au lieu de longs cheueux deliés desquelz le Cultivé est reuestu, il a de petites espines fort menues, dures, courtes & poignantes, dont les branchettes sont garnies.

## LE LIEU.

L'Asperge, signamment le cultivé, croist en Bourgoigne, & aucuns autres endroits comme en Allemagne, en lieux pierreux là ou y a terre argilleuse & grasse. En ce pais les Herboristes le plantent en leurs jardins.

Le Sauvage se trouue en aucuns lieux d'Italie & par tout le Langued'oc.



LE TEMPS.

Les tiges nues sortent en Avril, adonc les cuiët & menge on en forme de salade avec huile, sel, & vinaigre. Le fruit est meur en Aouët.

LES NOMS.

L'Asperge cultivée est appelé en Grec ἀσπράγος: en Latin *Asparagus*, & es Boutiques *Sparagus*: en haut Aleman *Spargeit*: en bas Aleman *Lozacteyt*.

L'Asperge sauvage est appelé en Grec ἀσπράγος πύρραιος, ἢ μάκρονδα: en Latin *Asparagus sylvestris*, & *Corradan*: en Cognu es Boutiques de ce país.

LE TEMPERAMENT.

Les Asperges, signamment les racines, sont tempérées en chaleur & froideur, & participans de quelque sécheresse. LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les nouvelles tiges d'Asperge fourboulies, & mengées avec huile & vinaigre, prouoquent à vriner, & seruent contre difficulté d'vrine, & amolissent le ventre. A

La decoction d'icelles à part, ou avec Cices beuë ouure les oppiliatōs du foye & des rongnōs: dauantage elle sert contre jaunisse, difficulté d'vrine, strangurie, & contre grauelle & la pierre. B

On dict qu'elle prise en mesme sorte donne allegeance & diminue la sciatique, & douleur de membres desnoies. C

La racine cuiët en vin profite à ceux qui sont mords de quelque beste venimeuse. D

Du Seneue.

Chap. LV.

LES ESPECES.

IL y a deux sortes de Seneue, le Domestique, & le Sauvage, dont le Domestique est de deux sortes, l'un ayant la graine blanche & grosse, & l'autre l'ayant petite & brunatre.

*Sinapi hortense.*

*Seneue domestique.*

*Sinapi sylvestre.*

*Seneue sauvage.*



LA FORME.

LE Seneue blanc a les ficelles grandes, rudes, non guere differentes au premier aux ficelles du Naveau rond, plus petites toutesfois, & puis apres des autres plus petites & plus decouppées, sur la

sur la tige qui est houeue & longue de trois ou quatre pieds, & se partit en plusieurs branches, le long desquelles croissent les fleurs iaulnates, & puis apres des siliques longues, houeues, contenant vne graine ronde, pale, plus grande que celle du Naueu rond, de goust acre & chaud.

La seconde espece de Seneue domestique ayant la graine brune, qui est le Seneue vulgaire, ressemble au precedent de feuilles, de tiges, & croiffon. Les fleurs sont iaulnes. La graine est brune, moindre que celle du Naueu rond, au reste acre & chaude.

Le Seneue sauuaage a les feuilles grandes, larges, fort incisees, houeues, & les tiges comme le Domestique, mais il est plus petit & ne croiff point si haut. Les fleurs sont pales en iaulne en forme de croix, apres lesquelles vient la graine rougeatre en clofe dans siliques rondes & longues.

## LE LIEU.

La Moustarde ou Seneue domestique est semé es iardins & es champs.

Le Sauuaage croiff à part soy en lieux pierreux & aquatiques, & le long des voyes.

## LE TEMPS.

Le Seneue domestique & sauuaage fleurit en Iuin & Iuillet, & rend aucunes fois aussi sa semence.

## LES NOMS.

Le Seneue s'appelle en Grec *σίνιπιν* Latin *Sinapi*: es Boutiques *Sinapis* & *Sinapium*: en François Seneue, ou Moustarde en haut Aleman *Sennff*: en bas Aleman *Senff*.

La premiere espece est appelée *σίνιπιν κάραιον*, *Sinapi kartaion*: & es Boutiques de ce pais *Ερακιν* en François Seneue blanc: en haut Aleman *weisser Senff*: en bas Aleman *wit Senff*.

La seconde est aussi estimée vne espece de Seneue domestique, & est des Modernes appelée *Sinapi commune*: en François Seneue de iardin ou Moustarde: en haut Aleman *yamer Senff*: en bas Aleman *ghymern Senff*.

L'espece sauuaage est appelée des Modernes *σίνιπιν άγριον*, *Sinapi syluestre*: en François Seneue sauuaage: en haut Aleman *wilder Senff*: en bas Aleman *wilder Senff*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Seneue, signamment la graine, est chaud & sec iusques bien pres au quatriesme degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La graine de Seneue broyée avec vinaigre, est vne bonne faulfe, conuenable pour manger avec viandes dures & grosses, soit chair, ou poisson: car elle ayde à la digestion d'icelles, & prouhitte à le stomach, l'eschauffant, & reueillant l'appetit.
- B Elle est bonne donnée en viande à ceux qui ont courte haleine, & qui ont oppilation du Thorax, car elle meurit & fait fortir le phlegme visqueux dont la poictrine est chargée.
- C Icelle machée, tire hors grand quantité de phlegme du chef, & du cerueau: & appaise douleur de dens. Pareille vertu a elle tenue en la bouche avec hydromel, ou gargarifée.
- D On en fait vn bon gargarifmé avec miel & vinaigre contre la luette, & contre tumeurs des amigdales & du gozier.
- E A ce mesme quâd les tumeurs sont endurcies & enuieillies, on fait vn gargarifmé vtile, du ius de Moustarde avec hydromel, car il refout & digere les tumeurs endurcies des amigdales & du gozier.
- F La graine de Seneue beue avec hydromel ou eau miellée, guerit la frâisô des fieures, & eimeut ou reueille le flux menstrual, & fait vriner.
- G Icelle tirée par le nez, fait esternuer, & ayde aux Epileptiques, & aux femmes qui ont suffocation de matrice, pour les faire reueiller.
- H Icelle pilée avec figues, & appliquée en forme d'emplastre, oste le bourdonnemét des oreilles, & est bonne contre sourdesse.
- I Le ius d'icelle fêché au soleil, & puis apres delayé avec miel, esclarcit la veuë, & oste l'asperité & rudesse des paupieres, induit dessus.
- K On fait Emplastre d'icelle avec figues, fort vtile pour lethargiques lesquels ne se peuent reueiller: & contre douleur de hanche appelée sciaticque, & dureesse de ratelle: & aux Hydropiques appliqué sur le ventre d'iceux. Brief cest Emplastre est de grande efficace cõtre toutes maladies & douleurs froides, signamment quand elles sont enuieillies, car il reschauffe les parties, & digere les humeurs froides, & les tire hors.
- L La graine de Seneue meslée avec miel, greffe nouvelle, ou avec vn cerot, guerit la mauuaise tigne qui fait tomber les cheueux de la teste, efface toutes taches & lentilles du visage, & oste toutes taches noires & meurtrissures.
- M Elle guerit aussi toute mauuaise gratelle, & profite contre morsures de serpens, appliquée avec vinaigre.
- N Le parfum & odeur d'icelle chasse tout venin & fait fouyr les bestes venimeuses.

## LA FORME.

**T**ortelle a de grâdes feuilles rudes, larges, comme les feuilles de Naveau, & les tiges gresles houlues, d'environ vn pied de long, ayant plusieurs fleurs iaulnes, produisant filiques & graine comme le Naveau rond, mais piquante & acre, comme la graine de Moutarde. La racine est gresle & simple

## LE LIEU.

La Tortelle croist par tout le long des voyes, pres des vieilles murailles, lieux mal cultivez, & souuent aussi par les champs, signamment là ou on a semé des Naveaux, tellement que ce semble vne mauuaise herbe ou peste du Naveau rond.

## LE TEMPS.

La Tortelle fleurit depuis le moys de Mars ou d'Auril, iusques à la Myzette, & souuent aussi la graine en est meure.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée des Modernes *Rapisträ*, & d'aucuns aussi *Synapsi* s'istrefre: en François Velar, ou Tortelle: en haut Aleman *Hederesich*: en bas Aleman *Serich*. Il semble que ce soit *ἰρίσιον*, *Erysimū* de Theophraste, appelé en Latin de Gaza *Trionam*. Ce n'est pas toutesfois l'*Erysimum* de Dioscoride, lequel on appelle en Latin *Irio*, car l'*Erysimum* de Theophraste, & *Irio* sont deux herbes differentes comme il appert hors de Plin au liure 18.

## LE TEMPERAMENT.

La Tortelle, & singulieremēt la graine, est chaude & seche iusques au tiers degré, de fort semblable temperament au Seneue.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

Ceste herbe n'est pas usurpée des Modernes en Medecine, mais aucuns, de la semence d'icelle A font de la Moutarde, comme de la graine de Seneue, laquelle ilz mengent avec les viandes au lieu de vraye Moutarde: par lesquelles choses il est manifeste que la graine de ceste herbe, n'est point differente de la graine de Seneue quand aux vertus & operations, & qu'on en peut vser au lieu d'icelle, combien qu'elle ne soit pas du tout si bonne. Pourtant a elle esté nombrée de Theophraste & Galien entre les semences desquelles on vse communement pour acoustrer viandes.

## De la Roquette.

## Chap. LVII.

## LES ESPECES.

**D**E ceste herbe il s'en trouue deux especes, l'vne Cultiuée, laquelle est plus vulgaire, & de laquelle on vse le plus: & l'autre Sauvage.

## LA FORME.

1 La Roquette cultiuée a les feuilles brunatres, fort incisées à deux costez, de goust chaud & acre. Les tiges sont de la hauteur d'un pied, ou d'auantage: sur lesquelles croissent moult de fleurs iaulnes, & puis apres de petites filiques, dans lesquelles la graine est contenue. La racine est longue & fibreuse, & ne meurt point legerement, mais reiette tous les ans.

2 La Roquette sauvage ressemble fort à la Cultiuée, sinon qu'elle est en toutes sortes plus petite, signamment de feuilles & fleurs qui sont aussi plus iaulnes & produisent plus petites filiques.

3 Outre ces deux especes, on trouue és iardins de ce pais encore vne autre espece de Roquette, laquelle on appelle Roquette Romaine, ressemblant fort de feuilles & fleurs au Seneue sauvage du quel auons parlé cy dessus, sinon que ses feuilles ne sont pas si rudes ne si houlues, & qu'elles sont plus conuenables à manger.

## LE LIEU.

1 La Roquette cultiuée se plante aux iardins, & se trouue aussi en ce pais en aucuns lieux rudes, mal cultivez & pierreux, & aux vieilles mazures.

*Erysimon Theophrasti* } Tortelle.  
*Rapistrum.*





La Sauvage se trouve aussi en lieux pierreux & pres des voyes.

#### LE TEMPS.

La Roquette fleurit principalement en Juin & en Juillet.

#### LES NOMS.

La Roquette se nomme en Grec *ἑρὺς* en Latin *Eruc.* en bas Aleman *Rahette*.

La premiere espece, pareillement aussi la tierce, est appelée *Eruc. sativa* & *hortensis*: en François 1.<sup>o</sup> Roquette domestique ou cultivée: en bas Aleman *Roosche Rahette*.

La sauvage est appelée *Eruc. sylvestris*, c'est à dire Roquette sauvage: en bas Aleman *wilde Rahette*.

#### LE TEMPERAMENT.

La Roquette est chaude & seche jusques au tiers degré.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A** La Roquette est bonne à mêger en salade avec Laitues, Pourcelaine, & autres semblables herbes froides, car mêgée en ceste sorte elle est bonne & convenable à l'estomach, & engarde que les herbes froides ne nuisent à l'estomach, mais mêgée seule elle fait douleur de teste, & eschauffe par trop, pourtant ne la faut il pas manger seulé, mais tousiours avec Laitues ou Pourpier.
- B** L'usage d'icelle incite au ieu d'amour, lignâment la graine, & prouoque l'urine & ayde la cuisson des viandes.
- C** La graine d'icelle est bonne contre venin de scorpiens, & d'autres semblables bestes venimeuses.
- D** Icelle induicte avec miel, efface les lentilles & taches du visage, & emporte les cicatrices noires avec fiel de beuf.
- E** On dict aussi que celui qui prendroit de la Roquette auant estre bastu, ou soitté, seroit endurci aux coups, se dit Plin.
- F** La racine cuicte en eau, tire les eschardes, & squilles des os rompus, appliquée dessus.

## LA FORME.

**D**ragon a les feuilles longues, estroictes, noires, de goust fort acré & brulant bien pres cōme la Roquette, non guere differentes aux feuilles d'Hyssope vulgaire, plus longues, toutesfois & plus grandes. Les tiges sont rondes d'environ deux pieds de haut, diuïfées en moult de rameaux, sur lesquels croissent de petits boutons, lesquels ouuerts, monstrent de petites fleurs iaulnes cōme or entremêlées de noir. Iceles passées vient la graine. La racine est longue, gresse, fort fibreuse, se trainant le long de la terre, & iettant tous les ans çà & là de nouvelles tiges. Ruellius dit en son deuxiesme li. chap. 66. que ceste herbe prouient de la graine de Lin enclōse dans la racine d'un Raisfort, ou d'as pescaille d'un Oignon de mer qu'on appelle Scylla en Latin, & ainsi plantée en terre, pourtant, se dit il, a il la nature des deux, car en partie il retire apres vinaigre, & en partie apres sel.

## LE LIEV.

Le Dragon est planté aux iardins, & n'est aussi guere commun. LE TEMPS.

Le Dragon demeure verd depuis le moys de Mars, iusques pres de l'hyuer, mais il fleurit en Iuliet.

## LES NOMS.

Ceste herbe n'a esté descrite de personne que de Ruellius, & n'est guere encore cognue, sinon en aucuns endroits de France, & en aucunes villes de ce pais comme Anuers, Bruxelles, Malines &c. là ou ceste herbe a esté premierement apportée de France. Pourtant n'a elle autre nom, que celui qui luy a esté donné des François, lesquels l'appellent Dragon, & là selon est elle nommée en Latin Draco.

## LE TEMPERAMENT.

Toute ceste herbe est chaude & brulante à la bouche & à la langue, dōt il est certain, qu'elle est chaude & seche iusques au tiers degré, & fort semblable en température à la Roquette.

## LES VERTVS ET OPERA.

Ceste herbe est aussi bonne mengée en salade avec les Laitues comme la Roquette, car elle corrige aussi la froidueur de la Laitue & semblables herbes. Dauantage ou il y a de ceste herbe, il n'y faut guere de vinaigre ne de sel, car selon le tesmoignage de Ruellius, elle est assez acré & salée d'elle mesme.

## Du Cresson alnoys. Chap. LIX.

## LA FORME.

**C**resson alnoys a feuilles estroictes & decouppées, de goust acré & brulant: les tiges rondes, d'environ vn pied de long, sur lesquelles croissent moult de fleuriettes blanches, & puis apres de petits calyces larges, dedans lesquels est contenue vne graine rougeatre.

## LE LIEV.

On seme en ce pais le Cresson par tous les iardins.

## LE TEMPS.

Le Cresson qui est semé de bonne heure fleurit en Iuin, & bien to st apres il liure sa semence. Celuy qui est semé tard, produict aussi plus tard ses fleurs & graine.



Nasturtium.  
Cresson alnoys



## LES NOMS.

Cette herbe est appellee en Grec *κράσιν*; en Latin *Nasturium*, d'aucuns Modernes *Cresson*; en François *Cresson alnoys*, ou *Nastort*; en haut Alemā *Kress*, & *Garten kress*; en bas Alemā *Kresse*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Cresson est chaud & sec iusques pres du quart de degré, signamēt la graine, & l'herbe quand elle est seche: car estant encores verte, elle n'eschauffe & ne leche pas si fort.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le Cresson mēgé en salade avec Laictues, est de semblable vertu que la Roquette, & il est bon de le mēger avec herbes froides, car mēgé seul il subuertit l'estomach, & nuit à iceluy, à cause de sa trop grande chaleur & acrimonie.
- B La graine d'iceluy lache le ventre, & tuē & pousse hors les vers, elle diminue la ratelle, elle prouoque le flux menstrual, & pousse hors l'arrierefais, & l'enfant mort.
- C Elle est prouffitabile ausi contre serpens, & bestes venimeuses, & le persum & fumée d'icelle les fait souyr.
- D Icelle prinse avec le brouet d'une poulle, ou quelque autre semblable viande humide, meurt & fait sortir le phlegme visqueux dont le thorax est chargé.
- E Icelle induite avec miel, guerit duretes de ratelle, oste toute gratelle & roigne, elle digere & refout œdemes, & engarde les cheueux de tomber.
- F Elle prouffite contre la sciatique, c'est douleur de hanche, contre douleur de teste enuialle, & contre toutes vieilles maladies froides, induite avec miel & vinaigre.
- G Brieu la graine de Cresson ressemble fort en vertus & operatiōs à la graine de Seneue, tesmoing Galien.

## Du Cresson aquatique.

## Chap. LX.

## LES ESPECES.

Cresson d'eau est de deux sortes, sçauoir est le Grand, & le Petit.

Siam.

Grand Cresson aquatique.

*Sisymbrium cordanum.*

Petit Cresson aquatique



LA FORME.

1 Le grand Cresson aquatique a les tiges rondes, creuses, d'environ vn pied de long, & là dessus de feuilles longues, composées de plusieurs feuilles rōdelettes assemblées sur vne queue. Les feuilles sont blanches & petites, croissans au plus haut & le long des tiges, apres lesquelles suyuent de petites filiques, dans lesquelles la graine est contenue, laquelle est petite & iuline. La racine est blanche & fibreuse.

2 Le petit Cresson aquatique a au premier de feuilles rondes, puis apres vient la tige ronde, d'environ vn pied de long, sur laquelle croissent de longues feuilles profond incisées à deux costez, bien pres semblables aux feuilles de Roquette. Les fleurs croissent au plus haut des tiges, de couleur blanchatre, ou de cler incarné, apres lesquelles viennent filiques petites là ou est la graine.

LE LIEV.

1 Le grand Cresson aquatique croist es fosses, & estangs, & aussi aux fontaines.

2 Le Petit croist es prez bas & humides, qui sont couuerts d'eau en yuer, & le long des fosses & estangs.

LE TEMPS.

1 Le grand Cresson aquatique fleurit en Iuillet & Aoust.

2 Le Petit fleurit in May iusques bien pres à la fin de l'alté.

LES NOMS.

1 La premiere espece est appelée en Grec *σινυριον* Latin aussi *Sium* & *Laser*: en François Cresson aquatique: en haut Aleman *Saun Kress*: en bas Aleman *waterkerse*, & là selon es Boutiques *Nasturium aquaticum*.

2 La seconde espece est appelée en Grec *σινυριον* & *σινυριον καρδινου*: en Latin *Symbrium cardanine*: d'aucuns aussi *Sium*: en François Passerage sauvage, ou petit Cresson aquatique: en haut Aleman *Gauchstium*, *wilder Kress*, & *wisen Kress*: en bas Aleman *Loechoc*, *göscorn*, & *Leyn waterkerse*: de Herboristes *Flos cuculi*, d'aucuns *Nasturium aquaticum*. Ce n'est pas Iberis comme aucuns ont estimé.

LE TEMPERAMENT.

Ces deux herbes sont chaudes & seches iusques au second degré.

LES VERTVS ET OPERA.

*pseudobanium, Barbazza.* Herbe S. Barbe

A Le Cresson aquatique est bon mégé en salade, à part soy, ou avec autres herbes, car il fait vriner, il rompt & fait sortir la grauelle & la pierre, & prouffite à ceux qui ne peuvent passer que goutte à goutte, & contre toute oppilation des rognons & de la vessie.

B Le petit Cresson aquatique efface les lentilles du visage & toutes taches, appliqué dessus au soir, & osté & la ué le matin.

C La Passerage sauvage cuicté en lixieu tue & chassé les pouds, quand on s'en laue la teste, ou le lieu ou ilz sont.

D Les vaches qui paissent là ou la Passerage sauvage croist abondamment, elles donnent fort bon lait, dont on fait beurre fort gras & saououreux.

De l'Herbe Saincte Barbe. Chap. L XI.

LA FORME.

Cette herbe a les feuilles verdes, charnues, larges, vnies, & rondates, non guere differentes aux feuilles d'Ache ou du Nauieu rond, mais plus grandes & plus larges que les feuilles d'Ache. Les tiges sont rondes, fort ramues par haut, portés mout de petites fleurs iulnes, & puis apres de petites filiques longues, rondes, dans lesquelles est enclōse vne petite graine. La racine est grosse & longue.

LE LIEV.

Cette herbe croist par les champs, aucunes fois aussi es iardins à la porée, & lieux mal cultiuez.

LE TEMPS.

Cette herbe est pour la plus part verde tout l'yuier, mais elle fleurit & est en graine en May & en Iuin.



## LES NOMS.

Cette herbe se nomme en haut Aleman *S. Barbara* haut; & là selon en Latin *S. Barbara herba*. Nous l'avons appellée *Barbare* aux François Herbe de *S. Barbe*: en aucuns endroits de Brabant on l'appelle *Strenuif*, pour ce qu'elle est bonne contre la pierre & gravelle: en Hollande & autres lieux *winterkerse*, pour ce qu'ilz la mangent l'hyer en salade au lieu de Cresson, pourtant est elle aussi appellée *Nasturtium*, ou *Cerdanum hybernum*. Il semble que ce soit le *Pseudobunium*, *Pseudobunium* de Dioscoride: Pour le moins ce n'est point *Sideritis latifolia*, ou *Scoparia* comme aucuns pensent.

## LE TEMPERAMENT.

Cette herbe est chaude & seche bien pres jusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A L'Herbe *S. Barbe* est vne bonne herbe à faire salade, pourtant la menge on l'hyer en salade, comme le Cresson, à quoy elle est fort conuenable comme le Cresson & la Roquette.
- B Elle mondifie aussi les playes & vlcères pourris, & menge la chair morte, & qui croist par trop, appliquée dessus, ou le jus d'icelle distillé dedans.
- C On a aussi trouué par certaine experience, que la graine de ceste herbe faict vriner, & pouffe hors la gravelle, & guerit strangurie, ce qui est aussi attribué à *Pseudobunium*.

## Du Thlaspi.

## Chap. LXII.

## LES ESPECES.

ON trouue quatre especes principales de Thlaspi, lesquelles ne sont guere differentes vne de l'autre, ny au Cresson quant au goust.

## Thlaspi.

Premiere espece de Thlaspi.



## Thlaspi alterum.

Seconde espece de Thlaspi.



## LA FORME.

La premiere espece de Thlaspi a les feuilles longues, estroictes: les tiges dures, lées, d'environ pied & demy de haut, sur lesquelles croissent de petites branches produisans de petites fleurs blan-



blanches, & puis apres de filiques plates, rondes, ayans par haut vne fendace, ou creueure, dans lesquelles est contenue vne graine petite, ronde, acree & brullante en la bouche, puis tost apres ayant le goust d'Ail ou Oignon, & de couleur brunatre.

2 La seconde espece, a les feuilles longues & asles larges, plus grandes & plus larges que les feuilles du premier, & vn peu dechiquetées ou crenées par les bors. Les tiges sont rondes, d'environ vn pied de long, parties en plusieurs branchettes sur lesquelles croissent petis calyces, bien pres comme à la Bourse de Berger, dans lesquelles est contenue vne graine acree & piquante.

3 La tierce espece de Thlaspi est moindre de succul. *Thlaspi minus.* Petit Thlaspi.

les & tiges que la fusidite, & a plusieurs petites branches gresles, sur lesquelles croissent fleurs & graine comme à l'autre, plus petites toutesfois.

4 La quatriesme espece a les feuilles longues, estroictes, rudes, grislates, les tiges ligneuses, ronds & flexiles: sur icelles croissent petites fleurs blanches, lesquelles passées, produisent filiques larges, contenans vne graine brunatre, fort chaude au goust, comme la graine du Creslon.

#### LE LIEU.

Ces herbes croissent par les champs, & le long d'iceux, en lieux incultivez, & pres des voyes, & se trouuent en abondance, l'vne en vn endroit, l'autre en vn autre.

#### LE TEMPS.

Ces herbes fleurissent, & sont en graine en aillé, depuis le moys de May, iusques au moys d'Aoult.

#### LES NOMS.

Cette herbe est appelée en Grec *Θλάσπι*, à *Θλάσπι*, & *σινάπι* en Latin *Thlaspi*, *Capset* le, & *Scandalacrum*, d'aucuns aussi *Myris*, *Byrron*, *Desmophon*, & *Myopteryouen* haut Aleman *wilder Kress*; en François *Seneue* sauage en bas Aleman *wilder Kresse*.

1 La premiere espece est le vray *Thlaspi* de Dioscoride: & est appelée des bas Alemans *Wissel cruyt*, & d'aucuns en Latin *Scordothlaspi*.

2 La seconde espece est appelée des Modernes *Nasturtium tetragonum*, & *Sinapi rusticum*. en haut Aleman *Bauris senff*, ou *Bauris kreff*, & là selon en bas Aleman *Worten mostaert*, ou *Boer en kerffe*, cest à dire *Seneue*, ou *Creslon rustique*.

3 La tierce espece est appelée *Thlaspi angustifolium*, & *Thlaspi minus*: en haut Aleman *Sysembrant*; en bas Aleman *Bessmercruyt*.

4 La quatriesme est sans faute aussi vne espece de *Thlaspi*, mais il n'a point de nom particulier.

#### LE TEMPERAMENT.

Le *Thlaspi*, signamment la graine d'iceluy, est chaud & sec iusques pres du quart degré.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

La graine du premier *Thlaspi* mengée, purge la cholere par haut & par bas, elle prouoque le flux menstruel des femmes, & rompt les absces interieurs.

Icelle donnée en clystere par le fondement, donne allegeance à douleur Sciatique. A ce mesme B vaut elle aussi, induicte dessus comme la graine de Moutarde.

#### LES NVISANCES.


Attendu que la graine de *Thlaspi* est fort chaude, & de forte operation, elle purge iusques au sang, prinse en trop grande quantité: elle est fort nuisible aux femmes enceintes, pourtant ne la faut il pas donner par dedans.

#### Du Thlaspi de Candie.

#### Chap. LXIII.

#### LA FORME.

Cette herbe croist environ à la hauteur d'un pied, & a les feuilles estroictes, bien pres semblables aux feuilles d'Iberis. Au sommet des tiges croissent les fleuriettes par rondes cimouchettes, de



tes, de couleur blanche, ou comme incarnée. Apres lesquelles viennent siliques plates, semblables en figure aux siliques de l'autre Thlaspi, plus petites toutesfois, dans lesquelles est contenue vne graine de goust acre & piquant, comme la graine de l'autre Thlaspi.

## LE LIEV.

On ne trouue point ceste herbe en ce pais, sinon és jardins d'aucuns Herboristes fort diligens.

## LE TEMPS.

Il fleurit en ce pais en May, & bien tost apres la graine est meure.

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *σπείρα*: en Latin *Arabis* & *Draba*: de Pline selon l'opinion d'aucuns *Dryophonon*: des Herboristes modernes *Thlaspi de Candie*, incognue és Boutiques.

## LE TEMPERAMENT.

Le Thlaspi de Candie est de semblable complexion que l'autre Thlaspi.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A On vŕe de la graine de ceste herbe seche, en viandes au lieu de Poyure au pais de Cappadoce, telmoing Dioscoride.

## De Irio. Chap. LXIII.

## LA FORME.

**I**rio a les feuilles longues, incisées & profond decouppées à deux costez, non guere differentes aux feuilles de la Roquette Romaine, ou du Seneue sauvage. Les tiges sont gresles & flexiles, lesquelles se laissent plier comme ozieres ou liens, suricelles croissent tout de fleurs iaulnes, & puis apres viennent de petites siliques gresles, cōtenans vne graine de goust acre & piquant. La racine est lōgue grosse & fibreuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist en ce pais par tout le long des voyes, & en lieux incultivez & pierreux.

## LE TEMPS.

Erysimon fleurit icy abondamment au moys de Iuin & de Iuillet. LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *ερίσιμον*: en Latin *Irio*: d'aucuns *χαμαίριον*, *Chamaerion*, cest l'Erysimum de Dioscoride, & non de Theophraste, duquel nous auons parlé cy dessus.

## LE TEMPERAMENT.

Erysimon est chaud & sec comme le Cresson.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A La graine d'Erysimon prinse en forme de looth, & souuent lechée, fait cracher & meuir les phlegmes visqueuses amassées dedans le thorax & poulmons: dauantage elle est fort profittable à ceux qui ont courte haleine, & contre toux enuieillie: A ce mesme on la fait meillieure, en la mettant premierement tremper, puis secher au feu, ou apres l'auoir enueloppée de paste le cuire ainsi, car autrement elle est trop chaude.
- B Icele ainsi acoustrée & mise en œuure, aide cōtre la iaul-



Erysimon Dioscoridis. Irio.



## De Iberis. Chap. LXV.

iaunisse, douleurs & trenchées de ventre, contre douleur de hanche, & contre tout venin & poison.

**C** La graine d'Erysimon est vilement induite avec eau & miel sur chancres cachez, dures, parotides, & sur vicilles & dures apostomes des mammelles, & des genitoires: car elle résout & digere les œdèmes.

### De Iberis. Chap. LXV.

#### LA FORME.

**I**beris a les tiges rondes, d'environ vne coudée de haut, fort ramues: Les fueillettes étroictes, vn peu plus grandes que les feuilles du Cresson. Les fleurs sont petites & blâches, apres lesquelles ensuyuet petites silques contenant la graine. La racine est grosse, blanche, de goust acré & chaud.

#### LE LIEV.

Iberis croist en Italie & autres pais chauds, pres des vieilles murailles, & autres lieux mal cultiuez: Les Herboristes de ce pas la sement en leurs jardins. **LE TEMPS.**

Iberis fleurit & est en graine à la Myzsté.

#### LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec *ἰβηρίς* καὶ καρδωμαντικὴ, & d'aucuns *λεπίδιον*: en Latin *Iberis*, *Cardanatica*, *Lepidium*, & d'aucuns *Nasturtium sylvestre*, incogne é Boutiques.

#### LE TEMPERAMENT.

Iberis est fort chaude & seche, de semblable temperament que le Cresson.

#### LES VERTVS ET OPER.

**A** Les anciens Medecins, signamment Damocrates, disent que la racine d'Iberis meslée avec axunge de porc, guerit la goute sciatique, portée liée sur la hanche, par les hommes quatre heures, & par les femmes deux heures, mais incontinent apres auoir osté l'herbe il se faut baigner.

### De la Passerage. Chap. LXVI.

#### LA FORME.

**P**asserage a les fueilles longues, larges, non guere differétes aux fueilles de Laurier, plus larges toutefois, plus longues, & vn peu crenées tout à l'entour. Les tiges rondes, mal aysées à rompre, d'environ deux pieds de haut: au sommet desquelles croissent mout de petites fleurs blanches, & puis apres vne petite graine. La racine est longue & simple, se trainant sous la terre, & produisant en plusieurs endroits tous les ans, de nouveaux jettons, & nouvelles fueilles.

#### LE LIEV.

La Passerage est semée en aucuns jardins de ce pais, & là ou vnefois on l'a bien plantée, elle sy tient volontiers, tellement que puis apres, on ne la peut point facilement destruire.

#### LE TEMPS.

La Passerage fleurit, & est en graine en Iuin & Juillet.

Les

Iberis.



Piperitis.

Passerage.



## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée des Modernes en Latin *Piperitis*, d'aucuns aussi *filæstris Raphanus*: en François Passerage: en haut Aleman Pfefferkraut: en bas Aleman Pepercrant: Il semble que ce soit le *λεπίδιον*, *Lepidium* de Paul Aegineta, & de Pline, toutesfois ce n'est pas le *Lepidium* de Dioscori: de, ny pareillement le *Piperitis* de Pline, combien qu'on l'appelle aucunesfois ainsi.

## LE TEMPERAMENT.

Ceste herbe est chaude & seche iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Aucuns Modernes vsent de ceste herbe en viandes au lieu de Poyure, pource qu'elle a la faculté & saveur de Poyure, duquel elle a prins son nom *Piperitis*.
- B Pareillement la racine d'icelle, attendu quelle est fort chaude, & de facultez fort semblables à la Moutarde & Roquette, est fort conuenable à la sciatique, appliquée par dehors sur la bouche au ec quelque gresse douce, comme d'oyson ou de chapon.

## Du Poyure aquatique, ou Curaige.

## Chap. LXVII.

## LA FORME.

Hydropiper.

Curaige.

**P**oyure aquatique a les tiges rondes, vnies, desnées, fort genoillées: Les fueilles longues, estroictes, nō guere differētes aux fueilles de Saulx, de goust acre & bruslant comme Poyure: Au plus haut des tiges, entre les fueilles, viennent les fleurs sur courtes queueus, amassées ensemble, bien pres comme à la Blette, petites, blāches, lesquelles passées y vient vne graine large, brunatre, qui pique à la langue. La racine est fibreuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist par tout ce pais le long des fosses, estangs, flots, & en lieux bas & humides.

## LE TEMPS.

Elle fleurit pour la plus part en Iuillet & Aoult

## LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *υδροπiper*: en Latin *Hydropiper*, & *Piper aquaticum*: en François Poyure aquatique, ou Curaige: en haut Aleman wasser Pfeffer, ou wuckenhaut: en bas Aleman waterpeper: in cogne & Boutiques.

## LE TEMPERAMENT

Hydropiper est chaud & sec iusques au tiers de gré. LES VERTVS ET OPER.

- A Les fueilles du Poyure aquatiq induictes avec la semēce, digerent & font eluanouyr œdemes, & duretes enuueillies, & dissoluent le sang figé des meurtrissures & contusions.
- B Les fueilles seches se reduisent en poudre, pour en vsr & viandes en lieu de Poyure, comme aussi la Passerage.

## De la Perficaire.

## Chap. LXVIII.

## LA FORME.

**C**este herbe ressemble au Poyure aquatique de fueilles, tiges, & fleurs amassées ensemble, toutesfois elle n'est pas chaude ny acre, mais pour la pluspart sans aucun goust manifeste. Les tiges sont rondes & genoillées. Les fueilles longues & estroictes comme celles du Poyure aquatique, plus brunatres toutesfois, ayans au milieu de taches noiratres, ce que n'ont les fueilles du Poyure aquatique. Les fleurs sont incarnées ou rougeatres, amassées aussi en vn, apres lesquelles vient vne graine large & brunatre. La racine est ialine & fibreuse.

## LE LIEV.

Ceste herbe croist aussi en lieux humides, & marescageux, le long des eaux, & on la trouue souuent pres du Poyure aquatique.

# Poyure d'Inde. Ch. LXIX.

LE TEMPS.

Elle fleurit en Juillet & Aoult, & bié tost apres elle est en graine.

LES NOMS.

Cette herbe est appelée des Modernes en Latin *Perficaria* en François *Perficaire*, d'aucuns *Curaige*: en haut Aleman *Perfichirant*, ou *flöchirant*: en bas Aleman *Perfichirant*, & d'aucuns *Blöocruyt*.

LE TEMPERAMENT.

La *Perficaire* est de complexion froide & seche.

LES VERTVS ET OPER.

- A La *Perficaire* verde pilée, est vtilement appliquée sur playes fresches & nouvelles, car elle les rairefchit, & les garde d'inflammation & aposteme. Pareille vers tu a le ius des fueilles distillé dedans.

## Du Poyure d'Inde. Chap. LXIX.

ES ESPECES.

ON trouue trois especes de ce Poyure, l'vn a les filiques moyennement longues & grosses, l'autre les a longues & estroictes, & le tiers les a courtes & larges, au reste non guere differens l'vn à l'autre de figures & maniere de croistre.

LA FORME.

Le Poyure d'Inde a les tiges quarrées, brunatres, d'enuiro vn pied de haut, sur lesquelles croissent fueil les brunatres, tendres, vnies, pres semblables aux fueil

*Perficaria.* *Perficaire.* 441



*Capficam.* Poyure d'Inde.



*Capficum oblongius.* Long Poyure d'Inde.



les de la Morelle commune, plus estroictes toutes fois, & plus aigues. Entre les feuilles viennent les fleurs alsées sur courtes queues, ayans communement cinq ou six feuilles, de couleur blanche à vne estoille verte au milieu. Apres les fleurs croissent les siliques, polies & vnies, de couleur verte auant quelles soient meures, & puis rouges & purpurées: celles de la premiere espece d'enuiró vn doigt de long: celles de la seconde, plus longues & plus estroictes: celles de la tierce larges, courtes & rondes. En icelles est cõtenue la graine, isulnatre en pallissant, large, chaude, & acre au goust comme Poyure.

## LE LIEV.

Cette herbe ne croist pas en ce pais d'elle mesme, mais aucuns Herboristes la plantent & entretiennent en leurs iardins avec grand soing & diligence.

## LE TEMPS.

La graine de ce Poyure meurit en ce pais au mois de Septembre, & sur l'uyver.

## LES NOMS.

Cette herbe estrangere est appellée d'Actuarius en Grec *κόκκινον*: en Latin *Capsicum*: d'Auicenne *Zingiber caninum*: de Pline, selon l'opiniõ d'aucuns, *Siliquastrum* & *Piperitis*: des Modernes *Piper Indicum*, *Piper Calcuticum*, & *Piper Hispanum*: en haut Aleman *Indianscher Pfeffer*, *Calcutischer Pfeffer*: en François Poyure d'Inde, ou d'Espagne: en bas Aleman *Peper van Indien*, & *Wesische Peper*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Poyure d'Inde est chaud & sec iusques au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERA.

A On vse en plusieurs lieux de la graine du Poyure d'Inde es viandes, car il a la mesme vertu & la ueur de Poyure: dauantage, elle isulnit les viandes comme le Safran, & prinse en ceste sorte, elle reschauffe l'estomach & ayde à la cuysson des viandes.

B Elle dissout pareillement & digere strumes, glandules, & toutes tumeurs froides, & efface toutes taches & lentilles du visage, induictes dessus avec miel.

## LES NVISANCES.

Il est dangereux de prendre souuent, ou par trop, de ceste graine: car elle a quelque malice cachée en soy, par laquelle elle tue les chiens, si on leur en donne à manger.

## Du Poyure.

## Chap. LXX.

## LES ESPECES.

Les anciens Medecins descriuent le Poyure de trois sortes, Long, Blanc, & Noir, lesquels on trouue encore à present à vendre es Boutiques des Apothicaires & Espissiers.

## LA FORME.

De la forme de l'arbre qui porte le Poyure, nous n'en scaurions autre chose escrire, sinõ ce que nous en auons trouué descrit des Anciens & de ceux qui ont hanté les Indes & le pais d'entour Calcut: considéré que c'est vn fruit estrangier, lequel ne croist pas pardeça. Pourtant nous n'en dirons icy autre chose, sinon ce qui se trouue es Anciens, ou ceux, qui ont hanté depuis peu de temps ledit pais, lesquels toutesfois ne sont pas tous d'vne opinion. Pline escrit que l'arbre qui porte le Poyure ressemble au Geneure. Philostratus dict que l'arbre portant le Poyure, & le fruit resẽble à *Agnus castus*, *Dioscoride* & aucuns autres escriuent que le Poyure croist es Indes sur vn petit arbre, & que le Poyure long (lequel resẽble aux chattons ou brebiettes du Bouleau venans deuant les feuilles) est cõme le premier fruit qui sort incontinent apres les fleurs, lequel avec le temps deuiet long, grand, & blanc, produisant moult de bayes pendans ensemble d'vne mesme queue,



queue) lesquelles non encore meures sont le Poyure blanc, & meures & noires sont le commun Poyure noir. Ceux qui traffiquent es Indes, Calecuth, & pais d'alentour, disent que le Poyure ne croist point sur arbres, mais sur vne sorte de Liseron ressemblant à la Couleuree blanche, lequel sentorteille au tour des arbres & hayes, produisant de longs pedicules gressies, d'ou pendent les grains de Poyure, tout ainsi que les Grofeilles d'outre mer, comme on peut voir en ce pais: car on amene en Anuers des Indes du Poyure consistant ayant encore ces pedicules & quenés. Les bayes cueillies verdes, demeurent blanches, & sont le Poyure appellé blanc, mais quâd elles sont du tout meures, elles deuiennent noires & pleines de rues & fronges, icelles sont le Poyure noir vulgaire. Ces mesmes Autheurs modernes disent aussi que le Poyure long n'est point le fruit de ceste plante, mais qu'il prouient sur autres arbres, sur lesquels il croist comme les chattons & brebiettes sur les Noiseliens & Bouleaux, lequel ilz appellent Poyure long, pource qu'il ressemble au Poyure de saueur & de facultez.

LE LIEU.

Le Poyure croist es Isles de la mer Indiane, comme en Tapobrana appellée Sumatra, & aucunes autres Isles circonuoisines, d'ou on l'amene à Calecuth, laquelle est la ville la plus puissante & plus marchande de toutes les Indes: & là le mesure on, non par poids, mais par mesures comme on fait le Blé en ce pais.

LBS NOMS.

Le Poyure est appellé en Grec *πίπρις*: en Latin *Piper*: en haut Aleman *Pfeffer*: en bas Aleman *Peper*.

1. Le Poyure long se nôme en Grec *μακρὴν πίπρις*: en Latin *Piper longum*: es Boutiques *Macropiper*.
2. Le Poyure blanc s'appelle *λευκὴν πίπρις*: en Latin *Piper album*: es Boutiques *Leucopiper*.
3. Le Poyure noir s'appelle en Grec *μαλὰν πίπρις*: en Latin *Piper nigrum*: es Boutiques *Melanopiper*.

LE TEMPERAMENT.

Le Poyure est chaud & sec iusques au tiers de degré, signamment le blanc & le noir, car le long n'est pas si trefsec, attendu qu'il est participant de quelque humidité.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

On le messe es saulles pour donner bon goust aux viandes, & pour reueiller l'appetit, & ayder à la cuysson des viandes.

Il prouoque l'vrine, il chasse les ventositez, douleurs de ventre, prins avec feuilles de Laurier B ou du Comin: il est tresbon contre tout poison, & morsures & piqures de bestes venimeuses, pour tant le messe on parmy les Antidotes.

Iceluy beu auant l'acces des fieures, ou induict sur le corps avec huyle, oste la frisson & rigueur C des fieures.

Iceluy prins avec du miel en forme de looth, prouffite contre toux froide, & contre toutes D froides indispositions du thorax & des poulmons.

Iceluy maché avec des raisins de Quaresme, attire hors du chef grande quantité d'humeurs, & E mondifie le cerueau.

On l'induit aussi vtilement avec du miel sur esquinances, car il dissout & digere la tumeur & F enflure.

Iceluy avec poix digere les strumes & glâdules, & tous oedemes endurcis, & tire hors les eschar G des & espines.

Le Poyure, le long principalement: est aussi vtilement meslé parmy les collyres escharcissans & H renforcans la veue.

De l'Ail. Chap. LXXI.

LES ESPECES.

IL y a trois sortes d'Ail, le Domestique, le Sauvage, & l'Ail d'ours.

LA FORME.

1. L'Ail de iardin a les feuilles de Gramen ou d'Oignon, entre lesquelles viennent à la seconde année de tiges rondes & creuses, sur lesquelles croissent les fleurs & semence, semblables aux fleurs & semence d'Oignon. La racine est ronde, bulbeuse comme le bulbe d'un Oignon, amassée de plusieurs noyaux ioints ensemble, sous lesquels pendent fibres petites & gressies.

2. L'Ail sauvage n'a point de feuilles, mais au lieu d'icelles a de longs tuyaux gressies, ronds, creux, entre lesquels vient vne tige ronde & dure, de deux ou trois pieds de hant, sur laquelle viennent les fleurs & la graine. La racine est aussi bulbeuse, sans gosses ou noyaux toutesfois, & a aucunes fois d'autres petis bulbes adioincts, desquels sortent nouvelles plantes.

Allium sativum. Ail de iardin.



Allium silyestrum. Le grand.



Ail sauvage. Le petit.



Allium vineale.

Ail d'ours.

De ceste espece s'en trouve il encore vne autre qui est moindre, au reste semblable aux autres tant de feuilles, tiges, & semence, que de racines, laquelle pro vient communement aux prez.

- 3 L'iers Ail appellé Ail d'ours, a communement deux feuilles grandes & larges, pres semblables aux feuilles du grand Muguet, entre lesquelles vient vne tige ou deux, sur lesquelles croissent moult de petites fleurs blâches. La racine a la figure d'un Ail nouveau d'odeur & goulit tresforte.

## LE LIEV.

- 1 L'Ail de iardin se plante és iardins.  
 2 L'Ail sauvage croist de soy mesme és châps, hayes, & quelques prez, signammét le petit, car le plus grand croist le plus souuent par les champs.  
 3 L'Ail d'ours se trouve és boys humides & obscurs.

## LE TEMPS.

- 2 L'Ail sauvage fleurit & est en graine en Iuin & Iuillet.  
 3 L'Ail d'ours fleurit en Auzil & en May.

## LES NOMS.

L'Ail s'appelle en Grec *αίλος* ou en Latin *Allium*; en haut Aleman *Knoßloch* ou *Knoßloch*; en bas Ale man *Schock*.

- 2 La premiere espece est appellée *Allium sativum*, & Ail de iardin, & *tum Schock*, ou *Schock*.

La se





La seconde espece s'appelle en Grec *επιτοκίπος αυ* : en Latin *Allium anguinum*, & *Allium silybstris* en François Ail sauuage-en haut Aleman *wilder Knobloch*, ou *feld Knobloch*: en bas Aleman *wildot looch*.

La tierce espece est appelée des Modernes en Latin *Allium ursinum* : en François Ail d'ours : en haut Aleman *wast Knobloch*, ou *Knoblauch*: en bas Aleman *Was looch*. Il semble que ce soit l'Ail que Dioscoride appelle *Scorodoprassum*, ou comme aucuns pensent *Ampeloprasum*.

LE TEMPERAMENT.

L'Ail est chaud & sec iusques bien pres du quatriesme degré.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

L'Ail mengé crud à ioun, ne nourrist point, mais au contraire engendre mauvais sang pour sa grande chaleur: toutesfois quand il est cuit iusques à ce qu'il ayt perdu son acrimonie, il n'engendre pas si mauvais sang, & combien qu'il n'ourrisse fort peu, il nourrist toutesfois dauantage que quand il est mengé crud.

Il est vtile à gens pleins de grosses humeurs, crudes & visqueuses, car il dissout & consume les humeurs froides.

Il chasse aussi les vêts, ouure toutes oppilatōs, tué & chasse hors vers larges, & puoque à vriner.

Il est bon contre tout venin & poison, prins en viandes ou cuit en vin & beu, car de sa nature il est cōtraire à tout venin: tellemēt qu'il fait souyr toutes bestes venimeuses du lieu ou il est. Pour tant a il esté appelé de Galien Prince des medecins, la Theriaque des rustiques & villageois.

On le met aussi fort vtilement sur morsures de chiens enragez, & sur toutes piqures & morsures de bestes venimeuses, comme araignes, scorpions, sangsues & semblables: A ce mesme vut mout de boyre la decoction d'iceluy faicte en vin.

Il garde de deuenir malades ceux qui sont contrainctz de boyre diuerses fortes d'eaux, & mau Iceluy mangé crud ou cuit, esclarcist la voix, guerit la toux enuieillie & prouffite grandement à ceux qui sont hydriopiques: car il seche l'estomach, & cōsume l'eau: outre ce il n'engendre point de souff particuliere.

La decoction d'iceluy avec Origan faicte en vin & bené, tué les pouds & les lendes.

Il est fort bon contre douleur de dens, car il appaise icelle, broyé avec vinaigre, puis appliqué sur les dens: ou cuit à part soy ou avec quelque peu d'encens en eaué, de laquelle on se laue la bouche, ou qu'on la met au creux des dens mauuaises. Il a pareille vertu meslé avec axunge d'oye & mis dans les oreilles.

Iceluy eschaché & appliqué sur les temples, donne allegance à vieille douleur de teste.

Iceluy bruslé en cendres & meslé avec miel, guerit mauuaise gratelle, & rudesse de la teste, & le poil qui tombe induict dessus.

Appliqué en mesme sorte il efface & guerit meurtrissures & contusions noires.

Il est bon aussi contre mauuaise gratelle blanche, vlceres de la teste coulans, & toute autre roigne, pilé avec sel & huile & induict dessus. Pareillement contre le feu volage.

Avec gresse de porc il digere & refout tumeurs endurees. Et avec souffre & resine, il tire le mal hors des fistules, comme dit Pline.

Il esmeut aussi le flux menstrual, & pouffe hors la secundine, quand les femmes sont asises en la decoction d'iceluy, ou si elles reçoieēt par vne selle percée la fumée d'iceluy mis sur charbons ardés.

On en guerit la pepie aux poulettes & poules.

LES NVISANCES.

L'Ail est nuisible & mauuais à gens cholériques, & à toutes gens de complexion chaleruse. Il faict mal aux yeux, & nuict à la veue, & pareillement à la teste, & aux rongnons.

De l'Alliaire. Chap. LXXII.

LA FORME.

Ceste herbe a au commencement fueilles rondatres, bien pres comme le Violier de Mars, plus grandes toutesfois, plus larges, & de couleur plus palle. Entre icelles prouieēt la tige, d'environ deux pieds de haut, ayant fueilles plus longues & plus estroictes que les premieres, & crenées tout autour, nō guere differētes aux fueilles d'Ortye, mais plus grandes. Lesquelles eschachées entre les doigts ont l'odeur & saueur d'Ail. Au plus haut des tiges y croist mout de petites fleurs blanches, & puis apres de longues siliques cōtenans vne graine noire. La racine est longue, gresse & ligneuse.

LE LIEV.

Ceste herbe croist volūtiers en lieux bas & mal cultiuez, comme aux bords des prés, & champs humides, aucunesfois aussi es hayes & le long des murs.

## LE TEMPS.

Cette herbe fleurit pour la plus part en May & en Juin, puis apres de vient en graine.

## LES NOMS.

Cette herbe est appelée des Latins modernes *Alliaria*, d aucuns aussi *Scordotis*; ce n'est pas toutesfois le vray *Scordotis*, lequel s'appelle aussi *Scordium*, décrit cy dessus: *Pandectarius* l'appelle aussi *Scordium*; El le s'appelle en François *Alliaire*; en haut Alemā *Knob Lochkraut*, *Kreuchel* ou *Sasskraut*; en bas Aleman *Sooch sonder sooch*.

## LE TEMPERAMENT.

Cette herbe est chaude & seche iusques pres du tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A On n'vse guere de ceste herbe en medecine: mais aucuns en vient és viandes au lieu d'Ail.  
 B Les Apothicaires ignorans, vient de ceste herbe au lieu de *Scordium*, non sans erreur, comme il est par tout manifeste.

## De l'Oignon. Chap. LXXIII.

## LES ESPECES.

Il y a plusieurs especes d'Oignons: les vns sont blancs les autres roux: les vns lōgs: les autres rōds: les vns grands les autres petis: mais tous d'une faculté, & faueur, sinon que l'un est un peu plus fort que l'autre, non differens toutesfois de feuilles, fleurs & graine.

## LA FORME.

L'Oignon a les feuilles bien pres semblables à l'Ail, creuses par dedans: Les tiges sont rondes, sur lesquelles viennent ronds chapiteaux couverts de petites peux blanches bien deliées, d'ou sortent mout de fleurs blanches estoilées, se tournans en petis boutons, dans lesquels sont contenus deux ou trois grains noirs anguleux. La racine est ronde, ou longue, composée de plusieurs pelures, dont celles de dehors sont les plus tenues.

## LE LIEV.

On le seme en ce pais par tout és jardins, & il ayme terre molle.

## LE TEMPS.

On seme communement l'Oignon en Mars, il est par creu en Aoust, & on le tire hors de terre pour le garder. Et si on le replante derechef en terre au mois de Mars, il produit fleurs en Juin, & est en graine en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

L'Oignon est appelé en Grec *κρόμμυον*: en Latin *Cepa* & *Cepe*: en haut Aleman *Zwibelen*: en bas Aleman *Zeyen*.

## LE TEMPERAMENT.

L'Oignon est pres chaud iusques au quatriesme degré & de parties grossés & non subtiles.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A L'Oignon engendre ventositez, il fait reuenir l'appetit, & subtile & consume les humeurs grosses & gluantes, sans toutesfois nourrir: principalement si on le mange crud. Mais étant bouilly deux ou trois fois, il n'est pas adonc si acre, & nourrit aussi avec cela, mais fort peu.  
 B Iceuy pris en viandes, lache tout doucement le ventre, & prouoque l'vrine en abondance.  
 C Il ouure aussi les hemorrhoides appelées en Grec *Hemorrhoides*, induict sur le siege avec huile ou vinaigre. Pareillement le jus d'iceluy appliqué au siege avec du cotton.

Alliaria.

Alliare.



Crommion, Cepa, Oignon.



Ice-

Iceluy poistry avec raisins de cabas & figues, & appliqué dessus, meurt & rompt les cedemes. D  
Le jus d'iceluy distillé es yeux, esclarcist la veue obscurcie, & efface les taches & maille encom- E  
menée des yeux.

Iceluy ius mis es oreilles, est bon contre sourdesse & bruiet d'icelles, & aux oreilles pleines de F  
boué & matiere purulente, pour les nettoyer.

Iceluy attiré par le nez, fait esterner & purge le cerueu.

Appliqué par dessous avec vn pessus, il esmeut le flux mensrual, & tire hors l'arrierefais. G

On l'applique ainsi vilement sur morsures de chiens mauvais, avec miel, Ruë, & sel. H

Il guerit la gratelle, & taches blanches de tout le corps, & pareillement la tigne: il remplit les K  
lieux pelez de la teste, induict dessus au soleil.

Iceluy induict avec gresse de chappon, est bon contre cloches esleueés des pieds & contre es- L  
corceures.

LES NVISANCES.

Si on en vse souuent, il fait douleur de teste, il fait beaucoup dormir, & nuit aux yeux.

Du Poreau.

Chap. LXXIII.

LA FORME.

Porrain. Poreau.

Poreau a feuilles longues, larges, ployées en vn, de goult & odeur non guere differentes à l'Oignon, entre lesquelles croist en deux ans vne tige ronde, produisant vn rond chapiteau avec ses fleurs comme l'Oignon, & puis apres vne graine, semblable quant à la forme à celle de l'Oignon, mais grise en couleur. La racine est blanche, & moindre q'vn petit Oignon.

LE LIEV.

On plante bien pres par tout ce pais es jardins le Poreau, & on ne le laisse guere venir à semence: mais on luy coupe bien pres tous les iours les feuilles iusques à terre, pour en vser iournellement en potages & autres viandes, pourtant ne peut il facilement esleuer.

LE TEMPS.

Le Poreau fleurit en May & en Iuin, vn an apres quil a esté semé, moiennant quil n'aye esté couppe: car estant continuelement couppe, il porte peu souuent fleurs & graine. Pourtant escriuent aucuns que le Poreau ne porte ne fleurs ne semence, ce qui n'est vray: car le Poreau qui n'a esté couppe produict fleurs & graine.

LES NOMS.

Le Poreau s'appelle en Grec *πράσιον*: en Latin *Porrain*: en haut Aleman *Lauch*: en bas Aleman *Porraye*.

Le Poreau non couppe s'appelle en Grec *πράσιον κισφικ* *λασπίς*: en Latin *Porrain capitatum*, c'est à dire Poreau testu.

L'autre lequel on coupe, est appelé en Latin de *Columnella* & *Palladius* *Porrain sectisum*, c'est à dire Poreau sectil, & qui se coupe.

LE TEMPERAMENT.

Le Poreau est chaud & sec iusques au tiers degre, de la complexion d'Oignon, mais non si fort.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Poreau engendre mauvais & gros sang, il enfle, & fait songer avec grand peine, principalement quand il est mengé crud: mais cuit en eau deux ou trois fois, il est meilleur & plus conue- A  
nable à manger.

Il fait vriner, il subtilise les humeurs, & amollit le ventre.

On boit vilement le jus de Poreau avec miel contre morsures & piqures de bestes venimeuses B

Le Poreau, ou le jus d'iceluy prins en forme de looth, mondifie la poitrine, fait cracher, & D  
guerit toux enuieille & la squinancie.

Il prouoque le flux mensrual, & si on fastied en vn bain fait d'iceluy avec eau marine ensem E



ble boulyz, il ouure la matrice & amollit toutes dureſſes d'icelle.

F Les fueilles de Poreau arreſtent le flux de ſang, ſignamment celuy du nez. Pareille vertu a lein d'iceluy meſſé avec vinaigre & poudre d'encens bien deliée, puis mis aux narilles.

G Il eſt bon de mettre la graine parmy les medicamens qui rompent la pierre.

H Elle arreſte & eſtanche tout flux de ſang par trop abondant, prinſe avec pareille quantité de bayes de Myrte.

## LES NVISANCES.

Le Poreau engendre mauuaiſes humeurs, & ventofitez: il ſaiſt ſonger avec peine, & obſcurciſt la veue, & nuit fort à ceux qui ont quelque vicere aux reins, ou en la veſſie.

## Du petit Poreau.

## LA FORME.

Petit Poreau a au lieu de fueilles, de petits tuyaux greſſes, tendres, & creux, comme de petits ioncs, fort amasſez enſemble, de gouſt non guere different au Poreau. Entre ces fueilles ionceuſes y croiſt aucunes fois des petites tiges rondes à petits chapiteaux, comme l'Oignon, beaucoup plus petits toutesfois, & pleins de petites fleurs purpurées. Les racines ſemblent de petits Oignons, mais beaucoup plus petites, amasſées en vn, & pleines de longues fibres.

## LE LIÉV.

On le plante en ce pais és iardins à la Porée.

## LE TEMPS.

Il fleurit en May & en Juin, vn an apres qu'il a eſté replanté ou ſemé.

## LES NOMS.

Ceſte eſpece de Poreau ſ'appele en François petit Poreau: en haut Aleman *Schntſmaſch*, *Woffſmaſch*: en bas Aleman *Wieflooch*, c'eſt à dire Ail ion ceux, pour ce qu'au lieu de fueilles il porte de petits ioncs. Il n'a point de nom Grec, ny Latin que nous ſachons. Pourtant l'a'uons nous appellé ſeſo le nom Alemā en Grec *Χνοναίος*: & en Latin *Sebenopraſum*. Aucuns cuydent que ce ſoit *Porrum ſetiſium*: mais que leur opinion ſoit faulſe, il appert par ce que n'ont eſcrit Columella & Palladius, ce q nous auons dit au chapitre precedent, que *Porrum ſetiuium* & *Porrum capitatum* ne ſont qu'vn, & qu'ilz viennent tout deux d'vne meſme graine, ſeulement differens en cela, qu'on en laiſſe croiſtre l'vn, & l'autre on le coupe ſouuent.

## LE TEMPERAMENT.

Le Petit Poreau eſt chaud & ſec iuſques bien pres au tiers degré, de temperament fort ſemblable au Poreau.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A) On en vſe en potages & viandes comme du Poreau, auquel il reſemble fort quant aux vertus & operations.

## Du Bulbe de iardin, ou Ail de chien.

## Chap. LXXVI.

## LES ESPECES.

IL ſe trouue à preſent deux eſpeces de ceſte ſorte de Bulbe, vne Grande, & l'autre Petite, au reſte ſemblables l'vne à l'autre.


## LA FORME.

Le plus grand Bulbe a les fueilles longues, large ſentre leſquelles croiſt vne tige droite ronde produiſant au tour de ſoy beaucoup de fleurs perſes en bleu, l'vne ſur l'autre, leſquelles commencent à fleurir par bas. La racine eſt ronde comme vn Oignon.

Le pe

## Chap. LXXV.

*Sebenopraſum.* Petit Poreau.



Bulbi esculenti genus.  
Grand Bulbe de iardin.

Bulbi esculenti genus minus.  
Petit Bulbe de iardin.



Le petit Bulbe ressemble au premier de feuilles, fleurs & racine, sinon qu'il est plus petit.

LE LIEV.

Il croist en aucuns endroits par les boys, mais on ne le trouue pas en ce pais, sinon es iardins des Herboristes, là ou on l'a planté.

LE TEMPS.

Il fleurit à la fin d'Auril & de May.

LES NOMS.

Ceste herbe est sans doute vne espece & sorte de Bulbe, appelée en Grec Βουλβή ἐσθητική. en Latin *Bulbus esculentus*, c'est à dire Bulbe à mêger : en haut Aleman il s'appelle *Spundtschnoblauch*: en bas Aleman *Spundtschoch*, c'est à dire Ail de chien.

LE TEMPERAMENT.

Le Bulbe de iardin est chaud & sec, ce que demontre asses l'amertume & adstriction d'ond il est participant.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Bulbe de iardin engendre gros sang & froid, & est de difficile digestion, & il ense: mais bou A ly deux fois en eau ou dauantage, il nourrit mieux, & mengé avec vinaigre, huile, & garam, il est plus saoureux, & nourrit plus, & n'est pas si flatueux, & est plus facile à digerer.

Iceluy induict appaise dislocatiōs, & douleurs de ioinctures, & tire hors les espines & eschardes. B On l'induit avec miel, ou à part soy sur vlceres rongeurs & podagres : & avec miel & poudre C de poyure bien deliée, sur tumeurs hydropiques & morsures de chien.

Il allege douleurs d'estomach, & arreste la sueur : & cuit en vinaigre & mengé, il ayde contre D rompures.

Il nettoie la teste des furfures, & vlceres coulans applique avec Nitrum rosty. Il efface les lentilles, induict avec miel & vinaigre, & les contusions, à part soy ou avec le iaulne d'un œuf & brûlé, puis meslé avec alcyonium, oste les taches du visage & cicatrices noires, induict au soleil,

# 450 Du Bulbe, ou Oignon fauuaige. Ch. LXXVII.

LES NVISANCES.

*Bulbus syluestris.*

Oignon fauuaige.

Il engendre froid & gros sang, & si on en mége beau coup, il debilité les nerfs.

Du Bulbe. Chap. LXXVII.

LA FORME.

Ceste herbe a les faucilles loügues comme l'Ail, mais peu souuét plus de deux, entre lesquelles croist vne tige ronde, creuse, d'environ vne paulme de haut: au sommet d'icelle croissent plusieurs fleurs iaulnes en forme d'estoille, lesquelles se tournent en chapiteaux ou si liques triangles: la dedans est la graine contenue. La racine est ronde comme vn Oignon.

LE LIEV.

Cest Oignon croist en plusieurs lieux d'Alemaigne, en lieux sablonneux, autour des valées & ruisseaux, aucunesfois aussi sous les hayes. LE TEMPS.

Ce Bulbe fleurit en Mars, & est en graine au mois d'Auril, puis peu apres s'esuanouyt, tellement que le mois de May & apres, on n'en trouue ne tiges, ne faucilles.

LES NOMS.

Comment ce Bulbe ayt esté appelé des Anciens, il n'est pas encore certainement cognu. Aucuns pensent que ce soit *Bulbina*: les autres en font *Salbog id'nd'wog*, c'est à dire *Bulbus esculentus*, mais selon l'opinion d'aucuns sçauans & la nostre, ce Bulbe n'est ny l'un ny l'autre. Pourtant l'auons nous appelé *Bulbus syluestris*: les hauts Alemans le nomment *ffesdystoisel*, ou *Alchertstoisel*: & là selon en bas Aleman *Best Myeyyn*: en François Oignon fauuaige.

LE TEMPERAMENT.

Cest Oignon fauuaige est chaud & sec iusques au second degré, ce qu'on peut cognoître par son amertume & adstriction.

LES VERTVS ET OPER.

- A Ceux qui ont expérimenté ce Bulbe, disent qu'il mollifié & resout les tumeurs, appliqué dessus.  
 B On l'applique aussi vilement sur vicerés humides, pourris, rongés & phagedéniques, cuist peu micrement sous les cendres, & puis broyé avec miel.

De l'Ornithogalum. Cha. LXXVIII.

LA FORME.


Ceste espece de Bulbe a au commencement longes faucilles, estroictes, herbues, d'environ vne paulme de long: Entre icelles prouient vne tige verte, & ronde, d'environ vne paulme de haut, portant quatre ou cinq petites fleurs, vertes par dehors & blanches par dedans, nō guere différentes en figure à vne fleur de Lys, signamment ausc qu'elles soyent du tout ouuertes, beaucoup toutesfois plus petites. La racine est ronde comme vn Oignon ou Bulbe, blanche par dedans & par dehors, fort glueuse comme la Cōsoulde grande, quand on la rompt par pieces: de goust quelque peu acre.

LE LIEV.

Ceste herbe croist en lieux sablonneux, cultivés & bien



Ornithogalum.



& bien exposés à l'air, & se trouue en plusieurs endroits de Brabant, signamment autour de Malines, bien pres par tous les champs. LE TEMPS.

Les faucilles de ce Bulbus viennent premierement en Mars & Auri, & les fleurs en May. Et environ le mois de Iuin on ne le void plus.

LES NOMS.

Ceste herbe est appelée en Grec *ἐπιστόμαρον* & en Latin *Ornithogalum*: incogne é Bouitiques en bas Aleman *wit Belz Nyeuyn*, c'est à dire Oignon sauuaige blanc, pour ce que nous ne scauons au tre nom.

LE TEMPERAMENT.

Ce Bulbe est temperé en chaleur & secheité.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Dioscoride dict qu'on le peut manger crud & cuit comme l'on veut.

Il est aussi fort propre à soulder playes nouvelles, appliqué dessus comme la grande Cōfoulde. A B

De la Squille. Chap. LXXIX.

ES ESPECES.

Il se trouue pour le iourd'hui deux especes de Squille: l'une portant fueilles étroictes, laquelle est la vraye Squille: & l'autre a fueilles larges, de laquelle on vse vulgairement pour Scilla.

LA FORME.

1 Les Bulbes de la premiere & vraye Squille sont fort grands & gros, & plus blancs que les bulbes de la Squille vulgaire. Les fueilles sont longues & étroictes, & de couleur grisâtre.

2 La Squille vulgaire a aussi les bulbes grands & espés, mais le plus souuent plus roux, & les pelures & tuniques plus espesses que l'autre. Les faucilles sont grâdes & larges pres semblables aux fueilles de Lys. Les fleurs petites & iaulnes croissent au plus haut le long des tiges, puis vient la graine.

LE LIEV.

La Squille ne croist pas de soy meime en ce pais, mais on l'ameine d'Espaigneicy pour en vsér en medecine, dont aucuns la plantent en leurs iardins.

LES NOMS.

1 La premiere espece de cest Oignon estrange est appelée en Grec *ἐπιστόμαρον*: & en Latin *Scilla*: é Bouitiques *Squilla*: en François *Sépouille*, *Squille*, ou *Oignon de mer*: en haut Aleman *Weyerswiel*: en bas Aleman *Wit Nyeuyn*: de Serapio *Cepe maris*, c'est à dire Oignon de fouris.

2 La seconde espece est vsurpée par la plupart des Apothicaires pour *Squilla*, combié que ce ne soit la vraye, mais est celle que les Grecs appellent *παραπέριον*: les Latins *Panacratium*, lequel a pareilles vertus que la Squille, pourtant on peut on bien vsér sans au cune erreur au lieu de Squille. Et ceste cy est aussi te nue du scauant Pierre Belon pour vn *Bulbus litoralis* de Theophraste, avec lequel il a grande similitude: car le *Panacratium* de Dioscoride & le *Bulbus litoralis* de Theophraste ne semblent qu'vn.

LE TEMPERAMENT.

La Squille est chaude iusques au second degré, & seche au tiers, de fort subtiles parties, incisive & digerente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Squille apres l'auoir couuert de paste, & rosty dans vn four chaud, ou sous les charbōs, tāt A quelle soit bien molle, & prinse à la quantité d'vn culier ou deux avec la huitiesme partie de sel, fait aller à selle & pouffe hors quant & quant les humeurs lentes & glueteuses.

Icelle rostie en ceste sorte, est vilement meslée parmy medocines qui font vriner, & qui seruēt B contre hydropisie, iaulnisse, rouctis, & trenchés de ventre.



# 452 Del'Asphodel,ou Hache royale. Cha. LXXX.

- C Prinse avec miel & huile, tue & pouille hors les vers longs & les ronds.
- D On la mesle non sans grand prouffit avec medecines propres contre toux enuiseillie, & courte haleine, & qui font cracher les phlegmes visqueuses amassées au creux de la poitrine: car prinse en ceste sorte, elle digere les grosses humeurs, & les fait sortir.
- E Icele acoustrée avec miel, lasche tout doucement le ventre: Pareille vertu a aussi la graine prinse avec figues & du miel.
- F Vne pecture ou deux de la racine de Squille tenues sous la langue toutes crues, estanchent la soif aux Hydropiques, se dict Pline.
- G La Squille cuicte en vinaigre tant qu'elle soit amollie, & broyée bien menu, est vtilement appliquee sur morsures de sanfues, serpens & semblables bestes venimeuses.
- H On applique vtilement le dedans de la Squille cuicte en huile ou terebinthine, sur cretures & fendasses des pieds, pareillement sur mules à talon, & poreaux, signamment quand elle est rostie sous les cendres.
- I En la mesme sorte, elle guerist vlceres coulans de la teste, & les surfures ou paillettes induictes dessus.
- K Les sneilles de Squille digerent & dissouvent les strumes & glandes, mises dessus par quatre jours.
- L Pythagoras dict que la Squille pendue à l'entrée ou porte de la maison, l'engarde de tout malheur & enchanterie.
- M Berytus dict que quand les fleurs de Squille sont brunatres, & qu'elles ne tombent ou perissent facilement, que l'année sera fort fertile, & y aura beaucoup de Bled.
- N Pancratium a les vertus & operations fort semblables à Squilla, si ce n'est qu'il n'est pas si fort ne vertueux, Et on en peut vser au lieu d'icelle en toutes choses, tesmoing Galien, & on le prepare en la sorte que Squilla, se dit Dioscoride. **LES NVISANCES.**
- O La Squille est vn medicament fort acre, subtil & digerent, nuisible & forçant la nature de l'homme, prinse, ou vsée crue: Pourtant, se dit Galien, n'en doit on point vser, si elle n'est premierement cuicte ou rostie.

## De l'Asphodel,ou Hache royale.

*Asphodelus mas.*  
Hache royale male.



## Chap. LXXX.

*Asphodelus femina.*  
Hache royale femelle.





## LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Hache royale, à sçavoir Malle, & Femelle.

## LA FORME.

1 La premiere espee de Hache royale porte longues fueilles, estroictes, comme le Poreau, entre lesquelles prouient vne tige ronde, d'vne coudée ou coudée & demy de haut: sur laquelle depuis le milieu iusques au plus haut croissent des belles fleurs blanches, ou de couleur incarnée fort pal-  
le, qui commencent à fleurir par bas, & finissent par haut. Icelles passées y vient de filiques petites, rondes, comme ployées, lesquelles s'entrouarēt en trois endroits estans meures: là dedans est vne graine brunatre. Les racines croissent par amas comme à la Piuoine femelle, chacune de la forme d'un gland long & gros, ou quelque peu plus longue, vn petit funguse par dedens, de gouft au cō-  
mencement quelque peu astringent, puis apres amer, toutesfois non guere estrange en gouft, de sorte que ce n'est de merueille, si on a par cy deuant mangé ceste racine, comme Hesiodē raconte & aucuns autres.

2 La seconde espee d'Asphodel a aussi les fueilles estroictes, comme la dessus dictē, plus petites toutesfois & plus courtes, entre lesquelles vient aussi vne tige droicte & vnic, d'enuirō deux pieds de haut, depuis le milieu iusques au puls haut reuelue de fleurs palles, parties en six, nō guere dif-  
ferentes aux fleurs de l'autre Asphodel. Icelles passées y suruiuent de petites filiques triangles, dans lesquelles est la graine. La racine de ceste est ronde comme la teste d'un Oignon, bien pres sembla-  
ble à la racine du Bulbe de iardin, mais vn peu plus grande. Brief ceste hache royale n'est guere differente à la premiere sinon quant à la racine, qui est la plus grande diuersité qui soit entre ces deux herbes; car elles ne different guere l'vne à l'autre de fueilles, tiges, fleurs, & semence, sinon que les fueilles de ceste cy sont plus courtes, & les fleurs plus loing l'vne de l'autre, & non si espes amassées ensemble.

## LE LIEV.

La Hache royale ne se trouue point en ce pais, sinon es iardins des Herboristes auquelz ilz la sement & plantent.

## LE TEMPS.

1 La premiere espee de Hache royale fleurit en May, & est en graine au moys de Iuin.

2 La seconde est aussi en fleur & graine en Iuin.

## LES NOMS.

Ceste herbe se nomme en Grec ἀσφιδελος: en Latin *Albus*, & *Hastula regia*: es Bouti-  
ques *Affodilus*: en François Hache royale ou Asphodel: des Herboristes & vulgaire de Brabant *Affodilten*. La fleur avec la queuē est appelée en Grec ἀνθρακός, *Anthracicos*: & en Latin selon Pline, *Albus*.

1 La premiere espee est appelée *Asphodelus mas*, & *Hastula regia mas*, & ceste cy est celle que Diof-  
cotide décrit.

2 La seconde s'appelle *Asphodelus femina*, & *Hastula regia femina*, & est celle que Galien décrit.

## LE TEMPERAMENT.

1 La Hache royale, la racine principalement de la premiere espee, est chaude & seche iusques  
au second degré.

2 Les racines de l'autre espee sont chaudes & seches iusques bien pres au tiers degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 La racine de la premiere espee, principalement bousie & prinse en breuage, prouoque l'vrine, A  
& les fluxeurs aux femmes.

Icelle prinse au poid d'vne drachme avec du vin, guerit mal de costē, la toux, contraction de B  
nerfs, conuulsions, & rompures.

Elle prouffit aussi grandement contre morsures de bestes venimeuses, si on en boyt à la quan- C  
tité de trois drachmes avec du vin, & applique dessus la morsure les fueilles, fleurs, & racines poi-  
sifries ensemble.

La graine & les fleurs de la Hache royale beuēs en vin, sont fort bonnes contre venin de scor- D  
pions, & autres bestes venimeuses: pareillement elles laschent le ventre.

La racine cuicte en lie de vin, est vilement appliquée sur vlcères pourris & rongeurs, & sur vlce E  
res enuicillis & apostemes des mammelles & genitoires. Elle vaut aussi contre apostemes fresches  
& qui ne sont que commencer, appliquée dessus en forme d'emplastre avec farine d'Orge rostie.

Le ius de la racine cuicte avec bon vin vieil, quelque peu de Myrrhe & de Saffrā, est vn fort bon F  
medicament pour les yeux, esclarcissant & aiguisant la veuē.

- G** Iceluy à part foy, ou meslé avec encens, miel, vin & myrrhe, guerit les oreilles pleines de boue & matiere purulente, infillé dedans.
- H** Iceluy préparé en mesme sorte, guerit douleur de dens, distillé de dans l'oreille contraire au costé là ou est la douleur.
- I** Les cendres de la racine bruslée, signamment de la seconde espee, guerissent vicerés malings de la teste, & remplissent la teste pelée de cheueux, induictes dessus.
- K** L'huile cuitte dans les racines, ou dedans laquelle les racines ont este cuittes, guerit bruslures, mulles à talon, & appaise la douleur d'oreilles.

## De la Vigne.

## Chap. LXXXI.

## LES ESPECES.

**I**L y a beaucoup de sortes de Vignes, mais par dessus tout il y en a deux sortes: la Vigne cultiuée & la Vigne sauuage, selon le tesmoignage de Dioscoride & des Anciens. La Vigne cultiuée est de diuerses sortes, tant en figure, que en couleur, tellement qu'il est bien difficile de nombrer, ou de reduire par escrit toutes les especes: pourtât il suffira que nous partissions la Vigne cultiuée en trois especes: dont la Premiere est bien rouge, & en vient vn ius brun rouge, lequel on appelle Teincture: la Seconde est bleue, dont en fort vn ius cler & blanc, lequel toutesfois deuiet rouge si on le laisse reposer en la cuue: La tierce blêche, dont vient le vin blanc, lequel demeure blêc. Et toutes ces especes de Vigne cultiuée ressemblent l'une à l'autre de feuilles & de boys.

## LA FORME.

## Vins Vigne cultiuée.

La Vigne a plusieurs rameaux gressés, ligneux, couuerts d'une ecorce tendue & creuée, d'ou prouiennent nouueaux reinsaux nouëux ou genoillés, produysans à chacun neud feuilles larges, crenées, & communement parties en cinq, & de longs capreoles & filets, par lesquels elle s'attache aux arbres, paux, estaches, & tout ce qu'elle peut attein dre. Ces mesmes reinsaux produisent aussi pour la plus part au second, tiers, & quatriesme neud premierement de petis bouquetz à fleurs blanches, puis apres de belles grappes de plusieurs raisins amassés ensemble, dans lesquels se trouuent de petis grains, qui sont la semence de la Vigne.

## LE LIEV.

La Vigne croist volontiers és montaignes exposées au soleil de mydy, & en pais chaud, comme és Canares & illes circonuoisines, Barbarie, Espagne, Grece, Candie, Sicile, Italie, & plusieurs autres regions chaudes. Elle croist aussi en France, & en Alemaigne le long du Rhin: & aussi en aucuns lieux du pais bas, comme Brabant, Haynau, & Liege: Mais celle qui croist en ce pais bas porte vn vin fort petit, non pour autre chose sinô pour ce que le Soleil n'y est pas assez vehement, & les nuëts y sont courtes. Car tesmoign Constantin l'Empereur. Le soleil doit donner au vin la force & vertu, la nuëct sa douceur, & la lumiere de la lune sa meurisson. Pourtant sont les vins de Canare, Candie & semblables regions, doux & forts, car le Soleil y luyt fort vehement, & les nuëts y sont plus longues qu'en ce pais. Pour ceste mesme cause sont les vins de Rhin & des regions Septentrionales moins forts & moins doux & amiables, pour ce que les nuëts y sont plus courtes, & que le Soleil y a moindre force. Pour la mesme raison ny en croist il point en Norueghe, Swede, Dennemarck, Vvestphale, Prusse, & autres regions froides: car les nuëts y sont fort courtes en zsté, & la vertu du soleil y est petite.

## LE TEMPS.

La Vigne fleurit en haute & basse Alemaigne, enuiron le commencement de Iuin. Et les raisins sont



font parfaitement meurs en Septembre. Vn moys apres c'est à scauoir en Octobre, on presse le vin, & on le met en tonneaux, pourtant s'appelle le moys d'Octobre en Aleman *Wijnmaent*.

## LES NOMS.

La Vigne cultiuée s'appelle en Grec *ἀμπέλαιος* & *ἐνέφορος*, & *κρέατος*, *ἴμπερος*; en Latin *Vitis vinifera*; en haut Aleman *Wierre*; en bas Aleman *Wijngraent*.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles & reinfeaux avec les capreoles sont froids, secs, & astringens, pareillement les grappes verdes; mais les raisins meurs sont chauds & humides iusques au premier degré, & sechés ilz sont chauds & secs tesmoing Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le ius des fueilles verdes de la Vigne, des reinfeaux & capreoles, beu, prouffite à ceux qui crachent sang, contre la dysenterie, aux femmes enceintes qui ont mauuais estomach. Pareille vertu ont les reinfeaux & capreoles prins à part eux; & la graine qui se trouue au fruiçt cuicte en esue & beuë.

Iceux capreoles & fueilles de Vigne pilés avec farine d'Orge rostie, sont vtilement appliqués sur douleur de teste prouenant de chaleur, & sur viceres chauds de l'estomach.

La Cendre de farmens secs bruslés induicte avec vinaigre, guerist condylomates & excrescences du fondement, lesquelles on auroit au parauant couppees.

Icelle dissolue en huile rosat & vinaigre, est vtilement induicte sur morsures de serpens, sur dislocations, & ratelle chalereuse & inflammée.

Les raisins verts engendrent ventositez au ventre & en l'estomach, & laschent le ventre.

Les raisins secs, sont fort bons contre la toux, & contre toutes maladies des poulmons, des rongons, & de la vessie.

Ilz sont aussi fort bons, tesmoing Galien, contre oppilations & debilité de foye, car ilz le desopilent & le renforcent.

La decoction des pepins de raisins sert contre dysenteres, & flux de ventre, si on la iette dedans le corps à tout vn clystere.

Elle arreste aussi les fluxeurs des femmes par trop abondantes, si elles se baignent dedans.

Les dis pepins pilés bien menu & induicte avec sel, digerent les tumeurs, & descendent les mammelles entières.

## De la Vigne sauuage. Chap. LXXII.

## LES ESPECES.

Vigne sauuage est de deux sortes, comme dit Dioscoride: l'une porte fleurs & raisins, mais les raisins ne meurissent point: l'autre porte de petis raisins qui viennent à maturité.

## LA FORME.

La Vigne sauuage ressemble fort à la Vigne cultiuée de farmens, fueilles, & capreoles. Dont la premiere espeece porte fleur, & puis apres le fruiçt comme la Vigne cultiuée: mais le fruiçt ne meurit point, & ne scait paruenir à maturité. La seconde espeece porte de petites grappes pleines de petis raisins, lesquels meurissent, & sont seches comme les gros raisins. Et on en faicte de petis raisins secs appelez communement Raisins de Corinthe.

## LES NOMS.

La Vigne sauuage s'appelle en Grec *ἀμπέλαιος*, & *ἐνέφορος*; en Latin *Vitis syluestris*, & *Libraica*.

La grappe desflorie de la premiere espeece de Vigne sauuage, & pareillement la fleur, est appelée en Grec *ἀνέμης*; & en Latin *Oenanthe*.

Le ius que lon presse des raisins de ceste Vigne, & pareillement de toutes grappes de raisins verdes, tit de la Vigne cultiuée, que de la Sauuage, s'appelle en Grec *ἐμπέσιον*; & en Latin *Omphacium*: és Boutiques Agreste en François Verius, d'aucuns Aigras.

Le fruiçt de la seconde espeece est appelé és Boutiques de ce païs *Passule de Corinthe*, ce sont Raisins de Corinthe.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles, farmens, & pareillement les capreoles de la Vigne sauuage ont telle vertu & faculté que les fueilles, farmens, & capreoles de la Vigne cultiuée, & le Verius. Les Raisins de Corinthe sont chauds & humides, de temperament & facultés non guere differens aux Raisins de cabas.

- A Les fueilles, sarmens, & capreoles de la Vigne sauuage, sont de pareille vertu & operation que les fueilles, sarmens, & capreoles de la Vigne cultiuée, & daissent à tout ce à quoy ceux de la Vigne cultiuée sont bons.
- B La fleur & grappe desflorie de la premiere espece sauuage, arreste le flux de ventre, & estanche tout flux de sang.
- C Appliquée par dehors sur l'estomach, prouffite contre dissolution d'estomach & rouchts, aussi fait elle si on la mengé.
- D Elle appaise aussi douleur de teste, versée ou appliquée sur icelle avec vinaigre & huile rosé, & prouffite grandement sur vicerés rongéans des genitoires.
- E Le Verrus ne differe point quant aux facultez à la grappe desflorie, & non meuse, signamment quand il est seché & reduict en poudre: & ainsi mis en ceure, c'est vn tresbon medicament pour l'estomach debile enflammé: car il le renforce, & le rafraeschit, en quelle sorte qn'on en vie, soit en viandes, ou autrement.
- F On fait vn Syrop avec du verius & du siccre ou du miel, lequel est fort bon contre la soif & sieures chaudes, & contre fluctations, vomissemens, & subuertissemens d'estomach ayans prins leur commencement des humeurs cholériques.
- G Il est aussi tresbon aux femmes grosses pour leur donner bon appetit, & leur oster tout appetit desordonné, & pareillement guerir fluctations & vomissemens.
- H Les Raisins de Corinthe ne font guere differens en vertu aux Raisins de Cabas,

Fin de la Cinquiesme partie de l'Histoire  
des Plantes.

# LA SIXIESME PARTIE DE L'HISTOIRE DES PLANTES, CONTENANT

LA DESCRIPTION DES ARBRES, ARBRISSEAUX,

Buiffons, & toutes Plantes ligneufes, avec leur fruit, re-

fine, gomme, & liqueur: pareillement leur differen-

ce, forme, nom, temperament, vertu

& operation.

PAR REMBERT DODOENS.

De la Rose.

Chap. I.

## LES ESPECES.

**I**L y a plusieurs especes de Roses, dont les vnes sont cultiuées & odoriferantes lesquelles on plante es jardins, & les autres sont sauvages croiffans d'elles mesmes aux bors des champs. De la Rose cultiuée, on en trouue principalement cinq especes, lesquelles fleurissent au commencement de l'esté, & vne qui fleurit aussi plus tard en Septembre.

### LA FORME.

1 La premiere espece de Rose cultiuée est la Rose blanche, laquelle a tiges ou verges longues, ligneufes, de .x. xij. ou xx. pieds de haut, aucunes fois plus hautes quand elles sont bien menées, pleines en plusieurs endroits d'espines aigues & crochues. Les feuilles sont longues, rassemblées de cinq ou sept feuilles l'une contre l'autre, d'ond chacune à part soy est crenelée tout à l'entour comme vne sie, & cru de. Les boutons croiffent entre les feuilles sur courtes queue, couverts de cinq feuilletes, dont les deux sont barbues à chaque costé, les deux non barbues, & la cinquieme barbue seulement d'un costé. Les boutons ouuers, apparoiffent de belles Roses odoriferantes & plaisantes, de couleur blanche, & au milieu plusieurs cheueux jaunes. Les fleurs tombées il y croiffent de chapiteaux ronds, rouges quand ilz sont meurs, d'as lesqz est vne graine dure en clofe, enveloppée d'une laine. La racine du Rosier est ligneuse & brachue ecome la racine des Arbrisseaux

2 La seconde espece de Rose cultiuée, qui est rouge, ressemble à la Rose blanche de feuilles, reinsaux, & branches, elle ne parvient toutesfois iamais à si grande hauteur, & les branches ne sont pas aussi grosses. Les fleurs sont rouges, odoriferantes, semblables en figure aux blanches.

3 La tierce espece sont celles qu'on appelle Roses de Prouince, elles ont les reinsaux pareils à la Rose rouge, sinon qu'elles croiffent plus haut, non pas toutesfois si haut que la Blanche, tellement que ce semble vne espece moyene entre la Rose rouge & blanche, ce que demontrent aussi les fleurs car elles ne sont ni rouges ni blanches, mais ont vne couleur moyenne entre le rouge & le blanc, bien pres incarnée, au reste semblables aux autres.

4 La quatrieme espece sont les Roses brunatres de Prouins, lesquelles ressemblent bien pres aux autres de reinsaux & de feuilles. Mais les fleurs d'icelle sont de belle couleur rouge obscur, & d'odeur fort plaisante. Celles icy sont les meilleures pour en vser en medecine.

5 La Cinquieme espece est vne sorte de Rose simple, & petite, appelée Rose sentant la Canelle. Les feuilles de laquelle sont plus petites que les feuilles des autres, les reinsaux gressés,

Rose. Le Rosier.



reueftus d'efpines, de couleur brunatre, croiffans bien pres à la longueur des Roses de Prouince. Les fleurs font petites, fingles, odoriferantes, de couleur palle en rouge.

La fixiefme efpece de Roses, appellées Roses musquettes, a aufsi les reinfeaux plus greffes, les 6  
fueilles & fleurs plus petites que les autres Roses, Elle croift toutesfois bien pres au fi haut que la  
Rose de Prouince. Les fleurs font petites, fingles, de couleur blanche, & d'odeur plaifante, nō gue  
re differentes en figure aux Roses fauuages, ou Roses sentans la Canelle.

La Rose fauuage a les fueilles rudes, piquantes, les branches & reinfeaux pleins d'efpines, com- 7  
me la Rose cultiuée, toutesfois les reinfeaux font plus greffes & les fueilles beaucoup plus petites.  
Les fleurs font aufsi fingles de couleur blanche, ou tirant sur l'incarné, fans aucune odeur. Lequel  
lestombés, y furiuent des boutons ronds comme à la Rose cultiuée, dans lefquelz est contenue  
la graine enuoloppée d'une laine houlfue. Sur ce Rosier fauuage croift fouuēt vne boulle houlfue  
de couleur verte tirant sur le rouge, & se trouue enuiron le mois de Iuin.

Entre les efpeces de Rose fauuage, s'en trouue vne qui a les reinfeaux du tout couuers d'efpines 8  
aigues: les fleurs petites, fingles, & blanches, de bien bonne odeur. Toute la plante est basse, & la plus  
petite d'entre les Roses tant domestiques que fauuages.

On peut bien nōbrer aufsi entre les efpeces de Rose l'Englé tier odoriferēt, lequel refemble au 9  
Rosier fauuage de reinfeaux, & branches houlfues & espineufes. Les fueilles ne leur retirent pas  
mal, plus verdes toutesfois & d'odeur fort amyable. Les fleurs font fingles, plus petites que la Ro-  
se fauuage, de couleur blanche pour la pluspart, aucunefois rouge, apres lesquelles viennent aufsi  
des chapiteaux comme aux autres Roses, de dans lefquelz est en close la graine.

## LE LIEU.

Les Roses cultiuées & l'Englé tier se plantent es jardins. Les Roses fauuages croiffent en plu-  
sieurs endroits de Brabant & d'autres pais, le long des hayes, pres des fosses, & en autres lieux in-  
cultiuéz entre les hayes & espines. La huitiefme efpece croift sur les digues, & bord de la mer de  
Flandres.

## LE TEMPS.

Les cinq premieres efpeces de Rose cultiuée fleuriffent en May & en Iuin, pareillemēt les Roses  
fauuages & l'Englé tier. Mais les Roses musquées fleuriffent en May, & puis derechef en Septēbre,  
ou là enuiron.

## LES NOMS.

La Rose se nomme en Grec *ῥόδον*: en Latin *Rosa*: en haut Aleman *Rose*: en bas Aleman *Roofe*:  
Les fueilles de la fleur font appellées en Latin *folia Rosarum*, c'est à dire fueilles de Roses.

Les ongtes, c'est à dire le bout blanc des fueilles par lequel elles sont attachées au chapiteau, &  
lequel on coupe ius quand on veut faire conserue ou syrrop de Roses, s'appellēt en Latin *ungues  
rosarum*, & en Grec *ὄνυχες ῥόδου*.

La cheuelure iaulne qui croift au milieu de la Rose est appellée en Grec *ῥόδον*: *ῥόδον* en La-  
tin *stos Rosa*: es Boutiques & des medecins Arabes *Anterra*, c'est à dire la fleur de la Rose.

Le bouton des Roses auant qu'il soit ouuert est appellé *Calix*.

Les cinq fueillettes qui stourent le bouton & le commencement des Roses, se nomment *Cortis  
ces Rosarum*, c'est à dire l'escorce de la Rose.

Les ronds chapiteaux, sur lesquelz les fleurs croiffent, & dans lefquelz la graine est contenue,  
s'appellent en Latin *Capita Rosarum*: en Grec *κεφαλαί ῥόδου*.

La premiere efpece de Rose cultiuée, est appellée en Italie *Rosa Damascena*, en ce pais *Rosa d'ibe*: en  
François *Rose blanche*: en haut Aleman *weiß Rosen*: en bas Aleman *witte Roofen*. Et ceste efpece  
semble celle que Pline appelle en Latin *Campans Rosa*.

La seconde efpece de Rose est nommée *Rosa purpurea*, & *Rosa rubra*: en François *Rose rouge*: en  
haut Aleman *rotter Rosen*: en bas Aleman *rotte Roofen*. Et sous ceste efpece sont comprises les  
Roses que Pline appelle en *Trachinias*, entre lesquelles *Rosa Mæstia* sont les plus brunes rouges.

La tierce efpece est appellée en ce pais Rose de Prouince: en bas Aleman *Prouinse Rosen*: en  
haut Aleman *Liebsfarbig Rosen*, lesquelles sont par uerture celles que Pline appelle *Alabâdica Rosa*.

La quatriefme efpece s'appelle Rose de Prouince: en bas Aleman *Prouinsech Rose*, à la difference 4  
des autres Roses rouges, Et celles icy semblent estre *Rosa Mæstia* de Pline.

La cinquieme efpece est appellée des Herboristes Brabançons *Cantrel Roofens*, c'est à dire 5  
Rose sentant la Canelle, & c'est par auenture *Rosa prænensis* de Pline.

La sixiefme efpece est appellée de Pline en Latin *Rosa coronata*, des Modernes *Rosa sera*, & *Rosa* 6  
*antimaniâ*: en François *Rose musquée* ou *muscadelle*: en bas Aleman *Muschet Roofens*, pour ce  
quelles semblent haïrer le musc.

La Septiefme efpece est appellée en Grec *κροσίδιον*: en Latin *Rosa camina*, & *Rosa syluestris*: en Fra- 7  
çois *Rose fauuage*: en haut Aleman *wilder Rosen*, & *Schickrosen*: en bas Aleman *wilde Roofen*. Ceste  
excroil-

excroissance ronde & velue qui croist souuent sur le Rosier sauuage, est appelée d'aucuns Apothicaires *Bedegar*, mais non sans erreur, car *Bedegar* est le Chardon appelé communement *Carlina*.

8 La huitiesme a prins son nom en bas Aleman du lieu de sa naissance *Dwyn rooskens*, & semble que ce soit ce que les Grecs appellent *κωνόβατον*: en Latin *Coniubus*, & *Rubus canis*, & de Pline *Rosa spinosa*.

9 La dernière espece est appelée de Pline en Grec *λυχνίς*, *Lychnis*: en Latin *Rosa Graeca*: en François & bas Aleman *Englentier*.

LA CAUSE DV NOM ET L'HISTOIRE.

La Rose est appelée en Grec *Rhodon*, pour ce quelle rend abondamment bonne odeur & fort plaisante, comme dit *Plutarque*.

On trouue aussi par escrit, que les Roses estoient au commencement toutes blanches, & que de puis elles sont deuenues rouges du sang de la Deesse *Venus*, ce qui aduint en ceste sorte.

*Venus* ayant le damoyfel *Adonis*, estoit aymée de *Mars*, lequel voyant que *Venus* portoit plus grande amour à *Adonis*, tira luy, tua *Adonis* esperant que *Venus* par ce moyen oublyroit son *Adonis*, & tourneroit toute son amour sur luy. Ce questant cognu de *Venus*, elle est courue en grand haste au secours d'*Adonis*, & tomba inaduertissamment entre des Rosiers, ou elle se blessa aux pieds de telle sorte, quil en sortit abondance de sang, dont les Roses furent arroufées & deuiendrent toutes rouges, laquelle couleur leur est demourée à la memoire de *Venus*. Les Autres escriuent que *Venus* saillit tout de saict anisé dedans les Rosiers, courroucée de ce que *Mars* auoit occis son amy *Adonis*.

Aucuns disent que les Roses sont deuenues rouges du bruage celeste *Nectar*, qui fut respandu par *Cupido*, lequel se iouant à la table des Dieux, de ses ailes renuersa le pot ou estoit le *Nectar*. Et pourtant dit *Philostratus*, que la Rose est la fleur de *Cupido*.

LE TEMPERAMENT.

Les feuilles de la Rose cest à dire des fleurs, sont de complexion chaude, & vn peu humide, en partie toutesfois astringente. La fleur, cest à dire la cheulure qui croist au milieu de la Rose, est seche & manifestement astringente: de semblable temperamēt sont aussi les boutons, chapiteaux, & fruitz, & ceste excroissance ronde & houeue qui croist sur le Rosier sauuage.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le ius des Roses, signamēt de celles qui sont les plus rouges, ou l'infusion, ou decoction d'icelles, est du nombre des Medecines douces & amiables, qui laschent le ventre, & qui se peuent prendre sans danger. Il purge par bas les humeurs bilieuses, & ouure les obstructions du foye, le renforçant, & nettoyant, dauantage il est bon contre toutes sieures chaudes, & contre la iaunisse.

Il est bon aussi d'en vser contre palpitations & tremblement de cueur, car il oste & chasse toutes humeurs malignes, hors des veines & arriere du cueur.

Il est pareillement bon de l'induire, sur yeux enflammes, & toutes maladies chaudes, signamment sur feu volage.

8 Les Roses broyées menu sont vtilement appliquées sur inflammations des mammelles, mordications & inflammations d'estomach, pareillement sur feu sacré.

Le vij dans lequel Roses seches ont bouilly, est bon à mal de teste, des yeux, des oreilles, des Engenciens, de la vessie, du boyau culier, & des membres de la femme, induict dessus.

Le iaunle qui croist dedas la Rose appelé la fleur de la Rose, arreste le flux des femmes, signamment le blanc, & pareillement tout flux de sang.

Le fruitz mengé arreste le flux de ventre, & semblablement tout flux de sang. G

La Rose sauuage se dit Pline broyée avec gresse d'ours, & induicte sur la teste, est mout vtile cō Htre alopecies.

L'esponge & excrescence qui croist sur le Rosier sauuage, est de grande efficace contre la pierre: Ire, & difficulté d'vrine: car elle fait sortir la pierre & grauelle, & prouoque l'vrine.

Du lasmin.

Chap. II.

LA FORME.

LE lasmin croist en façon de haye, & se laisse mener & estendre comme le Rosier ou la Vigne, il porte mout de reinsaux menus, pleins de neuds, remplis d'vne moelle spongieuse, comme le Sufin. Les feuilles sont de couleur verte obscure, parties en cinq ou sept autres, dont chacune à part soy est vnle & longue, non crenée par les bors. Les fleurs sont blanches, longues, d'odeur douce & plaisante, & croissent quatre ou cinq ensemble au sommet des branchettes.

## LE LIEV.

Le Jasmin croist en aucuns pais de soymels me, comme en Espagne & en Angle terre, En ce pais on le plante le long des vergers.

## LE TEMPS.

Le Jasmin fleurit en ce pais en Juillet & Aoust, mais le fruit n'y vient pas à perfectio

## LES NOMS.

Ceste plante est appellée des Arabes *Zan bab* & *jesmin*, & là selon en France & Allemagne entre les Herboristes *Jasminum*, & les *seminum*, & d'aucuns aussi *jasme* & *josmenum*. Des Modernes aussi en Latin *Apiaia*, pour ce que les mouches à miel se trouuēt volontiers autour des fleurs d'iceluy.

## LE TEMPERAMENT.

Scrapio escrit que le Jasmin est chaud iusques bien pres du second degré, ce que facilement aussi on peut cōprendre par son goust amer. LES VERTVS ET OPER.

- A Le Jasmin guerit la mauuaise gratelle seche & taches rouges, & refout les œdemes & colicētions appliqué dessus.
- B Pareille vertu à l'huile qui est faicte des fleurs de Jasmin, lequel bouté aux narilles ou souuent flairé, faict saigner par le nez.
- C Le Jasmin seche aussi les catarrhes, & humiditez du cerueau, & proufite contre froy des maladies d'iceluy.

## Du Cistus. Chap. III.

## ES ESPECES.

IL y a deux sortes de Cistus selon Dioscoride & les Anciens.

L'vn est vne sorte de plante dont nous te baillons icy le pourtraict.

L'autre est vne plante ligneuse, sur laquelle se trouue ceste humeur ou liqueur grasse qu'on appelle *Ladanum*. (melle.)

La premiere espeece qui ne porte point de *Ladanum*, est aussi de deux sortes, à sçauoir *Masse* & *Fe*

Le *Masse* porte fleurs rouges, & la *Femelle* blanches, au reste semblable l'vn à l'autre.

## LA FORME.

La premiere espeece de Cistus qui ne porte point de *Ladanum*, a les tiges rondes, hoiuēttes, genouillées, fort branchues: les fueilles rondatres lanugineuses, non guere differentes aux fueilles de Saule, plus courtes toutesfois & plus rondatres. Les fleurs croissent au sommet des tiges, semblables de figure à vne rose simple, de couleur rouge au *Masse*, & blanche à la *Femelle*. Puis après suruiennent de calyculs qui contiennent la graine.

A la racine de ce Cistus, se trouue, es regions là ou il croist de soy meisme, vne certaine excrescence, de couleur aucunesfois iaulne, aucunesfois blanche, aucunesfois verte: de laquelle on tire vne liqueur de laquelle on vſe es Boutiques.

La seconde espeece de Cistus, appellée aussi *Le don*, est vne plante ligneuse croissant en forme d'arbrisseau, ayant les fueilles douces, non guere differētes en figure aux autres, mais plus longues & plus brunatres.

Sur ceste plante se trouue vne certaine gresse, de laquelle on en faict *Ladanum*, lequel à la Myxte, & es plus chauds iours, croist sur les nouuelles fueilles de ce Cistus, lesquelles (apres que les fueilles, graine, & vieilles fueilles sont tombées) croissent premierement en xte. Icele gresse ne se cueillit pas seulement des barbes des Cheures qui le paissent (comme Dioscoride & les Anciens escriuent) mais aussi est rassemblée par les hommes en grande diligence avec instrumens à ce conuenables, comme aucuns sçauans Modernes escriuent, & principalement le sçauant *Pierre Belon*, lequel a frequēté & hanté l'isle de *Candie*.





## LE LIEV.

*Cistus non ladanifera.*

1 La premiere espece de Cistus, duquel nous baillons la figure, croist en plusieurs lieux d'Italie, Sicile, Candie, Cypre, Languedoc, & plusieurs autres pais chauds en lieux pierreux, rudes & mal cultivez.

2 La seconde espece se trouue principalement en Cidie, & Cypre, mais aussi en Languedoc.

## LE TEMPS.

1 Nous auons veu florir en ce pais la premiere espece de Cistus en Iuillet.

2 Le second Cistus florit & liure sa graine au Printemps & incontinent apres tombent les feuilles. Sur presté il recoure nouvelles feuilles, sur lesquelles à la Myrte & à ses iours plus chauds se trouue vne gresse, laquelle est diligement rassemblée & sechée.

## LES NOMS.

1 La premiere espece de ces plantes s'appelle en Grec *κίστος* & *κισθία*, d'aucuns *κισθαριον* & *κισθαρον*: en Latin *Cistus*, & *Cistus non ladanifera*.

2 Ce qui croist sur la racine est appelé en Grec *επικίστος*, d'aucuns *Erythron* & *Cytisus*, on en tire vne liqueur, laquelle on appelle aussi *Hypo cistis*, & à des Boutiques *Hypoquistidos*.

3 La seconde espece de Cistus est appelée en Grec *λάδανον* & *λάδανον*: en Latin *Ladum*, *Ladanum*, & des modernes *Cistus ladanifera*.

4 La liqueur grasse qu'on rassemble des feuilles est appelée en Grec *λάδανον*: en Latin *Ladanum* & à des Boutiques *Ladanum*.

## LE TEMPERAMENT.

1 Les fleurs & feuilles de Cistus sont seches au second degré, & quelque peu adstringentes.

2 Ce qui se trouue aux racines, est de semblable temperament, toutesfois plus astringent.

3 Le Ladanum est chaud infques bien pres du second degré, & quelque peu sec & astringent.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

1 Les fleurs de Cistus boullies en vin & beuës arrestent tout flux de ventre, & tout flux de sang, & A  
2 desechent toutes humidités superflues, tant de l'estomach que des autres parties du ventre.

3 Les feuilles de Cistus guerissent & consolident petites playes appliquées dessus. B

4 Hypocistis arreste aussi tout flux de ventre, & a plus forte operation que les fleurs ou feuilles C  
de Cistus, pourtant guerit elle aussi la dysenterie, & les menstrues des femmes trop abondans, & tout flux de sang.

5 Ladanum beu avec vin vieil arreste le flux de ventre, & prouoque l'vrine. D

6 Il est aussi fort profitable contre duretés d'amarry appliqué en forme de pessus, & tire hors la E  
seconde mis sur charbons vis, & le parfum receu par dessous.

7 Iceluy induict sur la teste avec huyle de myrthe, guerit alopecies, car il engarde que le poil ne F  
tombe pas, mais là ou il est tombé il n'en fait point recroistre d'autre.

8 Ladanum distillé à des oreilles avec hydromel ou huile rosat, guerit la douleur d'icelles. G

9 Iceluy induict avec vin sur cicatrices, il les efface. H

10 On le mesle aussi vilement parmy tous vnguens & emplastres, propres à eschauffer, amollir & I  
feder douleurs, & lesquels on applique sur le thorax contre la toux.

## De la Ronce.

## Chap. IIII.

## LES ESPECES.

LA Ronce est de deux sortes, tesmoing Ruellius, Grande & Petite.



## LA FORME.

Rabus. VBI. Ronce.

1 La grãde Ronce a mout de longs sarments & gresles, pleins d'espines poignantes, par lesquelles elle s'accroche aux vellemes de ceux qui paissent apres. Les feuilles sont inegales, rudes, & profond incisees par les bors, de couleur blanche par dessous, & brunastres par dessus. Les fleurs sont blanches, non guere differentes aux fleurs de Fraiser. Puis croist le fruit rouge en brunissant de plusieurs grains amasses en vn, non guere different à vne meure, beaucoup toutesfois plus petit, & plein de ius rouge & vineux.

2 La petite Ronce ressemble en plusieurs sortes à la grande, mais celle icy se traine pour la plus part le long de la terre avec ses reinsaux, lesquels facilement s'accrochent en plusieurs endroits & y fichent racines nouvelles. Les reinsaux d'icelle sont aussi garnis d'espines, les espines ne sont pas toutesfois si aiguës le fruit ressemble aussi à vne petite meure, plus petit toutesfois que le fruit de l'autre, au reste de couleur, liqueur & goust semblable à l'autre. Les racines de toutes deux iettent plusieurs reinsaux gresles lesquels se traient par terre.

## LE LIÈV.

La Ronce croist par tout ce pais le long des chaps & bois & autres lieux semblables couverts.

## LE TEMPS.

La Ronce fleurit depuis le moys de May iusques en Iuillet, & le fruit est meur en Aoult.

## LES NOMS.

1 La Ronce, principalement la grande, est appelée en Grec *ῥόζη* en Latin *Rabus* & *Sennis*: en François Ronces: en haut Aleman *Biemmen* en bas Aleman *Baemen* & *Baermen*.

Le fruit d'icelle est appelé en Grec *μύρρα ῥόζου*: en Latin *Morua rubi*, & *Vacinia*: en Boutiques *Mora bati*, & d'aucuns ignorans *Mora bessi*: en François Meure de Ronce, ou Meurons: en haut Aleman *Brombe*: en bas Aleman *Baermesien* & *Harghebrsten*.

2 La petite Ronce est appelée de Theophraste en Grec *ῥόζη ἡ μικρὴ*, *Chanabau*, cest en Latin *Humulus*. Le fruit d'icelle est appelé en François Catherine.

## LE TEMPERAMENT.

Les nouueaux jettons avec les nouuelles feuilles de la Ronce sont froids & secs iusques bien pres au tiers degré, & de complexion astringente, & pareillement aussi le fruit nō encores meur. Le fruit meur est aucunement chaud & astringent, non pas tant toutesfois que le non meur.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les nouueaux jettons de la Ronce guerissent viceres mailngs & chauds de la bouche & du gozier, & pareillement les amigdales enflées, & la luette, tenus en la bouche & souvent machés.
- B Ilz passerissent aussi les dens, quand on se laue la bouche du ius ou de la decoction d'iceux.
- A ce mesme vaut le fruit non meur vis en mesme sorte.
- C Le ius ou decoction d'iceux beu, arreste flux de ventre, le flux menstruel aux femmes, & tout flux de sang.
- D On applique vilement les feuilles pilées sur la region de l'estomach, contre tremblement de cuer, & douleur & relaschement d'estomach.
- E Elles guerissent hemorrhoides, & refrenent viceres phagedeniques, appliquées dessus.
- F Le fruit non meur, serre le ventre, & arreste la dysenterie & tout flux de sang.
- G Le ius d'iceluy cuit avec miel, prouffite grandement, contre tous viceres chalereux & enflés de la bouche, de la langue, & du gozier.
- H La racine de Ronce est bonne contre la pierre & prouoque l'vrine.



## LA FORME.

LE Framboisier est vne espeece de Ronce, ayât les reinseaux & fueilles non guere differentes à l'autre Ronce, mais non tant rudes, ne piqués, ny garnis de tant ou de si aigues espines, souvent aussi sans espines, signamment les nouueaux reinseaux qui n'ont pas encore vn an. Le fruit est rouge, au reste semblable en figure à l'autre. La racine est longue se trainât par terre, produisant tous les ans de nouueaux iettons, lesquels à la seconde année portent fleur & fruit.

## LE LIEV.

Le Framboisier se trouue en aucûs endroits d'Alemaigne és bois obscurs: en ce país on le plante és jardins, & ayme lieux ombreux, là ou le Soleil ne luyt guere.

## LE TEMPS.

Le Framboisier fleurit en May & Iuin, le fruit est meur en Iuillet.

## LES NOMS

Ceste Ronce est appelée en Grec *Βόρως*: en Latin *Rubus Idaeus*, du môit I da en Asie la mineur, non guere loing de Troie, là ou ceste Ronce croist en abondance, & a esté premierement trouuée: en François Framboisier: en Aleman *Himbeesamen*.

Le fruit de ceste Ronce est appelé en Grec *μύρον Βόρω*: en Latin *Morus rubi Idaeus* en François Framboises: en haut Aleman *Hymbeeren*, & *Hoebereen*: en bas Aleman *Himbeesien* & *frambesien*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Framboises ressemblent aucunement de complexion à la Ronce, non toutesfois si astringentes, & non tant fort sechantes.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les fueilles, nouueaux iettons, fruit & racine de ceste Ronce, ne sont guere differentes en vertu & operation aux fueilles, iettons, fruit & racine de l'autre Ronce, selon que dit Dioscoride.

Les fleurs du Framboisier sont vtilement induictes avec miel sur inflammations des yeux, & sur feu sacré, car elles amortissent le feu sacré.

Elles sont aussi vtilement beuës de ceux qui ont l'estomach debile & douloureux.

## Du Geneste.

## Chap. VI.

## LES ESPECES.

LE Geneste vulgaire est de deux sortes, l'un est haut & esleué, l'autre est petit & demeure tousiours bas, sous iceluy croist *Rapum genistæ*.

## LA FORME.

Le grand Geneste produict au commencement de sa racine des tiges dures, fortes & ligneuses ayans plusieurs branches anguleuses, gresles, longues, & lentes, lesquelles se laissent ployer comme on veut, sans se rompre. Sur icelles croissent petites fueilles noirâtres, entre lesquelles croissent de belles fleurs jaunes odoriferantes, non differentes en figure aux fleurs de Poys. Les fleurs tôbées, il y vient de siliques plattes, dedans lesquelles est enclouë vne graine platte, dure & brumatre. La racine est dure & ligneuse. Ce Geneste croist souvent à la grandeur d'un bien grand homme.

Le petit Geneste ressemble fort au susdict de tiges ligneuses, branchettes menues, petites fueilles, siliques & fleurs, sinon qu'il est beaucoup moindres, & qu'il ne croist point en hauteur, mais de meure tousiours bas, non excédant la hauteur de trois pieds.

On trouue souvent à la racine de ce petit Geneste vne plante q̄ les Brabâsons appellent *Bistrape*, cest



Geneſte. Geneſte.

Rapan geneſte.



ceſt à dire Naueau de Geneſte, lequel eſt attaché à la racine par vn long filé, aucunesfois deux ou trois pieds long ou dauantage de la principale racine. Il reſemble bien pres à vn petit naueau ou poyre, large par bas & eſtroict par haut, couuert d'eſcailletes brunatres, & croiſt aucunesfois ſeu, aucunesfois luy en ſont adioincts des autres petis. Diceluy fort vne tige brunatre, creuſe, d'environ vn pied de haut ou dauantage, portant moult de fleurs longues, blanches en brunifiant, amaſſées enſemble au tour de la tige reſemblans aucunement à vn heaume ouuert, dedans leſquelles paroifſent cinq ou ſix filez, leſquels on voit fortir par l'extremité de la fleur. Les fleurs paſſées y vient de ſiliques longuettes, rondes, petites, dedans leſquelles la graine eſt contenue fort petite & comme ſable, blanchatre, inutile toutesfois & ſterile.

Il ſe trouue auſſi vne plante fort ſemblable à ce Naueau, laquelle reſemble du tout de tiges brunatres & de couleur de boys croiſſans à la hauteur d'vn pied, & de fleurs, & de forme & couleur au Naueau de Geneſte: ſinon qu'elle n'a pas en terre ſi gros Naueau, mais pour la plus part vn bien petit naueau, & aucunesfois non autre choſe que racines fibreuſes entrelaſſées enſemble, ſignammét celle qui croiſt en lieux ſez & ſteriles.

## LE LIEV.

Le grand & petit Geneſte prouiennent és landes ſeches, & autres lieux ſablonneux, le long des ruyes, aucunesfois auſſi és bois.

Le Naueau de Geneſte ſe trouue en terre ſterile & maigre, & lieux ſablonneux à la racine du petit Geneſte, lequel ne vient point à perfection, & ne porte point, ou bien peu de fleurs.

L'autre eſpece ſemblable au ſuſdict Naueau ſe trouue en aucuns champs entre l'Auoyno, les 4 Poyz, Feues, Lentilles & autres grains, là où on croiſt point de Geneſte, & pareillement ſur digues ſeches & brulées le long de la mer.

## LE TEMPS.

Le Geneſte fleurit en May & Iuin. Les ſiliques avec la graine ſont mures en Iuillet.

Le Naueau de Geneſte ſe trouue en Iuin & Iuillet. Pareillement à d'autres plantes qui luy reſemble.

## LES NOMS.

Le Geneſte eſt appelé des Modernes en Latin *Geneſta*, *Geneſta*, & *Geneſta* en haut Alem.

& p'symment en bas Aleman *Bism*, & est sans doute vne espece de *Spartium*.

3 Ceste escescence de la racine du Geneste est appelée des Herboristes, & d'aucuns autres en Aleman *Brem raps*: & en Latin *Rapum Genifla*, & *Rapa Geniftra*, cest à dire Nauveau de Geneste: & est sans faute nulle vne espece d'Orobanche, & *Limodorum*.

4 L'autre espece qui semble audict Nauveau est appelée de Dioscoride en Grec *εραβοάκων*: en Latin *Orobanche* & *Frangula*, ce n'est pas toutesfois l'Orobanche de Theophraste, car elle est appelée de Theophraste *αυραβοάκων*, *Limodorum*, d'aucuns autres, comme de Photion aussi *εραβοάκων*, id est, *Leguminati* lica, elle n'a point le nom François ou Aleman que le sache.

LE TEMPERAMENT.

Le Geneste est chaud & sec iusques bien pres au tiers degré, absterif, & de parties subtiles.

LES VERTV'S ET OPERATIONS.

Les fucilles, branches & sommités du Geneste cuités en vin ou eauë, sont vtilés aux hydropiques, & à tous ceux qui ont obstruction de foye, de ratelle, des rongnôs, ou de la vesie, car en partie elle purge & pouffe hors par le ventre, & en partie par l'vrine toutes humeurs aqueuses, serenses & superflues. Pareille vertu a la graine prise enuiron au poid d'une drachme.

Ladictè graine est aussi vtilement meslée parmy toutes medecines qui prououent l'vrine, & rompent la pierre, car par sa vertu subtile elle ayde l'operation des autres medecines à ce conuenables.

Les fleurs de Geneste meslées avec sein de porc appaisent douleurs de la goutte appliquées dessus. Ceste Geneste a aussi toutes telles vertus que le Geneste d'Espagne, & on en peut vser en toutes les maladies esquelles cèluy d'Espagne est conuenable.

Le Nauveau de Geneste est tenu d'aucuns Empiriques modernes pour vne fort excellènte medecine contre la pierre, & à prououer l'vrine, le bouillant premier en vin puis le donnant à boyre, car comme ilz disent il ouure les opilations des rongnons, il prouoque & fait vriner, il rompt la pierre, & pouffe hors la grauelle.


Le ius d'iceluy frais & nouveau, consolide & guerit toutes playes nouvelles & mondifie celles qui sont empirées & pourries, on en peut aussi vser contre autres vicerès malings, car il les mondifie, & meine à guérison.

Et pour cōseruer mieux ledit ius, apres qu'on l'a tiré des racines nouvelles, il le faut mettre au Soleil iusques à ce qu'il deuienne espes, ou on y adioustra quelque peu de miel, & mettra au Soleil, car adonc sera meilleur & plus propre pour mondifier les playes & vicerès pourris: On en peut aussi tirer, des racines à demy seches, de l'huile conuenable à tout ce à quoy le dit ius prouffite.

Icelle huile nettoye & efface toutes taches, lentilles, & rougeoles de la face & de tout le corps induictes souuent dessus.

Dioscoride escrit qu'on peut manger Orabanche cru ou cuit, comme les reicttons des Asperges

*Spartum.* Geneste d'Espagne.



Du Geneste d'Espagne. Chap.VII.

LA FORME.

Le geneste d'Espagne a aussi les tiges ligneuses, & dou prouiennent de branches longues, gresles, lentes, lesquelles sont ou maës & sans fucilles, ou sommées de fort petites fucillettes çà & là bien loing l'une de l'autre. Les fleurs sont iaulnes non guere differètes aux fleurs du Geneste vulgaire, apres lesquelles il a aussi des siliques, dans lesquelles est contenue vne graine brune & platte comme l'autre Geneste.

LE LIEV.

Ce Geneste croist en Espagne en lieux secz, &

en Languedoc, il ne ſe trouve en ce païs ſinon és jardins des Herboriſtes.

## LE TEMPS.

Ce Geneſte florit en ce païs en Juin & auſſi plus tard, la ſemence eſt meure en Aouſt.

## LES NOMS.

Ce Geneſte eſt appellé en Grec *κατάφυλλον σπυρίδιον*; en Latin *Spartum* & aucunesfois auſſi *Geniſta*, des Herboriſtes de ce païs *Geniſtra* Hiſpanice; en bas Aleman *Spanenſe* *Krum*.

## LE TEMPERAMENT.

Il eſt de temperament chaud & ſec.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les fleurs & ſemence de ce Geneſte prinſes enuiron à la quantité d'vne drachme avec hydro-mel, ſont vomir avec force, comme l'Hellebore blanc, ſans danger toutesfois.
- B La graine prinſe ſeuſe laſche le ventre, faiſant ſortir quant & foy grande quantité d'huméurs aqueuſes & viſqueuſes.
- C Des branchettes trempées en eau, on en tire du ius, lequel prins enuiron vn petit verre plein, prouffite à la Squinace, c'eſt inflammation & douleur de gozzer, & à ceux qui ont la Scianque.

## Du petit Geneſte

## LA FORME.

CE Geneſte n'eſt guere different du Geneſte Vulgaire, ſinon qu'il n'eſt pas ſi haut, ne ſi droit, mais ſe couche bien pres par terre, ayit plu fleurs branches menues prouenans d'vne tige ligneuſe garnie de ſueilles longues & menues, & au ſommet de mout de fleurs belles & iſulnes, non guere differentes aux fleurs du Geneſte vulgaire, plus petites toutesfois, apres lesquelles viennent de ſiliques eſtroictes, contenant vne graine platte. La racine eſt dure comme celle des autres.

## LE LIEV.

Ce Geneſte ſe trouve en lieux incultiuex & baſ fieres, aucunesfois en terre humide & argilleuſe. Il ſen trouve au tour d'Anuers.

## LE TEMPS.

Il florit en Juillet & Aouſt, ou pluſtard, & bien toſt apres eſt la graine meure.

## LES NOMS.

Ceſte herbe eſt ſans doute vne eſpece de Geneſte, pourtant la peut on bien nommer en Latin *Geniſta humilis*, c'eſt Petit Geneſte, en bas Aleman *Zicherbren*. Les hauts Alemans en ſont vn *Flos ſins florius*, c'eſt à dire Fleur à tindre, & l'appellét en leur ſiſage *ſtreblumen*, *Geel ſtreblumen*, & *hey den ſmuck* pour ce que les Teincturiers ſ'en ſeruent à tindre leurs draps en iſuline.

## LE TEMPERAMENT.

Ceſte herbe eſt chaude & ſeche de complexion

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le Petit Geneſte eſt de pareille faculté & vertu que le Geneſte vulgaire mais non ſi tresfort.

## Du Geneſte eſpineux.

## Chap. IX.

## LA FORME.

LE Geneſte eſpineux a mout de verges ou ſions greſſes, ligneux, leſquelz au premier, & eſſans encore nouveaux, ſont pleins de ſueillettes verdres, entre leſquelles croiſſent de petites eſpines, leſquelles ſont tendres & molles & non guere poignâtes. Mais quâd les ſiſes ou verges ont plus d'vn an elles n'ont nulles ſueilles pour la plus part, adôc demieint les eſpines dures & piquantes.

Entre

## Chap. VIII.

*Geniſta humilis*

Petit Geneſte.



Genistella.

Genista spinosa.

Geneste espineux.



Entre les petites feuilles croissent les fleurs de couleur palle en iaulne, & semblables en figure aux fleurs de Geneste, plus petites toutesfois, apres lesquelles prouient de petites siliques pleines de graine ronde & rougeatre. La racine est longue & flechile.

1 La plante que les Brabançons appellent *Gasseldoren* semble bien vne espece de Geneste espineux, laquelle est fort rude & fort espineuse, produisant de verges droictes, ligneuses, sans feuilles, garnies par tout de longues espines aigues dures & fort poignantes, entre lesquelles y vient de fleurettes iaulnes & puis apres des siliques, semblables en figure aux fleurs & siliques du Geneste. Les racines sont longues, croissans de trauers en la terre, & bien pres aussi flechiles & ployables que la racine de l'Arrete beuf. **LE LIEV.**

1 Le Geneste espineux prouient en lieux incultuez, & le long des voyes, & se trouue en plusieurs endroits de Brabant.

2 L'autre espece croist aussi en semblables lieux & se trouue en aucuns endroits de la Champaigne de Brabant & es landes.

**LE TEMPS.**

1 Le Geneste espineux fleurit en May & Iuin.

2 Au mesme temps fleurit aussi la seconde espece.

**LES NOMS.**

1 La premiere plante est appellée des Modernes en Latin *Genistella*, & *Genestella*, c'est à dire petit Geneste: en haut Aleman *Erdt pfrymmen*, d'aucuns hiein *Streichblumen*, & *Stechend pfrymmen*; en bas Aleman *Stechende Bsem*.

2 La seconde espece, veu qu'elle ressemble au Geneste de fleurs & siliques, il semble que ce soit vne espece espineuse & sauvage de Geneste, parquoy on la peut bien nommer *Genista spinosa*, & *Genista spinosa*, c'est à dire en François Geneste espineux ou sauvage: en bas Aleman on l'appelle *Gasseldoren*

desen, Ce n'est pas Tragacantha, cest à dire Hirci spina, ou Paliurus comme aucuns ont pensé,

## LE TEMPERAMENT.

Le Geneſte espineux, principalement les fueilles sont de nature ſeche & astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Les fueilles du Geneſte espineux boullies en vin ou eauſ & beués, arreſtent le flux menſtruel deſordonné des femmes, & le flux de ventre.

B La graine beuë en vin profite cõtre morſures & piqures de ſerpés & autres beſtes venimeuſes

## De l'Arreste beuf.

## Chap. X.

## LA FORME.

Arreste beuf a moult de rameaux greſles, ſoupples, reueſtus de fueilles verdes en noirciſſant & rondes, & d'epines aigues dures & poignantes. Entre leſquelles vient de fleurs odoriferantes ſemblables en figure aux fleurs de Poys, de couleur purpurée pour la plus part, ou incarnée, aucunes fois toure blanche, aucunes fois auſſi iulne comme la fleur du Geneſte, mais fort peu ſouuent, car l'Arreste beuf à fleurs iulnes ſe trouue peu ſouuent. Les fleurs paſſées, viennent de ſiliques petites, pleines d'une ſemence large. La racine eſt longue, fort ſoupple, eſtendant ſes rameaux au large & au long ſous la terre, & nuysit beaucoup au ſoc de la charue en labourant la terre, car à cauſe de leur flexibilité, on ne les peut qu'à grãd peine couper du ſoc de la charrau.

## LE LIEV.

L'Arreste beuf ſe trouue en aucuns endroits de Brabant aux bords des champs gras & fertiles.

## LE TEMPS

Elle fleurit pour la plus part en Iuin.

## LES NOMS.

Ceſte herbe eſt appellée en Grec *ἀνώνη ἢ ἀνώνη* & en Latin *Anonis* & *Ononis*: des Modernes *Arresta bonis*, *Reſta bonis*, & *Remora arari*, d'aucuns auſſi *Aurella*: en François *Arreste beuf*: en haut Aleman *Samhechel*, *Deſſenbeech*, & *Stalbraut*: en bas Aleman *Paangwortel*, & *Stalcrut*.

## LE TEMPERAMENT.

La racine d'Arreste beuf eſt ſeche au tiers de gré & quelque peu chaude.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A L'eſcorce de la racine d'Arreste beuf prinſe auec miel, faiſt vriner, & rompt la pierre: La decoction dicelle faiſte en vin & beuë a pareille vertu.

B Ladicte eſcorce cuicte en miel & vinaigre eſt bonne beuë contre le mal caduc, ſe diſt Pline.

C Icelle boullie en eau & vinaigre, & tenue toute chaude en la bouche, elle guerit mal de dents.

D Les tendrons auant que produire les fueilles, cueillis & conſicés en ſel, ſont conuenables pour menger en ſalade, car ilz prouoquent l'vrine, & font fortir la grauelle ſi on en menge ſouuent.

## Des Couſines.

## Chap. XI.

## ES ESPECES.


Il y a deux fortes de Couſines, Les plus vulgaires ſont noires, Les autres ſont rouges.

## LA FORME.

La plante qui porte les Couſines noires eſt baſſe, ligneuſe, produiſant moult de rameaux, d'environ vn pied de long ou quelque peu dauantage: les fueilles rondes & de couleur verde obſcure, ſemblables aux fueilles de Buys ou de Myrte, leſquelles ſur l'hyuer tombent auec les fueilles des autres arbres, & au Printemps ſortent de nouveau des meſmes braches. Les fleurs ſont rondes, creuſes, ouuertes par deus, & croiſſent le long des braches entre les fueilles. Le fruit eſt rōd, verd





*Vaccinia nigra.* Coufines noires.*Vaccinia rubra.* Coufines rouges.

au premier, puis rouge, & en la fin quand il est meur, noir, plein de jus, de bô & plaisant goüst. La racine est ligneuse, gresle, souple & logue.

B De ceste espece fen trouue aucunesfois qui portent les bayes blanches quand elles sont meures, mais bien peu souuent.

1 La plâte qui porte les Coufines rouges ressemble à celle qui les porte noires de croïsson & branches, sinon que les feuilles sont vn peu plus grandes & plus dures, bien pres semblables aux feuilles d'vn grand Buys, & durent hyuer sans tomber ou peïr. Les fleurs sont incaraées, longues, rôdes, & croïssent par amas à la sommité des brâches. Le fruit est rouge, au reste non guere different à l'autre, de goüst austere & astringent, non toutesfois tant plein de jus que le noir. La racine est aussi ligneuse & longue.

3 Entre ces especes de Coufines peuuét bien estre nombrées les bayes que les bas Alemis appellent *Wrenbessî*, cest à dire Bayes de bas fibres. Desquelles les tiges sont fort petites, courtes, gresles & tédres, couchées bien pres par terre, & couuertes de petites feuilles estroictes, bié pres semblables en figure aux feuilles du Thym vulgaire, plus petites toutesfois, au sommet desquelles croïssent sur queués fort menues les bayes, bié pres semblables aux Coufines rouges, plus longues toutesfois & plus grandes, de couleur aucune fois seulement rouge, aucunesfois rouge tachetée, de goüst quelque peu austere & astringent.

## LE LIEV.

1 Les Coufines prouïent en Brabant & boys. Les Noires sont fort communes, & se trouuent en plusieurs endroits. Mais les Rouges ne sont guere vulgaires, & se trouuét en bien peu de lieux.

3 Les Coufines de marez croïssent en plusieurs endroits de Hollande en lieux bas & humides.

## LE TEMPS.

Les Cousines fleurissent en May, & leurs bayes sont meures en Juin. Les Cousines de marez sont meures en Juillet & Aoust.

## LES NOMS.

Les deux premiers fruits sont appelés en aucuns endroits de France Cousines: en haut Ale-<sup>ma</sup>man *Hydelbeeren*, *Dumpelbeeren* & *Buchbeeren*: en Brabant *Cratbesien*, *Postelbesien* & *Sa-<sup>u</sup>uerbesien*. On les peut bien appeller en Latin *Vacinia*, pource que sont petites *bacae*, c'est à dire bayes: car selon le témoignage d'aucuns sçavans personnages, le nom *Vacinium* vient aussi de *Bac-<sup>ca</sup>* cinium, qui est composé de *Bacca*. Et sans point de faute ce nom le ur coulent mieux que le nom de *Myrtilli*, duquel aucuns les appellent ainsi, combien toutesfois que ce ne soient point les vrayes *Vacinia*, desquelz Vergile fait mention quand il dict: *Alba ligustra caesant, vacinia nigra legantur*. car ce fruit est incognu en Italie.

La tierce espece est appelée selon les lieux ausquelz elle croist, en bas Aleman *Dr embesien*, & *De emosen*, c'est à dire Bayes de basieres ou de marez. Et nous l'avons pour la similitude qu'elle a avec les autres Cousines, appelée en Latin *Vacinia palustris*, c'est à dire Cousines de marez: car nul autre nom ne nous est cognu, si n'estoit que fust *Samolus* de Pline.

## LE TEMPERAMENT.

Les Cousines, signamment les Noires refroident jusques au second degré, & sechent quelque peu, & sont altringentes. De pareil temperament sont aussi les Cousines de marez.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Cousines, signamment les Noires mengées cruës, ou cuites, avec ou sans sucre, profitent à ceux qui sont travaillz de fieures chaudes & ardentes, & contre chaleur d'estomach, inflammation de foye & des parties interieures. Elles serrent le ventre & ostent l'enuie de vomir.
- B Du jus d'icelles, des Noires principalement on fait vn medicament que les Apothicaires appellent *Rob*, lequel est bon es fieures chaudes contre la soif, tenu en la bouche, & sert à tout ce à quoy
- D les bayes mesmes sont conuenables. Les Cousines de marez estanchent aussi la soif, & sont bonnes contre fieures chaudes, & toute inflammation de sang & parties interieures cōme les autres Cousines, ausquelles elles ressemblent fort de vertus & operations.
- E Briefles Cousines, signamment les Noires, & celles de marez ressemblent fort en temperament vertus & facultez aux Groiselles rouges, & pour icelles les peut on usurper.

## Du Sumac sauvage de Pline.

*Rbus hibernicus Plinij.*  
Sumac sauvage de Pline.



## Chap. XII.

*Gratia Dei quibusdam.* Hylope de garigues.



LA FORME.

**C**este plante est ligneuse, basse, ayant plusieurs branches brunatres, dures, sur lesquelles croissent feuilles asses longues, aucunement semblables aux feuilles du grand Buys, plus longues toutesfois. Entre les briches feuillues, y vient d'autres branchettes, sur lesquelles croissent come beaucoup d'espiz, chargés au premier de mout de fleurs petites, & puis apres de beaucoup de graine anguleuse amassée ensemble. Ceste graine est de forte odeur, de goust amer, & pleine d'une liqueur grasse & oleagineuse. La racine est dure comme celle des Cousines.

On peut bien adiouster icy ceste plante sauvaige que Hierosme Bouq appelle Hyssope de garigues, laquelle produict d'une racine ligneuse de tiges gresles, estendues le long de la terre, couvertes de feuilles grisâtres & vn peu velués, semblables en figure à la commune Hyssope de iardin, plus courtes toutesfois, au sommet de laquelle les fleurs sortent, semblables en figure aux fleurs d'Azarogenine, de couleur maintenant palle en iaulne, maintenant blanche, apres lesquelles survient de petits chapiteaux ronds, dans lesquels est contenue vne graine iaulne.

LE LIEU.

La première plante croist en Brabant en plusieurs endroits de la Champagne dudict pais.  
L'Hyssope de garigues, se trouue en aucuns endroits d'Allemagne en lieux mal cultiuez, sauvaiges & montaigneux. Aucuns Herboristes de ce pais la plantent en leurs iardins.

LE TEMPS.

Le Rhus fleurit en May & Iuin, la graine est meure en Iuillet & Aoust.

L'Hyssope de garigues fleurit en Iuin & Iuillet. LES NOMS.

La première plante appelée des Brabansons Gagef, est d'aucun Apothicaire nommée Myrtat, & la graine d'icelle Myrtilli, combien toutesfois que ce ne soit point Myrtus. Pourtant est elle appelée d'aucuns Modernes Pseudomyrsine, & Myrtus Brabantica, & semble que ce soit l'espece sauvaige de Rhus de laquelle escrit Plin au li. 24. chap. 11. de son Histoire.

L'Hyssope de garigues est appelée en haut Alemā *Spedel yfop*, & *feld yfop*: en bas Alemā *Spyden yfop*, pour ce quelle croist es Garigues, & desers. Aucuns la nomment en Latin *Grata Dei*, toutesfois elle n'a nulle similitude avec *Grata Dei*, ou *Gratiola*, qui est vne espece de Petite Centaurée, descrite en la troisième partie de ceste Histoire.  
Racine, Myrte sauvaige.

LES VERTVS ET OPERA.

Le Rhus sauvaige n'a nul vsage en medecine mais sert à mettre es garderobbes, car il contre garde les vestemens, de vermines.

Du Myrte sauvaige. Chap. XIII.

LA FORME.

**M**yrte sauvaige est vne plante basse, ligneuse comme le Rhus sauvaige, ayant les tiges rondes fort branchues & couvertes d'une corce brunatre & epesse, & fort reuestues de mour de feuilles noiratres, espesses & poignantes, non autrement differentes aux feuilles de Myrtus ou du petit Buys, sinon que chacune a au bout vne espine ague & piquante. Le fruit croist sur les feuilles, lequel est beau & rouge, & cōtient en soy vne graine dure. La racine est blâche & simple. LE LIEU.

Le Myrte sauvaige prouient en Italie, Languedoc, & Bourgoigne le long des chemins, & autres lieux incultuiez, en ce pais on le plante es iardins. LE TEMPS.

Ceste plante retient ses feuilles vyer & verte & en Italie & aux lieux ou elle croist d'elle mesme elle porte son fruit en uenir le moys d'Aoust, mais en ce pais elle n'est pas fructifere.

LES NOMS.

Ceste herbe est nommée en Grec *μυρτιν ἀγρία*,  
Rr iij



εξυμφοριν, μυρτερονδα, ή αυροαυβα: en Latin *Ruscus*, *Ruscus* & *Myrtus sylvestris*: es Boutiques *Ruscus*: en François Myrte sauuage, d'aucuns Buys poignant: en haut Aleman *Myrtebaum* & *Kerbenstein*: en bas Aleman *Schende Palm*, c'est à dire Palme espineuse, pour ce qu'elle ressemble aucunement au Buys lequel ilz appellent communement *Palmboom*: d'aucuns ausi *Myrtebaum*.

## LE TEMPERAMENT.

Les racines, pareillement ausi les feuilles sont chaudes au second degré, & seches au premier.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La decoction des racines de *Ruscus* faite en vin & beue, prouue que à vriner, rompt la pierre, & pousse hors la grauelle; dauantage elle est vile à ceux qui ont difficulté d'vrine.
- B Elle est bonne ausi prinse en mesme forte contre la iaulnisse, & douleur de teste, & esmeut le flux menstrual.
- C Les feuilles & fruit d'iceluy sont de mesme faculté que les racines, mais non si forte toutesfois ne si vertueuse, par quoy ausi on n'en vse guere.

## Du Bislingua, &amp; Laurier Alexandrin.

## Chap. XIII.

*Hippoglossus.**Bislingua.**Laurier Alexandrin.**Laurier Alexandrin.*

## LA FORME.

Le *Bislingua* a les tiges rondes comme le *Seel de Solomon*, d'environ pied & demy de haut, sur lesquelles croissent à chacun costé des feuilles brunatres, espesses, non guere differentes aux feuilles de *Laurier*, sur lesquelles croist du milieu vne petite feuille en forme de languette. Entre icelles petites feuilles & les grandes croissent de bayes rudes, rougeastres, de la grosseur d'un poys ou enuiron. La racine est tendre, blanche, longue, & de bonne odeur.

On trouue encore vne autre espece de *Bislingua* selon le tesmoignage d'aucunes gens scauans, laquelle produit ausi son fruit sur les feuilles, & ressemble à la dessusdicte de tiges, feuilles, fruit & racines, sinon que sur les feuilles n'y croist point d'autres petites feuilles auprès du fruit.

D'vne troisieme espece escrit encore le bien scauant *Matthioli*, laquelle ressemble asses à la

suſdicte de racines & fueilles: mais le fruit d'icelle ne croiſt point ſur les fueilles, comme aux autres, ains croiſt chacun ſur vne queue à part ſortant d'entre les fueilles, & eſt rouge, comme de la groſſeur d'un petit Poys cice. **LE LIEV.**

Le Biſlingua prouient en Hongrie & Auſtriche, pareillement en Italie és boys obſcurs. Les Herboriſtes de ce pais le plantent en leurs iardins. **LE TEMPS.**

Il iure ſa ſemence enuiron le mois de Septembre.

**LES NOMS.**

1 La premiere de ces herbes eſt appellee en Grec *ἵππογλωσσόν*, ou *ὑπόγλωσσόν*, & ſelon aucuns *ἵππογλωσσόν*: en Latin auſſi *Hippoglossum*, & *Hypoglossum*, des modernes *Vularia*, *Boniſacia*, *Lingua* *rozana*, & *Biſlingua*: en haut Aleman *Zapfflinkraut*, *Sauchblat*, *Zuffenblat*, *Beetblat*, & *Zungenblat*; & là ſelon en bas Aleman *Keſckruyt*, *Tonghenblat*, & *Capfenckruyt*, c'eſt à dire Herbe aux langues.

2 La ſeconde ſemble bien à voir auſſi vne eſpece de *Hippoglossum*, pourtât eſt elle appellee d'aucuns *Hippoglossum* femelle, & la deſſuſdicte auſſi *Hippoglossum*.

3 La tierce eſt appellee en Grec *λαύριον ἀλεξανδρινόν*, ou *λαύριον ἰερώνυμον*: en Latin *Laurus Alexandrina* & *Laurus idaa*, d'aucuns Modernes *Victoriola*: en François *Laurier Alexandrin*: en bas Aleman *Laurus* *Sain* *Ale* *paradiſien*. **LE TEMPERAMENT.**

1 *Hippoglossum* ſe dit Galien eſt mitigatif des douleurs.

3 Mais le *Laurier Alexandrin* eſt chaud & ſec.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

1 On loue fort les fueilles & racines d'*Hippoglossum*, contre inflation du gozier, de la laette, & A des amigdales, & contre les vicerations d'iceux: en gargarifine.

En Italie ſe dit Marcellus on pend ceſte herbe au col des petis enfans, quand ilz ont la luette: B Et vne guirâ de faicte d'icelle & miſe ſur la teſte guerit la douleur d'icelle, comme dit Dioſcoride.

Baptiſta Sardus eſcrit q̄ ceſte herbe eſt fort ſinguliere aux maladies d'amary, & que la poudre d'icelle prinſe plein vn cuillier, faicte incontinent raualler la matrice. C

2 La racine du *Laurier Alexandrin* cuicte en vin & beue, prouoque l'vrine, proufite à ceux qui ſont leur vrine goute à goute, eimeut les fleurs aux femmes qui enſantent avec grand peine, & pouſſe hors l'ariereſas & toutes immodiſtez.

*Myrica humilis.*

Petit Tamaris. D



Du Tamaris. Chap. XV.

**LES ESPECES.**

LE Tamaris eſt de deux ſortes, comme dit Dioſcoride, l'un grand, & l'autre petit.

**LA FORME.**

1 Le Tamaris eſt vn petit arbre, d'environ la hauteur d'un homme, ayant pluſieurs rameaux, de couleur aucunesfois verd pale, & aucunesfois brunatre ſur leſquelles croiſſent les fueilles petites, grâtres, pres ſemblables aux fueilles de Bruyere, ou de Sauiuir. Les fleurs tirent ſur le purperé & velués, leſquelles tombans ſen volent au vent.

2 Le grand Tamaris reſemble de fueilles au petit mais il croiſt beaucoup pl' haut, voire à la hauteur d'autres grands arbres, & produit vn fruit côme les petites pommes de Cheſne, ou Noix de galle.

**LE LIEV.**

1 Le petit Tamaris croiſt le lôg des eaueſ courantes & croupies: Et ſe trouue en aucuns endroits ſelon le cours du Rhin.

2 Le grand Tamaris prouient en Syrie & Egypte lequel eſt des Modernes encores incognu.

**LE TEMPS.**

Le petit Tamaris fleurit au Printemps, ſignamment en May.

## LES NOMS.

Cette Plante est appelée en Grec *μυρίκη* en Latin *Myrica* & *Tamarix*:és bonnes Boutiques *Tamarisif*, & là selon en François *Tamarix*, d'aucuns *Bruyere sauvage*: en haut Alemā *Tamarisfern* helly d'aucuns toutesfois aussi *Pottz* & *Wietzenbercy*: en bas Aleman *Tamarisfboom*.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles & nouveaux iettons de *Tamarix*, sont participans de quelque peu de chaleur, & absterifz, sans fecheresse manifeste. Le fruit & l'efcorce d'iceluy sont secs & astringens de la temperature des Noix de galle.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le *Tamarix* est vn medicament vertueux & singulier contre dureffe & oppilation de ratelle, & a en cela si grand force & singuliere, que lon a trouué par experience; les pourceaux qui auoient esté nourris & tousiours méyé hors d'vne auge de bois de *Tamarix*, n'auoir point de ratelle. Pour tant est il bon que les Splenetiques boient hors d'vn pot ou vaisseau de bois de *Tamarix*.
- B La decoction des fueilles & nouveaux iettons de *Tamarix* faicte en vin & quelque peu de vinaigre, beuë, guerit & desoppile la ratelle endurcie & oppilée. Pareille vertu a le ius d'icelles beu avec vin se dit Pline.
- C Contre douleur de dens il est aussi fort bon de tenir en la bouche la decoction des fueilles & reiettons faicte en vin, toute chaude.
- D La decoction des fueilles arreste les fluxeurs des femmes, estant asises ou si elles se baignent en icelle toute chaude.
- E La mesme decoction chasse & tue les lendes & pouds, en se lauuant d'icelle le lieu là ou ilz sont.
- F Le fruit du grand *Tamarix* prouffite à ceux qui crachent sang, & contre flux mensural par trop abondant: pareillement contre flux de ventre, & morsures de bestes venimeuses.
- G On vŕe de ce fruit au lieu de Noix de galle és medecines q̄ lon prepare pour la bouche & pour les yeux.
- H L'efcorce de *Tamarix* a pareille vertu que le fruit, & sert à arrester tout flux de sang, & de vêtre.

## De la Bruyere.

## Chap. XVI.

Erica. Bruyere.

Erica altera. Petite Bruyere.



## LES ESPECES.

IL y a en ce pais deux especes de Bruyere, L'une portant ses fleurs le long de la tige, appelée grande Bruyere. L'autre qui porte les fleurs par bouquets au plus haut des branches, laquelle on appelle petite Bruyere.

## LA FORME.

- 1 La Bruyere est vne plante ligneuse, fort branchue, non guere differente au petit Tamarix, beau coup toutesfois plus petite, plus tendre, & plus basse elle a les fueilles fort menu de couppees, non guere dissimilables aux fueilles de Cypres de iardin, plus brunatres toutesfois & plus dures. Les fleurs sont comme petits boutons partis en quatre, de belle couleur incarnée, & aucunes fois (mais peu souuent) blanche, croissans le long des branches depuis le milieu iusques au plus haut. La racine est longue, ligneuse, & de couleur rouge obscur.
- 2 La seconde espece de Bruyere est aussi vne petite plante basse, ayant moult de petits reinseaux tendres & gresles sortans de la racine, de couleur rougeatre ou brune, ayans les fueilles fort petites, non differentes en figure aux fueilles du Thym vulgaire, beaucoup toutesfois plus petites & plus tendres. Les fleurs croissent au sommet des reinseaux cinq ou six ensemble pendantes en bas de couleur incarnée en rouge, de forme longue en rondeur, creuses par dedans, ouuertes par le bout, comme vn petit tonnelet, plus petite qu'une Corneille qui est le fruit d'un Cornier. La racine est tendre & se traîne, jectant en plusieurs endroits de nouveaux reinseaux.

## LE LIEU.

La Bruyere croist es montaignes seches, maigres, & steriles, & es guarigues, boys, & deserts.

## LE TEMPS.

- 1 La premiere espece de Bruyere fleurit au commencement & en la fin de l'esté iusques en Septembre.
- 2 La seconde espece fleurit à la Myrte.

## LES NOMS.

- 1 La Bruyere est appelée en haut & bas Aleman *Spyden*, & est tenue des Modernes pour la plante que Dioscoride appelle en Grec *ερίκην*; en Latin *Erica* & *Erica*, & est parauenture le Selago de Pline.

Xylon. Plante Cotoniere.

- 2 La petite Bruyere est sans doute aussi vne espece de Bruyere, pourtant la peut on bien appeler en Latin *Erica altera*; en Grec *ερίκην ερίκην*.

## LE TEMPERAMENT.

Toutes les deux especes de Bruyere ont vne secheresse manifeste.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le ias des fueilles de Bruyere degoutté dans les yeux guerit douleur des yeux, & oste la rougeur d'icux, & renforcist la veüe.
- B Si la Bruyere est le vray *Erica*, les fleurs dicelle & les fueilles sont vtilement appliquées sur morsures & piqures de Serpens & semblables bestes venimeuses.

## De la Plante portant le Coton.

## Chap. XVII.

## LA FORME.

Cette plante croist en forme d'Arbrisseau, sans croistre fort haut: Les fueilles sont larges & profond incisées, plus petites que fueilles de Vigne, au reste aucunement semblables. Les fleurs sont iaulnes, & purpurées au milieu, crenées par les bors. Le fruit est bien pres pareil à auelaines plattes & larges, pleines de beau Coton blanc, dans lequel la graine est cachée.



## LE LIEU.

Le Coton croist en Egypte & és Indes, On le plante aussi en Candie, Malthe, & autres regions semblables.

## LES NOMS.

Le Coton est appelé en Grec *ζώνη, γού γούρνον*, & pareillement en Latin *Xylum* & *Gossipium*: és Boutiques *Coran*, *Bombax*, & *Bombesum*: en haut Aleman *Baumwool*: en bas Aleman *Cotton*.

## LE TEMPERAMENT.

La graine de Coton est chaude & humide, comme dit Serapio.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La graine de Coton appaise la toux, & prouffite contre toutes affections froides de la poitrine, elle renforce la vertu, & multiplie la semence de generation.

## Des Capres.

## Chap. XVIII.

## LA FORME.

## Capparis.

## Capres.

Les Capres sont vne plante espineuse comme bien pres la Ronce, ayant plusieurs fariemens estendus sur la terre, sur lesquels croissent epines dures, aigues, & crochues, & fueilles noires & rondes deus à len contre l'vne de l'autre, non guere differentes aux fueilles de Cabaret, ou d'vn Coignier selon Dioscoride, plus rudes toutesfois. Entre les fueilles prouient de petits boutons, lesquels s'ouurent en belles fleurs estoillées & odoriferantes, & puis apres y vient le fruit long & rond, moindre qu'vne oliue & contenant en soy vne petite graine. La racine est longue, ligneuse, reuettue d'vne escorce epesse & blanche, de laquelle on vse en medecine.

## LE LIEU.

Les Capres prouiennent en lieux rudes, mal cutiuez, pierreux & sablonneux, & és hayes, & croissent abondamment en Espagne, Italie, Arabie, & autres pais chauds: on n'en trouue point en ce pais. Le fruit toutesfois & les fleurs y sont connus pour ce qu'on les y aporte d'Espagne confictes en saumure ou sel.

## LES NOMS.

Les Capres sont appellées en Grec *κάρπαιος*: & en Latin *Capparis*, d'aucuns aussi *κύνος βατος*, *Cynosbato*, cest à dire en Latin *Rubus canis* & *Sentis canis*: En haut Aleman *Capperen*: En bas Aleman *Cappero*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Cappres qui croissent en Afrique, Arabie, Lybie, & autres pais chauds sont fort chaudes iusques bien pres au quatriesme degre, esleuans pustules, & vlcers la bouche, & rongens la chair iusques aux os. Mais celles qui croissent en Italie & Espagne ne sont pas si tresfortes, & sont plus conuenables à manger, estans moderement chaudes, seches & astringentes, signamment l'escorce de la racine, laquelle est la plus requise en medecine, car les fleurs & fueilles icunes, n'ont pas si forte operation, pourtant seruent elles mieu en viande.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A L'escorce de la racine de Capres sert grandement contre durese & oppilation de ratelle, prise avec oximel, ou meslée parmy huiles & vnguents à ce propres, & induicte par dehors sur le region de la ratelle.
- B On donne aussi vilement à boyre ceste racine, à gens qui ont la sciatique, paralitiques, & à ceux qui sont foullez ou froissez ou tombez de haut.
- C Elle esmeut aussi le flux menstrual, & prouoque fort l'vrine, de telle sorte que l'vrine en deuiet saigneuse, si on en vse par trop long temps & en trop grande abondance.





Elle nettoye aussi tous vlcres vieux, pourris & difficiles à guérir, & induïte avec vinaigre effa  
ce toutes taches blanches & vilaines. (dit Galien.

Le fruit & les feuilles de Capres ont semblable vertu q̄ les racines non toutesfois si tresforte, se

La graine de Capres cuiète en vinaigre & tenue chaude en la bouche, appaïse douleur de dens,

Le jus des feuilles, fleurs & nouveau fruit, tue les vers des oreilles distillé dedans.

Les Capres confictes en sel, comme on les aporte en ce pais, lauées cuiètes & mengées avec vin  
aigre, sont vne viande medicamenteuse, reueillant l'appetit ouurant les oppilations du foye & de  
la ratelle, consumant & digerant les phlegmes froides amassées en l'estomach, toutesfois elles ne  
nourrissent guere ou point du tout, comme dit Galien.

Du Groisielier.

LA FORME.

**G**roisielier est vne plante ligneuse, espineuse, croissât enuiró à la hauteur de deux, trois, ou quatre pieds, ayant plusieurs rameaux blichatres garnis de mout d'espines aigues, & les fueilles ver des en pallissant, douces, quelque peu larges & rō des, incisées à l'entour bié pres en forme de fueilles de Vigne. Entre les fueilles croissent de petites fleurs, & puis apres de bayes rondes, lesquelles meures deuenent, trāsparentes & iaulnates, ou rougeatres, de goust quelque peu doux. Laracine est gresse, dure, & ligneuse, & fort fibreuse.

LE LIEV.

On plante en ce pais le Groisielier bié pres par tous les iardins, le long d'iceux & és hayes.

LE TEMPS.

Le Groisielier deuiet bien tost verd en Mars, voire souuent en Feurier, il fleurit en Auri, & pro duit son fruit en May, duq̄ on vse fort en viang des. Le fruit est meur en la fin de Iuin.

LES NOMS.

Le Groisielier est appelé des modernes en Latin *Grossularia*.

Le fruit est appelé en Latin *Vua crispā*, & d'aucuns *Grossularia* en François des Groiselles: en haut Aleman *Kreusbeer*, & *Kreiselbeer*: en bas Aleman *Scheibessen*, ou *Kreiselessen*, & d'aucuns aussi *Knoeselen*. LE TEMPERAMENT.

Le fruit auant qu'il soit meur (car adonc on en vset plus) est froid & sec iusques au secōd degre, & assingēt, de pres semblable nature que la graps de raisin encore verde. LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les Groiselles non encore meures arrestent flux de ventre, & tout flux de sang, & signamment  
le ius exprimé d'icelles & puis seché.

On les applique aussi vilement sur inflammations chaudes, erisipeles, & feu sacré. A ce mesme  
valent aussi les fueilles, mais elles ne sont pas si vertueuses.

Les Groiselles non meures mengées en viand des reueillent l'appetit, refroident l'estomach cha-  
lereux & foye, & appaïsent la grande chaleur interieure, & est bon de les donner contre sieures.

Les fueilles nouuelles mengées crūes, prouoquent l'vrine, & prouiffent à gens trauaillez de la  
grauelle ou de la pierre.

Des Groiselles d'outre mer.

Chap. XX.

LES ESPECES.

**L**e Groisielier d'outre mer est de deux sortes en ce pais: vn porte fruit rouge & de goust amiss  
ble: l'autre porte noir, & de goust ingrat. LA FORME.

Les Groiselles d'outre mer ont les rameaux ligneux, flechiles, couuers d'vne escorce brunatre, & ayans les fueilles larges, noiratres, nō guere differentes en figure aux fueilles de Vigne, plus peti  
tes toutesfois: les fleurs croissent entre les fueilles aux ieunes bourgeōs amassées ensemble en quan  
tité

Chap. XIX.

Vua crispā.

Groisielier.



citée sur filets menus pendans en basses & les fleurs peries, croissent sur ledits filets de tous costés plusieurs petites bayes, verdes au premier, puis apres ronges, de goust quelque peu aigre, fort rafraichissant & amiable.

Les Groiselles noires ressemblent aux deuant dits de reinseaux, fueilles, fleurs, & fruiçt, sinon que les sont de couleur noire, & de goust mal plaissant, pourtant aussi ne sont elles point en vsage.

## LE LIÈV.

On plante les Groiselles d'outre mer en plusieurs jardins, d'ont on fait hayes entrelassées le long des voyes & bords des jardins.

Les Groiselles noires croissent d'elles mesmes en lieux humides mal cultiuez, le long des fosses & ruiers.

## LE TEMPS.

Les Groiselles d'outre mer sont pour la pluspart meures en juillet. LES NOMS.

Cette plante est nommée des modernes *Grossula* *vis rubra*, *Grossularia transmarina*, Ribes & Ribesant.

Le fruiçt est des Modernes appellé *Grossule transmarina*, & semblent bien à voir le fruiçt que Galien au septiesme de Medic. sec. loca appelle *ἄκρον σακουλαί*, *Vna* vrsi & Galeni. } Groiselles d'outre mer. Ribes.

La premiere espece est appellée *Grossula rubra*, Ribes rubrum: en François Groiselles rouges: en bas Aleman *Roode Hebesien*. Et icelles seulement sont en vsage és Boutiques & és viandes.

La seconde espece est appellée Ribes nigrum: en François Groiselles noires: en bas Aleman *Süwerte Hebesien*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Groiselles rouges sont froides & seches au second degré, & astringentes.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Groiselles rouges rafraichissent l'estomach & le soye chalereux, & on les prend vilement contre toute inflammation de sang, & fieures chaudes.
- B Icelles tenues en la bouche, ou machées, donnent allegance aux inflammations, guerissent phlegmons de la bouche, & estanchent la soif és fieures chaudes.
- C Elles arrestent aussi le flux de ventre causé d'humour cholérique, & la dyfentere, signamment le ius d'icelles seché.
- D Le Rob qui est fait du ius d'icelles avec sucre, est fort profitable à toutes les choses susdites, & arreste vomissemens & roucis de l'estomach, & est fort conuenable aux fieures chaudes, beau avec quelque eau froide, ou tenu en la bouche contre la soif.
- E Les Groiselles noires n'ont nul vsage en Medecine.

## De l'Espine Vinette.

## Chap. XXI.

## LA FORME.

Espine vinette est vn arbrisseau, de dix ou douze pieds de haut ou dauantage, produisant moult de rameaux ligneux, garnis d'espines aigues & piquantes. Les fueilles verdes en blanchissant, tendres, crenées par les bords, & de goust aigre, & pourtant on en vie en fausses au lieu d'Ouille. Les fleurs sont petites, pales en iaulne, croissant sur courtes queueués entre les fueilles, & puis apres pendent de petites longues & rondes bayes, de goust aigre & astringent, ayans vn grain dur au milieu lequel est la semence. La racine est dure, longue, diuisée en moult de rameaux, bien iaulne par dedans, & de goust quelque peu auster.

# De Acacia. Chap. XXII.

Berberis. Espine vinetet.

## LE LIEU.

L'Espine vinette se trouve en Brabant aux bords d'aucuns boys, & des hayes. On la plante aussi souvent es jardins, signamment par les Herboristes.

## LE TEMPS.

L'Espine vinette a nouvelles fueilles en Avril cõme les autres arbres: Elle fleurit en May, & le fruit est meur en Septembre.

## LES NOMS.

Cette plante est appelée es Boutiques Berberis, principalement le fruit, lequel y est le plus connu: en François Espine vinette: en haut Aleman Paiffel beer, Saurisch, Erbsel, Versisch: en bas Aleman Sausseoom. **LE TEMPERAMENT.**

Les fueilles & fruit de l'Espine vinette sont de temperament froid & sec au second degre, & de parties quelques peu subtiles.


## LES VERTVS ET OPER.

- A Des fueilles verdes de l'espine vinette on fait de la sausse à manger, comme de l'Ozeille, laquelle rafraichit & reucille l'appetit, & prouffitte grandemet à gens chaleureux & sieureux.
- B Le fruit arreste flux de ventre, tout flux des semmes desordonné, & tout flux de sang non naturel.
- C La racine d'icelle trepée en lexiue, iualnit les cheueux, si on les en laue souuent.

# De Acacia. Chap. XXII.

Acacia Egyptia. Acacia d'Egypte.

Acacia altera. Acacia Pontiq



## LES ESPECES

ACacia est de deux sortes, l'une croist en Egypte: L'autre es regions de Pontus.

## LA FORME.

1 La premiere espee de Acacia est vn arbrisseau espineux; ayant plusieurs rameaux garnis d'espi-  
nes piquantes: entre lesquelles viennent les fueilles parties en moult d'autres petites fueilles. Les fleurs  
sont blanches. La graine est large comme Lupins, enclose en siliques longues, d'ont on tire le ius  
qui est noir, & s'appelle aussi Acacia.

2 La seconde espee est aussi vne plante espineuse, ayant de longues espines aigues, & les fueilles  
semblables bien pres aux fueilles de la Rue commune. Le fruit est aussi enclos en siliques come  
le fruit de la premiere.

## LE LIEV.

1 La premiere Acacia prouient en plusieurs endroits d'Egypte, es deserts.

2 La seconde croist en Pontus & Cappadoce, tesmoing Dioscoride.

## LES NOMS.

Cette plante espineuse est appelée en Grec *ἀκασία*, & en Latin *Acacia*. Nul autre nom ne nous  
est cognu: incognu es Boutiques, combien toutesfois quelles ayent retenu le nom; lequel elles  
donnent au ius tiré de pruneaux sauvages, qu'on appelle Acacia baftard.

## LE TEMPERAMENT.

Acacia & principalement le ius, duquel ont vŕ les Anciens, est sec au tiers degré, & froid au pre-  
mie r, selon que dit Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Le ius d'Acacia arreste flux de ventre, & les menstrues par trop abondans, & fait retourner en  
son lieu la matrice tombée ou relachée, beu en vin rouge.

B On l'induit vtilement sur feu volage, & sur phlegmons, & ulcers chalereux, pareillement sur  
pustules chaudes de la bouche.

C C'est aussi vne tresbonne medecine pour les yeux, guairissant les inflammations & enstures  
d'iceux, & quand ilz sont prominens, induite dessus.

D Acacia noircist les cheveux de la teste, si on les laue  
de l'esue dans laquelle elle a trempé.

E Les fueilles & tendrons d'Acacia raffermissent & ren-  
forcent les membres qui ont esté desnoüés, si on les bai-  
gne & estuue de la decoction d'iceux.

## Du Myrte. Chap. XXIII.

## ES ESPECES.

ILy a maintenant deux sortes de Myrte, L'une s'appel-  
le Grand Myrte & vulgaire: l'autre Myrte petit ou  
noble.

## LA FORME.

1 Le grand Myrte est vn arbrisseau, croissant en ce pais  
en uiron à la hauteur d'vn homme, ayant plusieurs bran-  
ches couuertes de fueilles noiratres, de la forme & gran-  
deur bien pres des fueilles de Peruenche: Entre lequel  
les croissent en ce pais en temps chaud, de belles fleurs  
blanches & plaisantes, non guere differentes aux fleurs  
de Cerisier, mais vn peu plus petites.

2 Le petit Myrte est vne plante petite & basse en for-  
me & figure non guere dissemblable à l'autre, mais beau-  
coup plus petite. Les fueilles sont petites & estroictes,  
plus petites & plus estroictes que celles du Buys, de  
couleur non si tresuerde que les fueilles du grand. Les  
fleurs sont aussi blanches, non differentes aux autres si-  
non qu'elles sont quelque peu plus petites, plus doubles  
de fueilles.

## LE LIEV.

Le Myrte croist abŕ damné en Espagne & en Italie



autour de Naples. Il ne croist en ce pais, sinon es jardins de quelques Herboristes, lesquels le plantent en corbeilles, & le contregardent l'uyver avec grande diligence contre le froid, car il ne peut souffrir la froidure de ce pais. Le petit est ussi plus commun en ce pais que le grand.

LE TEMPS.

Le Myrte fleurit fort peu souuent en ce pais, si ce n'est par esté chaud, adonc fleurit il en Iuin, sans pouoir liurer fruit & ne graine.

LES NOMS.

Le Myrte s'appelle en Grec *μυρτίνα*: en Latin *Myrtus*, duquel nom il est cognu es Boutiques de ce pais.

Le fruit de Myrte est appelé es Boutiques *Myrtilli*.

LA CAUSE DV NOM.

Le Myrte se nomme en Grec *μυρτίνα*, à cause d'une ieune Damoiselle d'Athenes appelée Myrsine: laquelle surpassoit en beauté toutes les filles, & en force & adresse tous ieunes compaignons, & de Deesse Pallas fort chérie. Or la faisoit elle hanter & estre presente es tournoys, & lieux ou les ieunes gentils hommes s'exerçoient, à luyter à la course, & toutes autres fortes de jeux: pour puis apres comme Iuge couronner ceux qui auoient emporté le prix es tournoys & autres manieres de jeux. Mais estans aucuns de ceux qui auoient esté vaincus sur elle courroucez, feirent tant que par hayne & envie ilz la mirent à mort. Ce que venu à la cognoissance de la Deesse Minerue, feit incontinent croistre le Myrte odoriferant lequel elle appella Myrsine du nom de la Damoiselle Myrsine, à l'honneur & souuenance d'icelle, & l'ayma tresfort, comme au parauant elle auoit fait à la ieune Damoiselle.

LE TEMPERAMENT.

Le Myrte est sec au tiers degré, & froid iusques au premier.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les bayes ou fruit de Myrte sont vilement données à ceux qui crachét, vomissent, ou pissent **A** sang, car elles arrestitent tout flux de sang, pareillement aussi les fleurs des femmes, & menstrues par trop abondans.

Les mesmes prouffissent aussi contre le flux de ventre, & vicerés de vessie.

Le ius d'icelles seché, sert aux choses susdictes, & d'auantage à l'estomach par trop debile & hu- **C** mide, & contre piqures de Scorpions & Phalanges.

La decoction de la graine de Myrte noirist les cheueux, & les garde de tomber, elle guerit les **D** vicerés malings de la teste, & nettoye les paillettes & surfures, si on s'en loue souuent la teste.

Il est bon de lauer vicerés extérieurs du vin dans lequel la graine d'iceluy à cuit. Il prouffite **E** pareillement aux inflammations des yeux, appliqué dessus avec quelque peu de fine fleur, d'auantage il guerit les oreilles boueuses & coulantes inbillé dedans.

Il engarde aussi d'enyurer, ben au parauant.

La decoction de la graine ou fucilles de Myrte arreste les fleurs & flux menstrual par trop **G** abondant des femmes, si on les fait asseoir ou baigner dedans.

Elle est bonne pour lauer membres qui ont esté rompus ou desnoiés, car elle les renforcist & **H** conforte.

Les fucilles verdes de Myrte sont vilement appliquées sur vicerés humides, & sur toutes par- **I** ties ausquelles y a grande defluxion d'humours.

Icelles avec huile rosat, ou quelque autre de mesme faculté, aydent aux vicerés rongens, feu **K** sacré, dartres, & autres semblables eschauffures.

Les fucilles de Myrte sechées, induictes avec vnguent conuenable, guerissent ongles exulcerés **L** tant es mains comme es pieds, & ostent la sueur de tout le corps.

Du Laurier.

Chap. XXIII.

LES ESPECES

**L**aurier est de deux fortes, l'un a les branches & rameaux verts, & les fucilles dures & espesses. L'autre a les branches rougeastres, principalement estant ieune, & les fucilles plus molles, & plus debiles que les fucilles de l'autre.

LA FORME.

La premiere espece de Laurier croist aucunefois fort haut, ayant le tronc dur & gros, lequel se partit en plusieurs rameaux reueffus d'une escorce verte, & portent fucilles larges, longues, dures, espesses, & odoriferantes: entre lesquelles prouennent de boutons qui souuent en fleurs herbacées, & se tourment puis apres en vn long fruit, ayant par dehors vne escorce brunastre &

charnue, dans laquelle est enclôse le noyau blanche tre ou grisâtre, & oleagineux, de goust acré & amer.

La seconde espèce de Laurier n'est guere différente à la première, sinon qu'elle ne croist point si haut, & iette souuent de nouueaux bourgeons de la racine, lesquels souuent croissent aussi haut que les principales branches, tellement que ce Laurier croist peu souuent en forme d'Arbre. Les settons & rameaux d'iceluy sont rougeatres, & aucun fois bief rouges, & quand ilz vieillissent br'ouges. Les fueil les ressemblent aux autres, sinõ qu'elles sont plus tendres & plus deliées, & aussi odoriferantes comme les autres.

#### LE LIEV.

Le Laurier croist abondamment en Espagne, & semblables pais chauds. En ces pais bas on le plante es jardins, & cõtergarde du froid en grande diligence en yuer, excepté en Zelande, & es enuiron de la mer en terre salée, car là croist il fort voluntiers, & ne meurt point en yuer, comme il faict en terre douce.

#### LE TEMPS.

Le Laurier ne perd point ses fueilles, mais demeure verd yuer & esté. Et en Mars ou Aueil produit il fueilles nouuelles & nouueaux settons. Il ne porte point de fruit en ce pais.

#### LES NOMS.

Le Laurier est appelé en Grec *Λάρις*: en Latin *Laurus*: en haut Aleman *Losberbaum*: en bas Aleman *Laurus boom*.

Le fruit est appelé en Latin *Lauri bacca*: en François Bayes de Laurier: en haut Aleman *Losberrett*: en bas Aleman *Baherret*.

#### LA CAUSE DV NOM.

Le Laurier se nomme en Grec *Λάρις*, pour vne ieune Nymphé appelée Daphné fille de Ladõ & de la Terre. Elle estoit aymée du dieu Apollo, & estoit fort embrasé de l'amour d'icelle, tellement que la pourfuyuant par tout, en la fin l'ataignit & retint. Mais icelle voyant la pourfuyte d' Apollo, inuoua soudainement sa mere la Terre en ayde, laquelle pourant l'englouit & au lieu de Daphné produisit vn beau Laurier. Ce que veu par Apollo, demoura fort estonné, & appela l'arbre aussi Daphné par le nom de sa bien aymée Daphné, & en print vne branche, de laquelle est en trelasé vne guirlande & la mit sur son chef. Dond depuis ce temps la le Laurier est demeuré toujours vn signe de Prophetie, & est dédié au dieu Apollo, c'est à dire au Soleil. Pourtant disent les Gentilz que le Laurier est contraire aux esprits malings & enchantemens: de sorte que en la maison ou y aura vne branche de Laurier, nulz enchantemens ne pourront nuire, ne fouldres aussi, & que personne estant en ladicte maison ne sera frappé d'Epilepsie. Ilz disent aussi que le Laurier porte santé. Pour ces raisons estoit par cy deuant donné aux Senateurs Romains vn rameau de Laurier le iour du Nouuel an. A ces fins estoient aussi les Poëtes couronnéz d'vne guirlande de Laurier. Pour ce que la Poësie est vne sorte de Prophetie & vaticination, sur laquelle Apollo preside.

#### LE TEMPERAMENT.

Les fueilles & fruit de Laurier sont chauds & secs iusques au second degré bien pres, principalement le fruit, lequel est plus chaud que les fueilles. L'escorce de la racine est chaude & seche iusques au tiers degré.

#### LES VERTV'S ET OPERATIONS.

- A Le fruit du Laurier prins avec vin, prouffite contre morsures & piqures de Scorpions, & contre tout venin & poison.
- B Iceluy pilé bien menu & mêlé avec miel ou quelque syrop, & souuent lesché & tenu en la bouche

Laurier. Laurier.



che, est fort bon à gens qui desechent, aux asthmatiques & qui ont difficulté de respirer, & qui ont le thorax chargé de phlegmes.

Le vin de la decoction d'iceluy, ou bien le ius d'iceluy distillé és oreilles, guerit le son & bourdonnement d'icelles, & prouffite contre sourdesse & dure ouye.

Le fruit de Laurier guerit aussi douleurs & lasitudes de membres, retiremens & conuulsions de nerfs, roignes humides & seches, induict avec vnguens ou huiles à ce conuenables.

Pareille vertu a aussi l'huile tirée du fruit de Laurier: dauantage elle guerit toutes meurtrissures, & contusions noires.

L'esforce de la racine du Laurier beuë en vin, prouoque l'vrine, & rompt la pierre, & la fait sortir & la grauelle pareillement.

Icelle prinse en mesme forte ouure les oppilations du foye & de la ratelle, brief toutes oppilations des parties interieures: pourtant prouffite elle à la iaulusse enuieillie, dureté de ratelle, commencement d'hydropisie, & esmeut les fleurs menstruelles des femmes.

Du Troefne.

LA FORME.

**T**roefne est vne plante basse, peu souuent croissant en hauteur, mais plus tost croissant en forme de haye que d'arbre, ayant plusieurs branches gresles & fions, & les fueilles lóguettes & verdes en obcur, semblables aux fueilles de Peruenche, plus grades & plus longues toutesfois. Au sommet des brâches croissent bouquetz de fleurs blâches comme celles du Suseau, apres lesquelles viennent petites bayes, verdes au premier, puis noires. **LE LIEV.**

Le Troefne croist en Alemaigne en plusieurs endroits de foy mesme, entre les hayes, & semblables lieux incultuez. On le plante en ce pais aux iardins.

LE TEMPS.

Le Troefne fleurit en May & Iuin, & le fruit est meur en Septembre.

LES NOMS.

Ceste plante est appelée en Grec *φιλύρα*: en Latin de Plaine *Ligustrum* duquel Virgile & Columelle escriuent côme dessus est annoté: en François Troefne: en haut Aleman *Heinsholtz*, *Heindholtz*, *Reinswiden*: en bas Aleman *Reynwiltgen*, *Wondthout*, & *Keelruyt*. **LE TEMPERAMENT.**

Les fueilles du Troefne sont froides, seches, & altringentes. Le fruit à quelque chaleur, au reste de pareillement aux fueilles.

LES VERTVS ET OPERA.

**A** Les fueilles de Troefne guerissent enflures, absces, & viceres de la bouche & viceres & pustules du gozier se lauant la bouche ou gargarisant la decoction, ou ius d'icelle.

**B** Icelles reduictes en poudre sont vtilement espanduës sur viceres malings & ronges. A ce mesme vaut aussi le fruit vif en mesme sorte.

De l'Agnes castus.

Chap. XXVI.

LA FORME.

**A**gnes castus prouiet en forme d'arbrisseau, ayant plusieurs rameaux flechiles & qui se laissent ployer sans facilement rompre. Les fueilles sont pour la pluspart parties en cinq, aucunesfois aussi parties en sept fueilles, comme celles du Chanure, dont chacune est longue & estroicte, non guere differente à la feuille de Saulx, beaucoup plus petite toutesfois. Les fleurs croissent au sommet des branches en forme d'espi, amallées ensemble autour de la branche, & sont de couleur aucunesfois purpurée, aucunesfois de leger purpuré entremeslé de blanc. Le fruit est rond comme grains de Poyure.



LE LIEV.

Vitez.

Agnus castus

Agnus castus prouient, tesmoing Dioscori de, au long des riuieres, & des ruisseaux, en lieux incultuez & rudes: & ce en Italie & aus tres regions chaudes, car ici on ne le trouue pas, sinon és iardins de quelques diligens Herboristes.

LE TEMPS.

En Aoult fleurit Agnus castus en ce pais.

LES NOMS.

Ceste plante est appellée en Grec *ἄγνος*, Agnos, & d'aucuns *ἀγνος ἢ ἄγνομος*; en Latin *Vis tex*, *Salix marina*, ou *Salix amerina*, & d'aucuns *Pi per agrestis*: és Boutiques *Agnus castus*: duquel n'ó il est cognu entre les Herboristes: en haut Aleman il se nomme *Schafmulle*.

LE TEMPERAMENT.

Agnus castus est chaud & sec iusques au tiers degré, & de parties subtiles.

LES VERTVS ET OPERAT.

- A Agnus castus est vne singuliere medecine & remede pour ceux qui veulent viure en chasteté, car il est contraire à tous appetis lubriques & luxurieux, & desche la semence genitale, en quelle sorte qu'on le prenne, soit en poudre ou en decoction, ou mis sur le liét & coucher dessus. Pourtant s'appelle il Castus, c'est à dire chaste & pudique.
- B La graine d'iceluy beué, chasse & refout toutes ventosités & inflations d'estomach, des entrailles, du vêtre, & de la matrice: brief de tous les endroits du corps là ou il y a ventosités amassées.
- C Icelle ouure & guerit toutes duretés & oppilations de foye & de ratelle, & prouistite au commencement d'hydropisie, prinse en vin à la quantité d'vne drachme.
- D Elle esmeut aussi le flux menstrual, prinse à part foy, ou avec Pouliot, ou bié appliquée par dessus en forme de Pessus.
- E On la mesle aussi vtilement parmy vnguens & huiles qui eschauffent, adoucissent & guerissent membres engourdis, enroydis, & lassés: elle guerit aussi les creueures du fondemét & boyen culer induictes avec eau dessus.
- F Agnus castus prouistite aussi grandement contre toutes bestes venimeuses, il dechasse & fait fuir tous serpens & autres bestes venimeuses de là ou on l'espend ou brulle: il guerit toutes piqures & morsures d'icelles induict dessus, pareillement aussi la graine beue.
- G Il guerit duretés, oppilations, absces & vlcères de matrice, si on fait asseoir les femmes en la decoction d'iceluy.
- H Les fueilles d'iceluy avec burre, refouident & digerent en flures des genitoires induites dessus.
- I On dict aussi que ceux qui vont par chemin ne se lassent point, & ne sentent nulles escorceures en portant sur eux vne branche d'iceluy.



Du Sumach.

Chap. XXVII.

LA FORME.

Sumach croist en forme d'Arbrisseau, d'environ la hauteur d'un homme, produisant plusieurs branches, sur lesquelles croissent fueilles longues velues & douces, ayans au milieu vn nerf rouge, lequel à chaque costé a six ou sept fueilles l'une cōtre l'autre, crenées par les bords comme les fueilles d'Agri-moine, ausquelles ces fueilles icy ressemblent fort. Les fleurs croissent entre les fueilles, amassées ensemble sur longs pedicules, de couleur verte en blanc. La graine est platte, rouge, croissant en rondes bayes amassées en forme de grappe.



LE LIEU.

Rhus coriaria Sumach.

Il croist en Espagne & autres regions chaudes en grande abondance. On ne le trouue en ce pais sinon chez quelques diligens Herboristes.

LE TEMPS.

Le Sumach fleurit en ce pais en Iullet.

LES NOMS.

Ceste plante est appellée en Grec *ρῦς*, & d'Hippocrates *ρῦς*: en Latin *Rhus*, d'aucuns *Rhos*: des Apothicaires & Medecins Arabes *Sumach*: en Brabant, des *C6* returs qui le plus souuent acoustrent leurs cuirs à la facon d'Espagne, *Smacke*.

La graine de ce *Rhus* est appellée en Grec *ρῦς ὀτρι* & en Latin *Rhus obsoniorum*.

Les fueilles s'appellent en Grec *ρῦς ὑποδύκω* en Latin *Rhus coriaria*, & d'icelles acoustrent ilz les cuirs en Espagne & en Italie, comme en ce pais de l'orce de Cheine.

LE TEMPERAMENT.

Les fueilles, jus, & graine de Sumach sont froides au second degre, & seches iusques au tiers, de temperament fort astringent.

LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Les fueilles de Sumach ont pareille faculté qu' *Acacia*: parquoy elles arrestent aussi flux de ventre, & fleurs des femmes de serdonnées, pareillement tout flux de sang, cuictees en eau ou vin, puis beues.
- B La decoction d'icelles arreste aussi flux de ventre & la dysentere, iectée dedas le corps par dessous avec vn chyltere, ou se baignant en icelle: elle deseché aussi la boue des aureilles, distillée dedans, & noircist les cheveux, si on sen laue la teste.
- C La graine de Sumach prinse en viande, arreste semblablement tout flux de ventre, la dysentere, & les fluxeurs des femmes, signamment les blanches.
- D Icelle induicte sur contusions fresches, meurtrissures, playes, & bleffures, les engarde d'inflammation, absces, & exulceration.
- E Icelle broyée avec charbons de cheine, guerit & seche les hemorrhoides, induicte dessus. Pareille vertu a la decoction des fueilles ou de la graine, si on les en laue.



De la Riguelisse.


Chap. XXVIII.

LA FORME.

1 LA Riguelisse a les tiges & branches droictes, d'environ trois ou quatre pieds de haut, reuestues de fueilles brunatres composées de plusieurs fueillettes amassées & situées l'une contre l'autre, semblables aux fueilles de *Lentiscus* & de *Tragium*. Les fleurs croissent sur courtes queuees entre les fueilles & les branches, amassées ensemble en forme de petites boules. Lesquelles passées ensuyuent de ronds chapiteaux herissonnez composés de plusieurs siliques hoüssues amassées ensemble, esquelles est enclöse vne graine platte. La racine est droicte, longue, iulne par dedens, brune par dehors, non guere differente en figure à la racine de *Gentiane*, mais de saueur douce.

2 On trouue encore vne espece de Riguelisse, laquelle ressemble à la dessusdicte de tiges & fueilles. Les fleurs & siliques d'icelle ne sont pas amassées ensemble en forme de chapiteaux, mais croissent le long de petis pedicules gresles en forme d'espy comme au *Galaga* & à la *Vesce* sauuage. Les racines d'icelle ne sont pas droictes, mais croissent de trauers & sont fort ramées, brunatres par dehors, & iulnes par dedens, & de saueur douce voire plus douce que la racine de la dessusdicte.

LE



## LE LIEU.

La Riguelisse croist, tesmoing Dioscoride, en Pontus & Cappadoce.

La seconde se trouue en aucuns endroits d'Italie & d'Alemagne. En ce pais elles ne croissent, & d'elles mesmes, sinon plantées es jardins des Herboristes. Mais la seconde y est la plus cogneue.

## LE TEMPS.

La Riguelisse fleurit en Juillet, & en Septembre est la graine meure.

## LES NOMS.

La Riguelisse est appelée en Grec γλυκύριζα; en Latin Dulcis radix, & Dulcisradix; de Plin Scythi ea radix; es Boutiques Liquiritia; en haut Aleman Süßholz, & Süßwurtzel; en bas Aleman Sücthou, Galissihout, & Calissihout.

La premiere espee est le Glycyrrhiza que Dioscoride décrit, & on la peut bien appeller Glycyrrhiza vera, ou Glycyrrhiza Dioscoridis.

La seconde est Glycyrrhiza communis, ou Glycyrrhiza Germanica, de laquelle on vse principalement es Boutiques de ce pais.

## LE TEMPERAMENT.

La Riguelisse est temperée en chaleur & humidité.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A La racine de Riguelisse adoucit l'aspreté du thorax & du gozier, ouure & descharge les poulmons oppilez & chargez, meine la toux à maturité & fait cracher le phlegme, la maché & tenant par vne espace de temps dans la bouche. Pareille vertu a le jus de la racine, prins en mesme sorte.
- B A celle cause font ilz en quelques monasteres de Hollande des petis pains contre la toux, du jus de Riguelisse meslé avec Gingembre & autres espifferies, mais ilz valent seulement contre toux enuieillee & froide, & semblables accidens des poulmons & du thorax.
- C La racine de Riguelisse estanche aussi la soif, & rafraichit bestomach sec & eschauffé, & prouffite aux maladies chaudes du foye, tenue en la bouche, ou la decoction d'icelle beue.
- D La mesme guerit aussi vicerés des rongnos, & rongnes de la vessie, & appaise l'acrimonie, & purulenté de l'vrine, cuicte en eau & souuent beue.

Icelle induit avec miel sur ulceres & exulceratiōs des parties exterieures, les guerit, se dit Plin. B  
 Brief elle & le jus d'icelle, est vn medicament propre à appaiser, adoucir, & à consolider ausi, F  
 fort vtile & conuenable à la poictrine, aux poulmons, aux reins, rongnons & vesie.

De Rhamnus. Chap. XXIX.

LES ESPECES.

SElon Dioscoride, il y a trois sortes de Rhamnus: Vne ayant les feuilles lēgues & charmes: L'autre ayant feuilles blanches: La tierce les ayant rondatres.

Deuxieme espece de Rhamnus.

Tierce espece de Rhamnus.



LA FORME.

Toutes les especes de Rhamnus sont plantes ligneuses, lesquelles selō Dioscoride ont moult de branches droictes, garnies d'espines piquantes & aigues, comme les branches de l'Auboespine.

1 La premiere espece de Rhamnus a moult de feuilles longues, estroictes, tēdres, charmes: entre lesquelles prouiennent espines longues, dures, & aigues.

2 La seconde espece a feuilles longues, estroictes, blanches, nō guere dissemblables en figure aux feuilles d'Oliue, beaucoup toutefois pl<sup>us</sup> petites, entre lesquelles y viēt d'espines courtes & poinctues.

3 La tierce a les feuilles vn peu largettes & bien pres rondes, de couleur brunatre, tirant sur le rouge. Les espines de ceste espece ne sont pas si grandes ne si fortes que celles de la premiere espece. Les fleurs sont iaulnates, lesquelles passées suruiēt le fruit qui est large, bien pres à la forme d'vn peson, dans lequel est enclōse la graine. LE LIEN.

Rhamnus croist par les hayes & buissons, tesmoing Dioscoride.

1 La premiere espece n'est pas cogneue en ce pais, mais en Langued'oc y en croist asses.

2 On trouue la seconde en ce pais sur les digues le long de la mer, principalement en Flandres, li ou en aucuns lieux elle croist abondamment.

3 On trouue la tierce en ce pais es tardins d'aucuns Herboristes, & s'en trouue grande quantité en Langued'oc.

## LES NOMS.

Ceste espèce de Haye est appelée en Grec *ῥαμνός* & en Latin *Rhamnus*: incognue és Boutiques.

## LE TEMPÉRAMENT.

Les feuilles de Rhamnus sont seches iusques au second degré, & froides bien pres iusques au premier.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les feuilles de Rhamnus guerissent Erysipeles, & guerissent viceres rouges plicés bien menés & appliqués dessus.
- B Les Medecins de Mōpelier ont trouué par experiance, que la graine de la tierce espèce de Rhamnus est fort singuliere contre grauelle & pierre, prinée en decoction ou autrement.

## Du Rhamnus solutiuus des Modernes.

## Chap. XXX.

## LA FORME.

Ceste plante croist en forme d'Arbrisseau duquel le tronc est souuent de la grosseur d'une jambe, le boys duquel est iualne par dedans & l'esforce de couleur de chasteigne, bien pres semblable à l'esforce de Cerisiers. Les branches sont garnies d'espines aiguës, dures & piquantes, & ont feuilles rondes, ressemblans aucunement aux feuilles de Pommiers sauvages, plus petites toutesfois. Les fleurs sont blanches, apres lesquelles ensuyuent de petites bayes rondes, verdes au premier, puis apres noires.

## LE LIÈV.

Ceste plante croist en ce pais le long des champs & des boys, & és hayes.

## LE TEMPS.

Elle fleurit au mois de May, & en Septembre est le fruit meur.

## LES NOMS.

Ceste espine est appelée en Brabant *Rhijn* & s'ensuyuent de ces noms: en haut Aleman *weghedorn*, c'est à dire espine de voyes pour ce que'elle croist le long des voyes & sentiers: en Latin d'aucuns *Rhamnus solutiuus*, lequel nom nous luy auons voulu laisser attendu que nous ne scauons autre nom, combien toutesfois qu'il n'ayt nulle similitude avec le Rhamnus de Dioscoride, ou de Theophraste, parquoy ce n'est pas le vray Rhamnus.

Le fruit d'icelle est appelé en Brabant *Rhijnseisen*, c'est à dire en Latin *Bacca Rhamni*, pour ce qu'il s'en trouue beaucoup le long du Rhin: en haut Aleman *weghedornbeer*, & *Geutsbeer*.

## LE TEMPÉRAMENT.

Elle est chaude & seche iusques au second degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Bayes de ceste espine purgent puillamment par bas, pouffans hors les phlegmes visqueux, & humeurs cholériques, & ce avec grande force & excès, tellement qu'elles troublent fort le corps de ceus qui en prennent, & souuent le font vomir. Parquoy elles ne sont conuenables sinon à quelques gens robustes, & rudes villageois, lesquels espargnent plus leur argent q' leur vie: A gens molles & debiles, ces bayes sont fort nuisibles par leur force desmesurée: Et d'autant plus pour ce que lon n'a encore trouué rien dequoy on les puisse corriger, ou rendre moins nuisibles.
- B D'icelles, auant qu'elles soient meures, delayées en eau d'alm, on en fait belle couleur iulne? & quand elles sont meures, couleur verde, laquelle on appelle en François Verd de vespien haut Aleman *Saffgrut*: en bas Aleman *Sappgrut*.

*Rhamnus solutiuus recentiorum*

Plante portant le verd de vespien.



## LA FORME.

Aube espine demeure souuent basse, & croist tortu, entrelassée en maniere de Haye, aucunes fois croist droicte en forme d'arbre: adonc deuient elle haute comme vn poyriet sauuage, ayant le tronc asses gros, couuert d'une ecorce cendreuse. Les branches croissent aucunes fois fort longues & droictes: principalemēt quand elle croist es hayes, & sont garnies de longues espines agues & poi gnées. Les fueilles sont larges, profond incisées par les bords. Les fleurs sōt blāches, odoriferantes, semblables en figure aux fleurs de Cerisier ou Prunier, apres lesquelles vient le fruiēt qui est rond & rouge. La racine est fort ramuē, & croist profond en terre.

## LE LIEU.

L'Aube espine prouient es hayes aux bords des champs, & des iardins, & es boys, & est fort commune en ce pais.

## LE TEMPS.

Elle fleurit en May, & le fruiēt est meur en Septembre.

## LES NOMS.

Ceste espine est nommée en Grec ἐρύκανθα καὶ ἐρύκανθας: en Latin *Spina acuta*, d'aucuns *Pyryna* & *πυρίνα* ou *Pytyranthe*: en François on l'appelle Aube espine: en haut Aleman *Spagboorn*: en bas Aleman *Spagheboorn*, & *Witte Spagheboorn*.

Elle semble biē à voir le *κωρβόρος* c'est à dire *Rubus cavis* & *Canina fentis*, dont parle Theophraste au li. 3. chap. 18.

## LE TEMPERAMENT.

Le fruiēt de l'Aube espine est sec & astringent.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

Le fruiēt de ceste espine arreste flux de ventre, & les fleurs des femmes.

Et selon aucuns Modernes il prouffite contre la pierre & grauelle.

## Du Buys.

## Chap. XXXII.

## LES ESPECES.

Buys est de deux sortes, Grand & Petit, tous deux vulgaires en ce pais.

## LA FORME.

1 Le grand Buys est vn beau grand arbre, ayant le tronc gros, dur, conuenable à faire beaucoup d'ouurages & instrumens: car le bois d'iceluy est espes, ferme, dur, & se laisse fort bien mettre en cœure, & tailler de toutes sortes: dauantage il dure long temps, tellement qu'il ne se pourrit & ne perit facilement. Il a moult de rameaux durs & gros comme les autres arbres, reuestuz de moult de fueilles brunatres, lesquelles ne tombent pas, mais demeurent verdes tant l'hyuer que l'esté. Les fleurs croissent entre les fueilles sur petites branchettes menues, apres lesquelles vient la graine noire, enclosē en ronds calicules, de la grosseur du grain de Coriandre.

2 Le petit Buys est vn petit arbrisseau, non guere excédant la hauteur de deux pieds, mais estendant souuent les rameaux fort au large, lesquels prouiennent en grande quantité de la racine pour la pluspart, aucunes fois ausi d'un petit tronc. Les fueilles d'iceluy sont de couleur plus clere en verd, plus rondes, & vn peu plus petites que les fueilles du grand Buys, au reste elles sont semblables au dessus dit.



## LE LIEV.

Le Buys croist voluntiers en hautes montaignes & froides, comme es montaignes & deserts de Suyffe, Saouye, & autres lieux semblables là ou il croist abondamment. En ce pais on plante toutes les deux especes es iardins.

## LE TEMPS.

Le Buys fleurit enuiron le moys de Feurier, & de Mars. Et en Septébre est la grainé meure en aucunes regions.

## LES NOMS.

Le Buys se nomme en Grec *πύθος*; en Latin *Buxus*; en haut Aleman *Buxbaum*; en bas Aleman *Buxbaum*, & du vulgaire *Palmboom*, pour ce que le iour de Pasques fleuries ilz portent les rameaux & brâches d'ice luy au temple.

Le petit Buys est appelé d'aucuns en Grec *χαμαίπύθος*; en Latin *Nani Buxus*.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles de Buys sont chaudes, seches, & astringentes, comme le goust demonstre manifestement.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

On n'vse point du Buys en Medecine, & on ne trouue chez les Anciens rien particulier descript des facultez d'iceluy: toutesfois il y a quelques femmes & autres ignorans (lesquelz sauencent de donner remede aux maladies qu'ilz ne cognoissent point,) qui donnent les somitez du Buys à gens trauaille d'Apoplexie, ce qui est contre raison: car non seulement le Buys nuyt au cerueau prins dans le corps, mais est aussi tresmauuais souuent flairé.

Aucuns Modernes sauis escriuent que la lexieue *Πυρακισθή, Lycium* ou ont trempé fueilles de Buys, jaulnit les cheueux si on l'en lase la teste.

## Du Buys espineux. Chap. XXXIII.

## LA FORME.

Buys espineux est vn arbre non guere different au Buys, ayant mout de grosses branches de cinq ou six pieds de lög, ou dauantage, & les fueilles rondelettes, espesses, semblables à celles du Buys, & entre icelles, des espines aigues & poignantes. Les fleurs viennent aussi entre les fueilles, & puis vne grainé noire, ronde, comme de la grosseur du grain de Poyure. Les racines söt ligneules, & s'elcé dent au large.

Des Branchettes & racines de cest arbre trempées puis cuites, ou de la grainé exprimée, on en fait le Lycium, lequel a esté par cy deüit en gräd vsage en Medecine.

## LE LIEV.

Le Buys espineux prouient en Cappadoce & Lycie, & en aucis endroits d'Italie & Esclauonie. Il est encores incognu en ce pais.

## LES NOMS.

Ceste espine est appelée en Grec *πυράκισθη* & *λύκιον*; en Latin aussi *Pyracistha* & *Lycium*, de Theophraste *λύκισθος*, c'est à dire *Buxus spinosa*. On la peut bie appeler en François Buys espineux ou Buys d'asne; en bas Aleman *Buxpözen* selon le nom Grec.

LE



LE TEMPERAMENT.

Lycium, de seche, subtilie, & est astringent, comme dit Galien.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Lycium qui est tiré des branchettes, & racines, ou de la graine de Pyxantha, ayde à ceux qui sont trouués de flux de ventre & dysentere, pareillement aussi à ceux qui crachent sang, & ont la toux.
- B Il arreste aussi le flux menstrual desordonné, prins par dedans, ou appliqué par dehors.
- C Il est aussi tresutile aux vicerés rongeurs & pourris, oreilles coulantes, inflammations des gencives & amigdales, & aux creueures des leures & du fondement, in duict dessus.
- D Il esclarcit la veue, & guerit demangeons & gratelle des paupieres, & angets des yeux.

Du Houx. Chap. XXXIII

LA FORME.

Aquifolia.

Houx

**H**oux croist souuent en forme de haye entre les autres espines, aucunes fois aussi tout droict & deuiet grand & haut arbre, aynt le tronc gros, & les branches pareillement: le boys d'iceluy est fort dur & pesant, allist au sons de l'eau comme le Guaiac, ou Bois sainct, auquel le Houx ne ressemble pas mal. Les fueilles d'iceluy sont espesses & dures, d'environ la grandeur de la fueille de Laurier, mais pleines de coings espineux, lesquelles fueilles demeurent verdes iuer & a esté comme les fueilles de Buys & du Laurier, & ne sietrisent point facilement. Le fruiet du Houx est rond, d'environ la grosseur d'un Poys, de couleur rouge, & de goust ingrat & mal plaisant.

LE LIEV.

Le Houx croist en ce pais en lieux mal cultiuez & rudes, le long des chemins & des boys.

LE TEMPS.

Le fruiet du Houx est meur en Septembre, & demeure long temps apres sans tomber.

LES NOMS.

Le Houx est appellé d'aucuns Modernes en Grec *δρυφορίον ἄγρια*: en Latin *Ruscus flæstris*: en haut Aleman *walddistel*, oder *berchspalmen*: en bas Aleman *Huffi*: & semble bien à voir l'*Aquifolia* de Plinc, laquelle en Grec est appellée *ἄγρια* te moign Theodore Gaza. Toutes fois ce n'est point l'*Aquifolium* qui est appellé de Theophraste en Grec *καράγυος* & *καράγυον* te moign Plinc au li. xxvij. chap. viij. Ce n'est pas aussi *Paliurus* comme aucuns pensent.

LE TEMPERAMENT.

Le fruiet du Houx est chaud.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Aucuns lesquels se vantent auoir expérimenté le Houx, disent que cinq bayes d'iceluy prinnes sont bonnes contre la Colique, & sont aller à selle.
- B De l'esorce d'iceluy on en fait du gluz, pour prendre les oyseaux, la facon de faire duquel est assez cogneue.
- C On vse des petites branches & fueilles pour nettoyer les cheminées, comme on fait en Bourgoine & autres regions du Myrte sauuage & espineux. Autre chose ne scaurions nous escrire du Houx, attendu qu'on n'en vse point en Medecine.

Du Pommier. Chap. XXXV.

LES ESPECES.

Il y a plusieurs especes de Pommes, non seulement differetes en figure, mais aussi en saueur, grosseur



leur, & couleur, de sorte que ce n'est pas chose facile à pouoir nombrer toutes les espèces, comme aussi il n'est aucunement nécessaire, considéré que les arbres qui portent les pommes, ressembtent bien pres l'un à l'autre d'avantage qu'on peut aussi comprendre en peu d'espèces toutes sortes de Pommes, pour plus claire declaration de leur tēperament & facultez: leauoir est en douces, aigres aulteres, astringentes, aqueuses, & Pommes moyennes entre icelles.

#### LA FORME.

Les Pommiers deuiennēt pour la plus part avec le temps, hauts arbres & gros, ayant moult de branches estendues. Les feuilles verdes, rondatres, plus que celles du Poyrier, lesquelles perissent sur l'uyer renouuellans au moys de May. Les fleurs sont pour la plus part blanches, & sur aucuns Pommiers purpurées. Le fruit est rond de diuerfes sortes, de couleur & de saueur cōme dessus est dict. Et au milieu d'icelles sont enclos les pepins noirs en peaux dures.

#### LE LIÈV.

On plante les Pommiers es iardins & vergers, & ayment terre fertile & grasse.

#### LE TEMPS.

Les Pommiers fleurissent le plus souuent à la fin d'Auril, ou au commencement de May. Le fruit est meur, d'aucuns en Iuliet, d'aucuns en Aoult, des derniers en Septembre.

#### LES NOMS.

Le Pommier est appelé en Grec *μῆλα* en Latin *Malus* & *Pomus*: en haut Aleman *Apffelbaum*: en bas Aleman *Apffelboom*. Le fruit est appelé en Grec *μήλα*: en Latin *Pomū* & *Malum*: en François *Pōme*: en haut Aleman *Apffel*: en bas Aleman *Apfel*.

#### LE TEMPERAMENT.

Toutes Pōmes sont froides & humides les vnes toutesfois plus que les autres. Les aigres sechent plus que les autres, signamēt les astringētes. Les douces sont mois froides, & bien pres moyennes & temperées. Les aigueuses sont les plus humides, principalement celles qui ne sont ny aigres ny douces, mais participantes de tous les deux gousts.

- A** Les pommes rafraichissent l'estomach chaleureux, signamēt celles qui sont aigres & astringentes en saueur, & on en peut vser en fieures chaudes & autres inflammations d'estomach, & contre la soif: autrement, elles nuissent à l'estomach, excitans ventositez, & inflations au ventre.
- B** Pommes aigres cuites & mengées froides auant le past, lachent tout doucement le ventre.
- C** Pōmes mēgées auit le past, nourrissent fort peu, & dōnent alimēt fort humide & mauuais: car el les le corrompent incontinēt en l'estomach, & se tournēt eo mauuaises humeurs, principalement les playes nouvelles, pour empescher l'inflammation & aposteme.
- D** On peut appliquer les feuilles de Pommier sur commencement de phlegmons, & (aqueuses).


### Des Pommes d'Orange, Citrons, & Limons. Chap. XXXVI.

#### LES ESPECES.

Il y a trois sortes de Pommes à present, qui ont parcy deuant esté des Anciens comprises sous le Nom *Citrium*, dont la premiere est appelée Pōme d'Orange, la seconde Limō: la tierce Citrōo.

#### LA FORME.

Les arbres qui portent les Oranges, Citrons & Limons, croissent haut cōme autres arbres, aynt moult de rameaux verts, garnis en aucuns endroits d'espines fortes & poignātes. Les feuilles sōt verdes & espesses, non guere differentes aux feuilles de Laurier. Le fruit a l'escorce fort espesse pleine au dedens de moelle transparente, pleine de ius, entre laquelle est la graine.





1 La pomme d'Orange est ronde comme vne pome vulgaire, ayant l'escorce espesse, verte par dehors au commencement, puis apres qu'ad elles sont meures de belle couleur, orangée, comme Saffran blanche par dedans & spongieuse. La moelle est claire & pleine de ius, aigre en plusieurs pommes, & doux en aucunes. La graine est bien pres de la grandeur d'un grain de Blé, de goust amer.

2 Le Limon a la figure plus longue que l'Orange au reste nō guere differente, il a aussi l'escorce plus palle, & plus deliée, & la graine fort petite.

3 Le Citron est long, bien pres en forme de Concombre, ou plus long, l'escorce est espesse, iaulne par dehors, & blanche par dedans. Le dedans ou moelle est claire comme le dedans de l'Orange, ou est contenue la graine non guere differente à la graine de l'Orange.

#### LE LIEV.

Ce fruit prouient en Italie, Espagne, & aucis endroits de France. En ce pais les Herboristes plantent l'Oranger en leurs iardins, mais il ne porte point de fruit, si ce n'est cōstit bien gardé du froid & ce encores fort peu souuent.

#### LES NOMS.

L'Arbre qui porte ces fruits est appelé en Grec *μάλια μασχάοι*: en Latin *Malus medica*, & *Malus citria*.

Les fruits sont appelez par les anciens toute d'un nom en Grec *μάλα μασχάοι*: & en Latin *Malus citria*.

1 La premiere espece est aussi appelée des Anciens en Grec *χρυσόμυλον*: en Latin *Aureum malum* & *Malum Hebræicum*, d'aucuns aussi *Neranzium*, des Modernes *Malum Anaranzium*, & *Arantiam*: en François Pomme d'Orange: en haut Aleman *Pomeranz* *essen*: en bas Aleman *Arangie* *appelen*: en Espagnol *Naranzas*, lequel nom semble estre tiré de ce vocable *Neranzium*, du quel ces Pommes ont esté appelées par cy deuant tesmoing Nicander.

2 La seconde espece est appelée es Boutiques de ce pais *Limones* & *Malum Limonium*: en François *Limons*: en Aleman *Limonen*. Antoine Musc écrit que les Italiens nomment ce fruit *Citrium malum*.

3 La tierce espece est appelée *Cedromelon*, & en ce pais *Citroues* & *Mela citria*: en François *Citroues*: en haut Aleman *Citrimaten*: en bas Aleman *Citroenen*. Cette espece est appelée des Italiens *selon*: dit Musc, *Limones*.

#### LE TEMPERAMENT.

L'escorce de ces Pommes est chaude & seche.

Le dedans avec le ius est froid & sec iusques au tiers degré.

La graine est chaude & seche au second, de semblable temperament font bien pres les feuilles de l'arbre.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS:

A Le ius de ces pommes, & le dedans ou est contenu le ius principalement des Oranges, est tres bon contre corruptions contagieuses, & contre la peste & autres heures chaudes, & contregarde & preserue non seulement les gens contre telle maladie, mais aussi guerit la mesme maladie.

B Il cōforte aussi le cœur, & sur tout l'orifice de l'estomach: pourtāt guerit il toutes foibleses, passoyson, fluxuations, vomissemens & sanglouts suruenans es fieures chaudes, ou semblables maladies qui trouaillent l'estomach.

C Le mesme fruit avec son ius estanche la soif, & reueille l'appetit pour manger.

D Le syrop qui est fait du ius de ce fruit est pres pareil en facultez & operations au ius, il est toutesoies plus conuenable & plus amiable à prendre.

*Malus Citria cum malis tris* Oranger avec 3. diuers fruits.



- E** Les escorces de ces Pommes confictes seules ou avec sucre & mengées, reſſauſſent l'estomach, & aydent à la cuyſſon, conſumis toutes ſepareſſe de l'estomach, amendans pareillement l'aleine punaiſe.
- F** La graine eſt bonne contre tout venin, poiſon, piqures & morſures de toutes beſtes venimeuſes: elle tue & pouſſe hors les vers, tellement qu'il eſt bon de la donner aux enfans contre ladite maladie.
- G** De la graine miſe en terre en vient la premiere année de pe tis Arbriffeaux leſquelz mengex en ſalade, ou parmy autre ſalade, ſont fort ſauoureux: dauantago confortent tresbien l'estomach, & reueillent l'appetit

## De l'Arbre Mose.

## LA FORME.

**M**oſe eſt vn Arbre qui a les fueilles ſi tresgrâdes & larges, que lon pourroit facilement enuelopper vn enfant d'vn an dedens, tellement que ie ne penſe point qu'au monde il y ait arbre qui a la fueille d'vne telle largeur. Le fruiçt eſt ſemblable au Conçobre, tresſauoureux à manger ſur tous les fruiçts qui ſont au pais de Leuant.

## LE LIEV.

Ceſt Arbre a eſté trouué par vn religieux Frere Andrieu Theuet, en Syrie pres la grâde ville Alep ainſi appellée de la premiere letre Alphabetique des Hebreux là ou pluſieurs marchans traffiquent tant Indiens, Perſiens, Veniciens, qu'autres nations eſtrangeres.

## LES NOMS.

Ceſt arbre avec ſon fruiçt eſt appellé d'Auicenne chap. 495. *Mafa*, & eſt preſent en Syrie Moſe: & les Grecs, & Chreſtiens du pais, les Iuiſs auſſi diſent que c'eſt le fruiçt duquel menges Adam.

## LE TEMPERAMENT.

Le fruiçt du Moſe eſt chaud & humide

## LES VERTVS ET OPÉRA.

- A** Le Moſe méçé nourrit fort & ſoudain cōme dit Auicenne, mais mengé en trop grande quantité, eſtouppe le foye, & engendre phlegmes & cholere.
- B** Il eſt auſſi vtile à la poiçtrine, à l'estomach & rongnons, il adoucit les rudelles & aſpretez du gozier, prouoque l'vaine, et augmente la ſemence genitale.

## De la Pomme de Grenade. Chap. XXXVIII.

## LES ESPECES.

**I**L y a trois fortes de Pommes Grenades, les vnes ont le ius aigre, les autres doux, & les tierces vineux. Outre celles là y en a encoere vne eſpece ſauuage, dont les fleurs ſont vſurpées en medecine.

## LA FORME.

Le Grenadier eſt vn arbre non guere grand, portant mout de rameaux: les fueilles bien verdes & eſtroictes. Les fleurs ſont creuſes, de couleur de vermillon, puis apres vient le fruiçt qui eſt rond, & plein par dedens de beaux grains incarnes, d'ou ſort le ius, lequel eſt ou aigre, ou doux, ou vineux en ſauceur. L'escorce de ceſte Pomme eſt tendre & greſſe, mais eſtant ſeçhée, elle deuiet dure & hgneuſe, & de couleur de chaltaigne par dehors.

## LE LIEV.

Les Grenades croiſſent en regiōs chaudes, comme en Italie, Eſpaigne, & pluſieurs autres lieux.

LES

## Chap. XXXVII.

*Mafa.**Moſe.*

LES NOMS.

Malus punica.

Grenadier.

La Pomme Grenade se nôme en Grec *πόιν* & en Grec *πίον* en Latin *Malum punica*, & *Masim granatum*; les Boutiques *Pomum granatum*; en hauc Aleman *Granat* appelle; en bas Aleman *Granet* appelle.

Les fleurs du Grenadier domestique sont appellées en Grec *κίρνα*, & en Latin *Cyrti*. Les fleurs du sauvage selô Dioscoride sont appellées en Grec *βαλάντιον*; & là selon en Latin *Balaustium*.

L'escorce de la Pomme Grenade est appellée en Grec *σίδιον*; en Latin *Malicorium*, & aussi *Sidium*.

LE TEMPERAMENT.

Les Grenades sont froides & vn peu astringentes, mais non toutes d'vne mesme forte. Les aigres sont plus seches & astringentes; les douces tout le moins, & sont plus humides que les autres; les vineuses sont moyennes; L'escorce & les fleurs sont seches & astringentes.

LES VERTVS ET OPER.

- A Le ius des Grenades est fort propre à l'estomach, le confortant, & le rafraichis; fant quand il est par trop chaleureux; il est bon pareillement eetre foiblesse & fluctuations, côme le ius d'Oranges & de Citrons, & est fort vtile contre toutes fiures & inflammation de foie & du sang, principalement le ius des Grenades aigres, puis apres des vineuses; car les douces ne sont pas conuenables en fiures.
- B Les fleurs du Grenadier domestique & Sauvage, pareillement aussi l'escorce des pommes, arrestent tout flux de sang, reduictes en poudre & mengées, ou cuites en vin rouge & beuës, & sont vtils aux dysenteriques, & aux femmes traunilées de leurs fleurs, non seulement prinës en la sorte que dessus, mais aussi en se baignant en la decoction d'icelles.
- C Elles arrestent aussi flux de sang de playes nouvelles, en quelque forte que ce soit appliquées.
- D L'escorce tue les vers, & resiste à toutes corruptions dans l'estomach & entrailles.
- E Icelle, ou les fleurs, guerit humidité & debilité des genciues, avec ce rafermit les dens, si on les lioit en la decoction d'icelle.
- F L'escorce est bonne contre Romptures & hernies, meslée pasmy emplastres & liée dessus.
- G La graine des Grenades sechée au Soleil, a pareille vertu que les fleurs; elle arreste flux de vêtre & tout flux de sang, prinë en mesme forte.
- H Icelle induict avec miel, prouffite aux vlcères & vlcérations de la bouche, des genitoires, & du fondement.
- I On diët aussi comme Dioscoride escrit, que ceux qui prendront trois fleurs du Grenadier domestique, iuront dans vn an apres les yeux chalsieux.



Du Coing. Chap. XXXIX.

LES ESPECES.

Il y a deux fortes de Coing; L'vn est rond, & s'appelle Pomme de Coing; L'autre est plus grand & formé en façon de Poyre, & se nomme Poyre de Coing.

LA FORME.

La Coignaciere deuiet peu souuent fort grande, mais, elle produict moult de branches comme les autres arbres. Les fueilles sont rondates, verdes au costé d'enhaut, & blanches & douces à l'autre costé; au reste semblables en figure aux fueilles du Pommier vulgaire. La fleur tire sur couleur purpurée entremeslée de blanc; puis apres vient le fruit d'odeur plaisante,

& de figure acunefois ronde comme vne pomme, aucunefois longuatre comme vne poyre, couuert par dehors d'vne pelure iaulne reueitue d'vne petite laine blanche comme Cotté. Au milieu du fruit est contenue la graine ou pepins comme aux autres pommes.

LE LIEV.

On plante la Coignaciére és jardins: elle ayme lieux ombrageux, & humides.

LE TEMPS.

Le Coing meurilt en Septembre & Octobre.

LES NOMS.

La Coignaciére est appellée en Grec *μαδία κυδων* ou *μαδία* en Latin *Malum Cotonum*: en haut Aleman *Quittenbaum*, oder *Kattenbaum*: en bas Aleman *Queappelboom*.

Le fruit se nomme en Grec *μαδων κυδωνιον*: en Latin *Malum Cotonum*, és Boutiqs *Cytosium*: en François Coing: en haut Aleman *Quitten oppfel*, & *Kuttenoppfel*: en bas Aleman *Queappel*.

Le fruit rond est appelé d'aucuns *Poma Cytonia*, en François *Pôme de Coing* ou *Coing*: en bas Aleman *Queappelen*.

L'autre fruit qui a la forme de Poyre, Galien l'appelle *σπυδία* *Struthia*, & s'appelle en François *Poyre de Coing* ou *Coignasse*: en bas Aleman *Quirperren*, d'aucuns *Pyre Cytonia*.

LE TEMPERAMENT.

Le Coing est froid au premier degré, sec au second, & astringent.

LES VERTVS ET OPERAT.

A La Pomme de Coing arreste flux de ventre, dysentere, & tout flux de sang, & prouffite à ceux qui crachent sang, signamment crué, car cüste ou rosée, ne serre pas tant, mais est plus sinoureuse & plus conuenable à menger.

B La femme grosse qui mange souuent en viandes ou autrement des Coings, elle enfantera enfans prudens & de bon esprit, se dit Simeon Sethi.

C Le Codignac préparé avec miel (comme on faisoit par cy deuant) ou avec sucre (comme lon fait maintenant) est tresprouffitable & propre à l'estomach, le confortant, & retenant illecia vien de tant qu'elle soit digerée.

D Il arreste aussi flux de ventre, prins auant menger: & prins apres menger lache le ventre, & dot la bouche de l'estomach de telle sorte, qu'il n'en peut sortir ne monter nulles vapeurs ou cerneus d'auantage guerit douleur de teste prouenant de telles vapeurs.

E La decoction des Coings beuë a pareille vertu, & arreste le ventre & tout flux de sang, & les fleurs menstruelles.

F D'icelle on baigne le fondement relaché, & la matrice tombante, pour les faire retourner en leur lieu.

G On mesle vtilement les Coings parmy Emplastres, propres pour arrester flux de ventre & vomissemens. On les applique aussi sur inflammations de mammelles & autres parties.

H La laine qu'on trouue dessus les Coings cüste en vin guerist Carboncles, appliquée dessus, se dit Pline.

I Huile de Coing arreste vomissemens, fluxuations, & sanglots, induite sur l'estomach.

K La fleur de la Coignaciére arreste flux de ventre, crachement de sang, & le flux mensuel. Brief elle a semblable vertu que les Coings mesmes.

Du Pescher.

Chap. XL.

LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Pesches. Les vnes meurissent tard, & sont pour la plus part blanches, aucunes fois iaulnes, & les aucunes aussi rouges. L'autre espee meurist plus tost, & est appellée *Abricos*.




Malus Persica.

Pescher

Malus Armeniaca.

Abricoz.



LA FORME.

1 Le Pescher est plus tendre que les autres arbres, il n'est pas de longue durée, mais perit & meurt beaucoup plus tost que nulz autres arbres fruitiers. Les feuilles du Pescher sont longues, un peu crenées par les bords, non différentes des feuilles de Saule en autre chose, sinon qu'elles sont plus courtes & ameres. Les fleurs sont persifères; après lesquelles vient le fruit, de figure ronde, d'une vne Pomme, ayant d'un costé vne fente droite & profonde, & couverte d'une pelure languissante de couleur maintenant blâche, maintenant rougeatre, maintenant iaulne, de goust vineux. Au milieu d'icelles est vne pierre dure & rude, contenant un noyau côme vne Amande, plus petit toutesfois & plus amer.

2 L'arbre qui porte les abricoz, n'est guere différent de boys, fleurs, & façon de croistre à l'autre Pescher, sinon que ses feuilles sont courtes & larges, différentes des feuilles du Pescher. Le fruit semble à la Pesche, plus petit toutesfois & beaucoup plus tost meurt.

LE LIEU.

On plante le Pescher és jardins & és vignobles, & aime terre molle & douce, & lieux exposez au Soleil.

LE TEMPS.

Le Pescher fleurit en Avril, & les Abricoz sont meurs en Juin, les Pesches en Septembre.

LES NOMS.

1 Le Pescher s'appelle en Grec *περσική μολιά*; en Latin *Malus Persica*; en haut Aleman *Pfersich*; en bas Aleman *Persboom*.

2 Le fruit est appelé en Grec *μήλον περσικόν*; en Latin *Malum Persicum*; és Boutiques *Persicum*; en François *Pesche*; en haut Aleman *Pfersing*; en bas Aleman *Pers*. Celles de ceste sorte qui ne se separent pas facilement de leur pierre, sont appelées *Duracins*.

L'arbre

L'arbre portit Abricoz s'appelle en Grec *μαλία ἀρμυιακή*: en Latin *Malis Armeniaca* en Alemā *Wozghe pefcheom*.

Le fruit s'appelle *μαλία ἀρμυιακή*: en Latin *Mala Armeniaca*, *Præcoqua* & *Præcoela*: en François Abricoz: en Haut Aleman *Wozghelein* & *Wozghelein*: en bas Aleman *Wozghe pefchens* & *Quant pefes*.

Pefea ne doit point estre nombre sous ces especes, comme aucuns pensent, car Pefea est vn grand arbre comme vn Poyrier, tousiours verd & chargé de fruit, ainsi que dit Theophraste lib.iiij. chap.ij.

## LE TEMPERAMENT.

La Pefche est froide & humide au second degré. Les feuilles de l'arbre, & le noyau du fruit sont chauds & secs, bien pres iusques au tiers, & absterifs à cause de leur amertume.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Pefches auant qu'elles soient meures arrestent flux de ventre comme dit Dioscoride,  
 B Mais meures, elles lachent le ventre, & enpendrent mauuaises humeurs, car elles se corrompēt incontinent en bestomach, pourtant ne les doit on pas manger apres autres viandes teimoung Galien.  
 C Les feuilles du Pecher ouurent oppilations de foye, & lachent tout doucemēt le ventre, & profitent, avec autres herbes conuenantes, contre sieures tierces.  
 D Icelles appliquées sur le nōbril tuent & pouillent hors les vers, principalement aux petis enfans.  
 E Icelles seches & espan dues sur playes nouuelles, les guerissent & consolident.  
 F Le Noyau de la pefche ouure toutes oppilations du foye & des poulmons, & a fort semblable vertu aux Amandes ameres.  
 G Il est bon aussi contre difficulté de parole, quand quelcun est frappé d'Apoplexie, delayé en eau de Pouliot, & tenu en la bouche.

## De l'Amandier.

## LES ESPECES.

Amandes sont de deux sortes, Les vnes douces, Les autres ameres.

## LA FORME.

L'Amandier ressemble de croissō & feuilles au Pecher, il deuiet plus gros toutesfois, plus fort, & peut plus lōg tēps durer. Le fruit est vne noix dure cōme la pierre de Pefche, vne toutesfois par dehors, & couuerte d'vne escaille cōme la noix gague, dans iceluy est enclōse l'Amande, de goult amer, ou doux, cōme dessus est dict.

## LE TEMPS.

L'Amandier fleurit de bōne heure, avec le Pecher. Le fruit est meur en Iuin & Juillet.

## LES NOMS.

L'Amandier s'appelle en Grec *ἀμυγδαλίη*: en Latin *Amygdalus*: en haut Alemā *Wandelsbaum*: en bas Aleman *Wandelsboom*.

Le fruit est appelé en Grec *ἀμυγδαλίη* & *ἀμυγδαλίη*: en Latin *Amygdala* & *Amygdalum*: en François Amande: en haut Aleman *Wandel*: en bas Aleman *Wandels*.

## LE TEMPERAMENT.

Les Amandes ont le temperament asses chaud, signamment les ameres, lesquelles non seulement sont chaudes, mais aussi seches absterifs & incisives.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Amandes prinées auēt le pass, nourrissent peu & serrent le ventre, principalement estant plumées.

## Chap. XLI.

*Amygdalus.* Amandier.



- B** Les Amandes ameres, ouurent opilations des poulmons, foye, ratelle, rongnons & de toutes autres parties interieures: pour tant elles bonnes contre toux, difficulte d'aleine, exulceratiōs de poulmons, meſlées avec terbenchine, puis lechées, teſmoing Dioſcoride.
- C** Les Amandes ſont auſſi viles à ceux qui crachent ſang, prinſes avec amydon.
- D** Amandes ameres prinſes avec quelque vin doux, cōme Muſcadel ou Baſtard, prouoquent l'vrine, gueriffent difficulte d'vrine, & prouiffent à gens trauaillez de la pierre & grauelle.
- E** On prend à ieun cinq ou ſix Amandes ameres pour ne pas eſtre yure ce iour la.
- F** Icelles appliquees ſur le fruit & avec huile roſat, gueriffent douleur de teſte.
- G** On les applique vilement avec miel ſur tous viceres malings, pourris & rongens, & ſur morfures de chiens enragez.
- H** Icelles nettoient le cuyr, & la face de toutes taches & lentilles.

Du Poyrier. Chap. XLII.

LES ESPECES.

ON trouue auſſi bien diuerſes fortes de Poyres comme de Pommes. Les vnes bien toſt meures les autres plus tard, il y a auſſi des Poyres d'vuer: Les vnes periffent ſoudain, les autres durent long temps, & ſe peuvent garder: Les vnes ſont douces ou pleines de ius, les vnes graſſes, les autres dures & ſeches &c. tellement quil ſeroit mal poſſible de reduire en bon ordre toutes les eſpeces: Parquoy tous Lecteurs ſeront admonſtēs de vouloir plus toſt conſiderer le gouſt des Poyres, que la figure, ou temps de meurifon: car la faueur demonſtre mieux le temperament, & donne à cognoitre les facultez des Poyres.

LA FORME.

Le Poyrier eſt grand comme le Pommier, ou plus grand & plus haut, ayant le tronc gros, & mout de branches groſſes, leſquelles pour la plus part croiffent à mont, & non l'vne ſus l'autre, comme les branches du Pommier. Les fueilles ſont rondatres, vnies & bien verdes par deſſus: par bas ſouuent vn peu blanchatres. Le fruit eſt pour la plus part long, large par bas, & eſtroict par haut aupres de la queue, fort diuers de groſſeur, figure, couleur, & gouſt, comme deſſus eſt dict, au milieu du fruit ſont enclos les pepins, cōme aux Pommes.

LE LIEV.

Le Poyrier ſe plante es iardins & vergers: il y en croiſt auſſi aucunes fois es boys &c. mais mal cultiuez, mais on les tiēt pour ſauuages.

LE TEMPS.

Le Poyrier fleurit en Avril ou May, & le fruit eſt meur en eſtē & Automne

LES NOMS.

Le Poyrier ſappelle en Grec *ἄριος*: en Latin *Pirus*: en haut Aleman *Byrbaum*: en bas Aleman *Perboom*.


Le fruit eſt appelle en Grec *ἄρις*: en Latin *Pira*, ou cōme aucs eſcriuent *Pyra*: en François Poyres: en haut Aleman *Byren*: en bas Aleman *Perren*.

LE TEMPERAMENT.

Toutes Poyres ont le temperament froit & la plus grand part ſec & astringent, mais non toutes egalement: car les Poyres ſauuages, & autres astringentes & eſtrangantes, ſechent & ſerēt beau coup plus que les autres. Les poyres douces & graſſes, ſont plus humides

Pirus.

Poyrier.



& bien peu ou point adstringentes. Les moyennes entre icelles, ont le temperament selon celles auxquelles elles retirent le plus.

Les feuilles du Poyrier ont le temperament froid, sec & altringent comme dit Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Poyres princes auant le repas, nourrissent fort peu, plus toutesfois que les Pommes, principalement celles qui sont douces & grasses.
- B Les aigres & aulteres, & autres qui ne sont pas aqueuses, mengées crues ou cuites auant le repas, arreitent flux de ventre, & fortifient la bouche de l'estomach.
- C Icelles sont aussi vtilement appliquées sur cõuenemens de phlegmõs, & sur playes nouvelles.
- D A ce mesme valent aussi les feuilles de Poyrier, car elles cõsolident & referment playes nouvelles, se dit Galien.

## Du Nefflier.


## Chap. XLIII.

## LES ESPECES.

IL y a deux especes de Neffles selon Dioscoride. La premiere espece croist sur espines. La seconde sont les Neffles vulgaires, lesquelles sont aussi de deux fortes: car aucunes sont petites, & les autres grosses, de semblable forme toutesfois, pourtant sont elles tenues pour vne seule espece.

*Mespilus Aronia.* Azaroles.

*Mespilus alera.* Nefflier.



LA FORME.

- 1 La premiere espece est vn arbre espineux, fort semblable à l'Aube espine de feuilles déchiquetées. Le fruit de ceste est petit & rond, ayant trois pierrettes, comme dit Dioscoride. & croissent cinq ou six ensemble ou d'auantage.
- 2 Le Nefflier vulgaire, est vn arbre sans espines, bien pres comme les autres arbres. Les feuilles sont estroictes & longatres, plus petites que les feuilles de Pommier, non crenées tout à l'entour. Les fleurs sont blanches, parties en cinq. Apres les fleurs, croist le fruit de couleur grise, & de figure ronde, non guere differet à vne petite pomme ronde en aplattissant, l'vn petit, l'autre gros, toujours



toujours tousiſois plus petit qu'une pomme, ayant au ſommet vne large couronne & grande: Au milieu d'iceluy ſont contenus cinq pierres plattes, leſquelles ſont la graine d'iceluy.

LE LIEV.

- 1 La premiere eſpece a eſté veuë à Naples par le treſſauant And. Mathiolius iuecogue en ce pais
- 2 Le Nefflier vulgaire eſt planté es jardins & vergers, & croiſt auſſi volontiers en lieux rudes & mal cultiuez, pres les hayes & buyſſons.

LE TEMPS.

- 2 Les Neffles vulgaires fleurifſent en Auril ou en May, & ſont meures à la fin de Septembre.

LES NOMS.

- 1 Le Nefflier ſ'appelle en Grec *μάστος*: en Latin *Mespilus*: en haut Aleman *Mespelbaum*: en bas Aleman *Mispelboom*.

- 2 Le fruiçt eſt appellé en Grec *μάσταν*: en Latin *Mespilum*: en François Neffle: en haut Aleman *Mespel*: en bas Aleman *Mispel*.

La premiere eſpece eſt appellée en Grec *μάστος ἀραβία κη τρικόκος*: en Latin *Aronia*, & *Trigynia*: à Naples *Azarolo*.

La ſeconde eſpece eſt appellée en Grec *ἐπιμυδία*, *Epimelis*, & d'aucuns *στράνιον* *Sitanium*, ou ſelon aucuns *Setanium*.

La plus grande forte de ces eſpeces eſt appellée en François Neffle cultiuee: en Brabançon *Poſte miſſelen*.

LE TEMPERAMENT.

Les Neffles ſont froides, ſeches, & astringentes. Et de ſemblable temperament ſont auſſi les fueil les du Nefflier.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Neffles ſerrent le ventre, principalement encore verdes & dures, car apres quelles ont eſté gardées, & ſont molles, elles ne ſerrent pas ſi tresfort adone ſont elles plus propres à manger, toutesſois elles ne nourrillent point, ou fort peu.
- B Les pierrettes d'icelles pulueriſées & beuës, rompent la pierre, & pouſſent hors la gravelle, comme dict *Antonius Muſa*.

Du Meurier.

LA FORME.

Meurier eſt vn grand arbre, eſtendant ſes branches au large & au long: ayant les fueilles larges verdes, erénées à l'étour en forme de ſie. La fleur eſt petite & liquineuſe. Le fruiçt eſt de pluſieurs grains amasſez enſemble, comme le fruiçt de la Rôce, plus grand toutesſois, & plus long, de couleur blanche au premier, puis rouge, & noire au dernier, de gouſt vineux. Les racines ſont ſaulnâtres, principalement l'eſcoree dieilles laquelle a le gouſt amer.

LE LIEV.

Le Meurier croiſt volontiers es jardins & autres lieux chauds & cultiuez.

LE TEMPS.

Le Meurier a fueilles nouvelles en May, l'ſg téps apres tous autres arbres. Pourtant eſt il appellé es fables des Poëtes, le plus Sage entre les arbres: car il produit ſeulement ſes fueilles apres que les froidures & rimées ſont paſſées, tellement que par ce moy en il n'en eſt en dommageé comme les autres arbres.

LES NOMS.

Le Meurier eſt appellé en Grec *μυρία κη συκαμυρία*: en Latin *Morus*: en aucunes Boutiques *Morus* *Ceſſi*: en haut Aleman *Maulbeerbaum*: en bas Aleman *Moorbeſieboom*.

Le fruiçt eſt appellé en Grec *μύρον*: en Latin *Morum*: es Boutiques *Morum ceſſi*: en François Meures: en haut Aleman *Maulbeer*: en bas Aleman *Moorbeſien*.

Chap. XLIIII.

Morus.

Meurier.



## LE TEMPERAMENT.

Les Meures auant que meurir font froides & seches iusques au second degré, & astringentes. Celles qui sont paruenues à maturité, sont temperées.

L'escorce du Meurier, principalement de la racine d'iceluy est chaude & seche iusques au second degré, & incisive & modificative.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Meures verdes, sechées arrestent flux de ventre, & dysenterie, & vomissement, beués en vin rouge.
- B Les Meures lachent & humectent le ventre, faisant aller à chambre, principalement prinées à ieun, ou deuant menger.
- C Icelles prinées apres menger se corrompent ayement en l'estomach, & excitent ventositez, & inflations en iceluy.
- D Duius d'icelles il se fait vne confection en forme de Syrop, fort bonne contre tous vicerés & phlegmons de la langue, de la bouche, des amigdales, & du gozier.
- E Les feuilles de Meurier induictes avec huile, guerissent brulures.
- F L'escorce de la racine du Meurier bouillie & beue, ouure les oppilations du foye, & de la rate, le, & lache le ventre, poussant hors par mesme moyen les vers longs & larges.
- G La decoction des feuilles & racines tenué en la bouche, appaite douleur de dens,

## Du Sycomore.

## Chap. XLV.

## LA FORME.

Sycomorus.

Sycomore.

SYcomore est vn arbre grand comme le Meurier, ayât le tronc gros, & mout de brâches grosses. Les feuilles ressemblét fort aux feuilles de Meurier. Le fruit est en forme de Figue sauuage, sans aucuns grains toutesfois au dedans, & ne croist point sur les plus nouuelles branches comme le fruit des autres arbres, mais sur le tronc & plus grosses branches: il ne meurist pas aussi sil n'est bleié & entamé au paraunt.

On rassemble aussi vne gomme ou liqueur, de l'escorce des ieunes arbres Sycomores auât qu'ilz portent fruit, en entamant l'escorce d'iceux.

## LE LIEV.

Le Sycomore croist, tesmoing Dioseoride, en Carie & Rhode, & autres pais là ou le froment ne croist point ayement: On le plante aussi en abondance au pais d'Egypte à l'entour du grand Caire, là ou il a esté veu de Pierre Belon.

## LE TEMPS.

Ces arbres sont tousiours verds, & portent fruit trois ou quatre fois l'an.

## LES NOMS.

Cest arbre se nomme en Grec *συκόμορος* & d'aucuns *συκόμορος*: en Latin *Sycomorus*.

## LE TEMPERAMENT.

Le fruit du Sycomore est aucunemét temperé. La gomme d'iceluy a vertu d'eschaulser & amollir.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le fruit du Sycomore est propre à menger, mais il donne fort petit nourrissement, lachant tout doucement le ventre, sans ce qu'il nuyt à l'estomach.



- B La gomme est vile contre durcices de ratelle, douleur d'estomach, & morsures de serpens, prin se par dedans, ou induicte dessus la blessure.  
 C Elle resferme aussi playes & dissout vieilles collections.

Du Figuier. Chap. XLVI.

LA FORME.

LE Figuier cultiué, duquel nous parlons à present, a le mout de rameaux, au dedans pleins de moelle comme les branches du Suin, & au dehors reuestus d'une esforce vnie & pollie: Les feuilles grâdes, & larges, noires, cômunement parties en cinq. Au sommet des branches croist le fruit, lequel est rond & long en forme de Poyres, doux & remply de petis grains par dedens. Auant que le fruit soit meur, il en fort du lait quand il est bleisé, mais estant bien meur, le jus ressemble à miel.

LE LIEV.

Le Figuier croist abôdamment en Espagne & Italie, On en trouue aussi aucunes fois en ce pais, mais bié peu souvent, & faut qu'il soit planté en lieux chauds & exposez au soleil, & le doit on garder du vent de Septentrion.

LE TEMPS.

Le Figuier se rauerdist fort tard en ce pais, car il comence à ietter ses feuilles seulement à la fin du mois de May. Le fruit meurit sur la fin de l'esté.

LES NOMS.

- 1 Le Figuier domestique est appelé en Grec *συσι ήμυρής*: en Latin *Ficus sativa*: en haut Aleman *ffeygenbaum* en bas Aleman *Dyghenboom*.

Le fruit est appelé en Grec *σύκων*: en Latin *Ficus* duquel nom il est aussi cognu es Boutiques: en François *Figue*: en haut Aleman *ein ffeygen*: en bas Aleman *ein Dyghen*. Ce fruit, auant qu'il soit meur, se nomme en Grec *άλυβας*: en Latin *Grossus*: & estant sec, en Latin *Caria*, en Grec *ήξας* & non *καριος*, car *καριος* en Grec *Cario*, est vne espece de figue particuliere prouenant en Syrie.

- 2 Le Figuier sauuage est appelé en Grec *συσι ήγρία κήληνός*: en Latin *Ficus sylvestris* & *Caprificus*.

Le fruit de ce Figuier lequel ne meurist iamais, s'appelle aussi comme le fruit non meur du Figuier domestique: en Grec *άλυβος*: & en Latin *Grossus*: & d'aucuns aussi *ήρηνός* *Erineus*.

LE TEMPERAMENT.

Les Figues nouvelles & frechement cueillies sont quelque peu chaudes & fort humides.

Les Figues seches sont chaudes iusques pres du second degré, & quelque peu humides, & de parties subtiles.

Le jus des Figues est chaud & sec iusques bien pres au tiers degré, & pareillement acré & piquant.

Les feuilles sont aussi acres & reseratives, mais non si fort que le jus.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Figues nouvellement cueillies, nourrissent plus que les autres fruits: elles excitent toutes fois ventositéz & enflent, & lachent tout doucement le ventre.  
 B Elles rafraischissent aussi & estanchent la soif, prises toutes fois en trop grande quantité, elles debilitent l'estomach, & font perdre l'appetit de manger.  
 C Les Figues seches nourrissent plus que les fresches, toutes fois elles n'engendrent pas si bô sang, car ceux qui mangent beaucoup de Figues, ilz deuiennent pleins de pouds & de vermine.  
 D Icelles prises auant manger, lachent le ventre, & prouffitent aux rōgnons, car elles pouffent hors la grauelle avec l'vrine.



- E** Elles font fuër, faifans sortir par mefme moyen les humeurs corrompues & purifiés : parquoy on les donne vilement aux enfans trouués de petites verolles & rougeoles, car elles les font sortir legerement & fans difficulté.
- F** Elles prouffent pareillement au thorax & poulmons, adouciſſent la toux, font longue aëine, meuriſſent & font cracher le phlegme, en quelle maniere que ce ſoit, ou mengées crues, ou roſties ou cuitées avec hyſſope & beués.
- G** La decoction d'icelles eſt bonne aux epileptiques, à gens rōpus & caſſez, car elle reſout le ſang caillé, & apaiſe la douleur.
- H** Figes pilées avec ſel, Rue, & Noix, ſont contraires à tout venin, & corruption d'ier. Et eſtoit le Contrepoiſon duquel vſoit Mithridates Roy de Pontus contre tout venin & poiſon.
- I** La decoction des figes gargarifée, ou tenue en la bouche, prouffite contre aſpretez & enroure du gozier, pareillement contre toutes enflures & apoſtemes de la bouche, du gozier, amigdales & genciues, & contre enſure de la langue ſemblablement.
- K** Figes apaiſent douleur de dens, & des genciues, tenués en la bouche encontre le mal.
- L** Appliquées avec farine de froment, amolliſſent & meuriſſent apoſtemes, phlegmons, tumeurs derrière les aureilles, principalement en y adiouſtant ſemence de Lin & de Fenugrec. Et en y adiouſtant racines de Lyx, elles rompent les abſces.
- M** Icelles broyées avec farine d'Orge, conſument & digerent tumeurs ainſi que dit Gaſien.
- N** Icelles cuitées avec vin d'Aloyne & farine d'Orge, ſont vilement appliquées en forme d'Emplafre ſur le ventre de gens Hydropiques.
- O** Figes broyées bien menu avec graine de Mouſtarde, gueriffent bourdonement & ſon des aureilles, voire ſont meilleure oye, appliquée par deſſus en dehors.
- P** Brief les figes ſeches amolliſſent, digerent, & ſubtilient, & on en peut vſer dehors & dedens le corps ſoit pour meurir & amollir apoſtemes, ſoit pour les digerer & reſoudre.
- Q** Les ſucilles de figuier digerent ſtrumes & glandules, & amolliſſent & digerent toutes autres tumeurs, pilées bien menu, & appliquées deſſus.
- R** Les ius des figes guerit aſpretez, mauuiſe gratelle, petites verolles, rougeoles, lentilles & dartres, & autres ſemblables taches du corps & de la face, induict deſſus avec farine d'orge roſtie : il emporte auſſi les verrues induict à l'entour avec greſſe.
- S** Il guerit auſſi douleur de dens, ſi apres auoir trempé du coton dedans iceluy on le met contre la dent, ou bien ſi on le met dans le creux de la dent mauuiſe.
- T** Il ouure auſſi les veines hemorrhoides, & lache le ventre induit ſur le fondement. Pareille vetu ont auſſi les ſucilles, en ſen torchant le derrière.
- V** Iceluy eſt vilement induict avec farine de Fenugrec & vinaigre ſur goute chaude, principalement qui tient aux pieds.
- X** Il eſt bon diſſiller iceluy ius dans la playe de piqures de Scorpions, ou de morſures de chiens enragex.
- Y** Les ius des Figes faiët cailler le lait, & diſſout pareillement iceluy qui eſt caillé & pris, comme le vinaigre.
- Z** La cendre de Figuier induite avec huile Roſt & cire, guerit bruſſures. Et lexiue faiët deſcendre de Figuier, guerit gratelle & mauuiſes rongnes, ſi on ſe laue d'icelle.

## Du Prunier.

## Chap. XLVII.

## LES ESPÈCES.

**P**Remierement il y a deux fortes de Prunier, ſçauoir eſt Domestique & ſauuage. Les Prunes domestiques ſont de pluſieurs fortes, les vnes blanches ou iaulnes, les vnes de couleur de caſſaigne, les autres de cler rouge. Les vnes auſſi ſont groſſes, les autres petites: Les vnes ſont douces & ſeches, les autres freſches & aigres, deſquelles chacune eſpece a bien pres vn nom particulier. Les Prunes ſauuages ſont toutes les plus petites, & ſ'appellent Fourdines.

## LA FORME.

Le Prunier ſeſſeue comme les autres arbres, moyennant qu'il ſoit bien mené, & entretenu, & iette de ſoy mout de branches reuſteues d'vne eſcorce vne & brunatre, & dicelles en aſté ſort de la gomme apres auoir eſté bleſſées. Les ſucilles ſont vn peu longues, bien pres rondes toutesſois, vn peu crenées & dechiquetées tout à l'entour. Les fleurs ſont blanches comme celles du Cerifier, & ſont diueſées en cinq ou ſix ſucilles. Le fruit eſt pour la plus part long, vn grand, l'autre petit, & de couleur maintenant blan chatre ou iauatre, maintenant noiratre, & aucun eſtois

Prunus.

Prunier.

Prunus spinosa.

Prunier sauvage.



rougeatre, au milieu duquel est enclous vne pierrette longue & dure, contenant en soy le noyau, de goust amer. La racine de cest arbre s'estend bien large dessous la terre, & iette en plusieurs endroits de nouveaux iettons, lesquels ausy croissent contremont, si de bonne heure ilz ne sont coupés.

- 1 Le Prunier sauvage ne felleue point comme vn arbre, mais demeure bas, & contre terre comme autres hayes & buyssons, dont il est vne espeece. Il iette beaucoup de branches d'vne mesme racine, armées ga & là d'espines poignantes, & ayans fueilles semblables à celles du Prunier domestique, combien qu'elles soient plus petites. Les fleurs sont blanches. Le fruiçt est petit, beaucoup moindre que les autres Prunes, de goust aigre & astringent. La racine s'estend ausy bien loing deus sous terre, & est lente & ligneuse.

LE LIEV.

- 1 Le prunier cultiué se trouue par tous les Vergers.  
2 Le sauuage croist le long des champs, des voyes, & en autres lieux non cultiué comme autres hayes.

LE TEMPS.

Les Pruniers fleurissent en Avril, ou plus tost, signamment le Sauuage, lequel fleurit plustost que l'autre.

Les Prunes domestiques meurissent en Aoult, les Sauuages communement en Septembre.

LES NOMS.

- 1 Le Prunier est appelé en Grec *κωκυθιάδων*; en Latin *Prunus*; en haut Aleman *Pflaumenbaum*; en bas Aleman *Pruumboom*.

Le fruiçt se nomme en Grec *κωκυθιάδων*; en Latin *Prunum*; en François vne Prune; en haut Aleman *ein Pfäume* oder *Präume*; en bas Aleman *ein Pruum*.

- A Les grosses Prunes douces qui sont bleuetres, sont appellées de Theocrite *ῥαβύλα* *Brabyla*; des Latins *Pruna Damascena*; des François Prunes de Damas; en haut Alemä *Quetschen*, & *blauw Spilling*; des bas Alemans *Pruumen van Damasc*.

- B** Les Prunes vulgaires bruyantes ou persâtes, s'appellent Hispanica.  
**C** Les jaunâtes, sont appellées en Latin *Cereæ* & *Cereola pruna*.  
**D** Les grosses Prunes rouges & rondes, sont d'aucuns appellées en Latin *Pruna asina*: en François Prunes de cheval: en haut Aleman *Rospfbaumen*: & en bas Aleman *Rospfaymen*.  
**E** Toutes les plus petites prunes rondes se nomment en François Dauoines, en haut Alemâ *hifcin* *Schiffbaumen*, & en bas Aleman *Pallohen*.
- 2** Le Prunier sauvage se nomme en Grec *κακκωδία ἀγρία, καὶ ἀγροκακκωδία*: en Latin *Prunus fluestris*: en haut Aleman *Schlehdosen*: en bas Aleman *Schledosen*.  
 Le fruit est appelé en Grec *κακκωδων ἀγριον, καὶ ἀγροκακκωδων*: en François Prune sauvage ou Fourdeins: en Latin *Prunus fluestre, Prunelum, & Prunilum*: en haut Aleman *Schleffen*: en bas Aleman *Schleffen*.

Le jus des Pruneaux sauvages se nomme és Boutiques *Acacia*, & c'est pour icelle usurpé.

#### LE TEMPERAMENT.

Les Pruneaux domestiques rafraichissent & refroident.

Les Pruneaux sauvages sont froids, secs, & astringens.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Les Pruneaux nourrissent fort peu, & engendrent mauvais sang: mais ilz amollissent & lachent tout doucement le ventre, principalement quand ilz sont encores nouveaux & verds.  
**B** Les feuilles du Prunier, prouffissent contre enflures du gozier, & des amigdales, si on gargarise la decoction d'icelles.  
**C** La gomme du Prunier beuf avec vin, rompt la pierre, & pousse hors la grauelle, selon aucuns.  
**D** Les pruneaux sauvages serrent le ventre, & l'endurcissent: Pareille faculté ont aussi les Prunes non meures, & autres qui sont aigres & astringentes.  
**E** Le jus des Pruneaux sauvages est tresvil contre tout flux de ventre, flux des femmes, tout flux de sang, & on en peut bien vier au lieu d'*Acacia*.

### Des Sebestes. Chap. XLVIII.

#### LA FORME.

**A** Vx especes de Prunes ne sont guere differens, ceux que lon appelle *Sebestes* aux Boutiques. Lesquelz croissent aussi sur arbres, dont le tronc est reuestu d'une ecorce blanche, & les branches d'ecorce verte. Les feuilles sont rōdâtes. Le fruit n'est guere different aux Pruneaux, plus petit toutesfois, de couleur bleâtre, de goust doux, blanc par dedens, lent & visqueux, au milieu duquel sont contenues pierrettes, ayans noyaux au dedens comme celles des Pruneaux.

#### LE LIEU.

Ces fruits prouiennent en Italie, & quelques autres regions chaudes, d'ou on les apporte tous sechez par deçà.

#### LES NOMS.

Ce fruit pour sa viscosité est appelé en Grec *μύξα Myxa*, & *μυξία Myxaria*, és Boutiques *Sebesten*, d'aucuns *Sebesta*.

#### LE TEMPERAMENT.

Le temperament des *Sebestes* tire sur le froid & humide, pourtant font ilz aussi de nature fort semblable aux Pruneaux.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Les *Sebestes* sont bons en fleurs chaudes, principalement si le ventre est ferré.  
**B** Ilz prouffissent aussi grandement contre toux, & toutes defluxions chaudes & salées tombans sur le thorax & poulmons.  
**C** Ilz sont vilz aussi contre inflammation de vessie & des rongnons, & contre strâgurie & ardeur d'vrine.

### Des Iuiubes Chap. XLIX.

#### LES ESPECES.

Il y a deux sortes de Iuiubes selon Columelle, Rouges & Blanches.

#### LA FORME.

Les Iuiubes sont le fruit d'un arbre, comme les *Sebestes*. Elles sont rōdes & longues, non guere differentes à vne Oline, plus petites toutesfois, de couleur blanche ou rouille, de saveur douce, lesquelles estans gardées long temps, deuiennent du tout seches & toutes ridées: chacun fruit à en soy vne pierrette dure & longue, de façon semblable à la pierre de *Oline*, plus petite toutesfois.

LE LIEV.

Les Iuiubes croissent en pais chaud, comme en Italie, & autres semblables lieux.

LES NOMS.

Cest arbre est appellé de Columella en Latin *Ziziphus*.

Le fruit se nomme *Zizipha*, és Boutiques *Iuiube*: en François *Iuiubes*: en haut Aleman *Wust-Berlin*, Gabien selon Pais de quelques vns, les appelle en Grec *σνγκά Serica*.

LE TEMPERAMENT.

Les Iuiubes sont tempérées en chaleur & humidité.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les Iuiubes menagées sont de difficile digestion, & nourrissent fort peu, mais prises en electuaires, fyrops, ou autres medecines, elles adoucisent les rudesses du gozier, de la poitrine, & des poulmons, & prouffitent contre la toux.

En ceste mesme sorte elles sont prouffitables aux reins, rongnons, & vessie inflammés ou exulcerés, ou trauaillés de quelque humeur acre & salée.

## Des Guignes &amp; Cerifes.

## Chap. L.

LES ESPECES.

Guignes sont de deux sortes, Grandes & Petites: Les petites croissent sur hauts arbres, & les Grandes sur petis arbres: Il sen trouue aussi de chacune espece deux sortes, les vnes rouges, les autres noires.

LA FORME.

1 L'Arbre qui porte les Guignes ou petites Cerifes est communement grand, gros, & haut, come les autres grands arbres. L'escorce d'iceluy est vnice, de couleur de chasteigne, espesse de trois ou quatre doubles, & laquelle se laisse peller comme l'escorce du Bouleau. Les fueilles sont grandes, longues, crenelées tout à l'entour. Les fleurs sont blanches, disposées en cinq fueillettes. Le fruit a la saveur douce, & la couleur, maintenant rouge, maintenant brune semblable en figure aux grandes Cerifes, plus petit toutesfois, voire aucunes fois trespetit: En iceluy se trouue vne pierrette, ayant le noyau en soy enclos

2 L'Arbre qui porte les grandes Guignes ou Cerifes, n'est guere haut, mais pour la plus part de moyenne hauteur, au reste du tout semblable au petit Guigner, tant de fueilles que de fleurs. Le fruit est longuet, au reste rond, de saveur douce, de couleur maintenant rouge en pallissant, & bien pres demy rouge & demi blache: aucunes fois brune, & bien pres du tout noire, dont le jus taint en beau pers comme le Berfil.

3 Il semble à voir que les Gryotes soient aussi vne espece de Cerifes. L'arbre est communement tendre, & non haut, ne gros: pourtant aussi n'est il pas de longue durée. Les fueilles sont aussi plus petites, au demourant semblables aux fueilles du Cerifier. Les fleurs sont blanches, le fruit rond, sigre, maintenant rouge, maintenant noir comme les Guignes noires, lequel a aussi au milieu de soy vne pierrette, moindre toutesfois, & plus ronde, que les Guignes.

Il y fort de tous ces arbres gomme, comme du Prunier, & du Pescher, principalement l'escorce estant entamée.

LE LIEV.

L'Arbre qui porte les grosses Guignes, & le Gryotier se placent és vergers. Mais celuy qui porte les petites Guignes, croist le plus souuent le long des champs & és bois.

Cerisier.

Cerifier.



## LE TEMPS.

Les Guignes & Griottes fleurissent le plus souuent en Aueil: & les rouges meurissent en Iuin, & durent iusques en Iuillet: mais les noires meurissent en Iuillet, & on en a tousiours des nouuelles iusques à la fin d'Aoult.

## LES NOMS.

Le Guigner ou Cerifier s'appelle en Grec *κίρσηρος*: en Latin *Cerafus*: en haut Aleman *Kirfchen*, en bas Aleman *Kerfboom*.

Le fruit est appelé aussi *κίρσηρα*, Cerafa: en François Guignes ou Cerifes: en haut Aleman *Kirfchen*: en bas Aleman *Kerfen*.

1 La Première espece, singulierement celle qui porte le plus petit fruit, est le Cerafus décrit par Theophraste.

2 L'autre est d'anciens appelée *χάμακεραφος*, *Chamacerafus*: ce n'est pas toutesfois le *Chamacerafus* lequel *Afclapiades Myrleanus* décrit, le fruit duquel en yure comme le vin. Les *Biabifons* appellent l'arbre *Spaensche kerfcar*, & le fruit *Spaensche kerfen*, c'est à dire Cerifier, & Cerifes d'Espagne.

3 Le Gryotier est aussi tenu des Modernes, pour vne espece & sorte de Cerafus, pourtant s'appelle aussi le fruit Cerafa. Mais à mon iugement les Gryotes sont le fruit que Theophraste appelle en Grec *Νύκτορος*, & a esté tourné en Latin de Theodore Gaza *louis flamma*.

## LE TEMPERAMENT.

Toutes Cerifes, Guignes, & Gryotes ont le temperament froid & humide, mais les Gryotes refroident le plus, & par dessus toutes, les noires, lesquelles sont aussi astringentes, principalement quand elles sont seches.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Toutes Guignes amolissent & lachent tout doucement le ventre, menées deuant toutes autres viandes, mais elles nourrissent fort peu, & nuisent aux estomachs mal sains & humides: car elles sy corrompent facilement, principalement les plus petites, lesquelles sont souuentefois cause de fieures & autres maladies.

B Les Gryotes rouges lachent aussi le ventre, & sont plus saines & conuenables à l'estomach: car en partie elles le confortent, & en partie estanchent la soif.

C Les Gryotes noires, renforcent dauantage l'estomach, & estant seches arrestent flux de ventre.

D La Gomme qui sort tant du Guignier, Cerifier, que Gryotier est proufitable prinse en vin à ceux qui sont trauallez de la pierre & grauelle.

E Elle est bonne aussi contre rudesses du Gozier, des poulmons & de la poitrine, & contre enroueure, & la toux.

## Du Cornillier. Chap. LI.

## LES ESPECES.

Cornillier est de deux sortes selon Theophraste, Domestique, & Sauvage.

## LA FORME.

1 Le Cornillier domestique s'esleue haut bien souuent, & deuiet assez grand, comme autres arbres vulgaires, aucunesfois demeure il bas & croist en maniere de haye: comme plusieurs autres arbrisseaux. Il a le bois fort dur. La fleur est palle en iaulissant. Le fruit bi en rouge, longuet en façon d'olive, plus petit toutesfois, ayant en soy vne pierrette enclose comme l'olive.

2 Le Cornillier sauage ne s'esleue point comme vn arbre, mais demeure bas en forme de haye: Le bois des tiges & vieilles branches d'iceluy est aussi fort dur & lent: les nouvelles branches sont pleines de neuds, & au dedens pleines de moelle, comme les branches du Suin. Les fueilles sont fort semblables aux fueilles du Domestique. Les fleurs sont blanches & croissent par esmouchettes, apres lesquelles sensuiuent de petites bayes rondes, verdes au premier, puis quand elles sont meures, noires.

## LE LIEV.

1 Le Cornillier domestique se trouue en plusieurs lieux d'Alemaigne au sauage, comme autres hayes. Mais en ce pais il se trouue sans plus aux iardins.

2 Le Cornillier sauage croist es hayes & le long des champs.



Cornus mas.

Cornillier domestique.

Cornus femina.

Cornillier sauvage.



## LE TEMPS.

- 1 Le Cornillier cultivé fleurit tost, en Mars, ou plus tost : puis apres produit il ses feuilles. Le fruit est meur en Aoust.
- 2 Le Cornillier sauvage fleurit en Avril & en May: & les bayes sont meures en Septembre.

## LES NOMS.

- 1 Le Cornillier domestique est appelé en Grec *κωπία*: en Latin *Cornus*: en haut Aleman *Cornel*: en *Thierlinbaum*, & *Kurberbaum*: en bas Aleman *Cornolleboom*.
- 2 Le Cornillier sauvage est appelé en Grec de Theophraste *Κωπία*, cest à dire en Latin *Cornus femina*: Columelle l'appelle *Opalus*: en haut Aleman il se nomme *hartzege*: Les aucuns en Brabant l'appellent *wilden Blier* cest à dire Suin Sauvage pour ce qu'il a les branches nouvelles (comme dessus est dict) semblables au Suin.

## LE TEMPERAMENT.

- 1 Les Cornouilles domestiques sont froides, seches, & astringentes.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- 1 Les Cornouilles domestiques prinies en viande, ou autrement, sont bonnes contre flux de ven A tre, dysenterie, & renforcent l'estomach debile & chalereux.
- Les feuilles & icunes iertés guerissent playes fresches, & estâchent le sang d'icelles se dict Galien. B
- 2 Les Cornouilles sauvages ne seruent aucunement en vsage de Medecine. C

## Du Cormier.

## Chap. LII.

## LES ESPECES.

IL y a trois fortes de Cormes, les vnes toutes rondes comme pommes, les autres sont longuettes bien pres en façon d'œufs, les tierces sont larges par bas, non differentes aux poyres,

## LA FORME.

Le Cormier croist haut, ayant mout de branches reueltes de feuilles lógues & estendues amassées de plusieurs feuillettes l'une contre l'autre le long d'une queue, dont chacune à part soy est lóguette & crenée tout autour. Les fleurs sont blanches, apres lesquelles vient le fruiçt, de figure l'une fois ronde, maintenant longue, tantost comme vne poyre, lequel est rougeatre du costé qui regarde le soleil.

## LE LIEV.

Le Cormier ayme lieux froids & humides, & lieux montaigneux, mais principalemēt lieux pierreux. Il se trouue en aucuns endroicts d'Alemagne.

## LE TEMPS.

Le Cormier fleurit en Mars, & en Septembre est le fruiçt meur.

## LES NOMS.

Le Cormier ou Sorbier est appelle en Grec  $\alpha\sigma\tau\alpha$   $\alpha\sigma\tau\alpha$  en Latin *Sorbus*; en haut Aleman *Spermerbaum*; en bas Aleman *Sorbenboom*.

Le fruiçt se nôme en Grec  $\sigma\omicron\upsilon\beta\alpha$   $\sigma\omicron\upsilon\beta\alpha$ ; en Latin *Sorbuser*; en François *Corme* ou *Sorbe*; en haut Aleman *Spersting* *und* *Sposappfel*; en bas Aleman *Sorben*.

## LE TEMPÉRAMENT.

Les Cormes sont froides & seches, & altringent bien pres tout ainsi que les Nefles.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A Les Cormes cueillies auant quelles soient meures & sechées au soleil ou ailleurs, arrestent flux de ventre, mengées, ou la decoction d'icelles beuē.
- B Brief les Cormes ressemblent fort aux Nefles de vertus & Operations, sinon queelles ne sont pas du tout si fortes.

## De l'Arbosier. Chap. LIII.

## LA FORME.

Arbosier est vn petit arbre, non guere plus grād qu'un Coignier, le tronc du quel est couuert d'une ecorce rougeatre, rude, & esquailleuse. Les branches nouvelles sont polies & rouges, reueltes de feuilles longues, larges, espesses, & crenées tout à l'entour. Les fleurs sont blanches, petites, creuses, & croissent par amas, apres lesquelles vient le fruiçt qui est rond, de façon semblable à la fraise, verd au commencement, puis apres iaulnatre, & sur la fin quand il est meur rouge.

## LE LIEV.

L'Arbosier croist en plusieurs endroicts d'Italie, & d'autres país, au sauage: incongnu en ce país.

## LE TEMPS.

L'Arbosier fleurit en Juillet & Aoust: Le fruiçt est meur en Septembre, & sur l'ysuer

Sorbus.

Cormier.



Arbusus.

Arbosier.



uer, après qu'il a demouré pendant sur l'arbre vn an entier.

## LES NOMS.

Cest arbre s'appelle en Grec κόμαρος: en Latin *Arbutus*, d'aucuns *Vnedo*, iagoit que tel nom soit propre au fruit: en François Arbofier.

Le fruit se nomme en Grec *μυμάκιλλος*, ou selon aucuns *μυμάκιλλος*: en Latin *Vnedo* & *Meme-cylow*: en François Arbofes, ou Arbofes.

## LE TEMPERAMENT.

Le fruit de l'Arbofier a le temperament froid.

## LES NUISANCES.

Le fruit de l'Arbofier, nuit à l'estomach, & fait douleur de teste.

## Du Lotus.

## Chap. LIII.

## LA FORME.

**L**otus est vn arbre haut & grand, estendant ses branches, qui sont longues, au large. Les feuilles sont larges, rudes, crenées tout à l'entour: le fruit est rond, plus grand qu'un grain de Poyure come dit Dioscorid. pendit à longues queuees, verd au premier, puis iaunatre, & quand il est meur & sec noir, de bonne saueur.

## LE LIEV.

Lotus se trouue en Aphrique en abondance, il se trouue aussi en plusieurs lieux d'Italie & du Langued'oc.

## LE TEMPS.

Le fruit du Lotus est meur en Septembre, alors perd il ses feuilles, & en recouure de nouvelles avec la fleur au Printemps.

## LES NOMS.

Cest arbre s'appelle en Grec *λαρός*: en Latin *Lotus*: & *Celtis*: en aucuns endroits d'Italie Bagolaro, & d'aucuns Perlaro: en Langued'oc Micooulier, & le fruit Micooules.

## LE TEMPERAMENT.

Le Lotus seche, reffraint, & est de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERA.

- A** Les racleurs du bois de Lotus cuictes en vin ou eau, arrestent flux de ventre, dyfentere, & le flux mensural des femmes, beués, ou prinfs en infusion.
- B** Le fruit arreste aussi le vètre, & est bon à manger, sans nuire à l'estomach.

## Du Chastaignier.


## Chap. LV.

## LA FORME.

**C**hastaignier est vn arbre fort grand, haut, & gros, non guere different au Gaugnier. Les feuilles sont grandes & larges, rudes & fronnées, crenées tout à l'entour comme yne sie. Entre les feuilles au sommet des branches croissent les chastaignes, brunes par dehors, nues, vnies & plattes de la forme d'un cœur bien pres: elles sont encloses en escailles fort houlues & piquantes comme vn Eriffon, lesquelles pouurent d'elles mesmes, quand les Chastaignes sont meures, tellement qu'elles mesmes tombent dehors.

## LE LIEV.

Le Chastaignier ayme lieux ombreux & montaigneux qui sont situés vers Septentrion. Il se trouue grande quantité autour du Rhin, en Suisse & Dauphiné.



## LE TEMPS.

Les Chastaignes sont meures sur la fin de Septembre, & durent bien pres tout le long de l'hyuer.

## LES NOMS.

Le Chastaignier s'appelle en Grec *καστανία* : en Latin *Castanea* & *Nux castanea*; en haut Aleman *Kesttenbaum* & *Kastanibaum* : en bas Aleman *Castaniboom*.

Le fruit est appelé en Grec *στὸς βάλανος, σαρ δ'ιστὸς βάλανος, λεπτιμα, καστακιν κάρου, κη καστακιν*; en Latin *Nux Castanea*, *louis glâs*, & *Sardina glâs* en François *Chastaigne* : en haut Aleman *Kestten*; en bas aleman *Castanie*.

## LE TEMPERAMENT.

La Chastaigne est seche & astringente, bien pres comme le Gland, & chaude au premier degré.

## LES VERTVS ET OPERAT.

A Entre les fruits sauvages la Chastaigne est la plus conuenable & meilleure à manger, elle nourrit raisonnablement, toutesfois elle est de difficile digestion, & serre le ventre.

B On fait vn electuaire de farine de Chastaignes avec miel, bon cõtre la toux & crachement de sang

C Icelles reduictes en poudre, et appliquées en forme d'emplastre avec farine d'orge & miel, guerissent les mammelles enflées.

D L'escorce rousse vnie d'icelles, boullie & beue, arreste flux de ventre, dysenterie & tout flux de sang.

## Du Noyer ou Gauguier. Chap. LVI.

## LA FORME.

Noyer est vn arbre haut & gros, fendu en plusieurs branches, lesquelles s'estendent au loing & au large au commencement du Printemps elles produisent de longs panicules ou chattons iaulnâtres, pres semblables à ceux de la Saule, plus longs toutesfois, lesquels se stérifient, & tost apres tombent. Apres cela se montrent les sucilles, longues, grandes, & de bonne odeur, cõposées de plusieurs sucilles croissans l'vne contre l'autre le long d'vne costetelette, dont chacune est aussi grande & large. Le fruit croist entre les sucilles trois ou quatre ensemble couuert d'vne escorce verte, souz laquelle est vne escaille dure & ligneuse dans laquelle est enclos le noyau enuironné d'vne peau bien deliée.

## LE LIEV.

Le Noyer ayme lieux montaigneux & arides: On le plante en plusieurs endroits de ce pais & d'Allemagne es vergers, & le long des champs.

## LE TEMPS.

Les Panicules du Noyer sortent en Mars, ou pour le plus long en Avril. Les Noix sont meures vers la fin d'Aooust.

## LES NOMS.

Le Noyer s'appelle en Grec *καρύεια*; en Latin *Nux* en haut Aleman *Dufzbaum*; en bas Aleman *Doteboom*.


Castanea.

Chastaignier.



Nux.

Noyer.



Les

# De la Noix Muscade, & du Macis. Chap. LVII. 513

Les panicules & brebiettes qui viennent auant les feuilles, se nomment en Latin *Inlincam* : en Aleman *Gattschens*.

Le fruit s'appelle en Grec *καρύων καρδάμω* : en Latin *Nux regia*, *Nux iuglans*, & *Nux Persica* : és Boutiques *Nux* : en François *Noix* : en haut Aleman *wesschnuß*, & *Baumnuß* : en Brabançon *Diernoten*.

## LE TEMPERAMENT.

La Noix encore verte & nouvelle, est froide & humide.

La Noix seche est chaude, desiccative, & de parties subtiles.

L'escorce des Noix desechée fort, & est astringente: de semblable temperament sont presqu'aussí les feuilles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les Noix fresches & nouvelles sont meilleures à manger, que les seches, toutesfois elles sont de A difficile digestion, & nourrissent fort peu.

Les Noix seches nourrissent beaucoup moins, & sont encore de plus difficile digestion, elles B font douleur de teste, & nuisent à l'estomach, & à ceux qui ont la toux, & courte haleine.

Vne Noix seche ou deux prinse à ieun avec vne figue & quelque peu de Rue, prouffit contre C tout venin.

Il est bon aussi d'appliquer sur morsures de chiens enragez Noix seches avec du sel, du miel, & D des oignons.

Vicilles Noix & bien huileuses guerissent la tigne, & effacent contusions & taches noires, pilées E bien menu & appliquées dessus. Semblable vertu a l'huile qu'on tire d'icelles.

On fait vn medicament de l'escorce verte des Noix, lequel gargarizé, prouffit contre toutes F inflations & vlcères qui ne sont que commencer du gozier, des amandes, & de la bouche.

A ce mesme vaut aussi la decoction de ladicte escorce gargarizée. De semblable vertu sont aussi G si bien pres les feuilles.

## De la Noix Muscade, & du Macis.

## Chap. LVII.

### LA FORME.

**N**Oix Muscade est le fruit d'un arbre non guere different de croisson & de feuilles à nostre Pe scher vulgaire. Quand elle est encore sur l'arbre, elle ne ressemble pas mal à nostre Noix vul- gaire, sinon qu'elle est vn peu plus grande . Premierement elle a au dehors vne escorce verte, es- pesse, comme nostre Noix, de laquelle elle est du tout couuerte, sous icelle se trouvent de pellicu- les bien flairantes, rousses ou iaunates, dechiquetées ( lesquelles sont le vray Macis ) couchées sur vne escaille ligneuse, ferme, & dure comme celle des Auelaines : dans icelle est encloué le noyau fort aromatiq, ferme, elpes, & plein d'huile.

### LE LIEV.

Ces Noix se trouuent principalement en l'isle de Bandan, laquelle est située en la mer Indienne: Elles croissent là par tous les boys & au sauuage fort abondamment, comme a escrit Loys Romain.

### LES NOMS.

Ces Noix sont appellées en Grec *καρύον μυριστάριον*, & d'aucuns *μυριστάριον* : en Latin *Nux myrsi* si enés Boutiques *Nux moschata* : en François *Noix muscade* : en haut Aleman *Mosfosten* : en bas Ale- man *Dote muscaten*.

La pellicule qui est entre l'escorce de dessus, & l'escaille ligneuse, s'appelle en Grec *μύριον* : en La tin *Macer*, ce n'est pas toutesfois le Macer des Anciens : és Boutiques & en François *Macis* : en haut Aleman *Mosfosten blumen* : en bas Aleman *foelle* & *Mosfostenblomen*.

### LE TEMPERAMENT.

La Noix muscade est chaude & seche iusques au second degré : de semblable nature est aussi le Macis : d'auantage il est quelque peu astringent.

### LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Noix muscade renforce & reschauffe l'estomach qui est froid, & debile, singulierement boris A sice d'iceluy, elle fait l'haleine souuée, elle resiste aux vomissemens, & oste le hoquet, prinse en quelque sorte que ce soit.

Elle prouffit aussi contre douleurs & ventosités du ventre, & contre toutes obstructions du B foye & de la ratelle.

Icelle rostie ou sechée au feu, guerit flux de ventre, principalement si on la prend en vin rouge. C

Elle est vtile à la matrice, aux rongnôs & vessie, elle guerit le mal quand on ne peut pisser sinon D goutte à goutte prouenant de cause froide, & autres maladies secretes tant de l'homme, comme de la femme : elle rompt & pouffe hors la grauelle, signamment si elle a premier trempé en huile d'a- mandes douces.

**E** Le Macis a bien pres semblable vertu à la Noix muscade, il fait bonne aleine, il n'arreste pas seulement le flux de ventre, mais aussi la dysenterie, & fluxeurs des femmes.

**F** Il sert aussi contre battemens & tremblemens de cueur, & est meilleur contre toutes maladies froides de l'estomach que la Noix.

**G** L'huile tirée du Macis, induite sur la region de l'estomach, guerit le mal d'iceluy, & oste l'appetit de vomir & fluctuations de l'estomach, il fait bon appetit, & ayde la digestion.

## Du Noisetier.

## Chap. LVIII.

## LES ESPECES.

**I** Ly a deux sortes d'Aulaines ou Noisettes & de Noisetier, l'un Domestique, & l'autre sauvage.

*Corylus borrhensis.* Noisetier domestique.

*Corylus fyluestris.* Noisetier sauvage.



## LA FORME.

**A** Le Noisetier n'est qu'un arbrisseau, croissant en forme de haye, & produisant d'une racine, laquelle s'estend bien large, mout de tiges droictes, d'ond les vnes deuiennent le plus touuent grosses, hautes, & bien branchues, les aucunes longues & gresles, propres à faire des verges à pecher, pour ce qu'elles sont de matiere pliante & flechissante, & qui ne se rompt facilement. Les feuilles sont larges fronsées, & quelque peu crenées à l'entour, lesquelles sortent, apres que les Chattons ou brebiettes, qui croissent aussi sur le Noisetier, sont tóbés. Le frui& vient entre les feuilles amassé par trois ou quatre, en partie & non du tout couuert d'une escorce ou pelure. Il a coquilles dures & lignees, dans lesquelles est enclos le Noyau rond, plein, ferme, & couuert d'une pelure bien dilice & tédre comme les autres Noyaux, lequel est rouge au Noisetier domestique, & blanc ou palle au Sauvage.

## LE LIEV.

**C** On plante le Noisetier domestique és jardins.

**D** Mais le Sauvage croist és bois & lieux humides, obscurs & ombrageux.

## LE TEMPS.

Les Chattons du Noisetier sortent en yuer, & au Printemps ilz Pouurent, soudain apres se monstrent

font les feuilles. Les Noisettes sont meures au mois d'Avoust.

## LES NOMS.

Cest arbre, ou arbrisseau est appellé en Grec *καρύα πορτινίαι*: en Latin *Nux arellana*, & de Virgile *Corylas*: en François Noisetier: en haut Aleman *Haselstrauch*, & *Haselnußbaum*: en bas Aleman *Haselack*.

La Noix est appellée en Grec *καρύον πορτινίον*, & *καρύον*: en Latin *Nux Pontica*, *Nux arellana*, *Nux prænestina* & *heracleotica*: en François Noisette ou Auelaine, d'aucuns Noyfille: en haut Aleman *Haselnuß*: en bas Aleman *Haselnoe*.

Les Noisettes domestiques sont appellées en François Noisettes rouges: en haut Aleman *Rothsnuß* & *Rothnuß*: en bas Aleman *Rooder Haselnoten*. Elles sont les vrayes *Nuces Ponticae* descrites par les Anciens.

## LE TEMPERAMENT.

Les Noisettes sont de complexion non guere differente aux noix de Noyer, plus seches toutes fois, quand elles sont encore nouvelles: Mais quand elles sont seches, elles sont encore plus froides que les noix de Noyer.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les Auelaines nourrissent fort peu, & sont de difficile digestion, elles engendrent ventosités en A bestomach, & font douleur de teste mengées en trop grande abondance.

Icelles beues en hydromel, guerissent vieille toux: & rosties, puis prinſes avec quelque peu de B Poyure, meurissent le catarrhe.

Icelles bruslées & induictes avec axunge ou gresse d'ours, guerissent mauuaise tigne sur la teste, C & remplissent de poil les traces pelées en la teste.

On vse des coquilles des Auelaines en mesme sorte que des coquilles de la noix de Noyer contre la Squinance.

## Des Pistaces.

## LA FORME.

L'Arbre qui porte les Pistaces a les feuilles grandes, longues, composées de cinq, sept feuilles, ou d'auantage, croissans l'une contre l'autre le long d'une coste rougeatre, desquelles la dernière, qui est seule au bout, est toujours la plus grande. Le fruit de cest arbre ressemble bien pres aux petites Auelaines, & aux noix des pommes de Pin: là dedans est contenu le noyau. LE LIEV.

Cest arbre est estranger en ce pais, & se trouue seulement es jardins d'aucuns Herboristes diligens. Mais il croist à planté en Syrie & autres regions chaudes.

## LES NOMS.

Ces Noyfettes sont appellées en Grec *πισταία*: en Latin *Pistacia*: es Boutiques *Fistiet*, & là selon en Brabant *fisticien*: en François se peuuent nommer Pistaces.

## LE TEMPERAMENT.

Les Pistaces sont temperées en chaleur, & quelque peu astringentes.

## LES VERTVS ET OPERA.

A Les Pistaces valent contre oppilations de foye, & pour le reconforter aussi elles sont vtilles à bestomach: mais prinſes pour viande, elles nourrissent fort peu.

B Elles desoppilent aussi les poulmons & le thorax, & prouffissent pareillement contre la toux & difficulté de respirer, à part elles ou avec sucre.

## Chap. LIX.

Arbor Pistaciorum.

Le Pistacier.



C On les donne avec vin pour preseruer de toutes morsures & piqures de serpens & bestes venimeuses, selon que dit Dioscoride.

## De Nux Vescaria.

## Chap. LX.

## LA FORME:

Ceste Noix est vn fruit sauvage, & duquel on ne prend cure, croissant sur arbres qui souuent prouiennent en forme de frutex ou de haye, ainsi que plusieurs autres arbres sauvages. Cest arbre a les feuilles parties en cinq ou d'auantage, nō guere differentes aux feuilles du Suin plus petites toutesfois & plus verdes. Les fleurs sont blanches, rondes, & doubles, croissant cinq ou six ensemble, apres lesquelles viennent de vessies rondes, creuses, diuisées en deux ou en trois, dans lesquelles se trouvent le plus souuent deux noisettes, dont le noyau est assez doux.

## LE LIÈV.

Ceste plante ne se trouue sinon au suage, on la trouue en abondance en Alemaigne, & aucunes fois aussi par ce pais entre les hayes.

## LE TEMPS.

Les fleurettes sortēt en May: & les noisettes sont meures en Septembre.

## LES NOMS.

Cest arbre sauvage est appelé de Pline en Grec *σταφύλιος δένδρον*, & en Latin *Staphylodendron*: des Modernes *Nux vescaria* & d'aucuns *Pistacium germanicum*, incoit que toutesfois il aye fort peu de similitude avec les Pistaces.

Le fruit est appelé des hauts Alemans *pimperus*: des bas Alemans *Bin Anturnis noisemo*: c'est à dire en François Noisettes de S. Antoine.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

Quant au temperament, vertus & operations de ces Noisettes, nous n'en pouons rien escrire, veu qu'on n'en vŕe en chose du monde.

## Du Baguenaudier.

## Chap. LXI.

## LA FORME.

Baguenaudier est vn arbrisseau ayant les feuilles non guere differentes au Fenugrec, ou au Sene. Les fleurs sont belles, jaunes, pres semblables aux fleurs du Genest: Lesquelles passées y vient des siliques creuses, enŕées comme petites vessies, claires & luyŕantes, lesquelles sonnēt quand on les esclate. Leans est contenue la graine, platte, noire, non guere differente aux Lentilles.

## LE LIÈV.

Ceste plante ne se trouue en ce pais sinon en aucuns iardins. Et on la plante pour Sene, non sans erreur.

## LE TEMPS.

Il fleurit en May, & la graine est meure en Aouŕt.

## LES NOMS.

Cest arbrisseau se nomme en Grec par Theophraste *καλοῦρα*, par Theodore Gaza *Colutea* ou *Colutea*: & en Latin *Cynisus* selon Columelle, Varro, Palladius, & Vergi. en François Baguenaudier: en haut Aleman *weissel sinfen*: en bas Aleman *Sombarselŕe sinfen* & d'aucuns ignorans improprement *Beneboom*.

Staphylodendron Plinij.

Nux Vescaria.







Le fruit est chaud & sec iusques bien pres du second degré, & aussi astringent, notamment quand il n'est pas du tout meur.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Dactes sont de difficile digestion, elles sont oppilation de foye & de la ratelle: elles engendrent ventosités au ventre, & douleur en la teste, & engendrent gros sang, signamment estant men- gées verdes & toutes fresches, car estant bien meures elles ne sont pas si nuisibles: & estant bien di- gérées dans vn bon & fort estomach, elles nourrissent raisonnablement.
- B Dactes seches ferment le ventre & arrestent vomissemens & fluxions d'estomach (des fem- mes enciñcies principalement) appliquées en forme d'emplastre sur le ventre ou estomach, ou bien mellées parmy autres medicamens & mengées.
- C Elles renforcent pareillement le foye & ratelle debiles, mellées parmy autres medecines à ce- propres, soit qu'elles soyent appliquées par dehors, ou prises par dedens.
- D Les fueilles & rameaux du Da cber guerissent playes nouvelles, refestment vlcères, & rafraichis- sent inflammations chaudes: pourtant ont iadis les Anciens, voulans faire quelque emplastre à ce- conuenable, tousiours vsé des rameaux de Palmier à remuer leurs emplastres quand ils les cuisoit à celle fin qu'ilz eussent plus grande vertu, selon qu'on peut voir in Emplastro Diacalitheos, ou liure premier de Medic. secundum genera, de Galien.

## De l'Oliuier.

## Chap. LXIII.

## LES ESPECES.

Il y a deux sortes d'Oliuiers, le Domestique & le Sauvage.

## LA FORME.

- 1 L'Oliuier domestique & cultivé est vn ar- bre haut, grand, ayât mout de brâches char- gées de fueilles longues & estroictes, nō gue- re differētes aux fueilles de Saulx, beaucoup toutesfois plus estroites & moindres. Les fleurs sont petites. Le fruit est rond, bien pres de la forme d'vne prune, premieremēt verd au dehors, puis quand il est meur, noi- râtre, au milieu duquel est contenu vne pier- rette dure & ferme. De ce fruit on tire de l'huile appellé huile d'Oliue.

- 2 L'Oliuier sauvage ressemble bien pres au Domestique, sinon que les fueilles d'iceluy sont quelque peu plus petites, entre lesquel- les y croist mout d'espines poignantes. Le fruit est aussi moindre, & paruiet difficile- ment à meurir, de sorte que l'huile qu'on en tire, demeure tousiours verd & nō meur.

## LE LIEV.

L'Oliuier ayme vallées seches, & potis ter- res, on le trouue par tout en Espagne, Ita- lie, & autres semblables regions.

## LE TEMPS.

L'Oliuier fleurit au moy d'Auril & com- mencemēt de May: mais les Oliues meuris- sent en Octobre.

## LES NOMS.

- 1 L'Oliuier est appellé en Grec *ελαια*: en La- tin *Olea*: en haut Aleman *Welbaum* & *Wfl- uebaum*: en bas Aleman *Wlshboom*.
- 2 L'Oliuier sauvage est appellé en Grec *αγρι- ελαια*, d'aucuns *κίτρινος* & *αθησιακή* *ελαια*: en Latin *Oleaster*, *Olea sylvestris*, & *Olea aethiopia*.

Le fruit se nomme aussi en Grec *ελαια* en Latin *Oliua*: & là selon en François & Aleman *Oliue*. Les Oliues cōsées en saumure sōt appellées en Grec *καλυμμεναι*, & *αλιμειναι*: en Latin *Calymentae*



Olea sativa.

Oliuier domestique.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles & tendrons de l'Oliuier, sont froids, secs, & astringens. Les Oliues verdes & non meures sont froides aussi & astringentes, mais estans meures, elles sont chaudes & humides.

L'huile qu'on fait d'Oliues non meures est froid & astringent; mais celuy qui est tiré des Oliues meures, est chaud, humide, & de parties subtiles.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

Les feuilles d'Oliuier induites, valent contre feu volage, vlcères malings & phagedeniques, & autres tumeurs chaudes.

Iceles induites avec miel, mondifient les vlcères, & dechassent pareillement & effacent toutes autres tumeurs & collections.

Elles sont vtilles contre vlcères, apostemes, & inflammations de la bouche, & des genciuës, notamment des petis enfans, si on leur laue la bouche de la decoction d'iceles.

Le jus d'iceles arreste les fleurs des femmes, & tout flux de sang, pareillement aussi le flux de ventre, & la dysenterie, prins par dedens, ou appliqué par dehors.

Il est bon aussi contre rougeurs, inflammations, & vlcères des yeux, meslé parmy Collyres à ce propres, & aux oreilles pleines de bouë.

Les Oliues encore verdes & non meures, renforcent bestomach, faisans bon appetit, principalement confites en saumure, toutesfois elles sont de difficile digestion, & ne nourrissent guere.

Les Oliues meures petuertissent bestomach, & sont fluctuations en iceluy, elles engendrent pareillement douleur de teste, & nuisent aux yeux.

Huile d'Oliues verdes & non meures arreste, & fait euanouir commencement d'inflammations & tumeurs, & refroidit vlcères & exulcerations chaudes.

Elle vaut aussi contre vlcères pourris, & humidités excessiues des genciuës, & raffermist les dents, appliquée sur les genciuës avec coton, ou quelque laine bien deliée.

Huile d'Oliues meures ramollit, apaise douleurs, refout tumeurs, & guerit membres tendus & retirés, signamment quand elle est preparée avec bonnes herbes.

Huile d'Oliue est fort proufitable à faire toutes sortes d'huiles, soit d'herbes, ou de fleurs: car elle attire à soy facilement toute la faculté & vertu des herbes & des fleurs, avec lesquelles elle est mise au Soleil, ou autrement cuict & preparée.

Ceratonis, Siliqua. Carrouge.

## Des Carrouges. Chap. LXIII.

## LA FORME.

Ce fruiët croist sur grands arbres, qui ont les brans ches menues, reuictues d'une escorce brunrouge. Les feuilles sont longues, & estendues en forme d'aile, cõposées de six, sept, huit ou neuf feuillettes amassées le lög d'une coste ou queuë, l'une à l'opposite de l'autre, chacune desquelles est ronde, de couleur brun verte au dessus, & d'un cler verd au dessous. Le fruiët sont siliques plattes & tortues, aucunesfois de pied & demy de long, & larges d'un pouce, douces, dans lesquelles est la graine, laquelle est grande, platte, large, de couleur de chastaigne.

## LE LIEU.

Ces Siliques croissent en Espagne, Italie, & autres regions chaudes. Elles ne croissent en ce pais. Il se trouue quelquesfois es jardins de diligens Herboristes de petis arbrisseaux, lesquels ne peuuent porter ne fleur ne fruiët.

## LES NOMS.

Cest arbre est appelé en Grec κεράτιον: en Latin aussi Ceratonis. Le fruiët s'appelle en Grec κεράτιον: en Latin Siliqua, & d'aucuns Siliqua dulcis: du vulgaire des Herboristes Carobe: es Boutiques Xylocarasis: en François Carrouges ou Carobes: en haut Alema Sint Johans brot: en bas Aleman Sint Jans brot.

## LE TEMPERAMENT.

Ce fruiët est quelque peu chaud & astringent, notamment quand il n'est encore verd, mais seché.



## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les Carrouges encore nouvelles mengées, lachent tout doucement le ventre: mais elles nuisent à l'estomach, sont difficiles à digerer, & ne nourrissent guere.
- B Icelles seches, ferrent le ventre, prouoquent l'vrine, & sans nuire beaucoup à l'estomach, sont meilleures & plus conuenables à manger, que les fresches & nouvelles.

## Du Cassia fistula.

## Chap. LXV.

## LA FORME.

## Cassia fistula.

L'Arbre de Cassia fistula a les fueilles non guere differetes au Fresno: Elles sont grandes, longues & espandues, ramassées de mout de fueillettes croissans l'une à l'opposite de l'autre le long d'une queue, dont chacune est longue & estroite. Le fruit sont longues siliques, rondes, noires, dures & ligneuses, le plus souuent de deux pieds de long, & d'environ l'espaisseur d'un pouce ou d'un doigt, diuisées par dedens en plusieurs chambrettes, à ou est la graine, brunatre, platte, & la moëlle noire, molle & douce, laquelle on appelle fleur ou moëlle de Casse, fort requise en medecine.

## LE LIEV.

La Casse prouient en Syrie, Arabie, & semblables regions.

## LES NOMS.

La Casse est appelée d'Actuarius & des autres Medecins Grecs *κασία μαλακή* en Grec, cest à dire *Cassia nigra* en Latin: es Boutiques & des Medecins Arabes *Cassia fistula*.

## LE TEMPERAMENT.

La moëlle noire interieure de la Casse est chaude & humide au premier degré.


## LES VERTVS ET OPERA.

- A La moëlle interieure de la Casse est vne medecine fort douce & amiable, laquelle se peut donner sans aucune crainte à toutes gés debiles, voire aux femmes enceintes. Elle lache le ventre purgeant par iceluy les humeurs bilieuses principalement, aucunesfois aussi le flegme visqueux ramassé autour des entrailles, prise au poids d'une once.
- B La casse est vtile à ceux qui sont vexés de fieures chaudes, pleuresie, isulnisse, ou de quelque inflammation de foye, principalement si on la mesle avec eauxes, breuuages, ou herbes refrigeratiues.
- C Elle est vtile aux reins & rongnons, elle pousse hors la grauelle, & preserue de la pierre, meslée avec la decoction de Reguelisse, ou de racines de Persil, ou de Cices, ou de toutes ensemble, puis beuë.
- D Il est bon de gargarizer la Casse pour appaiser douleurs & enflures du gozier, & pour resoudre, meuir, & faire rompre tumeurs & apostemes.
- E Casse induite sur la partie tourmentée de la goute, allegé la douleur, comme dit Auicenne.

## De l'Anagyris &amp; Laburnum. Chap. LXVI.

## LA FORME.

- 1 **A** Nagyris est vn arbrisseau bas & petit, à branches menues, sur lesquelles croissent petites fueilles, tousiours trois ensemble, au reste pres semblables aux fueilles d'Agnus castus. Les fleurs sont iaunes, bien pres semblables aux fleurs du Chou. Icelles passées suruiennent de longues siliques, cōtenans vn fruit plat & dur, semblable aux Phaseoles, mais vn peu plus petit. Toute la plante est d'odeur tresforte & mal plaisante, comme le Glaieu puant.
- 2 Il se trouue aussi vn arbrisseau semblable à l'Anagyris de fueilles, & de croisson. Les fleurs croissent fort amassées ensemble le long d'une queue deliée, en façon d'espi, iaunes, pres semblables aussi



Anagyris.

Boys puant.

Laburnum.



aussi aux fleurs du Chou: Les Siliques sont plus rondes & plus petites que celles d'Anagyris, ayans aussi le fruit plus petit: Cette plante n'est pas de forte odeur, mais porte les fucilles plus grandes & plus larges qu'Anagyris.

**LE LIEV.**

Ces deux plantes croissent en plusieurs endroits d'Italie, au saunage, & es boys sur les montagnes.

**LE TEMPS.**

Anagyris fleurit en Avril & en May: l'autre en May & Juin le fruit est meur en Septembre.

**LES NOMS.**

- 1 La premiere de ces plantes est appellée en Grec ἀνάγρις: en Latin *Anagyris*: en Italien *Eghelos* nous la pourrons appeller en François Bois puant.
- 2 Pline appelle la seconde en Latin *Laburnum*. C'est pas Anagyris, ny pareillement *Lotus* comme quelques vns estiment faulxement.

**LE TEMPERAMENT.**

Les fucilles & graine d'Anagyris sont de complexion chaude & seche.

**LES VERTVS ET OPERATIONS.**

- A On donne les fucilles d'Anagyris au poids d'une drachme avec vin cuit, pour esmouvoir les fleurs aux femmes, & pousser hors la secondeine.
- B Icelles encore tendres & verdes appliquees, resoudent & reprimant tumeurs froides.
- C La graine mengée fait vomir avec force & violence.

**De la Saulx. Chap. LXVII.**

**LES ESPECES.**

ON trouve deux fortes de Saulx fort diuerfes: L'une fesseue haut & croist en grandeur & gros-feur

leur comme les autres arbres: l'autre demeure toujours basse portant oseres. La premiere espece a aucunes fois l'escorce rougeatre, aucunes fois blanche, aucunes fois iaulnatre:

## LA FORME.

Salix.

Saulx.

1 Saulx a le tronc gros, d'ou fortent branches hautes, longues, droictes, & fort ramues, lentes & flechiles, lesquelles sont couuertes d'une escorce ou brune en rouge, ou blanche, ou iaulnatre. Le long d'iceles croissent les fueilles longues & estoictes, verdes par dessus, & cendreuses par dessous.

2 La seconde espece de Saulx appelée Ozier, n'a point de tronc singulier, mais seulement vne grosse tette contre terre, d'ou croissent moult de branches ou verges menues couuertes d'une escorce brunaire, lesquelles sont fort flechiles, & se laissent facilement plier & tordre de tous costés. De ces verges on fait des corbeilles, chaires, panners, & choses semblables.

## LE LIEU.

Toutes Saulx croissent volontiers en lieux humides le long des fossés, & eaux, principalement les Ozieres.

## LE TEMPS.

La Saulx fleurit au commencement du Printemps: la fleur est amassée en vne leſg d'une bogue queuée, laquelle ouuerte est douce & lanugineuse, pourtāt appelle on toute la fleur Chatons.

## LES NOMS.

La Saulx est appelée en Grec *iris*: en Latin *Salix*: en haut Aleman *weydenbaum*: en bas Aleman *wilghe boom*: Theophraste la surnomme *άλσιν ακαρία* *Olesicarpus*, c'est en Latin *Frugiperda*, pour ce que ses chatons tombent auant que la graine soit bien meure.



1 La Saulx qui deuient arbre est appelée *Salix perticalis*.

A De ceste espece, celle qui a l'escorce rougeatre, se nomme *Salix nigra*, *Salix purpurea*, & *Salix gallica*: en François Saulx noire: en haut Aleman *Rot weiden*: en bas Aleman *Roope wilghe*: d'aucuns aussi *Salix viminalis*, pour ce que les branchettes sont lentes & flechiles se laissant mieux plier & tordre que celles des autres Saulx. Et de fait ceste Saulx noire est sans doute d'une mesme espece que l'Ozriere: car la plantant en lieux bas & aquatiques, & la coupant pres de terre, elle se tourne en Ozier.

B La seconde espece a blanche escorce, s'appelle *Salix candida*, & d'aucuns *Salix Greca*.

C La tierce à escorce iaulnatre se nomme *Salix virelina*: & selon aucuns *Salix amerina*: ces deux especes sont appelées en haut Aleman *weiss weiden*: en bas Aleman *weisse wilghe*, c'est à dire Saulx blanche.

2 La Saulx petite & basse est appelée en Latin *Salix pumila*, & *Salix viminalis*: de Columella *Sabina salix*, & *Amerina salix*: en François Ozier: en haut Aleman *hlein weiden*: en bas Aleman *wilghe*.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles, fleurs, graine, & escorce de Saulx sont froides & seches iusques au second degré, & astringentes.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Les fueilles & escorce de Saulx arrestent le cracher sang, vomissemens de sang, & tout flux de sang: pareillement aussi le flux menstrual desordonné des femmes, bouillies en vin & beuës.

B Les fueilles ou escorce de Saulx cuites en vin, apaisent douleur de nerfs & les renforcent, si on les en fomente.

C Les fueilles verdes pilées bien menu, & appliquées autour des parties honteuses, ostent l'appetit du ieu d'amour.

E L'escorce de Saulx reduite en cendres, & desmeslée avec vinaigre, fait tomber verrues, emporte galles endurees qu'on a aux mains d'auoir trauaillé, & agaçons, appliquée dessus.

LA FORME.

Quercus.

Chesne.

LE Chesne est vn arbre grand & large communement, estendant au long & au large ses branches grosses: il a l'escorce grise, bien vne quand il est encore ieune, & epaisse, rude, inegale, & fendue quand il est vieil. Les feuilles sont crenées profond tout à l'entour, sur lesquelles se trouvent aucunes fois en ce pais de petites pomettes, appellées pomes de Chesne, tout ainsi qu'en quelques autres regions les Noix galls y croissent, dont ces pomettes sont vne espece. Le fruiet des Chesnes se sont Glands pendans hors d'escailles rudes, creuses, & rondes. Il estend sa racine long & large.

Outre les Noix galls & Pomes qui se trouuent sur les feuilles du Chesne, il croist sur le Chesne, encore plusieurs autres choses comme Theophraste escrit plus amplement en son Histoire des Plantes, au Liure 3, chap. 8.

LE LIEV.

Le Chesne ayme lieux sablonneux, maigres, & secs, comme guarigues & bruyeres.

LE TEMPS.

Le Chesne renouelle ses feuilles en May. Les Glands sont meurs en Aoust. Les Pomes de Chesne croissent en esté, & commencent à tomber en Septembre.

LES NOMS.

1 Le Chesne est appelé en Grec *Αϋς*; en Latin *Quercus*; en haut Aleman *Eichbaum*; en bas Aleman *Eychenboom*.

2 Le fruiet se nomme en Grec *Βελαντις*; en Latin *Gland*; en François *Gland*; en haut Aleman *Eichel*; en bas Aleman *Eichel*.

3 Ceste Noix ronde ou Pome qui croist sur les feuilles, est appelée en Grec *νοϊς*; en Latin *Galle*; en François *Noix galle*; en haut Aleman *Eichopffel*, & *Galopffel*; en bas Aleman *Eychen appel*, & *Gafnoten*.

4 Les escailles & calices ou les Glands sont enclos d'vn costé, sappellét en Latin *Calices glandium*; es Boutiques *Capsule glandium*.

LE TEMPERAMENT.

Les feuilles & escorce du Chesne, pareillement les calices des Glands, sont secs iusques au tiers degré & astringens. De semblable temperamét sont aussi les Glands, siñ qu'ilz sont plus chauds, & non si astringens.

La Noix galle est froide & seche iusques au tiers degré, & fort astringente.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les feuilles & escorce de Chesne, & les calicules des Glands arrestent & guerissent le cracher A sang, pisse sang, & tout flux de sang; pareillement la dysenterie, & flux de ventre, boullis en vin rouge & beus.

Les feuilles de Chesne pilées bien menü guerissent & consolident playes nouuelles, & en arrestent le sang, appliquées dessus.

L'escorce de Chesne reduite en poudre est vtile aux petis enfans contre les vers, & contre flux de ventre desordonné.

Les calicules des Glands avec l'escorce de l'arbre, sont vtilement mellés parmy medecines, vnguents, huiles, & emplastres qui valent à arrester & reprimer flux de sang, ou d'autres humeurs.

Les Glands sont presque de pareille vertu que les feuilles & escorce, toutefois ils ne serrent pas si fort, ils prouoquent l'vrine, & valent contre tout venin & poison: ils sont singuliers contre morsures & piqures de bestes venimeuses cuiets en lait & mengés.

Iceux pilés bien menü sont vtilement appliqués sur phlegmons au commencement: & broyés avec



auec oing de porceau salé, guérissent vicerés malings & rongeurs.

- G La Noix galle est aussi fort stiptique, valant contre tout flux de sang, & flux de venere, vsurpée en quelque sorte que ce soit, soit qu'on la donne par dedans, soit qu'on la mette parmy huiles, vnguents, & emplastres, pour appliquer par dehors.
- H Elle vaut aussi cōtre humidité excēsiue, & tumeurs des genciuēs, & contre tumeurs des amygdales, & du gozier, pareillement aussi contre pustules de la bouche.
- I Elle arreste flux menstrual, & fait retourner la matrice relachée en son lieu, s'assant en la decoction d'icelle.
- K Icelle trempée en vinaigre ou eauē, noircist les cheueux : & mēge la chair superflue, induicte dessus.
- L Icelle bruslée, puis estaincte en vinaigre, ou vin, arreste flux de sang.

## Du Guy.

## LA FORME.

Ceste plante a mout de branches lentes, lesquelles sont estendues de trauers & s'entrelasent l'vne dans l'autre, couuertes d'vne escorce verdâtre. Les fueilles sont espesses & verdes en brunissēt, plus grandes & plus longues que les fueilles du Buis, au reste non guere differentes. Les fleurs sont petites & iaulnes, lesquelles passées y vient de petites bayes rondes & blāches, pleines d'vne humeur visqueuse, chacune desquelles a vne graine noire qui est la semence.

## LE LIEV.

Le Guy ne croist pas sur terre, mais sur les arbres: il se trouue souuent sur Pommiers, Poyriers, Saux, aucunesfois aussi sur Tillet, Bouleaux, & autres arbres: mais le meilleur & plus estimé est celuy qui croist sur le Chesne.

## LE TEMPS.

Le Guy fleurit a la fin de May, & le fruit est meur à la fin de Septēbre, lequel dure tout l'uyer.

## LES NOMS.

Ceste plante est appelée en Grec  $\xi\gamma\upsilon$ : en Latin *Viscum*: en Boutiques *Viscus quercinus*: en François Guy: en haut Alemā *Wistel*, & *Wistel*: en bas Aleman *Warentachen*.

## LE TEMPERAMENT.

Les fueilles & fruit de Guy sont chauds & secs, & de parties asses subtiles.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Les fueilles & fruit de Guy appliquées auec poix liquide, & cire, amollissent, meurissent & resoudent, scirrhes, bubons, & semblables tumeurs froides.
- B Lesdictes fueilles ou fruit auec encens guérissent vieux vicerés malings, & grandes apostemes mauuaises.
- C Elles guérissent aussi vicerés malings prouenans au bout des doigts des pieds & des mains, induictes auec Arsenic.
- D La graine de Guy broyée auec lyes de vin, guerit duresses de ratelle, & la diminue, appliquée sur le costé gauche.
- E On dict aussi que le bois du Guy qui croist sur Chesnes, & non d'autre, est fort bon contre Epilepsie & Apoplexie, pendu au col.

## Du Fresno.


## Chap. LXX.

## LES ESPECES.

Œ Selon que Theophraste escrit, il y a deux sortes de *Fraxinus*: l'vne appelée simplement Fresno: l'autre Fresno sauage.

## LA FORME.

Le Fresno est vn grand & haut arbre à mout de branches, dont les ieunes & nouvelles sont vuides, pleines de moëlle blanche, & ont plusieurs ioinctures, mais quand elles deuiennent grandes & vieilles, ces ioinctures se perdēt, & la moëlle se conuertit en bois. L'escorce de cest arbre est vne





Fraxinus.

Frefne.

Fraxinus bubula, Ormus.

Frefne fauage.



du tout. Les feuilles sont grandes, longues & larges, estendues en façon d'ailes, assemblées de plusieurs feuilles croissans l'une contre l'autre le long d'une coste ou queue: chacune desquelles est longue, & quelque peu crenée tout à l'entour. Le fruit du Frefne pend amassé en un, & n'est autre chose que des siliques plates & estroictes, contenant la graine qui est amere.

Le Frefne fauage devient aucunes fois aussi grand arbre, plus petit toutefois que le Frefne, croissant fort lentement: pourtât l'en trouue il beaucoup de petits, l'écorce d'iceluy est brune, pres semblable à celle de l'Aulne. Les feuilles sont grâdes, longues, plusieurs le long d'une queue, houisues, & quelque peu velues, fort semblables aux feuilles du Cormier. Les fleurs sont blanches, croissans par bouquets, lesquelles se tournent en bayes rôdes, verdes au premier, puis apres rouges, de goust mal plaisant.

LE LIEV.

1 Le Frefne ayme lieux humides, comme le bord des riuieres & torrens.

2 Le Frefne fauage prouient aux hautes montagnes, & en bois ombrageux aussi.

LE TEMPS.

1 La graine du Frefne meurit à la fin de Septembre.

2 Le Frefne fauage fleurit en May: le fruit d'iceluy est meur en Septembre.

LES NOMS.

1 Le premier arbre est appelé en Grec *μαλία*: en Latin *Fraxinus*: en François Frefne: en haut Aleman *Escherbaum*, *Escherholz*, & *Steyneschern*: en bas Aleman *Escher* & *Eschenboom*.

2 Les siliques ou fruit d'iceluy s'appellent es Boutiques *Lingua asie*, & *Lingua passerina*.

3 La seconde espece se nomme en Grec par Theophraste *Σαυμλία*: Gaza l'appelle en Latin *Fraxinus bubula*: Pline & Columella, *Ormus*, & *Fraxinus sylvestris*: quelques vns des modernes *Fraxinus orb*, aucuns *Sorbus aucuparia*, tant pour ce qu'il a les feuilles semblables au Cormier, appelé en Latin *Sorbus*, comme pour ce que les Oyseliers vsent du fruit d'iceluy à prendre les oyseaux: en François Frefne fauage: en haut Aleman *Walbaum*, & *grosser Walbaum*: en bas Aleman *Wauereschen*, & *Quafler*.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles & escorce du Fresno sont de chaleur temperée, & de parties subtiles.

La graine est chaude & seche iusques au second degré.

Les feuilles du Fresno sauvage sont aussi chaudes & seches, & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoctiō des feuilles & escorce de Fresno faicte en vin, beuë, ouure & cōforte le foye & ratelle estouppés, & guerit mal de costé. Pareille vertu ont elles boullies en huile & induictes sur le costé.
- B Les feuilles, escorce, & tendrons du Fresno sont bons vsurpés en mesme forte cōtre hydropisie, car ilz purgent l'eauë.
- C A ceux qui sont par trop gras, on donne tous les iours à ieuun trois ou quatre feuilles de Fresno à boire en vin, à celle fin qu'ilz deuiennent maigres.
- D Le ius des feuilles, escorce, ou tendrons du Fresno beu en vin, preserue de tout venin, principalement contre morsures & piqueres de serpens, & viperes.
- E On dict aussi que le Fresno a telle vertu contre tout venin, que ny à l'environ, ny sous l'ombre d'iceluy, scait demeurer quelconque beste venimeuse.
- F Lexiue faicte des cendres de l'escorce de Fresno, guerit gratelle blanche, & semblables rudesses (de cayr.
- G La graine du Fresno prouoque l'vrine, augmente la semence genitale, & incite au teu d'amour, principalement si on le prend avec Noix muicade, selō que Isaac, Rhafis, Damasctenus, & plusieurs autres Medecins Arabes escriuent.
- H Les feuilles du Fresno sauvage boullies en vin, valent contre douleur de costé, & oppilations de foye. Et prmfes en mesme forte, font baissier le ventre aux hidropiques.

## Du Peuplier.

## Chap. LXXI.

## LES ESPECES.

Peuplier est de trois sortes, tesmoing Plin: l'un, appelé Aubeau, le second, Peuplier simplement & le tiers, Tremble: lesquelles trois especes sont fort communes en ce pais.

*Populus alba.*

Aubeau,

*Populus nigra.*

Peuplier,



LA FORME.

1 L'Aubeau deuiant haut, grand, & gros : le boys duquel est blanc & non guere dur à tailler ou mettre en œuvre. L'escorce est vnie, blanchatre, principalement aux branchettes. Les fueilles sont larges, anguleuses, blanches d'un costé, douces & lanugineuses, & vnies, chaueses & verdes de l'autre costé. Auant que produire les fueilles il porte de longs chattons & brebiettes de couleur pres incarnées.

2 Le Peuplier noir deuiant aussi haut, grand, & gros. L'escorce duquel est vnie, mais plus brune. Les fueilles sont longuattes, larges du costé de la queue, & aiguës par deuant, quelque peu crenées par les bords, & non blanches, douces ou lanugineuses. Les chattons de cestuy cy se tournent en forme de grappes à mout de bayes rondes. Les boutons, qui viennent auant les fueilles, sont fort odoriferans à cause d'une gresse visqueuse & iaulne qui y est cōtēue. D'iceux on fait vnguent appellé Populeum.

3 Le Tremble ressemble au Peuplier noir: il deuiant aussi grand comme les autres deux. Les chattons de cestuy cy sont plus longs & plus brunatres que ceux des autres, de couleur pres grisatre & cendreuse en brun, de telle couleur que la queue d'un chat gris. Les fueilles sont rondatres, larges, & courtes, plus brunes & plus dures que celles du Peuplier noir, fort crenées tout à l'entour, & pendent à queuees fort gressées, qui est la cause que iamais ne sont coyés, mais trēblent tousiours, & rendent son l'vne contre l'autre. LE LIÈV.

Ces arbres s'ayment en lieux bas & humides, cōme es prés, & pres des fossés, estāgs, & ruisseaux. LE TEMPS.

Les Chattons du Peuplier prouiennent en la fin de Mars & d'Auril : & alors faut il aussi cueillir les boutons desquelz on fait Vnguentum populeon.

LES NOMS.

1 Le Peuplier blanc est appellé en Grec *Λυκίη* en Latin *Populus alba*, & d'aucuns *Forsarus* : en François Aubeau: en haut Aleman *Pappelsbaum*, *weissalbetbaum*, & *weiss popelweydr*: en bas Aleman *Abesboom*, & là selon d'aucuns ignorans en Latin *Abies*, non sans grande erreur, car *Abies* est le Sapin, comme nous dirons cy dessous.

2 Le second Peuplier est appellé en Grec *ἄγριος* en Latin *Populus nigra* : en François Peuplier: en haut Aleman *Aspen* & *Pöpselweiden*: en bas Aleman *Populiser* & *Popelacker*.

3 Le tiers Peuplier est appellé de Plin *Populus Libya*: en François Trēble: en bas Alemā *Katzece*. LE TEMPERAMENT.

1 Les fueilles & escorce de l'Aubeau sont temperées en chaleur & froidur, toutesfois quelque peu seches & absteriues.

2 Les bouttōs du Peuplier noir sont chauds & secs iusq's au premier degré, & de parties subtiles.

LES VERTVS ET OPÉRATIONS.

L'escorce du Peuplier blanc ou Aubeau boullie en vin, prouoque l'vrine, guerit pissē chaude, & A donne allegance à ceux qui ont la sciatique, c'est à dire douleur de hanche.

Le ius des fueilles appaisē douleur d'oreilles, & guerit les vlcères d'icelles, distillé dedens. B

Les fueilles & nouueaux boutons du Peuplier noir, allegēt douleur de goute es pieds & mains, C pilgēs bien menu & apphquēes dessus.

L'vnguent qui est fait d'iceux, vaut contre toutes inflammations, & contre toutes fioussures & D contusions nouuelles, & ensures, induit dessus.

De l'Orme.

Chap. LXXII.

LES ESPÈCES.

1 ON trouue deux sortes d'Orme, selon que Theophraste & Columella ont mis par escript : l'vne croist es campagnes: & l'autre es montaignes.

LA FORME.

1 La premiere espeece d'Orme est vn grand & haut arbre, ayant mout de rameaux festendans au large. Elle a le bois dur, brunatre, & difficile à fendre & nerueux : Les fueilles sont larges, ridées, quelque peu crenées tout à l'entour, sur lesquelles croissent souuent de vesies, ou se trouue vne liqueur visqueuse & gluante, dans laquelle croissent communement des vermisseaux: mais quand la dicte liqueur y demeure, vous la trouues à la fin de l'estē endurcie comme gomme par la vertu du Soleil. La graine de l'Orme est large, ronde, plate, & deliée, non guere differente à la graine des Ar roches, plus grāde toutefois. La racine festēd lōg & large. Ceste espeece est fort cōmune en ce pais.

2 La seconde espeece d'Orme n'est guere differente à la deuant dite de fueilles & de bois, mais elle croist beaucoup plus haut sans estēdre ses rameaux si fort au large, & portāt graine fort peu souuēt

Les feuilles de cestuy cy sont beaucoup plus ayes meés, & plus voluntiers mengées des vaches, beufs, & autre bestail, q̄ les feuilles du premier.

- 3 Outre ces deux especes d'Orme, on trouue aussi encore d'autres arbres quelque peu retirés à l'Orme, lesquels deuenent aussi grands & hauts. Ilz ont le bois fort lent & dur, pourtant en vse on beaucoup à faire roies de Moulins, poulies, & semblables instrumens, & engins à porter grãd fais & pois. Les feuilles sont aussi ridées & quelque peu crenées à l'entour, plus longues toutesfois, & plus estroites que celles des autres, palles verdes à l'ueners, vnies, polies, & luisantes, & aussi bien flairantes estans seches. Sur ces feuilles il n'y croist iamais de vesies, le bestail ne les menge pas aussi si voltiers que les feuilles d'Orme. La graine de ceux icy est pres semblable à celle des Ormes.

## LE LIEV.

- 1 La premiere espece ayme campagnes basses & vnies, & bõne terre & graisse, on la trouue aussi plantée en plusieurs endroits de Brabant le long des champs.

- 2 La seconde espece croist plus volütiers en montagnes: toutesfois vous ne trouueres guere en Westfandre iardin qu'il ne soit entouré de ceste forte d'Orme plâtée par rengées bié ordonnées.

- 3 Le tiers croist es bois en abondance, comme au bois de Soignie, & en aucuns endroits le lög des champs.

## LE TEMPS.

La graine des Ormes croist puis tombe en la fin d'Auail, quand les feuilles commencent à sortir.

## LES NOMS.

L'Orme est appelé en Grec ὄρνις: en Latin *Vlmus*: en haut Aleman *Ruffsholtz*, *Ruffbaum*, *Wolmenbaum*, *Lindbost*, & *Yffensholtz*: en bas Aleman *Wimboom*.

- 1 La premiere espece est appelée de Theophraste ὄρνις, c'est à dire *Vlmus*: de Pline *Vlmus palustris*: de Columella *Vlmus vernaculus*, & *Vlmus nostras*, c'est à dire Orme d'Italie.

- 2 La seconde est appelée en Grec par Theophraste ὄρνις ἑλληνική: en Latin *Montium*: de Columella *Astinia*, & *Vlmus Gallica*.

La graine de l'Orme est appelée en Latin *Saxera*.

Les Vermilleaux croissans es vesies & liqueur là dedans contenue, se nomment en Grec *κίρκις* *Cirpes*: en Latin *Calices* & *Muliones*.

La liqueur est appelée des Modernes *Gummi vmi*, c'est à dire Gomme d'Orme.

- 3 Le troisieme arbre est appelé de Theophraste en Grec *καυρία*, *Κόρυτα*: il semble que ce soit l'*Vlmus syluestris* duquel Pline fait mention: en François on la pourra nommer Orme sauuaige: il s'appelle en haut Aleman *Spanbuchsen*, & *Xuchschosen*: en bas Aleman *Scheselet*, & en quelques endroits *Serenteer*.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles & escorce de l'Orme sont quelque peu chaudes & astringentes.

La liqueur qui se trouue es vesies croissans sur les feuilles, est seche, mondifiante, & absteriue.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Les feuilles d'Orme cõsolident & guerissent playes nouvelles, bien broyées & appliquées defus. Pareille vertu a l'escorce interieure si on en lye les playes.
- B La decoction des feuilles d'Orme est bonne à fomentier & baigner bras ou iambes rompues ou cassées: car elle les guerit legerement.
- C Les feuilles broyées avec vinaigre, guerissent mauuaise gratelle & rogues.
- D L'escorce exterieure d'iceluy prinse au poid d'vne once avec vin ou eauë, pousse hors les phlegmes froides, & lache le ventre.



La liqueur qui se trouue es fueilles, embellit le cuir & le visage, effaçant toutes taches, lentilles, & dartres, si on l'induit dessus.

Elle guerit aussi playes fresches & nouvelles, infillée dedans, comme les Modernes ont trouué par experience.

Les fueilles d'Orme sont bonne pasture pour beufs, & vaches, selon que Theophraste & Colu mella escriuent.

## Du Tilleu. Chap. LXXXIII.

## LES ESPECES.

Theophraste décrit deux sortes de Tilleu, Malle, & Femelle. On les trouue toutes deux en ce pays, mais la Femelle est plus commune & mieux cognue.

## LA FORME.

Le Tilleu vulgaire, qui est la Femelle, deuiét grand & gros, estendant ses branches fort long & large, & faisant grand vmbre quand le Soleil luit. Il a l'escorce brunatre par dehors, vnüe, & nue, & ioygnant le bois, blanche, humide, & lente, se laissant ployer, tour ner, & tordre en toutes sortes: pourtant en saict on la matiere de quoy les cordes sont retorses. Le bois est blanchatre, vni, sans neuds, & fort doux au manier: pourtant en saict on aussi des charbons propres à faire poudre de haquebute. Les fueilles sont bié verdes, larges, quelque peu crenelées tout à l'en tour, au reste non guere dissimblables aux fueilles de Lierre. Les fleurettes sont blanchatres, odorifera ntes, & pendent plusieurs ensemble du milieu d'vne petite feuille estroict & bläche. Le fruit ne sont que petites bayes rondes, ou pilules, amassées par bouquets comme les bayes du Lierre, ausquelles est contenue vne petite graine ronde, noiratre, qui tom be, les pilules estans meures & fourrans.

La seconde espece de Tilleu, appellé Tilleu malle, deuiet aussi grosse & grande, s'estendant au lar ge comme l'autre Tilleu. L'escorce d'iceluy est au si lente, & sert à faire cordes & licouls: elle est plus rude toutesfois, plus epesse, & plus fragile, grisatre autour des petites branches, plus blanche que celle du Tilleu vulgaire, mais non si blanche que celle des branchettes d'Orme. Le bois de ce Tilleu est beau coup plus dur, plus noüeux, & plus iaulne, fort sem blable au bois de l'Orme. Les fueilles sont larges, no vniës, mais rudes, quelque peu crenelées tout au tour, asses semblables aux fueilles d'Orme, sinon que sur icelles n'y croist ismais de petites vesies. Cest arbre porte fort peu souuent fruit, de sorte que lon le pense pourst estre sterile, il produict pour fruit plusieurs comme filiques rondes & plates amassées en vn ayans vne fente au bout, fort sem blable de grandeur & figure aux filiques du vray Thlaspi décrit au cinquiesme Liure chap. LXII. chacune desquelles pend à vne queue à part.

## LE LIE V.

Le Tilleu ayme terre boine & conuenable, & croist de leger par tout ou il est planté.

## LE TEMPS.

Le Tilleu femelle fleurit en May: le fruit est meur à la fin d'Aouft.

## LES NOMS.

Cest arbre est appellé en Grec *φύλλον*: en Latin *Tilia*: en François Tilleu ou Tillet: en haut Ale man *Sinden*, & *Sindenbaum*: en bas Aleman *Sinde* & *Sindeboom*.

Le premier est appellé *Tilia femina*, c'est Tilleu femelle.

Le second s'appelle *Tilia mas*, c'est Tilleu malle: d'aucuns en François Hestre, & en bas Aleman *Ypelsjre*.

*Tilia femina.* Tilleu femelle.

## LE TEMPERAMENT.

L'escorce & fueilles du Tilleu sont temperées en chaleur, quelque peu desiccatives & astringentes, pres semblables en complexion à l'Orme.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La decoction des fueilles de Tilleu faicte en eauë, guerit pustules & vicres malings de la bouche des petis enfans, si on la leur laue.  
 B Les fueilles broyées en eauë sont vilement induites sur pieds enflés.  
 C L'escorce de Tilleu broyée avec vinaigre, guerit gratelle mauuaise & blanche, & semblables rognés, tesnoing Pline.

## Du Plane.

Platanus.

Plane.

## Chap. LXXIII.

*Aceris species folio maiori.* Espece d'Erable.

## LA FORME.

Plane est vn arbre estrange, lequel a esté par cy deuant tenu en fort grande estime en Italie & à Rome, de sorte que lon trouue par escrit, aucuns l'auoir arroulé de vin. Il deniet grand, haut, & estend ses branches & rameaux fort long & large. Les fueilles sont larges, fort semblables en figure aux fueilles de Vigne, pendantes sur longues queuës rougeastres. Les fleurs sont petites, & croissent par petis bouquets. Le fruit est rond, houlü, & quelque peu velu, d'environ la grosseur d'une Auellaine.

Il se trouue aux Alpes, en Alemaigne, & quelques endroits de Brabant vn arbre fort semblable au Plane. Il a aussi les fueilles larges come celles de Vigne pendis de lógues queuës, menues, & rouges. Les fleurs toutefois, & fruit de cestuy cy ne ressemblét pas aux fleurs & fruit du Platanus, mais aux fleurs & fruit d'Erable (duquel il est vne espece) qui sera descrit au chap. LXXXI. de ce Liure.

LE LIEV.

Le Plane croist en plusieurs endroits de Grece: on le trouue aussi planté en aucuns lieux d'Italie: il est incognu en ce pais.

L'arbre qui ressemble au Plane de feuilles, se trouue en quelques endroits d'Allemagne, sur hautes montaignes: & en Brabant, le long d'aucunes campagnes, mais fort peu souuent.

LE TEMPS.

Le Plane fleurit à la fin de Mars: & l'autre pareillement.

LES NOMS.

Le Plane est appelé en Grec *πλατάνος*, & pareillement en Latin *Platanus*.

L'autre qui ressemble au Plane, est aussi d'aucuns appelé en François Plane: en haut Aleman *Wasserstern*, & *Waldstern*. Ce n'est pas *Platanus*, mais vne espèce d'Erable, & semble que ce soit celle espèce qui est appelée en Grec *Κύπρινος* en Latin *Carpinus*.

LE TEMPERAMENT.

Les feuilles de Plane sont participantes de quelque froideur & humidité.

L'escorce & fruit sont plus dessicatifs.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le fruit de *Platanus* beu avec vin, ayde de ceux qui sont mordus de Serpens.

Iceluy broyé avec oing, guerit brûlures appliqué dessus.

L'escorce boullie en vinaigre, donne allegance à douleur de dens.

Les feuilles verdes & tendres bien pilées sont vtilement appliquées sur phlegmons, & arrestent fluxions des yeux.

De l'Aulne.

Chap. LXXV.

LA FORME.

*Alnus.*

*Aulne.*

Aulne est aussi vn arbre haut, grand, & ayant moult de branches, lesquelles se ront facilement, & ne se laissent guere legerement plier. L'escorce de l'arbre est brune. Le bois est assez dur, & dure long temps sous l'eau, voire plus long temps que nul autre bois: pourtât en fait on pilotis, pour asséoir fondemens en terre molle & fangeuse, & des tuyaux & canalz à conduire l'eau sous terre: mais hors l'eau il se gaste & pourrit fort legerement. Ce bois deuiet rouge incontinent quil est despouillé de son escorce, pareillement aussi quand il est vieil & sec. Les feuilles sont quelque peu gluetues au toucher, comme si elles estoient arroufées de miel: sa figure ronde, & quelque peu ridées, non guere differentes aux feuilles du Noye tier. Les fleurs de l'Aulne sont longs chattés bien pres comme au Bouleau. Le fruit est roud comme petites Olines, cōposé de moult d'escailles bien serrées ensemble: lesquelles estant meures & seches, fouurent, de sorte que la graine là contenue tombe hors & se perd.

LE LIEV.

L'Aulne croist volontiers es boys humides & bas, & ayme lieux aquatiques.

LE TEMPS.

L'Aulne commence à boutonner & produire ses feuilles nouvelles en Avril comme les autres arbres. Le fruit est meur en Septembre.

LES NOMS.

L'Aulne est appelé en Grec *κλήμα*: en Latin *Alnus*: en haut Aleman *Esendaum*, & *Ellersbaum*: en bas Aleman *Esensboom*.



## LE TEMPERAMENT.

L'escorce & feuilles de l'Aulne, sont froides, seches & astringentes.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

**A** L'escorce, de l'Aulne, à cause de sa vertu astringente, pourroit prouffiter aux apostemes, & tumeurs du gozier, des amygdales & de la bouche, comme les escailles, verdes exterieures des Noix mais iusques à present elle n'a esté vsurpée de personne, sinon pour taindre en noir quelques gros draps, chapeaux de feutre, & autres choses semblables, à quoy elle est propre.

**B** Les feuilles sont fort prisées contre phlegmons, vicerés, & toutes inflammations exterieures.

## Du Fau, ou Fouteau.

## LA FORME.

**F**AU est vn grand arbre & gros, ayant les feuilles deliées, vnies, polyes, asses larges, pres semblables aux feuilles du Peuplier mais pl<sup>us</sup> petites. Les fleurs d'iceluy ne sont que petis chattôs iaulnates, plus petis que ceux de Bouleau, au reste semblables. Le fruit, sont noix triangulaires cōtenans vn noyan bien doux. Ces Noix sont couuertes d'vne escaille espineuse, hors de laquelle elles tombent estans meures.

## LE LIEV.

Le Fau ayme lieux fort descouverts, larges & humides. LE TEMPS.

Le Fau fleurit & a nouvelles feuilles à la fin d'Auril, ou de May. Les Noix sont meures en Septembre avec les Chastaignes.

## LES NOMS.

Le Fau s'appelle en Grec *φύγις*: en Latin *Fagus*: en François Fouteau: en haut Aleman *Buchbaum*, ou *Buche*: en bas Aleman *Buchenboom*. Le fruit est à present appellé *Nuez Fagi*: en François Faine: en bas Aleman *Buchens noethens*.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles du Fau refroident. Le noy au du fruit est quelq<sup>ue</sup> peu humide & chaud.

## LES VERTVS ET OPERA.

**A** On applique vilement les feuilles de Fau, sur commencement de phlegmons, & semblables pustules & vicerés.

**B** L'eau qui se trouue au creux des Fouteaux, guerit gratelle & rongne des homes, cheuaux, vaches, & brebis, si on les en laue.

**C** On ne se fert encore des noix pour l'usage des personnes, toutefois elles sont douces & bones à mēger, bien pres cōuenables à tout ce à quoy les noix des pommes de Pin profitent.

## Du Bouleau.

## Chap. LXXVII.

## LA FORME.

**B**OULEAU deuiet aussi souuent haut & gros arbre, ayant mout de rameaux, qui ont mout de vergettes menues & lentes, pendans communement en bas, & se laissant ployer en telle sorte qu'on veut. L'escorce des vergettes & ieunes rameaux est vnue, polye, pleine de leue & de couleur de chasteigne: au tronc des arbres elle est dure par dehors, blanche, rude, inegale, & se d'vne aux rameaux de moyenne grosseur elle est quelque peu tachetée: sous icelle premiere escorce ioinit le bois se trouue vne autre escorce, vnue, & deliée comme papier, tellement que par cy deuant on en vsoit pour escrire dessus, auant que le parchemin & papier fussent cognus. Les feuilles sont asses larges, quelque peu creuées à l'entour, plus petites que les feuilles de Fau, au reste non guere dissimilables. Le Bouleau porte aussi chattôs cōme le Noisetier, plus petis toutefois ausquels viēt la graine.





## LE LIEV.

Le Bouleau se trouve es boys, es bruyeres & guarigues seches, & ausi le long des chîps à Bled.

## LE TEMPS.

Le Bouleau produit nouvelles feuilles en Avril: en Septembre sont les chattons meurs avec la graine.

## LES NOMS.

Le Bouleau s'appelle en Grec *ουλέα*: en Latin *Betula*: en haut Aleman *Birchenbaum*: en bas Aleman *Birchenboom*.

## LE TEMP. ET VERTVS.

Le Bouleau n'est pas vſurpé en medecine, pourtant ne cognoist on ny le temperament d'iceluy, ny les vertus: Les Anciens ont vſé de l'efcorce interieure d'iceluy au lieu de papier & des ieunes branchettes pour faire verges & baléts, cōme lon fait encore au iourdhuuy.

## De l'Aulne noir. Cha. LXXVIII.

## LA FORME.

A Vne noir ne croist point en forme d'arbre, & ne deuiet guere gros. Mais il produit mout de longues verges, droictes, fendues en autre petites vergettes couuertes d'vne efcorce delſée & noire, ſoubs laquelle ſen trouue vne qui eſt iaulnatre. Le bois de ces verges eſt blanchatre, ayant au milieu vne moëlle brune en rouge. Les feuilles ſont larges comme celles de l'Aulne, pres ſemblables aux feuilles des Cerifiers, plus rondes toutes fois & plus brunatres. Les fleurettes ſont blanchatres, apres lesquelles viennent de rondes bayes, verdes au premier, puis rouges & noires quand elles ſont ſeches, de gouſt eſtrange & mal plaiſant. LE LIEV.

Ce bois croist voluntiers es bois bas & humides.

## LE TEMPS.

Il fleurit en Avril: les bayes ſont meures en Aouſt.

## LES NOMS.

Cette plante eſt appellée des Brabanſons *Sprockenhout*, & des enfans de ce pais à *Pijſhout*, c'eſt à dire bois aux fleches, pour ce qu'ils en ſont des fleches à tirer: en haut Aleman *faußbaum*, & *ſeußbaum*: en Latin d'aucuns Modernes *Alnus nigra*, c'eſt à dire Aulne noir.

## LE TEMPERAMENT.

L'efcorce interieure iaulne de ce bois eſt de temperament ſec.

## LES VERTVS ET OPERA.

A L'efcorce iaulne de l'Aulne noir trempée en vin ou biere, & beuë, fait puiffamment vomir, & pouſſe hors les phlegmes & humeurs pourries contenues en l'eſtomach.

B Icelle boulie en vinaigre puis, tenue en la bouche, appaiſe douleur de dés, & guerit grantele & rongnes induictes deſſus.



Alnus nigra quibusdam.

Aulne noir.



Les feuilles font bõne nourriture pour les vaches leur faifans doner beaucoup de lait.

### Du Fufain, ou Bois pour faire lardoires. Chap. LXXIX.

#### LA FORME.

Fufain ne deuiet point grãd & haut cõme vn arbre, mais demeure bas, jetant mout de branches. Les troncs & vieilles branches font couuertes d'vne eforcee blanchatre: les ieunes d'vne eforcee verde ayant cõme quatre lignes de coulant le long des branches, qui font comme vne quadrature. Le bois est dur & iaulne en blanchiffant. Les feuilles font longues, quelque peu larges, deliées & tendres. Les fleurettes font blanchatres, pendans cinq ou six ensemble, & puis y vient de petites rondes bourfettes, quatre ioindës ensemble, lesquelles fouurent, le fruit estant meur: A chacune de ces bourfettes se trouue vn grain reueftu d'vne belle peau iaulne, qui estant delaiée avec eau ou autre humeur, taint aussi en iaulne.

#### LE LIEV.

Le Fufain croist en ce pais es hayes le long des champs & des boys.

#### LE TEMPS.

Il fleurit en Aueil, & le fruit est meur en Septembre.

#### LES NOMS.

Cette plante semble bien à voir celle Theophraste appelle en Grec *ἰωύριον*, *Enonymos*: Quelques vns l'appellent en Latin *Fasaria*, & *Fusanum* en François Fufain, Couillon de prestre, Bois à faire lardoires, à cause que lon se sert communement d'iceluy à faire lardoires: en haut Aleman *Spendelbaum*, & *Spat Hoedlin*: en Brabant *Papensfont*. Ce n'est pas *ἰύριον*, *Zygia*, ou *logas*, ou vne espece d'Ascer comme aucuns pensent.

#### LES VERTVS ET OPER.

A Le Fufain est, comme escrit Theophraste, fort nuisible à tout bestail, signamment aux cheures, qui en meurent, si elles n'en font par gées par haut & par bas.

### De l'Obiere, ou Opiere.

#### Chap. LXXX.

#### LA FORME.

Opiere ressemble au Suyn. Il a le bois, principalement les ieunes branches, pleines de moelle cõme le Suyn. Les feuilles sont larges, à cinq angles, pres de semblable forme à les feuilles de Vigne, plus petites toutesfois. Les fleurs sont blanches, & croissent par esmouchettes larges, desquelles celles du milieu sont petites, & celles du dehors qui enuironnent les

esmou



*Sambucus palustris recensioribus.*

Obiere.



esmouchettes sont grandes. Le fruit font bayes rondes, comme au Suyn, plus grandes toutes fois, & de belle couleur rouge.

LE LIEV.

L'Opiere croist le long des eaux, & en lieux bas & aquatiques.

LE TEMPS.

Il fleurit en May: le fruit est meur environ le mois de Septembre.

LES NOMS.

Cette plante est appelée des modernes en Latin *Sambucus palustris*, & *Sambucus aquatica*, c'est à dire Suyn de marés, ou aquatique, pour ce quelle a les fleurs, fruit, & bois plein de moelle comme le Suyn: On l'appelle en François Obiere ou Opiere: en haut Aleman *Schwefelder*, & *Bachholder*: en Erabant *Swetschen*, & *Swetschenhout*. Ce n'est pas *Opulus* comme aucuns pensent.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

Aucuns veulent dire que les bayes prises par dedans, font vomir & lachent le ventre: mais il n'a pas encore esté certainement expérimenté par gens doctes & experts.

De l'Erable. Chap. LXXXI.

LA FORME.

ERable croist aucunes fois en façon d'Arbre, fort haut, gros, & ayant mout de branches grosses: aucunes fois en maniere d'Arbrisseau, demourant bas. Il a l'escorce espesse, blanche & quelque peu: Le bois est dur, & orné comme de longues veines ondoyantes. Les feuilles sont larges, à cinq angles comme celles de l'Obiere, plus petites toutes fois, & plus vertes, fort semblables aux feuilles de Sanicle. Le fruit est long, plat, & delié, pres comme la Plume d'un petit oyfillon, ou comme l'asse de ces grandes mouches qu'on appelle Dames, ou d'une Sauterelle.

LE LIEV.

Erable croist en quelqs endroits es bois où il devient il grand arbre. & le long des fossés & ruisseaux, il demeure il petit & bas.

LE TEMPS.

Il fleurit en May, & la graine est meur en Septembre.

LES NOMS.

Cet arbre est appelé en Grec *σφινδα*: en Latin *Acer*, & semble à voir celle espèce d'Acer qui est appelée *pedunculata*, id est *Campestris*, & d'aucuns selon Theophraste *γλυκύς*, & *γλυκός*, de Plinè *Gallien*: en François Erable: en haut Aleman *Wassholder*: en Erabant *Booghout*, & *Wierhout*.

LES VERTVS ET OPERA.

Les Racines d'Acer broyées en vin & beues, valent contre douleur de costé, temoing *Serenus Sammonicus*.

Du Ienëure. Cha. LXXXII.

LES ESPECES.

IL y a deux fortes de Ienëure selon que Dioscoride escrit. L'une des especes devient grande & haute, l'autre demeure petite & basse, celle là est cognue en ce pais.

LA FORME.

Le petit Ienëure vulgaire, s'esleue aucunes fois en haut, & devient grand comme Arbres communs, mais le plus souvent il demeure bas, & croist en forme d'Arbrisseau ou frutex. Les branches de ce Ienëure sont couuertes d'une escorce deliée, laquelle se fend legerement, puis en fort aucunes fois (principalement es regions chaudes) en asté vne gomme, ou liqueur comme encens.

Les



Les fueilles sont petites, menues, dures, aigues & pointues, croissans le long des tiges & branchettes, & demourans toujours verdes sans perir en uyer. Le fruit est de petites rondes bayes, verdes au commencement, puis noires, de bonne odeur, de saveur douce, qui se trouue puis apres amere.

Le grand Ienéure est vn grand & haut arbre, portant les bayes aussi grâdes qu'Auelaines, aucunes fois aussi grandes que Noix gaugues, selon que Dioscoride recite. **LE LIEV.**

Le Ienéure se trouue sur hautes môtaignes, és bois ombrageux, & és voyes creuses & basses, il ayme terre froide & pierreuse.

**LE TEMPS.**

Au mois de May il fessele du Ienéure vne poudre isulne, laquelle est tenue pour la fleur d'iceluy, puis apres commencent à croistre les petites bayes, lesquelles meurissent en Septembre, vn an apres qu'elles sont sorties. Pourtant se trouue il sur le Ienéure de bayes meures, nō meures, grâdes & petites toutes ensemble.

**LES NOMS.**

Le Ienéure, ou Genéure est appelé en Grec *ἀγιωδες*, & d'aucuns *ἀκατάδιν* Latin *Iuniperus*: en haut Aleman *werscholder*, & *werscholderbaum*: en Brabant son *Genéuer*.

Les bayes sont appelées en Grec *ἀραιβίδες*: en Latin *Baccæ Iuniperi*: és Boutiques *Grana Iuniperi*: en François *Grains* ou *Bayes* de *Genéure*: en haut Aleman *werscholderbeeren*, & *Kromerbeeren*.

La gomme qui sort du bois & escorce, s'appelle és Boutiques *Vernix*: & en aucuns endroits, non sans grande & dangereuse erreur *Sandaraca*. Car le *Sandaraca* est vne substance corrosiue & venimeuse qui se trouue és mines de metal, avec lequel ceste gomme n'a nulle similitude.

**LE TEMPERAMENT.**

Le Ienéure entier avec fueilles, escorce, bois, fruit & gomme, est de temperament chaud & sec.

**LES VERTUS ET OPERATIONS.**

- A** Le fruit du Ienéure est vtile à l'estomach, poulmons, foye, & rongnons: il guerit vieille toux, trenchées & ventosités du ventre, & prouoque l'vrine bouilli en vin ou eau de mielée & bou.
- B** Il est bon aussi à gens foulés, tombés de haut, ou rompus, prins en mesme sorte.
- C** Le jus des fueilles preserue de tout venin, principalement des viperes & serpens: il est bon aussi à cela beu, & induit sur les playes au dehors. A ce mesme vaut aussi le fruit prins en quelque sorte que ce soit.
- D** Ienéure brulé, ou bien le fruit d'iceluy, chasse arriere par sa fumée toute beste venimeuse, & toute infection & corruption, de l'air: pourtant est il bon de les bruler en tēps de peste, & par tout là où l'air est infecté.
- E** L'escorce de Genéure brulée, guerit mauuaise gratelle, & rongnes, induite avec eau.
- F** La gomme de Genéure est bonne à ceux qui ont l'estomach & entrailles chargés de phlegmes froids: elle pousse hors toute sorte de vers, & arreste le par trop abondant flux des femmes.
- G** Le parfum de Vernix, prouffit au cerueau, desèche les humeurs superflues de la teste, & arreste flux de catarrhes.
- H** Ceste gomme destrempee avec huile rosat, guerit creueures & sondasses és mains & pieds.

**Du Cedre.****Chap. LXXXIII.****LES ESPECES.**

**C**edre est de deux sortes, Grand & Petit. Le Petit est aussi de deux sortes: l'vn a fueilles aigues & piquantes cōme le Ienéure: l'autre ne pique pas. **LA FORME.**

Le grand Cedre deuient fort haut, grand & gros, voire plus grand, & plus haut que le Sapin. **L'escors**



L'escorce depuis le bas du tronc iusques aux premières branches, est rude, & depuis là iusques au sommet, soit vne & polie, de couleur tirât sur bleu obscur, hors de laquelle coule de soy-même une fine blanche, humide, & odoriférante, laquelle estant illustrée du Soleil, se sèche & endurecit. Les branches sont longues, fort estendues au long & large, parties en mout d'autres brâchettes situées l'une à l'opposite de l'autre, comme au Sapin. Elles sont reueftues de mout de feuilletes, drues, petites, estroites, courtes, odoriférantes, pres semblables aux feuillets du Larix. Le fruit ressemble au fruit de Sapin, sinon qu'il est plus grand, plus gros, & plus dur, & croist tout droict comme au Sapin, selon que le tresdocte & tresdiligent Pierre Belon a escrit. Hors du tronc de ce Cedre icy coule vne liqueur claire que les Anciens appelloient Cedria.

1 Le premier petit Cedre, ressemble fort au Genéure : mais il est vn peu plus petit communément. Il a le tronc tortu & tors, couuert d'une escorce rude. Le fruit soit bayes rondes, comme celles du Genéure vn petit plus grandes toutesfois, de couleur verte au premier, puis isulne, & en la fin roussatre, d'assez bon goust.

3 Le second petit Cedre, ne fessele point, mais demeture tousiours petit & bas comme l'autre. Les feuillets de cestuy cy ne piquent pas, mais sont ronds & mouffes par le bout, pres semblables aux feuillets de Tamaris & du Saunier. Le fruit de cestuy cy sont aussi rondes bayes, vertes au premier, puis isulnâtes & en la fin rougeâtres, de goust amer.

LE LIEU.

1 Le grand Cedre prouiet en Afrique, & Syrie, & selon le tesmoignage de Vitruue, aussi en Candie, sur hautes montagnes, & lieux froids & humides, qui sont la pluspart couuerts de neige, comme sur le mont Libanus, Amanus, & Taurus, ainsi que Belon raconte.

2 Le second croist en Phénicie, & quelques endroits d'Italie, principalement en Calabre, sur le mônt Garganus, & aussi au Langued'oc.

3 Le tiers croist en Lycie, & se trouue en quelques endroits de France comme en Prouence Langued'oc.

LE TEMPS.

1 Le grand Cedre porte son fruit pres de deux ans, on le trouue tousiours avec le fruit qui meurt sur l'uyer.

2,3 Le petit Cedre, est tousiours verd, & chargé de fruit, ayant tousiours fruit meurt & non meurt comme le Genéure.

LES NOMS.

1 Le Cedre est appellé en Grec κέδρος: en Latin Cedrus: en François Cedre: en Aleman Cederbaum.

2 Le grand Cedre est appellé de Plin en Grec κέδρος: en Latin Cedrus maior, & Cedrus conifera.


3 La liqueur qui coule de cest arbre se nomme en Grec κέδρος: en Latin aussi Cedria, & Liqueur Cedrinus: d'Auicenne Serbin: de Serapio Kirran. De ceste liqueur Cedria souloit on par cy deuant en Egypte embauser les corps morts, lesquels sont à présent tirés de leurs sepulchres & vendus es Boutiques au lieu de Mumia, non sans grande & manifeste erreur. Car ce que les Arabes appellent Mumia, est appellé des Grecs Πισσαφθαλας.

2 Le premier petit Cedre est appellé en Grec κέδρος μικρόν: en Latin Acuta Cedrus, Cedrus phœnicia, Oxycedrus, & Cedria.

3 Le second petit Cedre se nomme κέδρος λυκία, Cedrus Lycia: & en Prouence, selon que Pierre Belon recite, Moruenic.

Oxycedrus,

Petit Cedre piquant.



## LE TEMPERAMENT.

Le Cedre est chaud & sec jusques au tiers degré: Cedria qui coule hors du grâd Cedre est pres t chaude au quatriesme degré, & de parties subtiles.

Le fruit du petit Cedre, est aussi chaud & sec, mais non si tresfort.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Cedria, c'est liqueur du Cedre, appaise douleur de dens, mise au creux d'icelles.  
 B Elle esclarcist aussi la veue, ostant & effaçant la maille & cicatrices des yeux, induite dessus.  
 C Icelle distillée es oreilles avec vinaigre tue les vers d'icelles, & avec vin de la decoction d'Hysope, guerit le son & bourdonnement des oreilles, & fait bonne ouye.  
 D Les Egyptiens ont par cy deuant gardé les corps morts avec Cedria: car elle les garde en leur entier & preserue de corruption: mais elle consume & corrompt chair viuante.  
 E Elle tue aussi les pouds & toute vermine, pour ceste cause, ce qui en est oyngt, les teignes, vers, & vermoulisire n'y frapperont point.  
 F Le fruit du petit Cedre mengé, vaut contre Strangurie, prouoque l'vrine, & esmeut les fleurs aux femmes.

## Du Saunier.

## Chap. LXXXIIII.

## LES ESPECES.

Saunier est de deux sortes, l'un a feuilles pres semblables à celles de Tamaris, l'autre ressemble de feuilles au Cypres. LA FORME.

Sabin.

Saunier.

- 1 Le Saunier qui est cognu en ce pais, croist en forme d'un petit & bas arbre. Il a aucunesfois le tronc de la grosseur d'un bras, lequel se fend en mout de branches, espandans legèrement au large & long: ces branches sont parties encore en autres branches menues, lesquelles se diuisent derechef en petites verges verdes, greilles, reue stues de mout de feuilles, pres semblables au Tamaris, plus dures toutesfois & plus poignâtes, demourans tout iours verdes yuer & esté, & de forte odeur. Le fruit sont petites bayes noires, non guere differentes aux bayes de lenéure.

- 2 La seconde espèce de Saunier, qui ressemble au Cypres, deuiet asses grâde & haute, ayant le tronc plus gros que le Cypres. Il a mout de branches espâdues. Les fueil les ressemblent à celles de Cypres. Le fruit sont bayes rondes, verdes au commencement, puis spres noires.

## LE LIEV.

- 1 Le premier Saunier se trouue planté en quelques iars dins de ce pais.  
 2 Le second prouient en Asie la mineur, & en Grece, On le trouue peu souuent en ce pais.

## LE TEMPS.

Le fruit du Saunier est meur sur l'yuer.

## LES NOMS.

- 1 Le premier arbre est appelé en Grec *Sabinus*: en Latin *Sabinus*: es Boutiques *Sauna*, d'aucuns *Saunier*: en François Saunier: en haut Aleman *Saunenbaum*: en bas Aleman *Saunboom*.  
 2 Le second est aussi appelé de Dioscoride *Sabinus* & *Saba*, de Pline aussi *Cupressus cretica*. Il semble à voir que ce soit l'arbre que Theophraste appelle en Grec *βία*, *βίου*, *Thia* vel *Thiam*, & Pline *Brasher*, ou *Braza*, comme le tresl'auant Pierre Belon a fort bien laissé par escrit.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles du Saunier, desquelles on vse principalement en Medecine, sont chaudes & seches jusques au tiers degré, & de parties subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Les feuilles de Saunier boullies en vin, prououquent si tresfort l'vrine, que le sang puis apres en



suýt, elles escmeuvent le flux menstrual, & pouillent hors la secondine, & enfant mort. Pareille vertu a aussi la sumée receuë par dessous.

Les feuilles broyées avec mie l, guerissent vlcères malings & phagedoniques: elles nettoient & B effacent toutes taches & cicatrices du corps de la personne.

Elles font aussi tomber les verrues qui croissent sur le membre viril & autres parties honteuses. C  
On melle aussi le Saunier vilement parmy huilles chaudes, & vngüents, & on l'y peut meller D  
au lieu de Canelle, la p renant au poid double, tesmoing Galien & Pline.

Du Cypres. Chap. LXXXV.

LA FORME.

Cupressus. Cypres.

Cypres a le tronc gros, droit, & long, sur lequel croissent mout de branches gressles, lesquelles ne s'estendent pas au large, mais s'esleuent en haut le long de l'arbre, de sorte que le Cypres n'est pas large, mais estroit, croissant en grande hauteur. L'escorce du Cypres est brune, le boys est isulnatre, dur, espes & ferré, & quand il est sec, odoriferant, principalement si on l'approche pres du feu. Le Cypres n'a pas de feuilles particulieres, mais les brâches produisent au lieu de feuilles beaucoup de courtes vergettes verdes & menues, se partissans en autres vergettes, lesquelles sont crenées en mout d'endroits, côme si elles estoient cöpallées de beaucoup de petites suicillettes. Le fruit est rond; de la grosseur bien pres d'une Prune, lequel souure en plusieurs endroits estât meur, contenant en soy vne graine platte & grisâtre, laquelle est fort aymée des Formis.

LE LIEV.

Cypres ayme hautes montagnes, & lieux secs, il ne croist pas voluntiers en lieux bas & humides.

LE TEMPS.

Les feuilles de Cypres demeurent tousiours verdes. Le fruit est meur en Septembre & venant l'yuer.

LES NOMS.

Cest arbre s'appelle en Grec κυπάρισσος, en Latin Cupressus, en Boutiques Cupressus, en François Cypres: en haut Aleman Cypses, en bas Aleman Cypressboom.

Le fruit est appelé en Latin Nuxes Cupressi, Pilule Cupressi, & d'aucuns Galbaliés Boutiques Nuxes Cupressi.

LE TEMPERAMENT.

Le fruit & les feuilles de Cypres sont seches iusques au tiers de gré, sans chaleur manifeste, & astringentes.

LES VERTVS ET OPERA.

Le fruit de Cypres prins au dedans, arreste flux de ventre, & dysentere, & vaut contre crache sang, & tout flux de sang. Pareille vertu a la decoction d'iceluy faicte en esue.

L'huile dans laquelle le fruit ou feuilles de Cypres ont bouilli, renforcent l'estomach, arrestent B vomissemens, serrent le ventre, arrestans tout flux d'iceluy, & guerissent excoriation des parties honteuses.

Les noix de Cypres guerissent aussi rompures, quand les entrailles sont deualées, appliquées C dessus par dehors. Pareille vertu ont les feuilles.

Du fruit de Cypres on guerit & oste la chair pourrie croissant es narilles. D  
Iceluy broyé avec figues grasses seches, guerit enflures des genitoires, & en y adioustant du le E uain il dissout & degaste bubons & bosses appliqué dessus.

Les feuilles de Cypres cuictees en vin doux ou hydromel, guerissent strangurie, & arrestent ef- F coulemens de la vesie.

Icelles palées bié menu, referment playes nouvelles, & arrestent le sang d'icelles appliquées dessus. G  
On les applique aussi vilement avec farine d'orge rostie, sur feu volage, carboncles & autres vl H ceres chauds, & rongeurs.

Les feuilles & fruit de Cypres induictees avec vinaigre, noircissent les cheveux. I



## LA FORME.

TAXUS. If.

**I**f est vn grand & haut arbre, demourant tousiours verd. Il a le tronc gros & couuert d'vne ecorce grise, fendue, & squamette. Les feuilles sont verdes en brunissant, longues & estroictes comme vne plume, amassées de plusieurs feuillettes assises le long d'vne queue, vne à l'opposite de l'autre, chacune desquelles est estroict & plus longue que les feuilles de Rosmarin, au reste non guere dissemblables. Il a pour fruit de belles bayes rouges, rondes, vn petit plus grandes que les Cusines, au reste non guere dissemblables.

## LE LIEV.

L'if prouient en Arcadie, Italie, Espagne, France, & Alemaigne : on le trouue aussi en ce pais au bois d'Ardenne. On l'a aussi par cy deuant plâté en ce pais aux jardins pour Tamariscus.

## LE TEMPS.

Le fruit de If est meur en Septembre.

## LES NOMS.

Cest arbre s'appelle en Grec *σπιναξ*, de Theophraste *μίσλαξ*, & selon Galien *καστός*, Castus : en Latin *Taxus* : des Apothicaires ignorans de ce pais *Tamariscus* : en François If : en haut Aleman *Jbenbaum* : & là selon en bas Aleman *Jbenboom*.

## LE TEMPERAM.

L'if est du tout venimeux, & contraire à la nature humaine.

## LES NVISANCES.

- A** On n'vse point de If au prouit de l'homme car il est si nuisible & venimeux, que ceux qui dorment seulement sous l'ombre d'iceluy, en deuenent malades, voire en meurent aucunesfois, signamment quand il est en fleur, & en Gascongne, là ou il est le plus nuisible.
- B** Si on mange le fruit d'iceluy, on en aqiert flux de ventre, les oyseaux en meurent, ou changent de plumage.
- C** Les Apothicaires ignorans de ce pais vident de l'ecorce de cest arbre au lieu de l'ecorce de Tamariscus : hors de cela on peut cognoistre, quel mal commettent iournellement les Apothicaires ignorans, quand ils baillent medicamens mauuais & nuisibles au lieu de bons, au grand detrimet des poures malades.



## Du Pin.

## Chap. LXXXVII.

## LES ESPECES.

**I**l y a deux sortes de Pin selon que l'ancien Theophraste escrit, Cultiué & sauuage. On trouue aussi beaucoup d'especes de Sauuage. **LA FORME.**

Le Pin Cultiué est haut & grand, ayant au sommet moult de rameaux, lesquels sont diuisés en autres branches rondes, reueintes tout à l'entour de petites feuilles dures, & bien pres poignites, fort estroictes, & de couleur verde en blanchissant. Le bois est rougeatre, pesant, & par dedens à l'entour du cœur, plein de seue & de liqueur. Il a pour fruit de grosses bouilles brunatres (lesquel les on appelle Pommes de Pin) ou croissent de petites noisettes contenans vn noyau blanc, doux, & duquel on vse souuent en medecine.

- A** La premiere espece de Pin sauuage, est haut, grand & fort espes, non pas toutesfois si haut que le Pin cultiué. Les branches sont estendues au large, ayans de feuilles longues & poinctues. Le fruit est court, & non dur, souurant facilement, & tombant legerement.
- B** La seconde espece ne croist pas haut, & n'a pas de tronc droit esleué, mais produit soudain hors de la racine beaucoup de branches, se coulans par terre, longues, fort lentes, & qui facilement se laissent ployer, de sorte que lon en fait des cerclés de lier tonneaux au vin, comme le tresseignant & diligent Matthiolus escrit. Le fruit de cestuy cy est vn peu plus grand que celuy de quelques autres Pins sauuages.
- C** La tierce espece, croist toute droite & deuiet grande & haute, non toutesfois si haute que les autres Sauuages. Les branches de ceste cy croissent comme celles du Picea. Le fruit est long & gros



gros, pres semblable au fruit de Picea, là dedans sont contenues de noisettes triangulaires, semblables aux noix du Pin cultivé, plus petites toute fois, fragiles, ayés le noyau de bonne saueur, comme celuy du Cultivé.

D La quatriesme espece a le fruit long, dur, lequel ne s'ouvre pas facilement, & ne tóbe legerement de l'arbre.

E La cinquiesme espece a de petites noix rondes, non guere plus grandes que le Cypres, lesquelles s'ouvrent facilement & tombent.

Hors de ces arbres prouient ceste liqueur que lon appelle Resine, principalement hors des Sauvages: & cou le la pluspart hors de l'escorce, ou hors du bois, mais au cunefois aussi s'en trouue és pommes.

De ces arbres sort aussi la Poix liquide & dure, laquelle on tire en les brûilít selon la maniere que Theophraste enseigne, laquelle est encore obseruée en Candie, comme Pierre Belon tesmoigne.

LE LIEV.

1 Le Pin cultivé prouient en plusieurs endroits d'Italie, d'Espagne, de Grece, & de France, és campagnes & iardins là ou il est planté.

2 Les sauvages croissent és montagnes, & aucuns d'iceux au plus haut des montagnes, ou il ne croist autres arbres, ne herbes, principalement la premiere espece Sauvage, laquelle on trouue aussi en Alemagne, Itáliá, Pole, & autres regions froides.

LE TEMPS.

Le fruit du Pin est meur en Septembre.

LES NOMS.

Le Pin est appellé en Latin *Pinus*: en Grec non *πίκνυς*, comme plusieurs Modernes estiment, mais *πίκνυς*, comme il est manifeste par les vers ensuyuans de Vergile au 7. des Aeneides.

*Ipsa inter medias flagrantem feruida pinam*

*Suylines, Là ou il faut entendre par flagrantem pinam, teda pinea, comme Seruius escrit.*

Ouide és Epistres Heroides:

*Vt vidi, vt perij, nec notis ignibus arsi,*

*Ardes vt ad magnos pineas teda deos.*

Item au quatriesme liure des Fastes:

*Uille accendit geminas pro lanpade pinus,*

*Hinc Cereis sacris nunc quoque teda datur.*

Prudentius in hymno cerei pascalis:

*Sen pinus piceam fert alimoniam,*

Par lesquels vers on peut cognoistre, que Teda vient de l'arbre appellé en Latin *Pinus*, auquel, selon que Theophraste escrit, *πίκνυς*, Peuce se change: de sorte que par cela on peut cognoistre que *Pinus* & Peuce n'est qu'un arbre.

1 L'espece cultivée est appellée en Grec *πίκνυς ἴμας*: en Latin *Pinus sativa*: en François Pin: en haut Aleman *Spartzbaum*, & *Kinsholz*: en bas Aleman *Pijnboom*.

2 L'espece sauvage se nomme en Grec *πίκνυς ἄγριος*: en Latin *Pinus syluester*, & *Pinaster*: en François Pin sauvage: en bas Aleman *wilde Pijnboom*: Des especes de Pin sauvage sont les arbres appellés en haut Aleman *Kijferholz*, *foersholz*, ou *fuertensholz*, *fischtenbaum*, &c.

A La premiere espece sauvage est appellée en François Aleue & Elue, selon Pierre Belon, & semble que ce soit *Pinus Tarentina*, duquel Pline fait mention.

B La seconde est appellée en Italien *Mughi*, & se pourroit appeller en Grec *χαμαπίκνυς*: en Latin *Humilis Pinus* ou *Pinus terrestris*.



C La tierce s'appelle en quelques endroits des montaignes entre Italie & Alemagne, Cembri, & Cirmoli. Ceste semble à voir celle (au jugement du tresdiligent Pierre Belon) que les François appellent Suisse. Ce n'est pas Sapinus, car Sapinus est le dessous du tronc de Sapin, comme apres nous escrirons.

D La quatriesme ressemble fort à celle que Theophraste appelle en Grec *πίκνις ἰδέα*: en Latin *Pinus idea*.

E La cinquiesme est appelée de Theophraste *πίκνις παραλία*, c'est à dire en Latin *Pinus marina*: en François Pin marin.

Le fruit du Pin est appelé en Grec *κωνίον*: en Latin *Conus*, & *Nux pinea*: en François Pomme de Pin: en haut Aleman *Zhebel*: en bas Aleman *Pijnappelen*.

Les noix qui se trouvent aux Pommes de pin sont appelées en Grec *πίστιδα*, & d'Hippocrates *κακώδωρον* Latin *Nuces pinee*: en François Pignons.

Le milieu du bois & partie plus interieure dure qui est pleine de liqueur & brulle comme vne torche estant allumée, se nomme en Grec *τέδα*, *ἡγύ δένδρον*: en Latin *Teda*: Et quand tout l'arbre entier est par dedens ainsi gras & plein de liqueur, alors dit Theophraste qu'il est changé en Teda: adonc meurt il aussi pour ce qu'il est chargé de gresse, comme vne persone ou beste qui est estouffée en sa gresse: adonc sont ces arbres propres pour en tirer la poix. Parquoy ceux s'abusent grandement qui pensent que Teda soit vn arbre particulier, & ne cognoissent point que c'est plus tost vn vice ou maladie du Pin. LE TEMPERAMENT.

L'escorce du Pin est seche & astringente, signammét les escailles des Pommes. De pareille complexion sont aussi bien pres les fueilles.

Le noyau des noix est chaud & humide, & quelque peu astringent.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

A Les escailles de la Pomme de pin, & l'escorce du Pin arrestent flux de ventre, & flux de sang, & prouoquent l'vrine. Pres semblable vertu a la decoction d'icelles, beuë.

B Elles guerissent aussi toutes escorceures, & valent contre brulures, broyées avec escume d'argent & en cens. En y adioustant de couperose, elles mondifient & guerissent viceres rongeurs.

C Les fueilles de Pin guerissent playes fresches & nouvelles, & bouliées en vinaigre, appaisent douleur de dens.

D Les pignons sont vtils aux Poulmons, mondifient le thorax, & font cracher les phlegmes: d'auantage ilz nourrissent fort, engendrent bon sang: pour ceste cause sont ils bons à ceux qui sont trouués de toux, & aux ethiques, prins en quelle maniere que ce soit.

E Ce fruit desoppile aussi le foye & la ratelle, adoucit acrimonie de l'vrine, pourtant prouffite il à gens trouués de la pierre & grauelle.


F Les vertus & operations de la Resine & de la Poix seront declarées cy apres.

#### Du Picea. Chap. LXXXVIII.

##### LA FORME.

**P**icea est aussi d'assez bonne grandeur & hauteur, mais n'est si grande que le Pin, demourant tousiours verte come le Pin, & Sapin. Elle n'a pas le bois si rouge comme le Sapin, Elle est aussi grasse, & en fort Resine de diuerses sortes. Les branches sont dures, parties en autres brèches, en forme de croix la pluspart, sur lesquelles croissent fueillettes verdes, non autour des branches, mais à chascun costé l'une à l'opposite de l'autre come petites plumes. Elle a le fruit plus petit que celui du Pin.

En brulant ce bois, il en sort aussi de la Poix, comme hors du Pin, tesmoing Dioscoride.



LE LIEU.

Cest arbre croist en plusieurs endroits de Grece, d'Italie, de France, &amp; aussi d'Allemagne.

LE TEMPS.

Le fruit d'iceuy est aussi meur en Septembre.

LES NOMS.

Cest arbre se nomme en Grec *πίτυς* en Latin *Picea*: en haut Aleman *Kot thammen*, & *Kot dannebaum*, cest à dire Sapin rouge: & là selon en bas Aleman *Kooder dunnboom*,Que *Pitys* & *Picea* soient vn mesme arbre, Scribonius Largus le declare asses, en la Composition 201. ainsi escriuant. *Resine pituina, id est, ex picea arbore.*

LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

Les feuilles, escorce, fruit, &amp; noix de cest arbre, sont pres de pareil temperament, vertus &amp; operations, que les feuilles, escorce, fruit &amp; noix du Pin.

## De la Resine coulant hors du Pin &amp; du Picea. Chap. LXXXIX.

LES ESPECES.

**L**A Resine qui coule hors du Pin & Picea est de trois sortes, sans la Poix, laquelle nous voulons descrire à part au Chapitre suyuant.

1 L'une fort par la chaleur du Soleil, &amp; chaleur de l'asté, hors du bois, estant rompu, ou couppe, principalement quand il est couppe.

2 L'autre se trouue sur &amp; entre l'escorce du Pin &amp; Picea, &amp; fount là ou ils ont esté fend' ou blessés.

3 La tierce croist entre les escailles du fruit.

LES NOMS.

Toute Resine est appelée en Grec *ρίτιν*: en Latin *Resina*: en Aleman *stersst*.1 La premiere espee s'appelle en Grec *ρίτιν υγρῆς* en Latin *Resina liquida*: és Boutiques de ce pais *Resina Pini*: en bas Aleman *stjnsstsen*, ou *mosumen stersst*, cest à dire Resine liquide.De ceste sorte est la Resine appelée des Anciens en Grec *ρίτιν κολοφωνία*, *Resina colophonis*, laquelle a eu tel nom à cause que par cy deuant on estoit acoustumé de l'apporter de Colophon. Maintenant les Apothicaires ignorans vsent au lieu d'icelle, d'une sorte de Poix seche, au grand detriement de plusieurs malades.De ceste sorte est aussi la Resine que les Brabantons appellent *stpieghststst*, laquelle se fond au soleil en asté, au demourant seche, & se peut reduire en poudre: Quelques vns la nomment *Resina arida*, cest à dire Resine seche, combien que ce ne soit la Resina arida des Anciens.2 La seconde Resine est appelée en Grec *ρίτιν ξηρῆς* en Latin *Resina arida*: mais celle qui coule hors du Pin est appelée en Grec *ρίτιν πικρῆς*, *Resina picea*: & celle qui fort du Picea *ρίτιν πικρῆς*, *Resina picea*, & *Resina picea*, d'aucuns *spaga*, telmoing Pline.Ces deux especes de Resine, & pareillement la Resine seche coulant du Sapin, sont maintenant vendues és Boutiques sans discretion, pour gros encens, & appellées des Apothicaires ignorans *thus*, d'aucuns *stapost*, & appellent le vray Encens *Olibanum*, non scachans que *Olibanum* qui est appelé en Grec *λίβανος*, *Libanus*, & *Thus*, sont vne mesme chose.3 La tierce Resine est appelée *ρίτιν σπυδρίων*, *Resina sprodiana*, celle icy a esté iusques à present incognoe és Boutiques.

LE TEMPERAMENT.

Toutes Resines sont chaudes &amp; seches, &amp; de temperament mondifiant &amp; absterif.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Resine mondifie &amp; consolide playes nouvelles, pourtant est elle la plus part meslée en tous Aunguens &amp; emplastres, qui seruent à playes nouvelles.

Elle amollit aussi tumeurs dures, &amp; cõsorte membres foulés, appliquée, ou induicte avec huiles B à ce propos.

## De la Poix. Chap. XC.

LES ESPECES.

**P**OIX est de deux sortes: l'une est liquide, & se nomme Poix liquide: l'autre est dure, & se nomme Poix aride ou seche. Elles coulent toutes deux hors du bois du Pin, du Picea, & de quelques autres arbres, comme du Cedre, Terebinthé, Larix, si on brule le bois d'iceux selon qu'il appartient, comme nous auons dit cy dessus.

LES NOMS.

La Poix est appelée en Grec *πίτα*: en Latin *Pix*: en Aleman *stsch*.1 La Poix liquide s'appelle en Grec *πίτα υγρῆς* en Latin *Pix liquida*: en Brabant *Teer*.2 La Poix aride se nomme en Grec *πίτα ξηρῆς*, *πίτα σπυδρίων*, *πίτα ξηρῆς* en Latin *Pix arida*: és Boutiques *Pix nautica*: en bas Aleman *stschsch*.

## LE TEMPERAMENT.

La Poix est chaude & seche jusques au second degré, & de parties asses subtiles, mais la Poix aride est la plus seche, & la Poix liquide est la plus chaude & de parties plus subtiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Poix liquide (tesmoing Dioscoride & Galien) prinse avec miel, mondifie le thorax: & est bonne lechée, à ceux qui ont courte haleine, & ont le thorax chargé de matiere purulente.
- B** Elle amollit aussi & meurit toutes dureffes & tumeurs, il est bon d'en oindre le col eslere esqui nance, ou enflure du gozier. Brief il est bon de la mesler parmy vnguens qui amollissent, anodans, & maturatifs. In duicte avec farine d'orge, adoucit & amollit dureffes de la matrice, & du siege.
- C** Poix liquide meslée avec soulfre, reprime vlcères rongeurs, & guerit toute mauuaife rongne, & gratelle, & en y adioustant du sel, elle est vtilement appliquée sur morsures & piqueres de serpens & viperes. Elle guert creueures venans aux mains, aux pieds, & au siege, in duicte dessus.
- E** Icelle broyée avec poudre d'encés bien subtile, guerit vlcères cauerneux, & les réplit de chair.
- G** Poix aride a pres telle faculté que la liquide, non si forte toutesfois: mais elle est plus propre & meilleure à consolider playes que la Poix liquide, selon que dit Galien.

## Du Sapin.

## Chap. XCI.

## LA FORME.

ἐλάτη. Abies. Sapin.

Sapin est vn arbre grád, haut & long, demourant tousiours verd, croissant beaucoup plus haut que le Pin, ou Picea. Il a le tronc fort droit, vni par bas sans neuds, & noïeux par haut le plus souuent. Là dessus croissent les branches, produisant fucilles pres semblables à Pif, plus petites toutesfois & plus blanches. Le fruit re semble à la Pôme de Pin, plus estroit & toutesfois & plus petit, non pendant en bas comme la Pôme de Pin, mais croist tout droit contre mont. De ce bois on en fait les Mas des nauires, & les rames & pieux.

- B** Hors de l'escorce de cest arbre estant enco re ieune, on assemble vne belle Resine liquide, claire & transparente, cōme les tresdoctes Matthiolus & Pierre Belon escriuent, qui est amere & aromatique, de goust pres semblable aux escorces de Citron ou de Limon consistes.
- C** On trouue aussi sur cest arbre vne Resine se che & blanche, comme sur le Pin & Picea, laquelle est aussi vendue pour Thus, c'est à dire encens, & usurpée du commun vulgaire.

## LE LIEV.

Le Sapin croist voluntiers es montaignes: & ne se trouue pas seulement en Grece, Italie, Espagne, France: mais aussi en Prusse, Pomeranie, Island, & en plusieurs endroits d'Allemagne.

## LES NOMS.

Cest arbre est appellé en Grec ἐλάτη: en Latin Abies: en François Sapin: en haut Aleman weiff Thannen, & weiff Thannenbaum: en bas Aleman wittre Dennenboom, & Thassiboom.

La partie inferieure du tronc de cest arbre qui est sans neuds, se nomme en Latin Sapius, & la partie superieure qui est pleine de neuds, Fußern, tesmoing non seulement Pline, mais aussi Vitruue au second de son Architecture.

- B** La Resine liquide & claire, coulant hors de l'escorce des ieunes arbres, est appelée des Modernes δάκρυον ἢ ἐλάτης Lachryma abietis, Lachryma abiegna, & d'aucuns Abiegna resina liquida, & Abiegnant oleum. en Italien Lagrimo: es Boutiques de ce pais Terrebinthina Veneta, & y est vendue pour la vraye Terrebinthine en François Terrebinthine de Venise: en bas Alemá Dene et seche Terrebinthine. Il y a quelques vns qui pensent que ceste Resine soit ἐλαίου δας βάρης, Oleo serefina de Dioscoride.



# Du Larix, & Terebinthine vulgaire. Ch. XCII. 545

La Resine aride & blanche est appelée *βύρινι αλατήρια*, *Resina albigna*, & est aussi vendue es Boutiques, pour Thüs & Garipot, comme la Resine seche du Pin.

## LE TEMPERAMENT.

L'escorce, & pareillemēt la Resine seche de cest arbre, sont de tēperament, vertus & operations fort semblables, à l'escorce & Resine seche du Pin, si nō qu'elles sont vn peu pl' acres, & absterfues.

La Resine liquide & claire est chaude & seche iulques au secōd degré, & aussi absterfue & mon difantēa cause de son acrimonie, non guere differente en temperament à la vraye Terebinthine.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Resine claire & liquide du Sapin prinse enuiron vne demy once de pesant, lasche le ventre, A en poussant hors les humeurs bilieuses & choliques: elle mondifie & guerit les rognans blessés, prouoque l'vrine, pouise hors la pierre & grauelle, & est bon de la prendre souuēt à ceux qui sont trouuillés de la goute.

Icelle prinse avec Noix muscade, & sucre à la grosseur d'vne noix, guerit Strangurie, & est fort B bonne contre excoriations des parties honteuses.

Elle est aussi singuliere pour toutes playes nouuelles, principalement pour playes en la teste, C car elle consolide & mondifie fort.

## Du Larix, & Terebinthine vulgaire.

### LA FORME.

Larix est vn grand arbre & gros, estendant asses au large ses branches qui sont lentes, & se laissent facilement plier. Le bois est rougeatre, espes, pesant & fort dur, de sorte q̄ le feu ne luy peut beaucoup nuire, si ce n'est qu'il soit brulé en la fournaise avec autre bois comme la pierre blanche. L'escorce de cest arbre est plus vnie que celle du Sapin. Les feuilles sont verdes, dechiquetées, croissans espesses & amassées ensemble, tombent sur l'uyer. Le fruit resamble aux Pommes de Pin, sinon qu'il est beaucoup plus petit, non guere plus grand que le fruit de Cypres.

De cest arbre sort vne liqueur ou Resine, qui est molle, humide, blanchatre, & obscure, semblable au miel d'Athenes quant à la forme, selon que Vitruue escrit.

Il croist aussi sur cest arbre vne sorte de Fūgus, c'est à dire vne excrescence fungueuse, appelée Agaricus, la quelle est vne medecine bonne & de grand vertu. Le meilleur Agaric est celuy qui est bien blanc, fungueux, fort leger, & friable. Celuy qui est d'autre sorte, c'est à dire noir, espes, ferme, lent, pesant, n'est pas conuenable est medecine, mais est mauuax & venimeux.

### LE LIEV.

Cest arbre croist en Lombardie le long de la riuieire du Pau, & en Silesie en abondance.

### LE TEMPS.

Cest arbre acquiert nouuelles feuilles au commencement du Printemps. Le fruit est meur en Septēbre.

### LES NOMS.

Cest arbre est appelé en Grec *λαρίξ*; en Latin *Larix*; en quelques Boutiques *Larix*; en haut Aleman *Leichenbaum*; en bas Aleman *Lochenboom*.

La Resine de cest arbre est appelée en Grec *βύρινι λαρίκιον*, *βύρινι*; en Latin *Resina laricina*, & Res B *sinu larinis* es Boutiques *Terebinthina*, non sans erreur, & là selon en Aleman *Termenthijn*, ou *Ter benthijn*, c'est à dire Terebinthine.

Ceste excrescence fungueuse qui se trouue sur le Larix, est appelée en Grec *ἀγαρίκιον*; en Latin C *Agaricum*; es Boutiques *Agaricus*; d'aucuns Medecins *sanilla*; en François *Agaric*.

### LE TEMPERAMENT.

Larix a les feuilles, fruit, escorce, & noyau de temperament pres semblable au Pin & Sapin, non pas

## Chap. XCII.

### Larix.



pas toutesfois d'operation du tout si vertueuse, ne si forte.

**B** La Resine de cest arbre est chaude & seche comme les autres Resines, plus absteriue toutefois  
**C** & mondifiante. L'Agarie est chaud au premier degre, & sec iusques au second.

LES VERTVS ET OPERATIONS.

**A** La Resine de Larix est aussi bonne eomme les autres Resines à mesler parmy vnguens & emplâtres, qui consolident, mondifient, & guerissent playes.

**B** Elle modifie aussi le thorax leché avec miel, & lache le ventre, prouoque l'vrine, & pouffe hors la pierre & la grauelle, prins par dedans.

**C** Agarie prins enuiron au poids d'une drachme purge par le ventre phlegmes froides & visqueuses, & autres humeurs grosses & crues qui chargent ou oppilent le cerueau, nerfs, poulmons, thorax, estomach, foye, ratelle, rongnons, matrice, ou quelques autres parties interieures.

**D** Agarie est bon contre douleur & tournoyemens de teste, contre epilepsie, & apostemes au cerueau, prins avec syrop acetueux.

**E** Il vaut contre courte haleine, asthme, toux difficile & de longue durée: il est bon aussi à gens tombés, froissés, blessés ou rompus au dedans, beu avec vin miellé si on est sans fièvre, ou eau miellée, si on a la fièvre.

**F** On le donne aussi vilement avec vin doux chict, à gens ethiques & phthisiques, & qui crachent sang, & contre reiections de sang.

**G** Il ouure oppilations de foye, & des rongnons, & vaut mout contre la iauuissie, & à gens qui sont defecoulourés, car il efface la mauuaise couleur, & fait reuenir vne belle couleur naturelle.

**H** Prins avec vinaigre, il ouure & guerit la ratelle oppilée & endureie.

**I** Iceluy prins sec sans aucune liqueur, renforce & conforte l'estomach debile, amende les fluctuations & rouctis d'iceluy, & fait faire bonne digestion.

**K** Agarie est aussi medecine conuenable contre fieures enuieillies, pour purger le corps, & contre les vers: on le mesle aussi vilement avec medicaments qu'on prend contre venin & poyson.

LES NVISANCES.

Agarie est de tardieue operatiō, & prins en trop grande quantite, debilitie les parties interieures. LA CORRECT.

Agarie est corrigé en le donnât avec Gingebre, sel gemma, & principalement avec Oxymel.

De Terebinthe. Cha. XCIII.

LA FORME.

Terebinthe demeure en quelqs lieux bas & humile: & en quelqs endroits il deuie grand & haut, selon que Theophraste escrit. Il a les fueilles longues assemblées de plusieurs fueilles croissans l'une contre l'autre le long d'une queue chacune desquelles est pres semblable à la fueille de Laurier. Les fleurs sont petites & roussatres amassées ensemble en forme de grappe, puis en sort de petites bayes rôdes, verdes au premier, puis rougeatres, & quand elles sont meures, noires, glutineuses, & odoriferantes. Les racines sont longues, croissans fort profond en la terre. Le bois est beau, noir, & espes.

Hors de cest arbre coule la vraye Terebinthe, laquelle est belle, claire & plus espesse, que l'arsine liquide, laquelle on recueille du Sapin. L'E. LIEV.

Le Terebinthe croist en abondance en Syrie, principalement au tour de Damas, là ou il deuie fort grand: on en trouue aussi en Grece, & quelques endroits d'Italie & du Langued'oc.

Terebinthus. Terebinthe.



## LE TEMPS.

Le Terebinthe fleurit au Printemps, & le fruit est meur à l'issue de l'esté avec les Raisins.

## LES NOMS.

Cest arbre est appellé en Grec *τέριμβινθος* en Latin *Terebinthus*: en François Terebinthe: en bas Aleman *Terebinthijn boom*: des Medecins Arabes *Albotin*.

Le fruit est appellé d'Auicenne *Granaum viride*.

La Resine est appellée en Grec *βερβιν τεριμβινθω*: en Latin *Resina Terebinthina*: d'Auicenne *Glus ten albotin*: incognue es Boutiques de pardeça.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles & escorce du Terebinthe sont chaudes & seches au second degré ( principalement estans bien sechées ) & astringentes.

Le fruit est chaud & sec iusques au tiers degré.

La Resine est chaude iusques au second degré, non toutesfois si tresseche: dauantage elle est absteriue.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Les feuilles & escorce du Terebinthe arreitent le crachement, la dysenterie, & les fleurs des femmes. Brief elles ont mesme vertu que Acacia & les feuilles & escorce de Lentisque, prinse en mesme sorte.

Le fruit de cest arbre prouoque l'vrine, incite au ieu d'amour, & vaut contre morsures de phalangies, beu avec vin.

La Resine d'iceluy qui est la vraye Terebinthine, lasche le ventre, ouure les oppilatiōs du foye, & de la ratelle: mondifie les rongnons, prouoque l'vrine, & pouffe hors la grauelle, prinse à la grosseur d'une noix, selon qu'Auicenne escrit.

Terebinthine leschée avec miel, mondifie le thorax, & les poulmons, meurit les phlegmes & les fait cracher.

La Terebinthine est bonne aussi cōtre toute gratelle, rongnes, & creueures de la face: Elle sert aussi grandement en tous emplastres qui adoucisent & amollissent.

La Terebinthine guerit aussi aureilles coulans, distillée dedés avec huile & miel.

## Du Lentisque, &amp; Mastix.

## Chap. XCIII.

## LA FORME.

Le Lentisque est en quelques endroits d'assez bonne grandeur & hauteur: & est me vn arbre de moyenne grandeur: & en quelques endroits, il iette de la racine mout de branches comme le Noysetier. Les feuilles, qui demeurent tousiours verd des, resembent aux feuilles du Terebinthe ou de resine, plusieurs amassées ensemble le long d'une queue, plus petites toutesfois que les feuilles du Terebinthe, de couleur verd obscure, charnues. L'escorce est lente, & se laisse facilement plier. Le fruit est rond & croist par grappes comme celuy de Terebinthe.

Hors de cest arbre coule la plus noble & meilleure Resine qui soit, appellée Mastix, laquelle n'est pas liquide, & ne se rassemble en vn comme les autres Resines, mais demeure diuisée en plusieurs parties d'environ la grosseur d'un grain de Blé. Le meilleur Mastix vient de l'isle de Chios, elle est belle, claire, blanche, fragile, & odoriferante. LE LIEU.

Le Lentisque croist abondamment en l'isle

Lentisque.

Lentisque.



Isle de Chios, là où il est fort cultivé pour le Mastix qui en sort : On en trouve aussi en Italie, & quelques autres régions, mais il n'y a point de Mastix, ou bien peu, & peu soutent.

## LES NOMS.

C'est arbre s'appelle en Grec *Χιτισ* : en Latin *Lentiscus*.  
La Resine est appellée en Grec *πύριον χιτισ*, *πύριον χιτισ* : en Latin *Resina lentiscina*, & *Mastiche* : les Boutiques *Mastix*.

## LE TEMPERAMENT.

Les feuilles & escorce du Lentisque sont de chaleur tempérée, & seches jusques au second degré, & quelque peu astringentes. De semblable temperament est aussi le Mastix.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Les feuilles & escorce de Lentisque, arrestent flux de ventre, dysenterie, le crachement, ou pisse-sang, le flux menstruel, & tout flux de sang : Elles valent aussi contre le boyau culier tombant.  
B Le Mastix est bon aussi contre crachement de sang, contre flux de ventre, & la dysenterie, il arreste aussi le flux menstruel par trop abondant, & tout flux de sang de quelque part qu'il vienne.  
C Le Mastix est vn medicament fort utile à l'estomach, le fortifiant & arrestant les vomissemens, il appaise toutes douleurs & resueille l'appetit amorty.  
D Iceuluy maché, & tenu en la bouche, seche & conforte le cerneau, arreste le flux des humeurs, & fait haleine odoriferante.  
E On froite les dens de Mastix, pour les blanchir, & pour raffermir & conforter les gencives molles & relachées.

## Fin de la Sixiesme Partie de l'Histoire des Plantes.

CESTE FIGURE AVEC SA DESCRIPTION DOIT ESTRE INSEREE au Chap. 51. du Tiers liure entre les especes de Cheurefeuille : mais pour ce que nous ne l'avons peu reconstruire en temps & en lieu pour la mettre en son rang, nous l'avons icy mise à la fin de la Sixiesme partie.

*Caprifoliij tertius species*, Tierce espece de Cheurefeuille.

## LA FORME.

- 3 Outre les deux autres Cheurefeuilles, il s'en trouve encore vn, semblable au premier de feuilles, lequel ne se tourne point au tour des arbres ou hayes comme les autres, mais est ferme de soy mesme & croist droit sans ayde de branches ou bois. Les fleurs d'iceluy sont blanches, beaucoup plus petites que celles des autres, de figure longuette, contenés en soy plusieurs filets : Elles croissent tousiours deux à deux & non plus sur vne queue entre les feuilles & branches : lesquelles passées y suruiét deux bayes rōdes & rouges en brunissant quand elles sont bien meures.

## LE LIEU.

- 3 Ceste tierce espece de Cheurefeuille croist en plusieurs endroits de la Sauoye, & pais des Suysses : En ce pais les Herboristes la plantent en leurs jardins.

## LE TEMPS.

- 3 Ce tiers Cheurefeuille fleurit en ce pais au commencement de May.

## LES NOMS.

- 3 Ce tiers Cheurefeuille est aussi tenu pour vn *Periclinenum* & *Caprifoliij*, & peut estre que Dioscoride fait comparaison des fleurs de cestuy cy avec les fleurs du vray *Faba*, & non des fleurs des deux autres. Les Suysses appellent le fruit *Spundhirschen*, c'est à dire *Cherises de chien*.





PETIT RECVEIL,  
**AVQUEL EST CONTENVE LA**  
 DESCRIPTION D'AVCVNES GOMMES  
 ET LIQVEVRS, PROVENANS TANT DES ARBRES, QVE  
 des Herbes : ensemble de quelques Bois, Fruictz, & Racines aromati-  
 ques, desquelles on se sert és Boutiques : retiré en partie hors de  
 l'Herbier Aleman, & assemblé en partie hors des escripts  
 de diuers Autheurs tant Anciens que Moder-  
 nes, lesquelz ont traité de  
 ceste matiere.

Par celuy qui a traduit l'Herbier de bas Aleman en François.

Εχει και η μουσα σπινθηα. Εστι και τῶ μύρου χαλι.



Habet & musca spicem. Et formica sua bilis inest.

EN ANVERS,  
 De l'Imprimerie de Jean Loc.  
 M. D. LVII.

## Aduertissement au Lecteur.

**C**ombien qu'il n'eut esté aucun besoin de faire le present Recueil, comme n'appertenant guere à la matiere qui est bien amplement traitée es six Liures precedens: Toutesfois tant pour satisfaire au desir de quelques vns, lesquelz eussent bien voulu le Liure estre de plus iuste Volume, que pour ne frustrer ceux de la nation Françoisse, des choses qui estoient au parauant contenues en l'Herbier Aleman. J'ay prins ceste hardiesse de recueillir les descriptions de quelques Liqueurs & Racines aromatiques qui estoient semées çà & là par l'Herbier Aleman, & les traduire en langue Françoisse, en y adioustant les descriptions de quelques autres Liqueurs, & Fruicts, & Bois aromatiques qui n'y estoient contenues, lesquelles ay tiré hors des Auteurs anciens, & ramassé comme en vn corps, sans le sceu toutesfois & consentement de celuy qui a fait l'Herbier: car il les auoit retenues de son Liure comme superflues, l'estimant asses suffisant pour contenter tout homme de bon iugement, voire pour satisfaire au desir des plus affamés en la matiere des Simples. Et pour ce que ie ne doute pas, que plusieurs trouueront estrange, que en quelques endroits ie me suis des-tourné de la commune opinion de ceux qui ont traité iusques à maintenant des Herbes: mesme que ie mets aucunesfois en auant choses qui sembleront du tout à eux contraires. Je les prie de considerer, qu'il doit estre libre à vn chacun de proposer avec toute modestie son opinion par maniere de deuis, es choses principalement ou les Auteurs sont si discordans les vns des autres: & s'ilz y trouuent des fautes (comme ie suis seur qu'il y en aura) me tenir pour excusé, car ie ne suis encore tant exercité en ladite matiere, que lon doiuue attendre grand chose de moy. Dauantage que la briueté du temps a esté cause qu'il a fallu faire toutes choses à la haste, de sorte qu'il m'a conuenu obmettre vne bonne partie des choses qu'auoye deliberé traiter au present Recueil. Ce faisant, ilz n'auront occasion de se mescôntenter de moy, si la matiere icy traitée ne respond à leur attente: ains plus tost se contenteront du bon vouloir, receuans en gré le petit Labeur qui leur est presenté.

PETIT RECVEIL,  
**AVQUEL EST CONTENVE LA**  
**DESCRIPTION D'AVCVNES GOMMES**  
**ET LIQVEVRS, PROVENANS TANT DES ARBRES, QUE**  
 des Herbes : ensemble de quelques Bois, Fruicts, & Racines aro-  
 matiques, desquelles on se sert es Boutiques, avec  
 leurs noms, temperament, & vertus.

**Des Liqueurs & Gommess provenans des Arbres.**

De Olibanum.

Chap. K



**D**E S le temps de Theophraste, il y avoit de grandes cōtroverses entre les Auteurs touchant l'arbre qui porte l'Encens. Les vns ont dit que c'est vn arbre d'environ cinq coudées de haut, fort ramu, ayant les fueilles de Poyrier, plus petites toutefois, & de couleur herbacée comme les fueilles de Rue, & l'escorce vnie & polie comme celle de Laurier. Les autres en ont fait vn arbre du tout semblable au Lentisque, & de fueilles & de fruit, sinon qu'il a les fueilles roussâtres. Les autres ont contendu l'arbre qui porte l'Encens & celuy qui porte la Myrthe tout en vn, pensans que la Myrthe & l'Encens fortissent d'un mesme arbre. Les autres qui se disent l'avoir veu, desquelz aussi Theophraste au li. 9. cha. 4. de son Histoire estime l'opinion estre vraye, en font vn petit arbre fort branclu, ayant les fueilles de Laurier, vnies, non espineuses : l'escorce du tout vnie & polie comme le Laurier. Pline au liure. 12. chap. 14. est pres de mesme opinion que Theophraste, sinon qu'il adiouste le tesmoignage de Iuba Roy de Lybie, lequel rescriuit à Cæsar, que c'estoit vn arbre ayant le tronc tortu, les branches comme Erable, lequel laissoit couler vne liqueur non plus ne moins que les Amandiers. Mais ated du que l'arbre ne vient pas en vfrage de Medecine, & que l'on vse sans plus de la liqueur qui en sort, & de l'escorce, il n'est besoing de nous plus longs temps amuser à la description d'iceluy, laquelle est tant incertaine : parquoy la laissant là nous viendrons à la description de l'Encens.

Dioscoride fait trois differences de ceste liqueur, selon la bôte d'icelle, & le lieu d'ou on l'apporte.

1 En premier lieu il prise le malle, qui est rond de sa propre nature, blanc, gras, & gommeux par dedans quand on le rompt, & ardent incontinent en perfum. Il s'en trouue de c'este sorte que lon apporte d'Inde, mais il est iaulnatre, & palle, & rond par artifice non de nature.

2 Le second lieu en bôte obtiét celuy qui viét d'Arabie, beaucoup pl' petit & pl' iaulne q' le premier. Il s'en trouue vne tierce espece, qui est blanche aussi, mais elle obeit aux doigts de celuy qui la manie, comme le Mastix.

3 **LE LIEV.**

Il prouient en Arabie qui est surnommée Thurifere à cause de l'Encens qui y croist, en terre argilleuse, & qui a peu de fontaines nitreuses.

**LE TEMPS.**

Pline dit qu'il se fait deux vendanges de ceste liqueur. La premiere & plus naturelle se fait au commencement des iours Caniculares es plus grandes chaleurs, en faisant ouuerture au lieu qui semble le plus plein, & qui est couuert d'une escorce tendre: celle là est la plus pure & la plus blanche & se nomme Carpheotum. L'autre se fait au Printemps: celle là est rouille, & n'est pas à conserer à la premiere, elle s'appelle Dathiatum.

**LES NOMS.**

L'arbre qui porte l'Encens s'appelle en Grec *λιβανός*: en Latin *Thus*: incognu des Modernes. L'escorce d'iceluy s'appelle en Grec *λιβανός φλοιός*: en Latin *Thuris cortex*: de nul vfrage es Boutiques de ce pais, mais trop bien es Boutiques de France.

La liqueur qui sort de cest arbre est appelée en Grec *λίβανον*: en Latin *Thus* du nom de l'Arbre: es Boutiques *Olibanum*: en François *Encés*: en haut Aleman *weyrauch*: en bas Aleman *weyrauch*.

1 Le premier & meilleur s'appelle en Grec *σαρωτίας λίβανον*, *αγομύ λίβανον*: en Latin *Thus masculum* & *bullicidiare*, & *Thus atomum*.

2-3 Le second en bonté s'appelle *κίπτικον*: en Latin *Copifum*. Le tiers *ἀμύτις*, *Ammites*.

**LE TEMPERAMENT.**

Olibanum est chaud au second degré, & sec au premier, participât de quelque peu d'astringtion. L'escorce de l'arbre est seche au second degré avec astringtion manifeste.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Olibanum remplit les vlcères cauerneux, & les meine à cicatrice: il guerit playes fresches & saignieuses, & arreste tout flux de sang, voire quand il fortiroit des membranes du cerueau.
- B On fait vn liniment d'iceluy broyé avec du lait, vtile contre vlcères malings du fondement & des autres parties. (teille)
- C Induit avec vinaigre & poix, il emporte les verrues pendâtes qui cōmencent, & mauuaise grande.
- D Il est bon contre brulures, & mules à talon, induit dessus avec axunge de porc, ou d'oyson: & contre vlcères coulans de la teste avec nitrum.
- E Il guerit les absces qui viennent à la racine des ongles, induit avec miel: Il est bon aux oreilles cafcées & rompues, avec miel: & contre autres douleurs d'oreilles infillé de dans avec vin doux.
- F Il est bon aux femmes qui sont subiectes d'auoir les mammelles enflambées apres l'enfantement, de les oindre d'Encens avec terra Cimolia & huile Rosat.
- G On le melle vtilement parmy medecines qui profitent au gozier & aux entrailles, & est bon à ceux qui crachent sang.
- H L'escorce d'iceluy est vtilement beuf contre crachemens de sang, contre defluxions d'estomach & la dysenterie: & appliquée avec vn pessaire, profite contre defluxions de matrice.
- I Elle vaut contre cicatrices des yeux, & brouillas & obscurité d'yeux.

## LES NVISANCES.

L'Encens prins de gens qui sont en santé, sans estre trauaille de maladie, engendre rage & forcenerie: & prins en trop grande quantité avec vin, il tue la personne.

## LE CHOYS.

Le meilleur est celuy qui a comme des mammelles (cela se fait quand l'une larme vient sur l'autre & sont meslées ensemble) qui est blanc, gras par dedans, qui brule incontinent estant allumé, & qui se rompt plus tost par petites pieces que de recevoir la dent.

## De Myrrhe.

## Chap. II.

Si l'opinion des Auteurs anciens est diuerse touchât la description de Thus: elle ne l'est pas moins en la description de Myrrhe: Car selon que raconte Theophraste au liure 9. de l'Histoire des Plantes chap. 4. & apres luy Pline au li. 12. chap. 15. de son Histoire. Aucuns ont laissé par écrit que l'Arbre dont vient la Myrrhe est moindre en grâdeur que celuy qui porte l'Encens, & plus ramu, ayant le tronc dur, tortu enuers terre, & plus gros que la jambe d'un home, couuert d'une escorce polye & vnue comme A drachne: les fueilles d'Orme, crespes, non vnies & pleines de pointes aux extremités comme celles de l'Eoufe qu'on appelle en Latin ilex. Aucuns les sont semblable au Terebinthe, mais plus rude, & plus espineux, ayant la fueille plus ronde, de goust semblable au Terebinthe. Les autres le font de cinq coudées de haut, espineux, ayant le tronc dur, tortu, plus gros que celuy qui porte l'Encens, principalement pres de la racine plus qu'en autre endroit, recuelt d'une escorce vnue, semblable à l'Arboufier. Aucuns le font rude & espineux, ayant la fueille d'Olivier, mais plus ridée & poignante. Les autres dient qu'il ressemble au Genéure, sinon qu'il est plus rude & plus espineux, ayant la fueille plus ronde, de mesme goust toutesfois. Aucuns, cōme nous auons dit au Chap. precedent, ont esté si hardis de dire que tous deux venoient d'un mesme arbre, scauoir est la Myrrhe & l'Encens. Dioscoride dit que c'est vn arbre semblable à Spina Aegyptia. Parquoy ce n'est point de merueille, qu'en tre tant de diuerfes opinions des Auteurs (qui ont bien eu le moyen de s'enquerir & scauoir la vraye histoire de ces arbres s'ils eussent voulu préder quelque peu de peine) nous ne scauons à laquelle nous arrester. Mais pour autant que nostre principal but est de traiter seulement de la Liqueur d'iceluy, de laquelle on vse en medecine, nous viendrons à la Myrrhe, laissant derriere toutes les descriptions, lesquelles aussi bien ne seruent de rien à la matiere, veu que seulement la Myrrhe est en vfrage.

Myrrhe donques est la larme d'un arbre estrange, quel qu'il soit, laquelle ceux du pais recourent en des vaisseaux, ou la recueillent de terre, ou bié la tirent ius de l'arbre pour ce qu'elle s'y attache: & de fait on en trouue souuent es Boutiques de pardeça qui ont encore l'escorce, qui ressemble à celle de Laurier ou Terebinthe. Dioscoride & Pline la distinguent en plusieurs especes. Car il y en a qui est grasse, de laquelle on tire le Staete: & celle là s'appelle Pedasimos selon Dioscoride. Il y en a vne autre qui est encore plus grasse, celle là croist en bonne terre & grasse, laissant grande quantité de Staete, & s'appelle Gabirea. Mais selon l'opinion de tous deux celle qui s'appelle Trogloditica, à cause du lieu ou elle prouient, est la meilleure: elle est iusante, tirât entre le verd & iaulne, & mordicante. Il y en a vne molle comme Bdelium, ayant vn petit plus forte odeur, laquelle Dioscoride estime seconde en bonté. Les autres sont noirâtres & seches, sans grasse, comme moyssies,

moyſies, & reſemblans à gomme. Pline leur baille tout autre nom, ſi ce n'eſt à la premiere, & eſtime ſeconde en bonté celle qui ſ'appelle Minza, combien toutesfois que Dioſcoride die celle qui a ſurnom Amminca eſtre à reietter, ie ne ſcay ſi ce ſeroit la meſme.

Mais pour ce que Galien au .i. liure de Antidotis dit manifeſtemēt que dans la meilleure Myrrhe, on trouue Opocalpaſum lequel il dit eſtre mortifere, & quil en a cognu pluſieurs qui apres auoir prins es Antidotēs de la Myrrhe ou il y auoit de l'Opocalpaſum, comme la meilleure, ſont morts en la fleur de leur aage: Pluſieurs ſont en doute ſilz doiuent vſer de la myrrhe qui eſt ainſi graſſe, & ſemble plus pres approcher de la deſcriptiō des Anciens, ou bien n'en vſer point craignīs de faillir. Et ſans doute il ne ſeroit que bon d'y prendre eſgard, mais attendu que Galien, qui nous a mis cecy en auant, n'a luy meſme baillē les notes par leſquelles on peut cognoiſtre Opocalpaſum, il me ſemble que nous ferions inconfiderement de reietter ſans nulle exception la myrrhe la plus graſſe & plus aprochant des notes attribuēes à la meilleure Myrrhe.

Il y en a d'autres qui penſent que Opocalpaſum, duquel Galien fait mention au lieu deuant dict, Opocarpaſum, ou Carpaſi fuccus, duquel Dioſcoride parle au liure fixieme & Galien au premier de medicamentis κατὰ γένος, & Opocarpatum, ou Carpathi fuccus dont fait mention Plin au liure 28. chap. 10. & au liure 32. chap. 5. & 9. ſoient vne meſme choſe, & amēnent ſur cela beau coup de raiſons, leſquelles ſemblent faire pour eux. Toutesfois, ſil nous eſt licite auſſi de dire noſtre opinion en ceſt endroit, ie penſeroie plus toſt que ce fuſſent choſes diuerſes. Car l'Opocarpaſum ou Carpaſi fuccus eſt mis par tout entre choſes froides, & la faculté d'iceluy le demōſtre aſſez dauantage Dioſcoride ordonne à ceux qui en ont beu tous les meſmes remedes quil a donné à ceux qui ont beu de la Cigue (qui eſt froide) & ſont tous medicamens chauds quil ordonne comme poyure, Caſtorium, ruē, menthe, amomum &c. Au contraire Galien dit que Opocalpaſum ſe trouue en la meilleure myrrhe qui ſoit, ſe qui ne ſe peut faire ſans participer du temperament de la Myrrhe, laquelle eſt chaude & ſeche au ſecond degré: il dit auſſi quil a vertu d'extenuer, ce quil ne ſeroit ſil eſtoit froid. Ce que ie veux eſtre dit, non comme choſe certaine & à laquelle il ſe faille arreſter, mais par maniere de diſpute, car ie croy quil eſt permis à chacun de dire ſon iugement es choſes quil a à traicter, moiennant quil ſe face avec toute modeſtie & ſans bleſſer le nom d'autrui. Or pour retourner ſur nos erres, & à fin de pourſuiure la matiere que nous auons encommencēe, il eſt à noter que Dioſcoride & pareillement Galien ſont mētion d'encore vne forte de Myrrhe appellēe Bœotica, qui eſt la racine couppee d'un arbre prouenant en Bœotie, ayant l'odeur de Myrrhe.

## LE LIEU.

L'arbre dont ſort la Myrrhe prouient en pluſieurs regions, comme Arabie, Indie: il y en prouient auſſi aux iſles: il ayme terre fertile & graſſe. E. E. T. E. M. P. S.

Plin dit que lon recueille la Myrrhe en la meſme ſaiſon que l'Encens, ſcavoir eſt es grandes chaleurs & iours Caniculaires, & quil ſ'en fait deux moisſons tout ainſi que de l'Encens.

## LES NOMS.

La Myrrhe eſt appellēe en Grec *μαύρα*: en Latin & es Boutiqs *Myrrha*: en haut Aleman *Myrrhe* en bas Aleman *Myrrhe*.

L'autre ſ'appelle en Grec *μαύρα Βεωτική*: en Latin *Myrrha Bœotica*: incogne des modernes.

## LA CAUSE DV NOM.

*Myrrha* a pris ſon nom de la Damoiſelle Myrrha fille du Roy de Cypre laquelle les poetes cōtent auoir eſté fort enflammēe de l'amour de ſon pere Cinyras, & ne pouuant à la longue plus endurer la flamme de l'amour extreme dont elle eſtoit maſtriſſēe, par la ruſe & fineſſe de ſa nourrice vint à iouyr de ſes amours & commettre inceſte avec ſon Pere, lequel ayant par bonne eſpace de tēps prins ſes eſbats avec celle qui luy eſtoit amenēe toutes les nuits & ne la cognoiſſant point luy print vn iour enuie de la cognoiſtre, & de fait il print la lumiere & ſ'en vint à ſon liē: mais recognoiſſant ſa fille, eſmeu de iuſte courroux la pourſuiuit l'eſpēe au poing, icelle ſuyant deuſt luy: toutesfois par le benefice de l'obſcurité de la nuit elle eſchappa des mains de ſon pere, & tant alla vacabēde çà & là quelle paruint en Arabie, on ennuye de plus long temps viuere en telle façon, pria les Dieux de luy changer ſa forme, ce quilz feirent: car elle fut tournēe en vn arbre qui a retenu le nom d'elle, & pleure encore vne larme tresexquiſe qui ſ'appelle Myrrha.

## LE TEMPERAMENT.

La Myrrhe eſt chaude & ſeche au ſecond degré, amere & abſterſiue. La Myrrhe Bœotique a vertu d'eſchauffer, amollir, reſoudre & digerer.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

La Myrrhe prinſe à la groſſeur d'une ſeue, vult eſtre toux enuieillie, difficulte de reſpirer, conſtre douleur de coſtē & du Thorax, contre flux de ventre, & la dyſentere.

- B** Prinsé en mesme quantité avec poyure & eauë, deux heures deuant l'acces des fieures, oste la frisson des fieures.
- C** Tenue sous la langue, elle guerit la rudesse du Gozier, & esclarçif la voix.
- D** Elle est bonne contre durelles de matrice: & appliquée par dessous avec aloyne, decoction de Lupins, ou ius de Rue, elle prouoque les fleurs & tire hors l'enfant.
- E** Elle profite aux gencies & raffermis les dens, si on se laue la bouche d'icelle avec vin & huile.
- F** On la mache contre aleine puante: elle tuë aussi les vers engendrez au ventre.
- G** Induite sur viceres de la teste, elle les guerit, & prouffite aux rompures des aureilles, & os desnus, avec la chair d'escargots.
- H** Instillée aux oreilles avec ius de Pauot, Castorium, & Glaciium, elle les nettoye de bouë, & guerit l'inflammation d'icelles.
- I** Elle guerit gratelle induite avec vinaigre, & retient & raffermis les cheueux qui tombent, induite avec Ladanum & vin de myrthe.
- L** Elle remplit les viceres des yeux, oste la maille d'iceux, & en chasse l'obscurité.

## LE CHOYS.

Il faut elire la plus nouvelle, orde, leger, d'une mesme couleur tout alentour, & qui monstre (estant rompue) des veines blanches & vnies comme ongles, qui est par petis lopins, acre, amere, & odoriferante. Galien au i.de Antidotis conseille d'eslire celle qui s'appelle Troglodytica, & Minga d'u lieu ou la meilleure prouist: elle est de bone odeur, & n'a rien d'Opocalpasum adioinct.

La seconde en bonté est celle qui est de diuerse couleur au dedens.

La plus mauuaise de toutes & qui est à reietter, est celle qui est noire par dedens & par dehors, & pesante.

## De Bdelium.

## Chap. III.

**N**OUS ne trouuons la description de l'Arbre qui porte le Bdelium, en nul Auteur ancien, sinon en Pline, laquelle toutesfois est bien courte. C'est vn arbre, dit il, noir, de la hauteur d'un Oliuier, ayant la feuille d'un Roure espee de Chesne, & le fruit & la façon d'un Figuier sauage. D'iceluy fort vne larne laquelle on appelle Bdelium, d'aucuns Bolchon, ou Malachra, des autres Madelon. Il en trouue de trois fortes, selon les lieux ou il prouient: car le plus pur & plus net viét d'Arabie Il y en a vn autre qui vient d'Inde, cestuy là est noir, ord plus amassé ensemble, & par plus grans loppins: On en apporte aussi de Petra ville de Syrie, lequel est sec, refineux, palle, & second en bonté.

## LE LIEU.

Il prouient en Arabie, en Inde, Mede, & Babylone.

## LES NOMS.

Ceste liqueur est appelée en Grec *Βδέλλιον*: en Latin Bdelium: incognue és Boutiques de ce pais: Car au lieu de Bdelium ilz vident de la plus grasse & gommeuse Myrthe qu'ilz treuent, la mettât à part pour s'en seruir. Quelques medecins scauans de France, entre lesquels est Guillaume Rondellet Medecin tresrenomé & lecteur ordinaire en l'vniuersité de Mompeljer, sont d'aduis qu'on pourroit subtiluer Propolis en defant de Bdelium, qui n'est autre chose qu'une matiere lepte, (de laquelle les mouches à miel bouchent les pertuis de leurs ruches) iaulne, odoriferante, & laquelle se peut mener aux doigts comme le Mallix. Hierocles Hippistater met in compositione Diastefaron, Bdelium au lieu de Myrthe.

## LE TEMPERAMENT.

Il est chaud au second degré, emollitif & digerent.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Il amollit durelles, & dissout tumeurs du gozier, & hergues aqueuses, emplastré dessus avec sa liue d'une personne à ieun.
- B** Il ouure la matrice, appliqué, ou bien le parfum d'iceluy receu par dessous, & tire hors l'enfant & toutes humidités superflues de la matrice.
- C** Iceluy beu, rompt la pierre des Rongnons, prouoque l'vrine, & chasse les grosses ventosités.
- D** On le donne vtiemēt à ceux qui sont trauaillees de toux, & qui sont mords de quelque Serpēt.
- E** Il vaut contre rompures, conuulsions, & douleur de costé.
- F** D'iceluy trempé en vin ou eau chaude, on en fait emplastre fort bon pour amollir durelles & nodosités des ioinctures.

## LE CHOYS.

Le meilleur est celuy qui est amer sans acidité, clair comme colle, gras par dedans, qui se dissout facilement, & net de bois & ordure, qui a bonne odeur en parfum, & semblable à onyx.

Entre les sçauans Modernes, il y en a plusieurs qui font de ceste opinion, que Lacca descrit par les Arabes, est le Cancamum de Dioscoride & des Grecs: car Serapio au chap. de Lacca recite la description de Cancamum qui est en Dioscoride & Paul Aegineta. Cancamum, dit il, est la larme d'un arbre qui croist en Arabie, semblable à la Myrrhe, de forte odeur, de goust ingrat pour son amertume, de laquelle on vse en parfums. Mais si le Lacca duquel on vse és Boutiqs est celuy des Arabes, il est grandement à douter: car si nous le considerons bien, nous ne trouuerons point, qu'il approche guere à la description de Lacca: attédu que le Lacca des Arabes est vne Larme semblable à Myrrhe, de forte odeur: ce que vous ne trouuez en celuy des Boutiques car c'est vne matiere seche, sans odeur, insipideal est bien vray qu'il retire quelque peu à la Myrrhe de couleur, & est tousiours enuoullé autour de fragmens de petis batons, comme Dioscoride descrit la Myrrhe Bæotique, à laquelle veut aucuns referer la comparaison que fait Dioscoride en la description de Cancamum, quand il dit qu'il ressemble à la Myrrhe, toutesfois nous en laissons le iugement à gens sçauans, lesquels pourront esplucher la matiere de plus pres: il nous suffit d'en auoir seulement touché comme en passant. Encore y a il vne chose, c'est, que Serapio en la description de Lacca semble confondre la description de diuers Simples: car apres auoir recité la description de Cacamum hors de Dioscoride & Aegineta il vient aussi à reciter la description de Lacca hors de Rafis & Isaac. Es lieux maritimes de Syrie, dit il, tombe du ciel le Lacca sur les branchettes & fuesilles du Nessier: & puis apres. Cancamum ou Lacca est vne chose rouge attachée aux plus petites sions des plantes, de tresbon goust: On le cuiçt, puis on teint des draps ou laines en couleur purpurée, laquelle teinture on appelle krames, & vulgairement Cramoylin: en apres il enseigne la maniere de le lauer. Par lesquelles paroles on peut asses cognoistre qu'il descrit choses bien diuerses & tout sous vn mesme chapitre & mesme nom: combien que lon ne scauroit tirer hors de la description de Dioscoride, que Cancamum puisse valoir à faire teinture en couleur purpurée. Parquoy il ne seroit pas mauuais de substituer quelque autre simple doué de mesme faculté, au lieu de Lacca, es compositions ou il entre (attendu qu'il nous est incognu encore pour le present) non toutesfois Sanguis Draconis, comme ont fait les Cordeliers qui ont commenté sur l'Antidotarium Mesue: car le sanguis Draconis est de faculté tout contraire au Cancamum des Grecs.

## LES NOMS.

Ceste larme est appelée en Grec κάρκαμον, ἰλάχα: en Latin Cancamum & Lacha: des Arabes Saa ou Lach: incogneuée Boutiques, combien qu'ilz en ayent retenu le nom.

## LE TEMPERAMENT.

Cancamum est chaud & sec au secon d degré: il a vertu d'attenuer & inciser.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

On dit que Cancamum a vertu d'attenuer gens gras & repletz, prins au poid de scrupule & de Amy en eauë, ou vinaigre miellé par quelques iours.

Il est bon aux splenetiques, car il diminue la rate, aux Epileptiqs & à ceux qui ne font que B soupirer continuellement.

Il prouoque les fleurs aux femmes prins avec eauë miellée, & oste les obstructions du foye & C des intestins.

Delayé en vin, il guerit cicatrices des yeux, & debilité d'iceux qui prouient d'humeurs grosses D lesquelles eslourdissent les esprits & par consequent les yeux.

Il prouifte grandement contre douleur de dens, & par trop grande humidité des genciues. E

## De Styra.

## Chap. V.

## LES ESPECES.

Les Arabes ont constitué deux especes de Styra, jaçoit toutesfois qu'on n'en trouue qu'vn, descrit par Dioscoride & autres Anciens tant Grecs que Latins: Les Apothicaires ont suyuy les Arabes, & d'abondât en ont adiousté encore vn, de sorte que lon trouue pour le present trois Styra chez les Apothicaires: sçauoir est Storax calamita, Storax liquida, & Storax rubra.

## LA FORME.

1 Styra est vn arbre semblable au Pomier de coing: ayant le fruit gros comme auellaines. D'iceluy sort vne gomme appelée de mesme nom que l'arbre, de laquelle on vse és Boutiques sous le nom de Storax calamita: & croy que ce nom là luy soit demouré à cause que Galien au premier des Antidotes prefere celuy qui est apporté de Pamphlie en des roseaux qui s'appellent en Latin Calami. Cestuy est le vray Styra des Anciens.

2 On trouue és Boutiques encore vne sorte de Storax lequel ilz appellent liquide qui n'est autre chose selon le tesmoignage des plus sçauans, que le Staçte exprimée des Anciens: Si est ce toutes-

fois qu'il recient quelque odeur du Styrax calamita, mais il est beaucoup plus penetré & d'odeur plus forte, qui me fait penser que ce pourroit estre la Resine plus liquide du Styrax, avec laquelle on eut demeslé de la Myrrhe, comme fouuet d'un mesme arbre, il en coule Resine l'une plus liquide que l'autre.

Il s'en trouve aussi un qu'ils appellent *Storax rubra* és Boutiques de France & de basse Alemagne. C'est l'escorce de quelque arbre, assez espesse, de couleur roussâtre tiré sur le noir. Il en arriue beaucoup en Anvers, & est achetée des Juifs pour s'en servir és parfums, voyla dequoy elle est apelée d'aucuns en Brabant *Thus Indeorum*, & d'aucuns *Thymiana*. Selon toutesfois l'opinion de gens Scauans ce n'est autre chose que le *Narcaphtho* des Anciens, lequel, selon le tesmoignage de Dioscoride, estoit apporté des Indes, & ressemble à l'escorce d'un Sycomore, duquel on fait parfum à cause de son odeur plaisante. Car il dit ainsi. *Narcaphthum ex India defertur, corticosum, simile Sycomori libro, quod iucandi odoris gratia sufficitur: miscetur thymianatis compositis*: laquelle description conuient au *Styrax rubra* des Boutiques de ce pais, jointé que (selon que nous auons deuant dit) les Juifs l'achettent pour s'en servir en parfums.

## LE LIEU.

Il croist en Pisidie, Cilicie, & Cypre, & en Crete pareillemét, mais l'autre est meilleur, & celui principalement qui croist au tour de Gabala de Syrie, dont il a prins le nom Gabalites.

## LES NOMS.

Cette gomme est apelée en Grec *σύραξ*: en Latin *Styrax* és Boutiques *Storax calamita*.

## LE TEMPERAMENT.

Le *Styrax* est chaud & sec, emolitif & maturatif.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Le *Styrax* est bon contre la toux, contre defluxions tombans du cerueau és parties plus basses, & contre enroueure.
- B Beu ou appliqué par bas, il prouoque les fleurs aux femmes. Il est vtile aux femmes qui ont la matrice fermée & endurcie.
- C Il lache le ventre tout doucemét, prins en petite quantité avec terebinthine, en forme de pilules.
- D On le mesle vtilement parmy emplastres qui ont vertu de refondre & digerer.
- E Infiltré dans les oreilles, il guerit bourdonnement d'icelles: & induit sur les strumes & nodosités des nerfs, il les resout.
- F Il profite contre venin qui nuit à cause de sa froideur, comme Cigue & autres semblables.

## LE CHOYS.

Dioscoride dit qu'il faut eslire celui qui est gras, roussâtre, resinoux, qui a quelques fragments blancs, demourit long téps en sa bonne odeur, & qui rend vne liqueur comme miel quand on l'a mollit: il faut reietter celui qui est noir, & comme plein de son, friable, & comme moysi.

## De Sarcocolla.

## Chap. VI.

**S**arcocolla est la gomme d'une plante epineuse croissant en Perse. Et la meilleure est celle qui est iaulnaire, amere au goust, & qui ressemble aux fragments & petis loppins d'Encens: Plin. tou. tefois au li. 13. cha. 11. de son Histoire prefere la blanche à l'autre, & pareillement au li. 24. chap. 14.

Styrax. L'arbre portant le Storax.





## LES NOMS.

Cette gomme est appelée en Grec *σαρκώκολλα* en Latin & es Boutiques *Sarcocolla*: en François *Sarcocolle*.

## LA CAUSE DV NOM.

Les Grecs ont appelé cette Larme *Sarcocolla*, pour ce qu'elle recolle playes & dissections de la chair, comme la colle fait le bois.

## LE TEMPERAMENT.

*Sarcocolla* est chaude au second degré, & seche bien pres iusques au mesme degré, d'efficacité sans mordication & acrimonie, comme dit Galien.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

*Sarcocolla* selon que Mesue escrit purge le phlegme crud & gros, & les humeurs lentes & vis-  
A queuses, qui sont es ioinctures & parties extremes: elle mondifie le cerueau, les nerfs, le thorax, & les poumons: & vaut grandement contre toux enuieillee & de longue durée, courte aleine, & à ceux qui sont fort phlegmatiques & piteux, prise environ au poids d'une drachme, ou quelque peu d'auantage.

Elle est fort consolidatiue, parquoy elle resferme playes & vlcères, elle mondifie vlcères malings B & pourris les remplissant de chair nouvelle, signamment estant mise en poudre & espandue dessus, ou induicte dessus avec miel.

Cette gomme est fort propre contre fluxions des yeux, taches, obscurité, & cicatrices & sembla-  
bles defecits d'iceux: principalemēt si elle a trempé en lait d'asnesse par quatre ou cinq iours, com-  
me escrit Mesue, mais il faut par chascue iour renouueler de lait, en versant hors le vieil.

## LES NVISANCES ET CORRECTION.

Ceux qui en vrent souuent deuiennent chauius: Elle fait aussi tard son operation, & trouble ceux qui ont l'estomach bilieux: parquoy il se faut garder de leur en donner. On augmente & renforce la vertu qu'elle a de lacher le ventre en y adioustant du Gingembre & Cardamomum.

## De Camphora.

## Chap. VII.

## LA FORME.

**C**aphura, selon le dit de ceux qui ont nauigé es Indes Orientales, est vn arbre de telle grandeur & largeur, que sous l'ombre d'iceluy se peuuent cacher par centaines de personnes: il est de matiere legere & ferulacée. D'iceluy coule vne gomme ou larme qui est appelée de mesme nom que l'Arbre: & s'en trouue de plusieurs sortes, Vne qui se trouue fichée entre les veines du bois, par longues lames. Vne autre, qui apres auoir rompu l'escorce, sort hors du tronc de l'arbre, comme la Resine, & demeure fichée à icelle, ayant au premier de taches rouges, & puis apres deuient blanche ou par la chaleur du Soleil, ou par la force du feu: Celle la est appelée par les habitans du pais Riachina, ayant prins tel nom d'un Roy de ce pais appelé Riach qui premier trouua la maniere de blanchir le Camphre: C'est aussi la meilleure & celle qui dure plus long temps. L'autre est plus grosse, non clere, de couleur noire, parquoy inferieure en bonté. Il s'en trouue vne troisieme, encore plus vile, de couleur fuligineuse & enfumée. Apres icelle vient vne qui est impure, pleine de vermoulature, ramens, & eschardes, laquelle deuient lente en maniere de colle, & est par lo-p-pins de la grosseur d'une Auellaine, ou d'un pois Cice: d'icelle on vse es Perfums, & suffumigations, comme de l'Encens & de Myrrhe. Toutefois les Modernes n'en font point tant d'especes, mais ilz se contentent tous de les reduire sous deux especes à scauoir en Rude & Elaborée. La Rude est celle qui n'a point sentu le feu: & l'Elaborée est toute Camphre, qui cuicte & purgée par la chaleur du feu ou du Soleil, a acquis vne couleur blanche.

## LE LIEV.

Cest arbre croist es Indes sur hautes montaignes pres de la mer: & est signe qu'il y aura grande abondance de Camphre, quand le ciel a beaucoup tonné & soudroyé, ou qu'il a fait tremblement de terre.

## LES NOMS.

Cette larme est appelée des Grecs plus recens *κάπουρα*: des Latins *Caphura*: des Arabes *Kapher*, & *Chafurés* Boutiques *Camphora*: en François & Aleman *Camphre*.

## LE TEMPERAMENT.

*Camphora* selon les Arabes est froide & seche au tiers degré: voila dequoy ilz luy attribuent toutes facultez refrigeratiues: mais les Medecins modernes la disent estre chaude, prenans de ce argument, que iettée en l'eau elle ardra tant qu'il ne reste plus rien en laissant tresbonne odeur, & qu'elle est de parties si subtiles, que souuent elle s'en va toute en fumée, estant enfermée en boytes: parquoy pour la bien garder il la faut tenir en vaisseau de marbre ou d'albâtre & penseuoir dans la semence de Lin ou de Pssyllium.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Camphre, selon le dit des Arabes, induite sur la teste, guerit douleur d'icelle, & est bonne contre inflammations de foye.
- B On la met en liniments qui se font pour esclarcir le cuyr & luy donner lustre, & pour prohiber inflammations des playes & vlceres. Elle est bonne aussi contre feu volage.
- C Beuë avec ambre & eauë de Nenuphar, elle vaut contre fluxion de la semence genitale, & contre fluxeurs blanches des femmes. Elle a mesme vertu induite sur le bas ventre, sur les genitoires & à l'endroit des rongnons; mais il la faut premier tremper tresbien en mucilage de la semence de pssyllium, ou en verius, ou en ius de Morelle.
- D Elle eslanche le sang coulant par le nez, ou instillée dedans avec semence d'Ortye, ou induite sur le front avec ius de Ioubarbe grande, & de Plantain.
- E Elle est vtile contre desfluxions chaudes des yeux: & induite sur les genitoires, elle oste l'appetit du ieu d'amour.
- F Elle preferue les corps de pourriture, parquoy on la mesle vtilement parmy Antidotes qui se font contre venin, contre morsures & piqures de bestes venimeuses, & contre maladies contagieuses & pestilenciales.
- Briefsilz luy attribuent beaucoup de vertus, desquelles ie me tairay pour euitter prolixité.

## LES NVISANCES.

- G Le trop frequent vsage de Camphre fait qu'on ne peut reposer, & prinse en breuuage fait bien tost deuenir chauue.

## Du Vernix. Chap. VIII.

**V**ernix, comme a esté dit au chap. 82. de la Sixiesme partie, est la gomme du Genéure fortât és grandes chaleurs, semblable au Maltix, ou à l'Encens, blanche au commencement, puis apres rouille quand elle deuiet vieille.

## LES NOMS.

Ceste gomme est appelée des Grecs modernes *κόμμη ἐκ γυμνίου*: en Latin *Gummi iuniperi*: des Arabes *Sandarax*: és Boutiques & en François Vernix: des Barbares *Sandaracha* non sans grande erreur: car le *Sandaracha* des Grecs est tout autre chose que le *Sandarax* des Arabes, comme il appert assez par la description qu'en baille Dioscoride au cinquieme liure disant: *Sandaracha* prouient és mesmes veines metalliques, là ou l'Arfenic ou Auripigmentum se trouue, & y a seulement celle difference, que *Sandaracha* est plus rouillatre, tirant sur le rouge, sentant le souffre, & n'ayant rien d'autre matiere extremelee. D'auantage les vertus & facultés du *Sandaracha* des Grecs sont bien autres que celles du *Sandarax* des Arabes, car, comme nous auons dit, *Sandarax* n'est autre chose que le *Gummi iuniperi* des Grecs duquel nous descrirons les facultez en son lieu: & *Sandaracha*, est vn mineral fort caustic, & de nature brulante, tout ainsi que l'Arfenic, duquel on fait depilatoires. Mais l'erreur est procedée des ignorés medecins qui ont tourné ce mot *Sandarax* en *Sandaracha*, ne se soucians point, ou fort peu des inconueniens qui en sont puis apres ensuyuis. Parquoy il est à noter, que par tout ou les Arabes, ou bien ceux qui les ensuyuent, ordonnent en quelq composition *Sandaracha*, ilz entendent *gummi iuniperi*, de laquelle il faut vser: au contraire par tout ou lon trouue és descriptions des Grecs *Sandaracha* ordonné, il y faut entendre, & pareillement vser tousiours de celle de laquelle Dioscoride & Galien font mention, semblable à Auripigmentum.

Il y en a quelques vns, qui se fondés sur le tesmoignage de Pline, lequel au li. 13. chap. 11. escrit la gomme de Genéure estre inutile, nient que le Vernix ou Vernigo soit la gomme de *Iuniperus*, attendu qu'on vse du Vernix en plusieurs choses & contre diuerses maladies: & en veulent faire l'Erithace duquel Pline fait mention en son liure. 11. chap. 7. qui s'engédre de la rouille du Printéps & du ius des arbres, en maniere de Gomme, & la trouue on és riches des mouches à miel à la ioincture des trous qui sont aux rayons: Outreplus ilz disent que ceux qui vsent du Vernix vulgaire des Boutiques, ne scauët de quoy ilz vsent, ne ce quilz font: car si c'est la gomme de Genéure, elle est inutile: & si c'est l'Erithace des Grecs, elle ne peut auoir les facultés que les Grecs plus recens & Arabes attribuent à ceste gomme que lon tient és Boutiques pour Vernix.

Or laissant toutes controuerses derriere, nous nous arreterôs à la commune opinion des plus scauans Modemes, qui reietans l'opinion de Pline, lequel dit la gomme de Genéure estre inutile, conserment par leur autorité l'experience que lon fait journellement d'icelle en vsage de medecine.

Le Vernix est chaud & sec au premier degré, de pareille faculté que l'Ambre, mais un peu plus forte.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

Le vernix arreste flux de sang coulant par le nez, broyé avec le blanc d'un œuf, & induit sur A les temples & le front: & avec farine ou poudre d'Encens & le blanc d'un œuf, il arreste vomissements, & ferre le ventre, induit dessus.

La poudre d'iceluy prise en un œuf mollet, arreste vomissements bilieux, & flux de ventre sanguinolent. B

Le parfum d'iceluy arreste catarrhes, & empêche qu'ils ne tombent es parties inferieures, C  
Il digere le phlegme assemblé en l'estomach & es intestins, & tue les vers engendrés au ventre D de la personne.

Il prouffite contry resoluions & relaschemés de nerfs qui viennent à cause des humeurs froides E  
Il arreste crachemens de sang, & hemorrhoides coulantes, induit dessus. F

Avec huile rosat & de Myrte, il reserme creures du siege, & guerit fendasses des mains & des G pieds venans de froid, induit dessus.

Il desèche fistules humides mis dedans: & arreste flux menstrual des femmes. H

D'iceluy avec huile de semence de lin on fait Vernix liquide duquel on use pour esclaircir les I peintures, & pour donner lustre au seril est aussi vtile contre brulures, & singulier contre douleur & tumeur des hemorrhoides.

## Des Liqueurs &amp; Gommess prouenans des Herbes.

## De Panaces, &amp; Opopanax.

## Chap. IX.

## LES ESPECES.

Combien que Dioscoride & Theophraste ne s'accordent pas en la description de Panaces, toutesfois ilz en constituent trois sortes: la premiere est Panaces Heraclium: la seconde Panaces Asclepij: la tierce Panaces Chironium Mais nous suivrons la description de Dioscoride, comme plus autentique.

## Panaces Heraclium.

## LA FORME.

- 1 La premiere espece de Panaces a grâdes fueil les verdes, rudes, couchées & estendues par terre, parties en cinq crenes, pres semblables aux fueilles de Figuier. Entre icelles prouient vne tige haute, grosse, genoilée, blanche par dehors & sanguineuse, reuestue de fueilles semblables mais un peu plus petites, & portant à la cyme esmouchettes comme l'Aneth, qui ont la fleur iaulne, & la grainé odoriferante & acre. Il a prouenad d'une meisme teste mout de racines blanches, de forte odeur, & reuestues d'une escorce fort espesse & amere.

De ceste racine, & aussi des tiges incisées en fort la liqueur appellée Opopanax, laquelle est encore fresche & nouvellement tirée, est blanche: mais estant seche, elle deuiet toute iaulne au dehors comme si elle estoit en safranée.

- 2 La seconde espece de Panaces a la tige gresse d'une coudée de haut, genoilée, ayant les fueil les plus grandes, & plus houlfues que celles du Fenul, & odoriferantes. Les fleurs croissent par esmouchettes, qui sont iaulnes, odoriferantes, & de goust acre. La racine est petite & tendre.

- 3 Le tiers Panaces a les fueilles semblables à la Mariolaine: la fleur iaulne: la racine petite, n'en trant guere profond en terre, & de goust acre.

Le



## LE LIEU.

La premiere espece croist és environs de Cyrene en Lybie, & Macedoine pareillement en Beroë, & en Phocis d'Arcadie, là ou on la sème & cultiue diligemment pour le prouffit quilz tirent du ius d'icelle.

La tierce espece prouient sur le mont Pelius de Thessalie, & ayme lieux gras.

## LE TEMPS.

Opopanax se tire & recueillit au temps de Moysson.

## LES NOMS.

La premiere espece est appelée en Grec *πανάκις ἑρόδιου*, c'est en Latin *Panaces Herodotum*, de Galien aussi *Panax*: incogne és Boutiques de par deça.

La liqueur qui en prouient se nomme en Grec *ἀποπανάξις*: en Latin aussi *Opopanax*: és Boutiques *Opopanacium*.

La seconde espece s'appelle *πανάκις ἀσκληπιῦ*, c'est *Panaces Asclepij*, ou *Asclenapij Panaces*.

La tierce s'appelle *πανάκις χιρόνιον*, *Panaces Chironium*.

## LE TEMPERAMENT.

Le premier Panaces est chaud au tiers degré, & sec au second.

De Pareil temperament est aussi la liqueur d'iceluy.

Les deux autres especes sont de semblable temperamēt, mais non si chaud, & sont plus debiles.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A La graine du premier Panaces beuë avec Aloyne, esmeut les fleurs aux femmes: & prinse avec de la Sarrasine, est bonne contre venin de toutes bestes venimeuses. Beuë en vin, guerit suffocations & strangulations de matrice la faisant bailler & retourner en son lieu naturel.

B La racine d'iceluy hachée bien menu, & appliquée par bas en la matrice, tire hors l'enfant mort & portée non naturelle.

C Icelle induict avec miel sur & dedés vieux vlceres, les guerit, & recouure de chair les os dénuëz

D Opopanax est fort singulier contre le froid & frisson des sieures, douleur de costé, trenchées & ventositéz des intestins, strangurie, & à ceux qui sont tombés de haut, qui sont rompus ou blessés par dedans, beu avec eauë mellée, Prins en mesme sorte, ou avec du vin, guerit gratelle & blessures interieures de la Vessie.

E Iceluy, selon que s'écrit Mesue, prins au poid de deux drachmes, ou moins, euacue par le ventre le phlegme, & humeurs froides, Jentes & visqueuses, les attirant des parties loingtaines, comme de la teste, des nerfs & ioinctures: dauantage il profite grandement contre toutes maladies froides du cerueau & des nerfs, comme est Spalme, Paralytie, &c.

F Iceluy prins en mesme sorte, & mesme quantité, mondifie le thorax, & est fort vile aux asthmatiques, à ceux qui ont courte haleine, & qui sont trauailliez de toux vieille & difficile.

G Il guerit aussi duresses & accidens de la ratelle, & l'hydropisie, trempé en moult puis beu.

H Opopanax digere, amollit, & resout tous scirrhes & œdemes, trempé en vinaigre, & appliqué ou induict dessus. Il est aussi tresbon de le mesler parmy emplastres & onguents qui se font pour eschauffer & amollir.

I Il est vilement induict sur la Sciatique, & donne allegance à douleur de gouste aux pieds, appliqué dessus avec la pulpe de Raisins secs.

K Iceluy meslé avec miel, & appliqué par dessous en forme de pessus, esmeut les fleurs aux femmes, pouffe hors la secondeine & enfant mort, chasse les ventositéz hors de la matrice, & guerit toutes duresses d'icelle.

L Appliqué sur carboncles pestilentioux, & tumeurs, les rompt: principalement apres l'auoir trempé premier en vinaigre, & meslé avec leuain.

M Il appaise aussi douleur de dens, mis au creux des dens mauuaises: ou bien, comme dit Mesue, bouilly en vinaigre & tenu en la bouche.

N Induict à part soy sur les yeux, ou meslé parmy collyres à ce propres, esclaircit la veuë.

O On en fait vn emplastre avec de la Poix, lequel est fort singulier contre morsures de toutes bestes sauvages & enragées, appliqué dessus.

P Les fleurs & graine du second Panaces, proufissent grandement contre morsures de serpens, & beuës en vin, & induictes sur les morsures avec huile.

Q Les mesmes fleurs & graine induites avec miel, guerissent vlceres malings, vieux, & rongeurs, & pareillement durillons.

R La graine, les fleurs, & semblablement la racine du tiers Panaces, sont fort vilement beuës contre le venin de tous serpens & viperes.

## LE CHOYS.

Les meilleures entre les racines sont les blâches, dures, bien pleines, & seches, qui ne sont point vermoulues, qui sont aromatiques, & de goust acre. Elles ne sont pas toutes fois en vſage en ce pais.

Le meilleur Opopanax est celuy qui est fort amer, blanc au dedans, iaulne au dehors eſme Safran, vni, gras, friable, & tendre, se fondant en leau, & d'odeur forte: Celuy qui est noir & mol est à reſetter.

## De Lasepitiū &amp; Laser.

## Chap. X.

## LA FORME.

**L**asepitiū, par ce qu'on peut tirer de Theophraste & Dioscoride, est vne herbe qui meurt tous les ans, ayant la tige grande & grosse comme Ferula: les fueilles de Persil, de goust plaisant: La graine large & fueillue: Il a beaucoup de racines prouenis d'vne teste, grosses, & reueitues d'vne eſcorce noire.

De ces racines & des tiges estant ſcarifiées & incisées, en sort vne liqueur forte, laquelle on seche, & est fort requise en medecine, appellée Laser: mais elle n'est pas toute d'vne forte, car elle change de goust, d'odeur, & de maniere, selon les lieux ou Lasepitiū croist.

**1** La liqueur que l'on tire du Lasepitiū croissant en Cyrene, est d'odeur plaisante, & ſauveur non guere ingrâte: de forte que par cy deuant, on n'en a pas seulement vſé és Boutiques & en medecine, mais aussi és gasteaux & autres viandes, selon que Pline tesmoigne.

**2-3** Celle que l'on tire de Lasepitiū qui croist en Mede & Syrie, est d'odeur fort ingrâte & puante.

## LE LIEV.

Lasepitiū prouient és hautes montaignes & deserts de Cyrene & Aphrique, celuy est tout le meilleur & rend vne liqueur fort bonne & odoriferante. Il croist aussi en Syrie, Mede, Arménie & Lybie, mais le ius ou liqueur d'iceluy n'est pas si bonne, & est d'odeur fort ingrâte.

## LES NOMS.

Cette plante s'appelle en Grec *σάφιον*: en Latin *Laser*, & *Lasepitiū*: d'aucuns tesmoing Dioscoride *Magadaris*, lignamment celle qui ne rend point de Liqueur, comme en Lybie.

Les tiges du vray Lasepitiū sont appellées en Grec *σάφιον*, & en Latin *Siphium*.

Les racines *μαγδαρίς*, & *Magadaris*.

Les premieres fueilles qui ne sont que sortir de terre, *μαγδαρίς*, *Maſſetum*.

Le ius ou liqueur de Lasepitiū s'appelle en Latin *Laser*: des medecins Arabes *Aſa*, ou *Aſſa*.

Le ius qui sort des tiges, est appellé de Pline *Caulis*, de Gaza interprete de Theoph. *Scapariū Laser*. Celuy qui sort des racines, *Rhizias*, de Gaza *Radicariū Laser*.

**1** Celle gomme ou liqueur qui est fort odoriferante s'appelle en Grec *δρόσ κυμακός*: en Latin *Succus Cyrenicus*, ou *Laser Cyrenaicum*: en cogneue és Boutiques: Car ce qu'ilz tiennent pour Laser, ſuyuans l'opinion de tous les Scauans modernes, & appellent *Gummi benqui* ou *Beizai*: en François Benioin, n'est point le Laser: mais est la liqueur de quelque gros arbre à nous incogneu comme asserment ceux qui ont nauigé en Leuant, ioinct aussi que les grosses eſcorces & fragments de bois que l'on trouue souuent meſlé parmy le Benioin, rendent assez ample tesmoignage que ce ne peut estre la liqueur d'vne herbe qui petit tous les ans.

**2** Celle qui viét de Mede se nôme en Grec *δρόσ μαδαρίεν* Latin *Laser medicū*, ou *Succus medicus*.

**3** Celle qui prouient en Syrie se nomme *δρόσ συριακός* Latin *Laser Syriacum*.

Ces deux dernieres especes venús de Syrie & Mede, à cause de leur odeur forte & ingrâte sont appellées des Medecins Arabes & Apothicaires *Aſa ſatida*: en haut Aleman *Ceufſis dseck*: en Bra bant d'un nom fort estrange *ſterlſonſonſa*.

## LE TEMPERAMENT.

Lasepitiū, principalement la racine, est chaud & sec au tiers degré.

Laser est aussi chaud & sec au tiers degré, mais il excède beaucoup en chaleur les fueilles, tiges & racines de Lasepitiū. **LES VERTVS ET OPERATIONS.**

Les racines de Lasepitiū sont fort vtilles, selon le tesmoignage de Diosc. & Galien, contre tout A poison beués: & mengées és viandes vn petit, ou prinſes avec ſel, sont bonne aleine & odoriferante.

Les fueilles de cette plante, selon queſcrit Pline, boullies en vin & beués, mondifient la matrice, & pouſſent hors la ſecondine & enfant mort.

Les racines bien pilées avec huile diſſoluent le ſang caillé, effacent ſuggillations & contuſions noires, guerriſſent & reſondent ſtrames, bubons, & tous durillons, induiſtes deſſus.

Icelles miſes en poudre & reduites en forme d'emplastre avec huile d'Iris, & cire, appaiſent & D guerriſſent douleur Sciatique.

- E** Icelles boullies avec l'eſcorce de pommes de grenade, & vinaigre, gueriffent les hemorroïdes, emportent les poreaux & toutes excréſcences du fondement. Pareille vertu ont elles ſi on foment le fondement de la decoction d'icelles faite en eau.
- F** Elles mondifient auſſi le thorax, incifent & digerent le phlegme viſqueux, & prouffrent grandement contre toux enuieille cauſée de froid, prinſes avec du miel en forme de looth.
- G** Elles prououent l'vrine, mondifient & nettoient les rongnons & veſſie, rompent & pouffent hors la pierre, dirouuent les fleurs menſtruales, & pouffent hors la ſecondine & enfant mort.
- H** Tenues en la bouche & machées, appaiſent douleur de dens, & tirent du cerueau grãde quantité d'humours,
- I** La liqueur ou gomme de Laſerpitium, de celui de Cyrene principalement diſſolu en eau & beue, oſte & guent enroueur venue fondainement, & humée avec vn œuf mollet, guerit la toux & prinſe avec quelque bouillon, eſt bonne contre Pleureſie enuieille.
- K** Laſer guerit la iaulniſſe, & hydropiſie prinſ avec figues ſeches.
- L** Il eſt fort vtile contre ſpaſmes & contractions de nerfs & membres, prinſ au poid d'vn ſcrupule & prinſ avec poyure & myrthe, prouoque les fleurs menſtruales & pouſſe hors la ſecondine & enfant mort.
- M** Prinſ avec miel & vinaigre, ou avec ſyrop aceteux, il eſt ſingulier contre Epilepſie.
- N** Il ayde aux Coeliagues, c'eſt à dire ceux qui ont flux de vêtre prouenãt de debilité d'eſtomach, prinſ dans la peau de raiſin.
- O** Il dechaiſſe auſſi friffons & tremblemens de ſieure, beu avec vin, poyure, & encens. On en fait vn Electuaire avec poyure, gingembre, & ſaillies de Rue broyées enſemble avec miel, lequel on appelle Anſidotum ex ſucco Cyrenaico, iceluy eſt ſingulierement bon contre ſieures quartes.
- P** Il vaut contre morſures de toutes beſtes venimeuſes, & toutes playes faites par dards ou ſagettes enuenimées, prinſ par dedans, & appliqué par dehors ſur les playes. On le met auſſi vtilement ſur toutes playes ou morſures de chiens & autres beſtes enragées, & ſur morſures de Scorpions.
- Q** Il aguiſte la veuë, & efface la maille en l'œil qui commence, induite ſur les yeux avec miel.
- R** Dioſcoride dit que mis au creux des dens mauuiſes en oſte la douleur, mais Plinẽ amẽne contre ce l'experience d'vn homme qui en ayant ainſi viſé ſe precipita de haut en bas, pour l'extreme douleur quil ſentoit. Lié toutesfois dedã vn linge avec encens & tenu ſur les dens, guerit douleur d'icelles, ou biẽ la decoction d'iceluy, figues & hyſſope boullies enſemble en eau, tenuẽ en la bouche.
- S** Induit avec miel, reprime la Luette, & guerit l'eſquinance gargarizé avec hydromel, & gargarizé avec vinaigre & tenu en la bouche, fait tomber les Sangſues qui ſe ſeroient attachées au gozier de quelcun.
- T** Il rompt apoſtemes & carboncles peſtilentiaux, appliqué deſſus avec Rue, nitrum, & miel : En meſme ſorte il emporte agaçons, moiennant qu'on les aye premier ſcarifié tout autour avec quelque couteau.
- V** Induit avec couperoſe & verd de gris, emporte toutes excréſcences de chair & le polype qui croiſt au nez, & toute mauuiſe gratelle, & induit avec vinaigre, poyure & vin, guerit la male tigne & cheute de cheveux. (ment.)
- X** Cuſcẽt en vinaigre avec l'eſcorce de Grenade, emporte toutes excréſcences qui viennent au fõde
- Y** Contre mules à talon, on fomente premier les talons avec vin, puis on oingt les mules de cõſte gomme cuiſte en huile.
- Z** La liqueur puante qu'on appelle Aſa foetida, vaut auſſi à toutes les choſes precedentes, & combien qu'elle n'eſt pas ſi propre que le Laſer de Cyrene: Elle eſt toutesfois vtilement ſairée, ou induite ſur le nombril, contre ſuffocation de matrice.
- On viſe du Beniõyn au lieu du Laſer Cyrenaicum en toutes les choſes ſuſdites qui ſont attribuées au Laſer odoriferant.

## LE CHOYS.

Le meilleur Laſer eſt celui qui eſt rouſſatre, clair & lücide, ſentant la myrthe, non verdatre, de bonne & plaiſante odeur, lequel diſſolu deuiẽt blanc.

## De Sagapenum.

## Chap. XI.

Sagapenum eſt le jus ou liqueur d'vne plante ferulacée ſemblable au Panax croiſſant en Mede, inutile du tout ſe dit Galien, ſi ce n'eſt tant qu'on en tire la liqueur. Comment le Galbanum ſe tourne aucunefois en Sagapenum nous en parlerons au chap. enſuyuant.

## LES NOMS.

Ceſte gomme eſt appelée en Grec *σάγαπενον* Latin *Sagapenum* & *Sagapenum* d'aucuns *Sac-*  
*pemi*

AN. Toutesfois, comme dit Galien, on l'appelle improprement *Sagapenum*, & par faute d'autre nom, veu que ce nom conuient à la plante dont elle est tirée, & se deuroit plus tost appeler *ἐπίσ σαγας* *πρω*, id est, *Sagapeni succinon* l'appelle és Boutiques *Scrapium*.

## LE TEMPERAMENT.

*Sagapenum* est chaud iusques au tiers degré, & sec iusques au second.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

*Sagapenum* prins au poid d'une drachme, purge par le conduict d'embas, les humeurs lents & A visqueuses, & toutes phlegmes non meures, & la cholere: Dauantage il vaut cõtre toutes maladies froides enuieillies & difficiles à curer: il purge le cerueu, & est fort bon contre toutes douleurs de teste, & contre apoplexie & epilepsie.

Prins en mesme sorte, il profite contre cõuulsions, paralysie, & contractions & douleurs de nerfs. B

Contre courte aleine, toux froide, longue, & enuieille, douleur de costé & du thorax, le *Sagapenum* est fort vtile, car il mondifie le thorax de tout phlegme froid. C

Il guerit aussi duresses, oppilations, & ventosités de la ratelle, non seulement prins au dedans: D mais aussi induict & appliqué par dessus.

Il est bon contre toutes frissons, & fieures froides enuieillies. E

Beu avec eauë miellée, il prouoque les fleurs menstruales, & pousse hors l'enfant mort. F

Prins avec vin profite grandement contre morsures & piqures de toutes bestes venimeuses. G

La fraieur de ceste gomme est fort vtile contre suffocations de matrice. H

Trempeé en vinaigre, digere, resout & efface tumeurs enuieillies, scirrhes, bubons, & durillons ve I nãs autour des ioinctures, & on le mesle vtilemēt parmy tous onguets & emplastres qui amolissent

Il esclarcist aussi la veue, & oste le commencement de la maille en l'oeil, effaçant cicatrices & ta- K ches en iceux, dissillé es yeux avec ius de Ruë. Il vaut aussi contre suffusions & obscurité d'iceux qui prouient à cause de la grosseur des humeurs.

## LE CHOYS.

Le meilleur est celuy qui, comme dit Mesue, se fond incontinēt en l'eauë, & qui a l'odeur d'Ail ou qui sent entre le *Laser* & *Galbanum*, se dit *Dioscoride*: qui est acre, clair, de couleur iaulnatre par dehors, & blanc par dedans.

## De Galbanum.

## Chap. XII.

**G**albanum est aussi vne gomme ou liqueur prouenēt d'une sorte de *Ferula*. Au chapitre precedent nous auõs touché que le *Galbanum* se tournoit en *Sagapenum*. Or il est à noter que *Galbanum* au premier liure des *Antidotes* dit'expressément que *Galbanum* se change en *Sagapenum*: scauoir est la partie de *Galbanum* plus impure, plus blanche & legere, laquelle mise en eauë se dissout facilement, non pas quelle aye du tout la nature de *Sagapenum*: mais elle l'approche de si pres que souuent ceux qui se penseroient bien exercitēs en la cognoissance des Simples, y seroient abusés: toutesfois le *Galbanum* ainsi changé retient tousiours quelque marque (comme aussi font les autres simples qui changent de nature en autre) par laquelle on le peut discerner de *Sagapenum*. Car le *Sagapenum* fait de *Galbanum* n'a point la mesme odeur qu'a le vray *Sagapenum*, mais il retient vne odeur ingrate ou, comme l'on appelle, hircine: au reste il y a si peu de difference, qu'on se peut seruir de l'vn au lieu de l'autre, voire és *Antidotes*, car ilz y sont bons tous deux, & resistent tous deux aux serpens & venin, le *Galbanum* toutesfois moins que *Sagapenum*.

## LE LIEV.

La plante dont sort le *Galbanum* prouient sur *Amanus* montaigne de Syrie.

## LES NOMS.

Pline appelle la plante d'ou le *Galbanum* sort, en Latin *Stagonitis*.

La liqueur ou gomme est appelée en Grec *αλβανον* en Latin & és Boutiques *Galbanum*: d'aucũs aussi *Metopium*.

## LE TEMPERAMENT.

*Galbanum* est chaud pres iusques au tiers degré, & sec iusques pres du second.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

*Galbanum* est bon contrē toux enuieille, à ceux qui a grand peine & difficilement peuent res- A pիրer & qui ne sont que soupիրer. Il est fort vtile à gens rompus par dedans & contē cõuulsions & contractions de nerfs. Iceluy beu en vin avec Myrthe, vaut contre tout venin prins par de- B dans le corps, ou tiré par dards, fleches ou fagettes enuenimées.

Prins en mesme sorte, il esmeut les fleurs menstruales, & pousse hors l'enfant mort. Pareille ver- C tu à il appliqué par dessous, ou le parfum d'iceluy receu par bas: & prins de la grosseur d'une seue en vn verre de vin, aide contre difficulté d'enfanter, se dit Pline.

- D** Il chasse par son odeur tous serpens du lieu ou il est brulé, & à ceux qui en font oingta, nulles bestes venimeuses ne leur peuvent nuire. Et les serpens qui seront touchez d'icelle mellée avec huile & Spondilium, il faut qu'ilz meurent.
- E** Le parfum de Galbanum ayde aussi aux femmes trauaillées de suffocation de matrice, & aux Epileptiques: il remet aussi la matrice à son naturel, induit sur le nombril.
- F** Galbanum amollit, adoucit, & tire hors les espines, eschardes, & humeurs froides: dauantage on le met vtilement sur scirrhes & tumeurs enuicillées, & se melle parmy tous vnguens, huiles, & emplastres qui ont vertu de reschauffer, digerer, dissoudre, amollir, rôpre apostemes, & de tirer hors espines & eschardes.
- G** On l'induit vtilement sur oppilations de ratelle, & contre douleur de costé.
- H** Iceluy induit avec vinaigre & nitrum, efface les lentilles & taches de la face & de tout le corps.
- I** Mis au creux de dens mauuaises, appaise la douleur d'iceux.
- K** On le verse vtilement avec huile Rosat, ou nard es aureilles purulentes & pleines de bouë.

## LE CHOYS.

Le plus prisé est le cartilagineux, bien pur, gras, bien ferme & ferré, sans auoir de boys entremeslé, retenant quelque peu de la graine, & de Ferula, de forte odeur, ne trop humide, ne trop sec.

## De Ammoniacum.

## Chap. XIII.

**A** Mmoniacum est vne gomme ou liqueur d'vne espee de Ferula qui se nomme Agayllis, testimoing Dioscoride. Aucuns disent qu'elle a les fueilles de Silphium, plus charnaes toutesfois & comme visqueuses.

## LE LIEV.

Elle croist pres de Cyrene au pais d'Afrique, & pres du temple là ou Ammon rendoit oracle en Lybie.

## LES NOMS.

Ceste liqueur est appelée en Grec selon le temple d'Ammon, ἀμμωνιακή: en Latin Ammoniacum: es Boutiques Ammoniacum, & Gummi Ammoniacum.

La liqueur plus pure & nette & meilleure est appelée Thrausma, comme dit Dioscoride, cest à dire Fritura en Latin.

Celle qui est plaine de terre & de grauiers, Phyrana.

## LE TEMPERAMENT.

Ammoniacum est chaud au second degré, & bien pres sec iusques au mesme degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A** Ammoniacum prins au poid d'vne drachme, lache le ventre, & pousse hors le phlegme froid & visqueux, l'attirant à soy des parties bien loingtaines: Dauantage il est bon cõtre courte aleine, aux asthmatiques, contre oppilatiõs du Thorax, Epilepsie, goutte, douleur de hache appelée Sciatique, & cõtre douleur de teste enuicillée, mala die & accidens du cerueau, des nerfs, & parties extremes.
- B** Il mondifie le thorax, meurit les phlegmes & les fait cracher prins en forme de looth avec miel, ou prins avec la decoction d'orge mondé.
- C** Il amoindrit aussi & guerit la ratelle endurcie & oppilée, il pousse hors l'enfant mort, & proquoque l'vrine: mais il n'en faut prendre qu'un petit à la fois, car si on le prend en quantité ou souuët, il fait pisser sang.
- D** Il guerit toutes tumeurs & duresses, & dõne allegeance à douleur de foye & de la ratelle, trempé en vinaigre, & induit ou appliqué sur le mal.
- E** Appliqué avec miel ou poë, dissout durillons, & emporte & fait rompre les tofes, ce sont duresses creuës de la goutte es ioinctures & parties extremes: il digere aussi toutes tumeurs & scirrhes appliqué dessus: & on le melle vtilement parmy tous onguents & emplastres qui eschauffent, adoucisent, amollissent, & attirent.
- F** On l'induit vtilement sur douleur Sciatique, & sur toute douleur & lassitude des parties avec huile de cyprus & nitrum.
- G** Ammoniacum est aussi non sans prouffit mellé avec collyres qui esclarcissent la veuë, & medecaments qui sont faits pour oster obscurité & maille des yeux.

## LE CHOYS.

Le meilleur Ammoniac, selon ce que Dioscoride escrit, est celuy qui est ferme, pur, qui n'a n'eschardes de bois, ne grauiers, ny aucune autre ordure entremeslée, de goust amer, tirant sur l'odeur de Castoreum, qui ressemble pres au vray Encens, de petites boules & petis lopins: Celuy qui est plein de terre & de grauiers est à reietter.



**E**uphorbium selon Diofcoride est vn arbre ayant la semblance de Ferula, à fueilles larges, se dit Plaine, comme celles d'Acanthus. Ceux du pais ou il croist en tirent la liqueur qui est blanche comme lait, apres auoir incisé les tiges de ceste plante se tenans bien loing à cause de l'acrimonie d'icelle, & la recoiuet en des peaux bié nettes en grâde quantité, sans ce qui est espandu sur la terre.

Diofcoride dit quil se trouue deux sortes de ceste liqueur: L'une qui est de la grâdeur du grain d'Iraum, semblable à Sarcocolla: L'autre qui s'est figé au fond des peaux, est lucide.

Iean Leon qui a descrit l'histoire d'Afrique baille bié vne autre maniere de recueillir l'Euphorbium, & donne quant, & quant la description de la plante, laquelle nous auons bien voulu icy adiouster, à celle fin que lon puisse conserer si le pourtrait de la plante icy représentée, ne semble bien à voir l'Euphorbium descrit par iceluy asses improprement: il dit donc ainsi.

Euforbio est la gomme d'une certaine herbe qui croist en maniere d'une Carde sauvage: & entre les rameaux d'icelle se forme vn certain fruit gros comme nostre Concombre vulgaire verd, estant grenelé par dessus: mais il est log d'une coudée & demie, & quelque fois davantage. Ce fruit ne croist pas sur les rameaux de la plante, mais sort de la terre come vn tronc, duquel en prouiennent vingt & cinq & trente autres. Quand il vient en maturité, les Villains de ce pais le piquent avec la poincte d'un couteau, qui en fait sortir vne liqueur comme lait, laquelle vient visqueuse, puis la recueille avec le couteau mesme, & la mettent dans des oudres, là ou elle se fait: mais il faut entendre que la plante est toute espineuse.

Cette description est asses impropre, car il semble confondre la plante avec le fruit, quand il dit au commencement que le fruit se forme entre les rameaux de la plante, puis il dit quil ne croist point de la plante, mais de terre produisant vingt cinq & trente autres fruits. Ce qui conuendroit plustost à la plante, comme la figure demonstre: car d'une seule fueille plantée en terre, il en prouiet en moins de trois ou quatre ans, vingt cinq, trente, ou quarante autres fueilles l'une croissant sur l'autre, de sorte qu'en la fin deuenient comme vn arbre, la premiere fueille plantée se tournant en tronc & la seconde & la tierce pareillement, puis les autres en rameaux.

Ces fueilles à leur premier sortir ressemblent à la tige d'un Artichaut, vides, puis s'estendent en long & large, de bresseleur de deux doigts, longues à peu ne fois d'un pied ou pied & demy, & larges de demy pied, ayans moult de petites esleuettes, comme verrues arrangées, pleines de longues espines aigues & poignantes: icelles piquées ou blessées il en sort vne liqueur glauque, & blanchâtre: Quand la plante est vieille de sept ou huit ans, elle produit entre les fueilles vng fruit long d'une paume bien pres, & rond, plein de verrues esleuées comme au Concombre ou à la Pomme de merueille, & de semblable couleur qu'il est meur, & auoir est rouffatre en rouffissant.

## LE LIEU.

Euphorbium descrit des Anciens se trouue sur le mont Athlas en Lybie pres de Mauritanie.

L'autre que descrit Iean Leon se trouue en Afrique & es Indes, d'ou premierement il a esté apporté en Europe. On le trouue aussi en quelques endroits de France planté es jardins pour nouuesuté.

## LE TEMPS.

La plante icy représentée produit ses fueilles au Printemps, & le fruit est meur en Automne es Vendanges.

## LES NOMS.

La gomme descrite des Anciens se nomme en Grec *εὐφορβία*: en Latin *Euphorbium*: es Boutiques *Euforbium*.

Pourtrait du Figuier d'Inde lequel restime estre l'Euphorbium de Iean Leon.



L'autre s'appelle d'aucuns *Cardus indicus*, & *Ficus indicus*, c'est à dire Chardé & figuier d'inde.

#### LA CAUSE DV NOM.

Suba roy de Lybie a esté premier inuenteur de ceste herbe, & l'a ainsi appelée du nom de son Medecin frere de Musa medecin de l'Empereur Auguste.

#### LE TEMPERAMENT.

Euphorbium est fort chaud & sec, jusques pres du quart degré.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

**A** Euphorbium acoustré en la maniere descrite cy dessous, purge & pouffe par bas, ainsi que dit Mesue, les phlegmes lentes, froides & visqueuses, les attirant à foy des nerfs & parties loingtaines, & purge aussi la cholere. D'auantage il est fort bon contre douleur de teste enuicillie, paralyse, spasme, debilité prouenant d'auoir eu la grosse verole, douleur de nerfs & parties extremes, qui sont enuicillies, & contre iaulnissé. Pareillement contre la peste, & semblables maladies contagieuses, comme escrit Gentilis.

**B** Il se fait vn emplastre d'Euphorbium avec douze fois autant d'huile & vn petit de cire, fort singulier contre toutes douleurs des ioinctures, affolure, paralyse, cõuulsion & contraction de nerfs & contre toutes douleurs & indispositions d'iceux, comme Galien au 4. de Medicamentis secundum genera declare plus amplement, enseignant comment & en quel temps il faut augmenter ou diminuer la quantité d'Euphorbium, ce qui seroit trop long de le reciter en cest endroit.

**C** Euphorbiũ broyé avec huile de Laurier, gresse d'Ours, ou de loup ceruier, ou de gresse semblable, guerit la tigne, & pelade, faisant recroistre de nouveau poil, nõ seulement sur la teste ou lieux de frusé de leur poil: mais fait aussi croistre la barbe, qui vient fort tard, induit dessus en mesme sorte

**D** Iceluy induit avec huile sur les temples d'vne personne fort endormie, lethargique, et tormentée de rage, la reueille. Et appliqué sur la nué du col, fait retourner la parole à ceux qui auoient perdue par estre touché d'Apoplexie.

**E** Euphorbium induit avec vinaigre, efface & emporte toutes taches vilaines & ordes du corps, signamment les escailles blanches de la peau.

**F** Quelle faculté a la plante icy representée, il est encore incognu.

#### LE CHOYS.

Il faut prendre celuy qui est iaulnatre, cler, fragile, & fort acré & brulant en la bouche & au gozier, qui est nouveau & frais, qui ne soit guere plus d'vn an vieil: car ceste liqueur pert beaucoup de sa vertu par vieillesse, comme escriuent Galien & Mesue.

#### LES NVISANCES.

Euphorbium a cause de sa chaleur par trop grande, est prins par dedans, fort nuisible au foye estomach, & toutes parties interieures, les enflambant & eschauffant outre mesure.

#### AMENDEMENT ET PREPARATION.

La malice d'Euphorbium est corrigée en plusieurs sortes: premierement il se fait oyndre d'huile d'amandes douces, puis le mettre dedans au milieu d'vn Citron en vn pasté de leuain, & le faire ainsi cuire. Quand le pasté sera cuit, on tirera l'Euphorbiũ dehors pour s'en seruir en medecine.

Manardus prend Maltix & gomme tragacant, autant que d'Euphorbium, & les meslant ensemble les met au milieu d'vn pain non cuit, les laissant ainsi là cuire tant que le pain soit assez cuit: puis il prend ce du milieu & en fait des pilules fort singulieres contre debilité prouenant de verole, & toute douleur des parties exterieures.

Vn autre mesle avec Euphorbium pareille quantité de Maltix, & en fait des pilules avec jus de Citrons, ou d'Oranges, lesquelles il estime grandement contre la Peste.

#### De Glaucium.

#### Chap. XV.

#### LA FORME.

**G**laucium est vne herbe basse, qui a pres les fueilles du Pavot cornu, sinon quelles sont plus charmes, plus petites, plus ordes, espandues sur la terre, d'odeur ingrante, & goust amer avec attraction. Toute l'herbe est pleine d'vn jus iaulne comme or. De ceste herbe on tire vne liqueur laquelle on appelle Glaucium du nom de l'herbe, en ceste sorte. Les habits du pais ou elle croist mont les fueilles en des pots de terre mis dans des fours à de my chauds, & les laissent là chauffer tant qu'elles deuenient sietries, puis les tirent hors & en les bien pilans en tirent le jus, duquel on se sert en medecine.

#### LE LIEV.

Ceste herbe croist en Syrie es enuironz de Hierapolis & en Parthie tesmoing Dioσκο. & Pline.

#### LES NOMS.

Ceste liqueur s'appelle en Grec γλαυικον: en Latin Glaucium du nom de la plante: des Arabes Me-mir,

mith, & Memith. Or ce nom Memith est cognu es Boutiques, içoit que le vray Glaucium ne sy trouue point: car les Apothicaires ignorans qui pleins d'arrogance, prennent hardiment leur quid pro quo, ne se souciais guere ny des malades, ny des medecins, qui aucunes fois ont bien peu de connoissance des choses qui concernent la notice des herbes, font peu de cas de les tromper, & prennent pour le vray Glaucium: aucunes fois le jus de la grande Esciaire dite *Chelidonium maius*, lequel peut ressembler de couleur au Glaucium, mais est de temperament & vertus du tout contraire: aucunes fois le jus du Psaut cornu, lequel ilz appellent faulxement Memith.

Parquoy ce n'est pas de merueille si les medecins trouuēt souuēt tofois, que les medecines qu'ils ont ordonnées, ne respendent pas à leur dessein, quand ilz se laissent ainsi abuser des Apothicaires ignorans. Et seroit bien besoing que les bons & diligens medecins, qui cherchent la sante & guerison des malades à eux commis, veillent eux mesmes faire & dispenser les medecines qu'ilz ont ordonnées, & rendissent peine d'acquiescer la notice de tous simples & drogues necessaires à la medecine, à fin de ne se laisser ainsi tromper des Apothicaires ignorans, & d'euiter toute calōnierou bien qu'ilz feissent comme les Anciens medecins, Hippocrates Galien, & tous autres de renom ont fait, lors que la medecine n'estoit point ainsi separée en trois, cest à scauoir de composer eux mesmes les medicamens, ou de les faire composer en leurs maisons, & en leur presence.

## LE TEMPERAMENT.

Glaucium est froid & astringent.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

On mesle vilement Glaucium parmy tous collyres & medecines des yeux, pour refroidir & ar A  
rester des fluxions d'humeurs tombans sur iceux.

Il guerit aussi & efface le feu volage qui n'a pas encore prins racine, induit dessus. B

## De Tragacantha. Chap. XVI.

Tragacantha. Espine de bouq.

## LA FORME.

TRagacantha a moult de branchettes ramues, lentes & flechiles, estē diuēs au large, de sorte qu'une plante occupe aucunes fois pied, ou pied & demy de terre en rond: Les fueilles sont petites, cōme celles de la Lentille, blanchâtres, & quelque peu lanugineuses, situées l'une à l'opposite de l'autre le long d'un pedicule ou queue, ne plus ne moins qu'à la Lentille. La fleur resseble à celle de Lēuille plus petite toutefois & pres semblable à celle du Cicer, blanchatre, aucunes fois distinguée de lignes purpurées. La graine est enclose en petites siliqs, semblable bien pres au Lotus syluestris: Toute la plante est garnie de tous costés d'espines bien aiguës, poignantes, & fermes. La racine festend en longueur sous la terre, cōme celle de la Riguelle vulgaire, jaune par dedes & noire par dehors, lente, & difficile à rompre, laquelle iette es grandes chaleurs, cōme es iours Caniculaires, vne gomme blanche qui se trouue attachée à icelle.

## LE LIEV.

TRagacantha croist en Mede & Crete, cōme dit Plin: il sen trouue aussi en autres regions, cōme en la Prouince pres de Marseil le là ou ven ay trouuē en abondance.

## LE TEMPS.

TRagacantha fleurit au mois d'Auril, La graine est meure en Iuin, & es iours caniculaires se trouue la gomme attachée à la racine.

## LES NOMS.

Ceste Plante est appellée en Grec *γυγακία*: en Latin *Tragacantha*, & *Hirci spina*: incognue es



boutiques, voire mesme de ceux chez lesquels elle croist on la pourra appeler en François Espéne de bouq à l'imitation des Grecs & Latins.

La gomme qui en sort est aussi appelée en Grec *γυαγακός βαι* en Latin *Tragacantha lachrima* és Boutiques *gummi Dragacanthi*.

#### LE TEMPERAMENT.

*Tragacantha*, se dit Galien, est de semblable temperament que la gôme arabeque, c'est à scauoir desiccative & emplastique.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A La Gomme de *Tragacantha* est bonne contre toux, rudesse de gozier, enroueure & asperité de voix, prinse avec miel en forme de looth. Pour ce mesme & pour rudesses du thorax & de la trachée artère on en fait és Boutiques vn electuaire lequel ilz appellent *Diastragacanthum*.
- B On la boit trempée en vin cuit au poids d'vne drachme, contre douleur de rongnons & croissons de Vessie, en y adioustant come de cerf brulée & lauée.
- C On la mesle ausly és collyres qui se font pour les yeux à fin d'oster l'acrimonie d'iceux. Elle resserre ausly les pores & conduicts du cuir.

#### LE CHOYS.

Il faut eslire celle qui est lucide, gresse, vnie, pure & bien nette sans ordure quelconque, & qui est douce.

## Des Escorces, Fruicts, & Bois aromatiques.

### De Cinnamomum.

### Chap. XVII.

IL n'y a pas petite controuerse entre les Medecins modernes, si nous auons le vray *Cinnamomum* ou non. Car il y en a quelques vns qui sont de ceste opinion, que si on examinoit diligemment nostre *Cinnamomum* vulgaire, qu'on en trouueroit quelques fragments entre les autres qui approchent de la description de *Cinnamomum*. Les autres sont d'opinion du tout contraire & ceux la sont en plus grand nombre, lesquels disent que le vray *Cinnamomum* nous est incognu & que le *Cinnamomum* duquel on vse communement és Boutiques appelé *Canella* du vulgaire, n'est autre chose que la *Cassia* descrite par les Anciens; car toutes les notes que *Dioscoride* attribue à *Cassia*, on les trouue toutes en nostre *Cinnamomum* visuel, come nous declarerons au chap. ensuyuant. Mais pour ce que *Pline* escrit que le *Cinnamomum* & *Cassia* croissent en vn mesme endroit, on pourroit à bon droit demander la cause pourquoy on n'en ameine aussi bien que de *Cassia*, laquelle on trouue en si grande quantité, attendu que lon en auroit beaucoup meilleure despêche que de *Cassia*, & que les marchans y auroient plus grand profit. Parquoy il est à presupposer que le *Cinnamomum* est du tout faully aussi bien que le *Balsamum* en Iudée: car des le temps de Galien il y en auoit grande penurie & ne s'en trouuoit sinon és cabinets des Empereurs. Or si des lors nul n'en auoit sinon les Empereurs, & encore en bien petite quantité, combien qu'ilz eussent domination sur tout le monde: ce n'est pas de merueilles si maintenant il n'en vient pas à nous joint aussi, que des le temps de *Pline*, les forests ou croissoit le *Cinnamomum* furent brulées par les Barbares, & que le vent de *Mydy* est là si vehemēt qu'il allume de forests entières, qui fut cause que le pris d'iceluy augmenta à moytié.

Quant à la description de *Cinnamomum* les Anciens mesmes ne s'accordent pas: Car *Theophraste* au li. 9. chap. 5. le fait de la grandeur du *Vitex* ayant moult de branches ramues. *Pline* au 11. de son histoire chap. 9. dit que le plus haut arbrisseau n'a point plus de deux coudées de haut, de quatre doigts de grosseur, & branchu des le bas à six doigts pres de terre, comme s'il estoit sec, de nulle odeur quand il est verd, & ayant la feuille d'*Origan*. Galien au premier des *Antidotis* dit qu'il a veu vne caisse d'environ quatre coudées & demy de long, laquelle estoit amenée des regions Barbares, ou estoit vn arbre entier de *Cinnamomum* de la première espece: puis apres il dit que chacune espece de *Cinnamomum* est comme vn petit frutex produisant d'vne racine maintenant fix, maintenant sept verges, ou vn peu plus ou moins, mais non de longueur egale, la plus grande toutes fois n'a pas plus d'vn demy pied de long: Parquoy il y a bien à faire de se scauoir ex plier hors de tant diuerses opinions des Auteurs. *Dioscoride* & Galien en citent onsix especes. Le premier est *Cinnamomum Mofyliticum* ainsi appelé pour ce qu'il retire quelque peu à *Cassia Mofylitis* le meilleur est noiratre, de couleur de vin tirant sur le cendreau, ou comme Galien dit au premier de *Antidotis*, qui a telle couleur comme si on demesloit avec du lait de la couleur noire & quelque peu de bleu, vni, ayant de petis rameaux fort noüeux, d'o deur tresamiable, qui est la

principale marque par laquelle on peut cognoistre le meilleur. Le Second croist aux montaignes, espes, humide, & fort rouffatre. Le Tiers a tresbonne odeur, & est noir, ramu, nayant guere de ioinctures. Le Quatriesme est fungueux, blanchatre, plein de boilles, friable, & ayant grande racine qui ressemble du tout à Casia. Le Cinquieme a forte odeur, & est roux, ferme, non guere nerveux, ayant l'esforce semblable à Casia qui est rouffatre, & la racine grosse. Il y en a vn autre quil appelle Pseudocinnamomum, lequel a la faculté fort debile, & l'odeur pareillement.

Theophraste le distingue tout autrement, & le partit seulement en cinq au passage cy dessus alleguëien ceste sorte. On dit que le Cinnamomum est distingué en cinq parties, & que Celuy est le meilleur qui est plus prochain aux germes & aux sommités : on le coupe de la longueur d'une paulme, ou quelque peu plus longue. Le Second, celuy qui vient apres, lequel est couppe plus courtz puis le Tiers, & le Quatriesme : Le Dernier, & le pire est celuy qui est plus prochain de la racine, pour ce qu'il a fort peu d'esforce, en laquelle gist toute la bonté, non au bois : Pour ceste cause on est acoustumé de preferer les sommités à cause qu'elles ont plus d'esforce.

Ludouicus Romanus au liure qu'il a escrit de son voyage dit que l'Arbre qui porte Cinnamomum n'est guere different du Laurier, soit que vous regardes le tronc, soit que vous consideres les feuilles, & les bayes, lesquelles toute esois sont plus petites & blanchatres au Cinnamome, qui n'est autre chose que l'esforce des branches & se cueille en ceste sorte. De trois en trois ans ilz incisent l'esforce & la tirent ius des branches : Ceste esforce ainsi tirée des branches (car ilz ne touchent au tronc de l'arbre craignant qu'il ne perisse) appellent ilz Cinnamomum : mais il n'a point ceste odeur plaisante incontinent apres qu'il est tiré ius, mais seulement vn mois apres, quand il est bien seché.

Il y en a quelques vns qui le font semblable au Grenadier, bien ramu & se ayant en terre seche. Toutesois le croy plus tost que ce soit la Casse des Anciens que le Cinnamome quilz veulent descreire, laquelle a esté tenue tousiours par cy deuant pour le vray Cinnamome.

#### LE LIEV.

Le Cinnamomum prouient en Arabie Pheureuse, & aussi és Indes, comme dit Strabo.

Le Cinnamome de Ludouicus Romanus prouient en l'isle de Zailon en la mer Indiane.

#### LES NOMS.

Ce Simple est appelé en Grec *κιννάμωμον* : en Latin *Cinnamomum*, & *Cinnamum* des Arabes *Darfes* ni: cognu seulement de nom és Boutiques & du vulgaire.

Puis donc que le Cinnamomum ne viét pas à nous & qu'il nous est incognu : on pourra substituer le double de Casia, comme dit Dioscoride & Galien au premier de Antidotis. Quintus, comme recite Galien, toutes les fois qu'il y entroit en vne composition du Cinnamomum, il y mettoit Carpesium, lequel nous est à present incognu, mais selon Galien, c'est vne herbe semblable à Phu, plus vertueuse toutesois, & plus aromatique, & n'est autre chose que le Cubebe des Arabes, qui est bien diuers aux Cubebes des Boutiques, comme on trouuera en conseruant la description de tous deux : car le Carpesium des Grecs, ou Cubebe des Arabes sont racines gresles comme celles de la Valeriane ou semblables aux plus menus sarmens de Cinnamomum : & les Cubebes des Boutiques sont vne graine ronde comme celle de Poyure. Parquoy puis que le Carpesium nous est incognu aussi bien que le Cinnamomum, il vaut mieux de sarrestre à Galie, lequel dit au lieu dessus alleguë, que en défaut de Cinnamomum on peut tousiours prendre le double poid de la meils leur Casia qui est nostre Canelle, ioinct aussi qu'iceluy preferre la Casia en c'est endroit au Carpesium.

#### LE TEMPERAMENT.

Cinnamomum est chaud au tiers degré, & de parties tressubtiles, & plus delicatif que tous les autres simples qui sont chauds en pareil degré.

#### LES VERTVS ET OPERATIONS.

Cinnamomum prouoque l'vrine, & le flux mestruel aux femmes : il tire hors aussi l'enfant mort. A bey, ou bien appliqué par dessous avec myrthe.

Il est vtile contre morsures de toutes bestes venimeuses, & contre toute sorte de venin : voila B pourquoy on le messe par tout és Antidotes.

Il a grande vertu contre obscurités des yeux, subtiliant les grosses humeurs qui sont cause d'obscureur la veue.

Induit avec miel, il efface lentilles & toutes taches du visage. On le messe aussi parmy vnguets D precieux.

Il guerit toux difficile, & defluxions : & est tresvtile contre hydropisie, douleur de rongnons, & E difficulté d'vrine. Brief, il a tresgrande vertu en toutes choses.

**C**assia selon le iugement de tous scauans Modernes, n'est autre chose que le Cinnamomum vulgaire duquel on vse és Boutiques, lequel est tant cognu du vulgaire qu'il n'a que faire de plus ample description. Dioscoride & Galien en constituent plusieurs especes, la premiere desquelles appellent Zigi, icelle doit estre preferée à toutes comme la meilleure, car elle approche de si pres à la similitude de Cinnamomum, que des le temps de Galien mesme on la vendoit au lieu de Cinnamomum : parquoy ce n'est pas de merueilles si nos Ancestres en ont ausi tousiours vse iusques à maintenant en lieu de Cinnamomum: & en vse on encore par tout és Boutiques, dont ny auroit grand danger moyennant qu'on print tousiours la meilleure: Car Galien mesme au 4. liure de Antidotis escrit, que Cassia est si trespareille à Cinnamomum, qu'il a veu aucunes fois les sommités de l'arbre de Cassia du tout semblables à Cinnamomum, combien qu'il ecriue vn peu deuant que la meilleure Cassia ne differe guere au plus vil Cinnamomum quant à la bonté.

Cassia d'iques selon Dioscoride à l'escorce espesse, les sucilles de Poyures Il faut eslire celle qui est roussâtre, de belle couleur, retirât à Coral, qui a les fistules estroites, grosse, de goust acre, & participante de quelque astriction avec son acrimonie, aromatique, & sentant le vin: icelle icy toutesfois ne tient que le second lieu. Car il faut tousiours preferer celle de laquelle nous auons deuant parlé, appelée de Dioscoride & Galien Zigi, qui est principalement requise en medecine, elle est espesse, de couleur purpurée en tirant sur le noir, sentant les roses. Le tiers lieu en bonté obtient celle que lon appelle Mosylitis. Toutes les autres sont viles & de petite valeur, comme celle qui s'appelle Asyphenum, noire, ingrate, ayât l'escorce tenue & fendue, A icelle ressemble du tout Pleurocassia, mais on la cognoist au gout comme ainsi soit quelle n'est ny acre, ny odoriferante, & l'escorce tient au bois. Il se trouue ausi vne fistule large, molle, legere, surculéuse, laquelle on prefera à la susdite. On reprouue & reiette en general celle qui est blancheâtre, rude, sentant le bouq, & qui a la fistule fort deliée.

Theophraste fait ausi mention de Cassia au li 9. chap. 5. lequel Pline a ensuyui, qui en parle en ceste sorte au li 12. de son histoire sur la fin du chap. 19. Cassia est ausi vn arbrisseau lequel produict ioignant ou croist le Cinnamomum, mais és montaignes, ayant les serments plus gros, reuefuts d'vne peau deliée plus tost que d'vne escorce: il est haut de trois coudées, & a trois couleurs diner ses. Il est blanc quind il commence à fortir enuiron la hauteur d'vn pied: puis il est rougeâtre enuiron demy pied, la reste noirâtre. Ceste partie est la plus louée, puis l'autre ensuyuant, on reiette la blanche. On coupe les branches à la longueur de deux coudées, puis soudain on les cout dedans peaux de bestes nouvellement escorcées à fin que se pourrisans, le bois soit mangé des vermineux qui s'en gendrent leans, car ilz ne touchent pas à l'escorce (laquelle seule est vtile) à cause de son amertume.

Les Apothicaires montrent vne Cassia laquelle ilz appellent fistula. icelle ressemble du tout de forme à la Canelle, sinon qu'elle est plus tenue & non si epessee: elle a quelq' odeur aromatique, & quand elle a esté quelque temps machée elle pique à la langue: ic ne sçay si ce ne seroit point le Pseudocassia des Anciens. Quelques gens doctes ont opiniõ que ce soit le Narcaphthum des Anciens: Toutesfois chacun a son iugement libre, pour la reduire sous quelle description des Anciens que bon luy semblera. De la Cassia solutua ou nigra que les Apothicaires appellent communement Cassia fistularis à cause des longues filiques qu'elle porte, il en est parlé au sixiesme liure du chap. 65.

## LE LIEU.

Elle croist en Arabie l'heureuse: on l'ameine de Portugal en la ville d'Anuers.

## LES NOMS.

Elle est appelée en Grec *κασσία*, & *ζυλακασσία* des Grecs plus modernes: en Latin *Cassia* & *Cassia* des Arabes *Selycha*, ou *Salibacha*: és Boutiques *Cinnamomum*: & pour iceluy vendu par tout: en François Canelle: en haut Aleman *Limmerländer*: en bas Aleman *Lanceel*.

## LE TEMPERAMENT.

Cassia est chaude & seche au tiers degré bié pres, elle est ausi de parties fort subtiles, de goust fort acre, & quelque peu astringent. **LES VERTVS ET OPERATIONS.**

- A** Cassia digere & coupe toutes les humeurs superflues qui sont au corps: Elle conforte l'estomach, & le foye & autres parties nobles.
- B** Elle est vtile pour prouoquer les fleurs aux femmes qui sont arrestées, sçauoir est quant elles ne se peuent purger suffisamment à cause de la quantité & espesseur de la matiere.
- C** Elle est bonne mise és medecaments qui se font pour esclarcir la veüe. Induite avec miel,
- D** elle efface toutes lentilles du visage: & beuë, elle ayde contre morsures de serpens & de viperes,
- E** On la donne ausi vtilement à boire contre toutes inflammations interieures, & cõtre douleur de rognons qui vient de l'oppilation d'iceux par humeurs espesses & visqueuses.

Elle vaut contre obstructions de matrice & pour l'elargir, si les femmes reçoivent le parfum d'elle par bas.

Brief elle vaut à beaucoup de choses, & à tout ce à quoy le Cinnamome est bon, prise en double quantité au lieu d'iceluy, si ne se trouve point.

## Des Clous de Giroffle.

## Chap. XIX.

## LA FORME.

L'Arbrisseau qui porte le Clou de Giroffle croist en forme de Suy, ou selon aucuns, il est semblable au Buys, ayant les feuilles de Canelle, mais plus rondes, pres semblables à celles de Laurier. Il a la fleur petite, noirâtre en roux, avec vne petite testelette comme vn clou (d'où elle a prins son nom en François) qui a quatre dents situés l'un contre l'autre en maniere de croix, & au milieu vne petite esleueure quarrée. Ceste fleur deult apres plus grosse & se tourneroit en fruit qui le laisseroit par croistre: mais pource que la fleur est plus exquise & meilleure, on la cueille auant qu'elle se tourne en fruit, si est ce toutesfois qu'il s'en trouue quelques vns entremelés, lesquels sont aucunesfois languets & gros come la pierrette d'une Oliue. Voila de quoy Auicene l'a distingué en mâle & femelle, appellant mâle le fruit qui est long & gros come la pierrette d'une Oliue, & plus noir q̄ la femelle, qui est le meilleur: entendât par la femelle la fleur auant qu'elle se tourne en fruit.

Entre les Clous de Giroffle on trouue souuent de petis rameaux fort genoillés & pleins de branchettes à chascun neud, qui sont de pareille couleur que les Clous ou quelque peu plus rouffâtres: Iceux bien examinés (selon l'opinion de quelques Gens sçauans) sembleront auoir quelque similitude avec le Cinnamomum des Anciens: A ceste opinion pourroit aider quelque chose le passage de Dioscoride au 5. li. chap. 86. parlant du Coral en ceste sorte. Le plus loisible est le rouge, de couleur de Sandix bien rouge, fort ramu en maniere de frutex, semblable au Cinnamome, si nous referons ce semblable au Cinnamome, à la forme: ioinct aussi que lon trouue beaucoup de notes en ces fragments, qui conuiennent au Cinnamome: ce que ne voudroye toutesfois affirmer, mais seulement en ay voulu toucher en passant, à fin de bailler occasion de les examiner de plus pres, laissant en cela à chascun son iugement libre.

Pline fait mention des Giroffles au li. 12. de son Histoire chap. 7. On trouue aussi, dit il, en Inde semblable au grain de Poyure lequel on appelle Caryophyllus, plus grand toutefois & plus fragile. On dit qu'il croist es forests d'Inde. On l'ameine à cause de son odeur. Dioscoride & Galien n'en font nulle mention que le sache: mais bien Aegineta au li. 7. chap. 4. Caryophyllon, comme si on disoit feuille de noix, ne respond point à son nom ny de fait ny d'essence: mais ce sont les fleurs d'un arbre croissant es Indes ayans la figure de petis festus, de couleur noire, de la longueur d'un doigt, odoriferantes, acres, quelque peu ameres, chaudes & seches bien pres au tiers degré, de grand vsage en viandes, & en toutes sortes de medicaments.

## LE LIEU.

Il prouient en quelques Isles de la mer Indiane, non guere loing de Bandan.

## LE TEMPS.

Auant qu'ilz commencent à meurir, ceux qui en ont le soing battent les Arbrisseaux avec des cannes, & les abbatent ainsi comme on fait les Oliues, en estendant toutesfois premier tout au tour de l'arbre de clayes faites de feuilles de Palmier.

## LES NOMS.

Ce frutex s'appelle des Grecs plus Modernes comme dit Paul Aegineta & Sethi καρυόφυλλον: en Latin Caryophyllon: des Arabes Carunfel, & Charunfel. La fleur s'appelle es Boutiques Caryophylli, & le fruit la acheue Antophyllum, improprement, veu qu'ilz deuroient plus tost appeller le fruit Caryophyllum, & la fleur ou commencement du fruit Antophyllum: en François Gyroffles & Clous de Giroffle: en bas Aleman Grosse nagel. LE TEMPERAMENT.

Ilz sont chauds & secs iusques au tiers degré bien pres, ou à la fin du second.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

Le Clou de Giroffle est bon meslé parmy collyres qui aiguissent la veue, car il oste & guerit l'obscurité des yeux: il vaut aussi contre inflammation & rougeur d'iceux.

Il est bon à l'estomach, au foye, & au cuer: il ayde la cuisson des viandes & arreste flux de vêtre. B La poudre des Clous de Giroffle prise enuiron quatre drachmes de pesant avec lait, incite grandement au ieu d'amour.

## Du Cardamomum.

## Chap. XX.

Dioscoride & Galien ne nous ont pas laissé par escrit la forme de Cardamomum, mais ilz se sont contentés de seulement nous declarer lequel estoit le meilleur. Il faut eslire dit il celuy qui est

est plein, difficile à rompre, bien serré & solide ( car celuy qui n'est tel est estimé inutile ) de goût acre, quelque peu amer, & faisant mal de teste à cause de son odeur. Plin en fait aussi mention au li. 12. chap. 11, en ceste sorte. Semblable à iceux & de nom & de croïsson est aussi le Cardamomum, ayant la semence lōgue. Il y en a quatre especes, L'un tresverd & gras, ayant les angles aigus, fort à rompre, lequel est en plus grand' estime: le prochain à iceluy est celuy qui est blancheâtre en roux: Le tiers est plus court & plus noir: Le pire est de diuerses couleurs & se rompt facilement, sans grand odeur, lequel fil estoit le vray, deuroit retirer au Colbus. Theophraste en fait seulement mention en passant le mettant entre les simples odoriferans, au li. 9. chap. 7. Les vns disent qu'on amène le Cardamomum & Amomum de Mede, les autres d'Inde, avec le Nardus & toutes les choses aromatiques, ou la plus grande partie.

2 Les Arabes descruent aussi vn autre Cardamomum que ne sont les Grecs ny les Latins, en vn chapitre particulier, le diuisant en deux especes, grande & petite.

A Le grand Cardamomum est la semence d'une plante, enclose en des chappiteaux longs semblables à ceux de la Rose, lesquels contiennent de grains noirs, ronds, plus grands que les grains de Poyure, ayans en soy de petite semence anguleuse, odoriferante, pleine, de goût acre & astringent; laquelle comparée au petit est moins acre, mais elle est beaucoup plus astringente.

B Le Petit est sans chappiteaux & filiques, ayant les grains de semblable couleur que le Grand.

3 Il se trouue es Boutiques encore deux autres especes de Cardamomum qui ne conuiennent en rien à celuy qui est décrit par les Grecs, ny à celuy des Arabes.

*Cardamomum minus Officinarium.*  
Grand Cardamome vulgaire.

*Cardamomum minus Officinarium.*  
Petit Cardamome vulgaire.



#### LA FORME.

A Le Grand est vne silique longue, dure, & ligneuse, cōme vne noix Gaugue, plus longue & plus estroicte, ou sont contenues beaucoup de graines anguleuses, dures, fermes, & de bonne odeur.

B Le Petit est vn petit fruit dur & rond cōme vne noix Auellaine, ou plus petit, auquel sont aussi contenus de petis grains anguleux, beaucoup plus petis que ceux du Grand.

Aucuns ont pensé que le Capsicum, ou, comme lon appelle Piper Indianum, fut vn espece du Cardamomum des Arabes: toutesfois leur opinion est ailes refutée par le trescauant Matthiolus en ses Commentaries sur Dioscoride. LE LIEV.

Le Cardamomum des Anciens venoit d'Armenie, Bosphore, d'Arabie, Mede, & Inde, comme tesmoignent Theophraste, Dioscoride & Plin.

#### LES NOMS.

1 Le Cardamomum des Anciens est appelé en Grec *καρδάμωμον*: en Latin *Cardamomum*: des Arabes *Cardamum*, *Cordumum*, ou *Cardumum*.

2 Les Arabes appellent leur grand Cardamomum *Sacolla*, ou *Chachul*: le Petit *Heil*, & *Heilone*.

3 Ces deux icy sont incognus es Boutiques: mais au lieu d'iceux ilz en ont deux autres especes, la premiere desquelles & plus grande est la Graine de Paradis.

#### LE TEMPERAMENT.

1 Le Cardamomum des Anciens est chaud & sec au second degré.

2 Celuy des Arabes est chaud & sec au premier degré, participant de quelque astringion.

Au lieu de Cardamomum, Paul commande apres Galien de substituer le Myrte & le Cyperus qu'on appelle Souchet.



## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le *Cardamomum* des Anciens prins avec eauë, est bon à ceux qui sont trauuillés d'Epilepsie, & A de la fistiatique: Il est bon contre la toux, paralytie, & contre conuulsions & rompures au dedans. Prins en mesme sorte, il vaut contre trenchées & torsions de vêtre, & pouisse hors les vers larges. B  
Beu avec vin, il prouoque l'vrine, & est vtile à gens qui ne peuvent passer sinon gouste à gouste, C  
& contre douleur de rognôs: & si on le boit avec l'escorce de la racine de Laurier, il rompt la pier  
re & la pouisse hors.

Il profite contre piqures de Scorpions & contre morsures de toutes bestes venimeuses, prins D  
en mesme sorte. Induit avec vinaigre, il guerit mauuaise gratelle. E

Le *Cardamomum* des Arabes conforte l'estomach & ayde à la cuisson des viandes. F

Il est vtile contre desfailemens & vomissemens, principalement si on le dône avec ses chapiteaux, G  
avec Mastix & ius de Mente, ou avec le ius de Grenade & Mente, ou avec le ius d'une Grenade  
aigre douce seulement.

## De Glans vnguentaria, ou Ben. Chap. XXI.

## LA FORME.

**B**En est le fruit d'un arbre semblable au Tamaris, comme dit Dioscoride, de la grosseur d'une  
Auellaine, le noyau duquel pilé & pressé comme les Amandes, rend vne liqueur, de laquelle on  
vse au lieu d'huile es vnguens precedeux. Galien au 6. des Simples s'accorde avec Dioscoride, tou-  
chant la maniere de tirer l'huile, quand il dit que les Perfumeurs & Droguistes vient du ius de la  
chair du fruit. Pline toutesfois au liure 11. de son Histoire chap. 21. dit que c'est le fruit d'un arbre  
qui a la feuille semblable à Heliotropium: & adionste que les Droguistes tirent l'huile des escor-  
ces: & les Medecins, des noyaux, les pilans en y versant eauë chaude. Mais il semble que la senten-  
ce de Dioscoride & Galien est plus vray semblable, à scauoir que tant les Medecins que les Perfur-  
meurs & Vnguentaires tirent l'huile du noyau, & non de l'escaille ou coquille de laquelle il est en  
clos: car c'est vne chose seche que la coquille des noix, & de laquelle on ne peut tirer huile.

Mesue en fait deux sortes, l'une grande, & l'autre petite. La grande est de la grosseur d'une Auel-  
laine, triangulaire: & la Petite commé vn Pois cicer: pleines toutes deux d'une moelle blanche, vnie  
& oleagineuse: La Grande nous est seulement cognue.

## LE LIEU.

Elle prouient en Egypte, Aethyopie, Arabie, & Petra, ville de Syrie pres Judée, & en Barbarie.

## LES NOMS.

Ce fruit est appellé en Grec *Βένη* ou *Βένη*: en Latin *Glans vnguentaria*, de Pline *Myrobolan*  
nom: des Arabes *Habel*, *Ben*, *Ban*: des Barbares *Gramam Benis* Boutiques *Ben*.

## LE TEMPERAMENT.

L'huile qui est tirée de ce fruit est chaude, se dit Galien. Le fruit a vertu d'inciser & est abster-  
sif à cause de son amertume, & astringent. L'escorce du fruit est fort astringente.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Mesue dit que ce fruit prins ou en breuuage, ou autrement, purge par haut & par bas le phlegme A  
legg & espes: Pourtant est il vtile medicament contre la Colique, non seulement prins en breuuage,  
mais aussi ietté dedans le corps par clystere, principalement si la Colique prouient de ventosi-  
tés & pituite.

Des noyaux d'iceluy broyés avec Polenta & miel, on en fait Cataplasme fort bon contre stru- B  
mes, & dunllons: & avec miel seulement, contre maladies de nerfs venans de froidure, comme pa-  
ralysie, conuulsions & contractions de nerfs.

Il vaut contre oppilations & duresses de foye & de ratelle, appliqué dessus en forme d'empla- C  
stre avec farine de Lupins & Spica Nardi.

La Noix prinse au poids d'une drachme, diminue & consume la ratelle. D

On l'induit sur podagres avec farine d'Yruse, & eauë miellée: & cuite en vinaigre, elle empor- E  
te gratelle blanche, & seche: & avec nitrum, elle corrige les cicatrices des playes: & efface les lentil-  
les & taches du visage & de tout le corps induite avec vrine, comme aussi fait l'huile tirée d'icelle,  
ainsi que dit Mesue.

L'huile d'icelle distillée es oreilles, n'en appaise pas seulement la douleur, mais aussi en oste & F  
guerit la sourdesse, & bourdonnement.

Les Perfumeurs se seruent d'icelle à parfumer les gans & autres choses, la deméllit avec musc, G  
ciuette, & ambre gris, non pour aucune odeur quelle aye, mais pour ce quelle recoit facilement  
toutes odeurs & avec cela ne deuient iamais rance par longuëlle de temps.

## LES NVISANCES.

Cette Noix nuit fort à l'estomach, & trouble les intestins, comme dit Mesue, à cause d'une humi-  
dité excrementieuse & acide qu'elle est plaine.

## LA CORRECTION.

On la corrige en la rotissant au feu, car par ce moyen elle perd cette humidité superflue qui ex-  
citoit vomissemens, & purge seulement par bas. On la cuit aussi avec semence d'Anis & de Fenouil

## LE CHOYS.

Celle la est à preferer, qui est la plus plaine, plus recente, plus blanche, & qui fescaille le plus fa-  
cilement. Pline prefera celle qu'on amaine de Petra ville de Syrie pres Iudée, qui a l'escorce noire  
& le noyau blanc.

## Des Myrabolans. Chap. XXII.

## LES ESPECES ET CHOYS.

LE fruit duquel nous auons parlé au chapitre precedent, lequel est appellé de Pline Myrobala-  
num, a fait souuenir des Myrabolans des Arabes (desquels nous traiterons au chapitre pres-  
sant) lesquels n'ont pas esté descrits ny cognus des Anciens, & que ie sache: car ie croy que Actuarius  
seulement entre les Grecs qui sont plus recens, en fait mention.

Les Myrabolans donques selon les Arabes sont distingués en cinq especes.

Les premiers sont ceux qu'ilz appellent Flaus: & de ceste sorte faut eslire ceux qui sont jaunes  
tres en verd, pesans, pleins, gommeux, qui ont beaucoup de chair & le noyau petit.

Les deuxiesmes sont appellés Che-pula: les meilleurs sont les plus gros, de couleur noire tiré sur  
le purpuré ayans l'escorce epesse, & qui iettés en eau sen vont incontinent au fond.

Aucuns sont de ceste opinion, que ces deux icy viennent tout d'un arbre, & qu'ilz differont seule-  
ment en couleur, à cause que l'un a esté cueilli auant qu'il fut meur, & l'autre nō iusq's à tant qu'il  
fut bien meur: mais on n'en scauroit rien prononcer de certain, attendu que nous ne cognoissons  
l'arbre qui porte ces fruiscts, & ne scauons mesme en quel endroit ilz croissent.

Les Tiers sont appellés Indica pour la couleur cerulée qu'ilz ont: on prefera les plus noirs, plus  
charnus, plus pesans, qui n'ont point de pierrette au dedés, & lesquels estans rōpus on trouue solides  
& les Quatriesmes, qui se nomment Empellica, sont à preferer, quand ilz se diuisent par plus gros  
lappins, plus espes & plus pesans, & quand ilz ont plus de pulpe & de chair que de pierrette ou  
noyau.

Les Cinquiesmes appellés Bellerica, doiuent estre pres de semblable forme que les Empelica, &  
& doiuent auoir l'escorce epesse.

## LES NOMS.

Les Myrabolans sont appellés des Arabes Hallig, & Dillegi: d'Actuarius en Grec *μυροβόλων*  
en Latin *Myrobolans* & *Myrobolani*: des Barbares, & es Boutiques *Myrobolani* & *Myrabolani*.

La Premiere espece est appellée en Grec *μυροβόλων φλάου*: en Latin *Myrobolans flaus* & *flaus*:  
es Boutiques *Myrobolani citrini*.

La seconde en Grec *κεπούλα*: en Latin *Cepula*, ou *Cebulea*: es Boutiques *Kebuli*.

La 3. espece, en Grec *ινδικά* & *δρασκώρια*: en Latin *Inda* & *Dansonia*, & *Nigra*: es Boutiques *Indi*.

La quatriesme espece: des Arabes *Embleg*, *Amleg*, & *Ambegien* Grec *εμπελικα*: en Latin *Em-  
pellica*, seu *Emblees* es Boutiques *Embliei*.

La cinquiesme & derniere espece, des Arabes *Bellileg*, *Bellegi*: en Grec *βελλικα*: en Latin *Be-  
llezica*, seu *Bellezica*: es Boutiques *Bellirici* & *Belirici*.

## LE TEMPERAMENT.

La premiere espece est froide au premier degré, & seche au second.

La seconde & tierce espece sont froides & seches au premier degré.

La quatriesme & cinquiesme espece, sōt froides, seches, & astringetes à la fin du premier degré.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

A Toutes sortes de Myrabolans, comme dit Mesue, retardent la vieillesse à ceux qui en vsent sou-  
uent, ilz sont auoir bonne couleur, ilz donnent bonne odeur, ilz resioissent, & confortent l'esto-  
mach, le cuer, & le foye: ilz profitent contre hemorrhoides, & estaindent la cholere: mais les Ci-  
trins sont les meilleurs en cest endroit, car ilz purgent la cholere, & aydent singulierement à ceux  
qui sont de temperament chaud.

B On les broye sur le Porphyre pour mettre es Collyres qui se font pour les yeux avec verius, ou  
eau rose, ou le jus de fenouil, pour reprimer inflammation des yeux, & arrester defluxions d'iceux.

C La poudre d'iceux meslée avec mallix, est bonne pour guerir vlcères.

- 3 Ceux qui se nomment Cepuli, purgent le phlegme, ilz ourent l'entendement, & esclarcissent D  
la veue, principalement estans conuictés en sucreeilz purgent aussi l'estomach & le confortent.  
On les donne vtilement à gens hydropiques, & à ceux qui sont trauaillees de longues sieures. E
- 3 Ceux qu'on appelle Indi ou nigri, purgent la melancholie: Ilz sont bons contre tremblemens, F  
ilz sont bonne couleur, ilz sont viles contre lepre, ilz dechassent tristesse & guerissent sieures  
quartes.
- 4 Ceux de la quatriesme espece, purgent le phlegme, renforcent le cuer & le cerueau, ilz aug- G  
mentent l'entendement, & purgent l'estomach de phlegme & autres humeurs superflues, le con-  
fortant & estanchant la soif; d'auantage ilz arrestent vomissemens, & reueillent l'appetit.
- 5 De pareille vertu sont aussi ceux de la cinquiesme espece. H

## De Santalum.

## Chap. XXIII.

**L**es Arabes constituent trois especes de Santalum, Citrin, blanc, & rouge, lesquels sont tous co-  
gnus és Boutiques excepté le Citrin ou iaulne: car de celly la on n'en ameine plus, mais au  
lieu d'iceluy on vñe de la partie interieure & du cuer du Blanc, lequel est aromatic & iaulnatre.

Or plusieurs font en doute si cest Arbre a esté cognu des Anciens, & si ne se pourroit point re-  
ferer à aucune description faite par iceux.

Aucuns le veulent referer à l'Aspalathus des Anciens: Et pour ce qu'on pourroit obiecter que  
l'Aspalathus des Anciens n'est qu'un frutex ou arbrisseau fort ramu & espineux, & l'arbre du Sant-  
tal fort grand & droit, comme ceux qui ont fait le voyage és Indes orientales afferment (là ou il  
sen trouue de grandes forests) ilz respondent que ceste difference vient seulement à raison du lieu  
de la naissance: Car en Inde à cause que l'air est temperé les Arbres y deuiennent grands, mais en  
terre froide il demeure arbrisseau espineux. Toutesfois ceste raison est assez legere, & de peu de  
poix pour donner autorité à leur opinion. Car si elle pouoit auoir lieu, l'Aspalathus paruiendroit  
aussi bien à iuste grandeur en Syrie qui n'est pas pais froid, comme és Indes. D'auantage nous trou-  
uons que Serapio a descrit l'Aspalathus à part sous le nom Darisahan, & fait vn autre chapitre de  
Santal, sans en donner aucune description, sinon qu'il recite hors de Isaac, que Sitalum est vn bois  
que lon ameine de Syrie, duquel sen trouue trois sortes, à sauoir Blanc, Rouge, & Iaulne, lesquels  
sont tous receus en vsage: Le me donne toutesfois de merueille comment ceux qui ont fait le voya-  
ge és Indes, & qui se disent en auoir là veu de grandes forests, n'ont laissé par escrit quelle est la for-  
me d'iceluy, & si se font trois diuers arbres ou non. Le iaulne est plus estimé, puis apres le rouge,  
en tiers lieu le blanc.

## LE LIEU.

Il croist, comme recite Serapio, en Syrie, & és Indes Orientales en grande abondance.

## LES NOMS.

Il est appellé des Arabes *Samad*: des Grecs plus Modernes *σάνταλον*: en Latin *Santalum*: és Bou-  
tiques *Sandalum*: en François Sandal: en Aleman *Sambel*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Sandal selon les Arabes est froid au tiers degré, & sec au second, mais le rouge vn peu plus  
froid que les autres. Toutesfois il y en a entre les Modernes qui doutent s'il est froid, & seroient  
plus tost d'opinion qu'il fust chaud à cause de la bonne odeur dont il est participant.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

Le Sandal est bon à gens chaleureux, contre debilité d'estomach, & contre douleurs d'iceluy cau A  
fées par l'acrimonie de la cholere.

Iceluy pilé avec eau rose, & induit sur les temples en y adioustant vn petit de Camphre, done B  
allegeance à douleurs de teste tresardantes.

Le Sandal blanc & sarcocolla broyés autant de l'un comme de l'autre, & induits avec le blanc C  
d'vn œuf sur le front & les temples, arreste desfluxions qui tombent sur les yeux.

Le Sandal, principalement le rouge, est tresvile contre inflammations & goutes chaudes, induit D  
avec ius de Morelle, ou de Ioubarbe, ou de Pourpier, ou de Lentille aquatique: car il reprime &  
arreste les humeurs qui coulent & s'écoulent parties.

Les Sandals beus, aydent grandement à l'estomach chaleureux. E

Ils profitent contre sieures chaudes, parquoy on en fait des Epithemes avec eau rose qui in- F  
duits sur l'endroit de l'estomach, estainent le grand ardeur d'iceluy en sieures chaudes.

Ils confortent le cuer, & le resiouysent: pourtant on les mette parmy medicamets qui se font G  
contre palpitations & tremblemens d'iceluy.

LA plus grand part des Gens doctes de ce temps icy font de ceste opinion, que le Lignum Aloës soit l'Agallochum décrit par Dioscoride. Mais pour autant que nous ne trouvons qu'une sorte d'Agallochum descrite par iceluy, & que les Boutiques montrent deux especes de Lignum Aloës, sans le Lignum R hodium, qui n'est autre chose qu'Oleaster venant de Rhodes, duquel elles ont vû par cy devant au lieu de Lignum Aloës: me semble que ne seroit pas hors de raison si nous amenions les sentences de quelques Gens sçavans touchant ce Simple.

L'un est de diuersé couleur ayant des veines blanches ou pales en iaulnissant, & d'autres rouffres en noir, entremeslées ensemble, mais plus aux rameaux qu'au tronc. Quelques Gens sçavans estiment que ceste sorte soit Thuia: mais pour autant que nous ne trouvons en nul Auteur de quel le sorte est le bois de Thuia, il faudroit examiner de plus pres, quelle chose les pourroit avoir meü de dire que soit Thuia. Theophraste au li. 5. de son Histoire chap. 5. décrit Thuia en ceste sorte. Thuium ou Thuia protient apres du temple de Ammon, & en Cyrene: il ressemble au Cypres sauvage de rameaux, de feuilles, de tronc, & de fruiçt: ou pour mieux dire, c'est comme vn Cypres sauvage, &c. Plin su vant Theophraste en a fait aussi mention au li. 11. cha. 16. Ilz disent tous deux que c'est vn bois qui dure long temps sans se corrompre, de sorte que Theophraste au mesme lieu dit que le Cupressus & Thuia durent plus mis en ouurage que nul autre bois quelconque, & pour ceste cause ceux d'Ephefe edifièrent de bois de Cypres les Portaux du temple de Diane, cõme pour durer à eternité. Nous ne trouuõs pas q̄ Cupressus auquel Thuia ressemble, soit de diuersé couleur cõme est ce bois que lon tient es Boutiques pour Lignum Aloës, duquel on fait des Patenostres: par quoy Thuia ne le peut aussi estre, veu qu'ilz se doiuent ressembler en toutes choses. Trop bien nous liions en Theoph. que Thuia est fort commode à recevoir couleur, pour le discours des veines vn doyant donc il est rempli, principalement à la racine: qui me fait penser que le texte de Dioscoride au Chap. du Safran, soit corrompu, & que au lieu de *διὰ μὲν τοῦ τὰ πολύχλωρον καὶ ἰσχυρὸν, οὐδὲν τὴν ἰσχυρὰν τῆς ἑμῆς βλάστησεως, τοῦτο χρῆσται*, il faut lire *τῆς θύιας βλάστησεως*. c'est à dire: Car pour l'abondance du ius donc il est plain & pour sa belle couleur, les Italiens en vident à taindre le bois Thuia: non à taindre les mortiers, cõme à interpreté Ruelle: ce qu'a tresbié annoté Pierre Belon en son liure de Coniferis arboribus. Ces passages pourroient auoir meü ceux desquelz ny dessus fait mention, de dire que ceste sorte de Lignum Aloës fust le Thuia, & pareillement ce que Diosc. escrit au chap. de Agallochum, là ou il dit qu'Agallochum est semblable au bois de Thuia, de diuersé couleur &c. ce qui se deuoit referer au Thuia ia mis en œuvre & painct, si ce n'estoit q̄ le tresseuant Matthiolus renuerse ceste opinion, par ce qu'il dit le passage de Diosc. estre corrompu en cest endroit: car selon son dire il ne faut pas lire *ἐπιχρῶμεν ὑμῶν*, c'est à dire, racheté ou macqueté, odoriferant, mais selon Orbanus, *διὰ μὲν οὖν ὑμῶν*, c'est à dire, il est donques de bonne odeur, ce qui se peut prouuer par ce que ne Paulus Aegineta, ne Serapio (lesquelz ont tiré ceste Histoire mor à mort hors de Dioscoride) ne font nulle mention ny des poinçts ny des macules que ce bois deuoit auoir. Aucuns l'estiment estre l'Aspalathus de Dioscoride.

L'autre est de couleur rouffre en noir, gommeux, lequel brulé, rend vne odeur plaisante, pesant & allant au fons de l'eau. Cestuy cy est reduit par quelques Gens sçavans sous les especes d'Ebenus, duquel parle Diosc. au premier liure en ceste sorte. Le meilleur Ebenus est celuy qui vient d'Ethiopie, & qui est noir, n'ayant nuls discours de veines par la matiere du bois, & vni cõme vn corne mise en œuvre, solide & espés quand il est rompu, de goust acre & quelque peu asstringent. On le brule en parfums à cause de son odeur plaisante, sans que la fumée d'iceluy soit facheuse. Approché du feu estant encore frais & nouveau, il fallume à cause de sa gommosité, & broyé sur le porphyre il deuiert rouffre. Il y en a vn autre qui vient d'Inde, lequel a de pieces entremeslées qui sont blanchatres, & quelque peu iaulnes, & rachetées en plusieurs endroits: mais le premier est le meilleur. Theophraste en fait aussi mention au dernier Chapitre du 9. de son Histoire. Le bois d'Ebene, dit il, ressemble à celuy du Buys, mais estant despoüillé de son escorce il est tresnoir, & broyé sur le porphyre, il est vtile aux yeux. Plin pareillemēt au li. 12. cha. 4. dit. Il y a deux especes d'Ebene. Celuy qui est le meilleur ne se trouue guere, c'est vn arbre: ayant le tronc sans neuds, & de matiere tresnoire, & plaisante à voir deuant mesme qu'ilz soit mis en œuvre. L'autre croist en maniere de frutex comme le Cytisus, & se trouue par toute l'Inde.

Lesquelles opinions j'ay bien voulu icy amener, avec les passages des Auteurs à fin de donner occasion à ceux qui font bien exercités en la cognoissance des Simples, de s'eschacher la matiere de plus pres, & d'estre incités par l'exemple de ceux (desquelz j'ay amené l'opinion) à vouloir illustrer l'estude de l'histoire des plantes. Mais pour ce que la plus grande partie des Modernes tient ceste derniere espece de Lignum Aloës, qui est la meilleure, pour l'Agallochum décrit par les Anciens: il nous faut voir ce qu'ilz en disent.

Agallochum selon Dioscoride, est vn bois amené d'Inde & Arabie, semblable à thuis, de bonne odeur, astringent avec quelque amertume, reueultu d'une escorce bigarrée, laquelle semble plus tost vne peau bien deliée qu'une escorce, lequel on mange, ou on se laue la bouche de la decoction d'ice- luy, pour auoir bonne haleine. Paul Aegineta dit bien pres tout le mesme au li. 7. chap. 3. .

Serapio en constitue plusieurs especes par le tesmoignage de Abobanasa, lequel dit. Le plus lou- able Agallochum est celuy qui est appelé Indum. . Et combien qu'il se trouue plusieurs especes d'Agallochum en Inde, il y en a toutesfois vni qui à particulièrement se nom Indum, pour ce que luy excède en bonté les autres especes d'Agallochum, tout ainsi qu'entre les Myrobolans les noirs qui sont les plus excellens sont appelés Inda. L'Agallochum Indum, se trouue en vne isle d'Inde de qui se nomme Fimua. Le meilleur est le noir, de diuerses couleurs, plein de ius, pesant, espes & solide, n'est blanchâtre, & lequel ne se brule facilement. Le second lieu en bonté à l'Agallochum Monduni ain- si surnomé de Mondel ville d'Inde. Le tiers est Seisi, lequel on cognoist n'estre guere inferieur en bonté aux autres, par ce que ietté en l'eau il ne nage pas dessus, mais il va incertainement au fond. De ce- ste sorte le meilleur est celuy qui est espes & bien plein d'humour. Le dernier lieu à celuy d'Alchu- meri, inferieur en bonté à celuy de Seisi, combien qu'il ne soit distant sinon trois iournees du lieu ou croist celuy de Seisi. Celuy est le meilleur qui est noir, non blanc, pesant, & qui resiste long temps à la flamme. Il dit tout le mesme de l'Autorité de Ghesalfetebeni, sinon qu'il adiouste qu'on dit que le bois d'Agallochum coupé ius de l'arbre est enseueilly sous la terre vn an de long, à fin qu'il aquire meilleure & plus plaisante odeur en laissant l'escorce rude derriere qui n'a nulle odeur. La quelle opinion confirme Simeon Sethi entre les Grecs plus recens, en adioustant la cause pour- quoy on l'enseueylt sous terre. Pour ce, dit il, qu'ilz n'estiment point qu'il deuiene odoriferant, s'il n'estoit vn peu au parauant amorty, & neust senty quelque peu de la verrouillure: Parquoy ceux du pais apres l'auoir coupé par tronçons le enseueillent sous terre, puis le tirent hors quand il est temps, & le vendent aux marchans.

Ce que Pline recite à la fin du chap. 4. du li. 12. où il dit que l'Ebene ne s'allume pas facilement par l'autorité de Fabianus: ioinct avec les passages allegués hors de Serapio, semble faire quelque chose pour l'opinion de ceux qui estiment le second Lignum Aloës estre Ebenus. Toutefois ie ne veux rien affirmer, ains me contente d'auoir seulement mis en auant l'opinion de quelques Gens doctes qui ont bon desir d'auancer auant qu'en eux est restu de la Medecine.

LE LIEU. Le Lignum Aloës se trouue en Inde & Arabie.

Agallochum prouient en Inde & Arabie. Ebenus en Ethiopie & Inde. Le Lignum Aloës est ame- né de Calecuth & d'Alexandrie, en Europe. LES NOMS. Arabiens disent Abobanasa. I

Ce Bois est selon l'opinion de plusieurs appelé en Grec *dy-Meyen*: des Modernes *dy-Meyen* en Latin *Agallochum*, d'aucuns & des Bontiques *Lignum Aloës*: des Arabes *Hoad*, Anglois, *Aigaloim*, ou *Agalugi*: en François Bois d'Aloës: en haut Aleman *Paradis holtz*, *Alors holtz*: en bas Aleman *Paradis hout* & *Lignum Alors*. LE TEMPERAMENT. Il est chaud & sec.

Il est chaud & sec au second degré selon l'humide & est participant de quelque astringence.

#### LES VERTUS ET OPERATIONS.

Agallochum espars par tout le corps, engarde de suer: on en vse comme dit Dioscoride, en per- sions au lieu d'Encens.

La racine d'iceuy beuf à la quantité d'une drachme, est bonne contre par trop grande humi- dité & debilité d'estomach, & oste la chaleur d'iceuy.

Il est bon de la boyre avec eau contre douleur de costé & de foye, & contre dysenterie & treq- chées de ventre.

Il ouure toutes obstructions, il serre le ventre, & ayde grandement contre difficulté d'vrine quand on ne peut passer sinon goutte à goutte qui prouient de froid & debilité de la vessie.

On le donne contre maladies du Cœur, pourtant le mesle on parmy tous medicaments cordials.

On s'en sert aussi en parfums, pour l'odeur gracieuse qu'il a.

Si la seconde espece est Ebenus, on en vse en parfums come de l'Agallochum, & broyé sur le por- phyre, on le mesle parmy collyres qui se font contre vlcères, cicatrices, pustules & fluxions des yeux.

### IV Des Racines aromatiques.

De Acorum. Chap. XXV.

#### LA FORME.

Acorum selon que dit Dioscoride, a les feuilles d'Iris, plus estroites & plus courtes: Il a les racines non guere differentes à Iris, replées, non droictes, mais comme toutes, estendues de long de la terre.

la terre, genoillées, blanchâtres, âcres au goust, & quelque peu ameres, d'odeur non inodore. Selon l'opinion des plus Dôctes modernes, la Racine qui est vulgairement appelée és boutiques *Calamus odoratus*, de laquelle on use journellement au lieu de *Calamus*, est le vray *Acorum* des Anciens car si nous l'examinons bien de pres, nous trouverons que toutes les notes que les Anciens attribuent à *Acorum*, se trouvent au *Calamus aromaticus* vulgaire. Dauantage le lieu de la naissance declare assez que nostre *Calamus* n'est autre chose qu'*Acorum* & non le *Calamus* des Anciens car il croist en abondance en Lituanië, & celle part de Tartarie qui est proche de Pontus, d'où on apportoit le meilleur *Acorum* du temps de Pline. Il a les fueilles pres semblables à Iris, la fleur aussi semblable, de couleur rouge en purpurée sans aucune diuersité & les tiges comme Iris, sinon quelles sont plus longues & plus grêles, sans qu'il porte aucun roseau, comme tesmoignent ceux qui l'ont par plusieurs fois veu.

Cette description du *Calamus vsuel*, declare assez que ce ne peut estre *Calamus odoratus* des Anciens, qui n'est pas vne racine, mais vn roseau fort genoillé, & qui se rompt par eschardes, qui a la fistule ou tuyau plein d'araignes, blanchâtre, lent au macher, & astringent, & amer avec quelque acrimonie, comme escrit Dioscorides; mais que c'est plus tost l'*Acorum* des Anciens, joint aussi que Theophraste & Pline ont dit, que le *Calamus odoratus* ne differe point en forme, de tout autre sorte de Roseau duquel il est vne espece, mais odoriferante.

Quant à la plante qu'on appelle vulgairement *Acorus*, laquelle croist és eaux, & lieux aquatiques à fleur iaulne & fueilles d'Iris, si en est parlé assez amplement au chap. XXXV. de la Seconde partie, ou le renouue le Lecteur.

## LE LIEU.

Le meilleur *Acorum* vient de Colchis en Pontus, & de Galatie. Il croist aussi en abondance en Lituanië du costé de Tartarie. Hermetolus Barbarus escrit que autour de Mexotis qui est vn lac venant tomber en la Mer de Pont il s'en trouue grande quantité, & est appelé de ceux du pais encore pour le iourd'huy *Acorum*.

## LES NOMS.

Cette racine est appelée en Grec *ἀκάρου* Latin *Acorum*, & *Acorus* de Pline; és Boutiques seulement *Calamus aromaticus*, car elles sont destituées du vray *Calamus*; en bas Aleman *Castmus*.

## LE TEMPERAMENT.

La racine d'*Acorum* est chaude & seche au tiers degré, & de parties subiles, se dit Galien.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A** La decoction de la racine d'*Acorum* pronouë l'vrine, & vaut contre difficulté d'vrine, & toutes maladies froides de la vesie.
- B** La racine est bonne contre douleur & affections du thorax, douleur de costé, & contre trenchées de ventre, & ouvre les oppilations du foye & de la ratelle.
- C** Iceelle beue avec hydromel, est vtile contre rampurs du dedans, & contre conuulsions & contractions de nerfs; & pareillement aux paralytiques qui ne se peuuent aucunement ayder de leurs membres.
- D** Elle profite grandement contre morsures de serpens, car elle attire à soy le venin & empêche qu'il ne penetre au cuer; pourtant la messe on aussi parmy les Antidotes, cesont Medecines qui se prennent contre venin.
- E** Elle efface toutes taches & macules des yeux, & est vilement adiolnée és collyres qui se font pour cela.
- F** Il est bon de se fomenten les genitoires de la decoction d'icelle faicte en vin, pour en oster l'encre fleur & toute tumeur.
- G** Elle esmeur les fleurs aux femmes si d'icelle elles se fomentent les parties, ou si elles en recoient la suinée par vne celle perçee.

## LE CHOYS.

La meilleure racine d'*Acorum* est celle qui est solide, blanche, plainne, non mengée de vermoullure, & qui est odoriferante & quelque peu amere.

## De Galanga. Chap. XXVI.

## LES ESPECES.

ON trouue és Boutiques deux sortes de Galanga, l'vne Grande & l'autre Petite.

## LA FORME.

La petite Galanga est vne racine petite, rougeâtre en purpurée dehors & dedans; genoillée, & nouëe, odoriferante, de goust fort acie, de sorte que machée elle brule la gorge comme Poyrè-

ou Gin-

ou Gingembre, de forme & d'odeur semblable au *Cyperus*: pourtant l'ont aucuns appelée *Cyperus Babylonicus*.

La grande Galanga est vne racine beaucoup plus grosse que l'autre, de la grosseur d'un pouce ou davantage, estant comme pleine de jointures par dehors & de couleur rouillatre comme la petite, mais plus blanche par dedens, & n'est pas de si bone odeur, ne si acre, ne si vertueuse que la Petite. On ne trouue pas par escrit quelles feuilles, quelles fleurs, ne quelle semence & racine ces plantes icy ont, parquoy nous n'en voulons dire autre chose.

## LE LIEV.

On les apporte de Syrie en Europe.

## LES NOMS.

La petite est tenue pour la Galanga que *Scrapio* décrit au *cha. 13. du livre 4.* & est appelée des Arabes *Gahngem* ou *Kahngem*: des Grecs plus nouveaux *γαγγύμα*: és Boutiques & du vulgaire *Galanga*: en haut Aleman *Gelgenturty*: en bas Aleman *Gelgant*.

La grande n'a pas de nom particulier, & n'est décrite des Arabes avec la Galanga dessusdite, mais a esté amenée long temps de puis, & reduite sous Galanga, laquelle à la difference de l'autre on a appelée *Galanga crassa*, & *Galanga maior*.

Quelques vns ont estimé que ce soit l'*Acorum* des Anciens: mais attendu qu'elle n'a nulles notes ou marques qui se puissent referer à *Acorum*, comme plusieurs Gets scauans ont bien au long écrit, en refusant par vives raisons & arguments indissolubles l'opinion de ceux qui l'ont tenue pour *Acorum*, il n'est à besoing de les repeter en cest endroit.

## LE TEMPERAMENT.

La Galanga est chaude & sèche iusques au tiers degré.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

La Galanga profite grandement aux estomachs humides, froids & pituiteux: elle fait faire digestion, recueille l'appetit, & chasse les ventosités, reduite en poudre & beuë avec vin, ou prise en autre maniere.

Elle est vtile contre la Colique, c'est douleur de ventre, à cause de la vertu qu'elle a de digerer les humeurs froids & pituiteux qui sont cause de la Colique.

Elle eschauffe les róngons refroidés: elle augmente la semence genitale, & incite à jeu d'amour quand on la tiendrait seulement en la bouche, & vaut contre toutes maladies froides.

Tenue en la bouche, elle fait bonne alciue & odoriferante: & conforte le cerueu & la memoire, appliquée és narilles.

On la boit vilement avec ius de Plantain contre palpitation & tremblement de cuer.

La Grande a la mesme faculté, mais elle est plus debile en toutes sortes.

## LE CHOYS.

La meilleure est celle qui est pesante, solide, bien rousse, odoriferante, & fort acre au goust.

## Du Gingembre. Chap. XXVII.

## LA FORME.

Gingembre, comme rapportent ceux qui ont esté és Indes, est vne herbe qui a moult de racines grandes & noüesées, se trainans sous la terre comme le Gramen, d'environ la grosseur d'un doigt, molles ou douces par dehors, & blanches par dedens, de bonne odeur, & de goust de Poivre. Les feuilles de Roscau, qui se meurent & renouellent trois ou quatre fois l'an, toutes fois celles d'enhaut ne sont point plus grandes que celles de Gramen: il se trouue aucunes fois entre les racines quelques vnes si tresgrandes qu'elles peüssent vne liure: Quand on les tire hors de terre, on laisse tousiours en terre vn neud de racine, à fin qu'il croisse, fessende, & produise d'autres racines pour l'autre année. Ceux du pais où il croist vnt des feuilles verdes en plusieurs choses, témoinsing *Diofcoride*, comme nous faisons icy de la R. en viandes & sauses.

## LE LIEV.

Le Gingembre croist en Arable, on l'apporte aussi de Calcutville tresrenommée d'Inde, non seulement sec, mais aussi confict tous verd, lequel est beaucoup meilleur que celuy qu'on confict sec en ce pais.

## LE TEMPS.

Il est temps de le cueillir quand les feuilles debienent seches: car sil est cueilli hors de saison il est subiect à vermoullisüre, & se corrompt facilement.

## LES NOMS.

Ceste racine est appelée en Grec *γινγίβρι*: en Latin *Zingiberis*: és Boutiques *Zinziber*: en François *Gingembre*: en haut Aleman *Jngber*: en bas Aleman *Gengederr*.

## LE TEMPERAMENT.

Le Gingembre est chaud au second degré, & quelque peu humide.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Le Gingembre est vne medecine singuliere pour l'estomach refroidi, car il reschauffe & confortte: il recueille l'appetit, il lache le ventre: il ayde à la cuisson des viandes, & coupe les grosses humeurs qui sont en l'estomach & es intestins.
- B A ce mesme vaut la racine d'iceluy conficte, prise du matin à ieu.
- C Il corrige toute humidité de l'estomach, & toute corruption qui seroit engendrée leans par auoir mengé des fruiets en trop grande abondance.
- D Iceluy conficte en syrop, ou en succe est vtile contre la toux, & refroidemens: il mondifie la poitrine & coupe & meurt le phlegme visqueux & lent.
- E Il est bon aussi de le mettre es collyres qui confortent la veue & esclarcissent les yeux, quand l'obscurité prouient d'humidité trop grande.
- F Il vaut contre obstructiōs de foye causées de refroidemēt & d'humidité, & cōsorte la memoire.
- G Il augmente la semence genitale, & incite au ieu d'amour. Pareillement on le mede vtilement par my tous medicamens qui se donnent contre venin & tout poison.
- H Brief le Gingembre reschauffe & est fort vtile prins en viandes: & donné avec medecines fortes & laxatiues, comme Colocinthe, Hermodattes & semblables, il corrige la malice d'icelles.

## De Zedoaria.

## Chap. XXVIII.

## LA FORME.

Zedoaria, selon que Serapio recite de l'autorité d'Isaac, est vne racine semblable à Aristolochia rotunda, de goüst & d'odeur de Zingiber, laquelle on apporte de Syrie.

Par ceste description on peut clairement voir, que le Zedoaria des Arabes est tout autre que ce luy duquel on vse communement es Boutiques, qui est vne racine longue vnie, blanche par dehors & quelque peu brunatre en roux par dedans, aromatique, amere, semblable en figure au Gingembre, & fort acre.

Or regardons maintenant si nous ne serions reduire le Zedoaria vulgaire sous la description de quelque plante cogne des Anciens. Guillaume Rondeler Docteur en Medecine tresrenomme, & Lecteur ordinaire en l'vniuersité de Montpellier est de ceste opinion, que ce soit la premiere espeece de Costus descrite par Dioscoride au premier liure; Et de fait si on l'examine de pres, on trouuera bien pres en ceste racine toutes les notes que Dioscoride attribue au Costus Arabicus, lequel il dit excéder toutes les autres espees en bonté, estre blanc, leger, de bonne odeur, puis apres. Le meilleur, dit il, est le plus nouveau, blanc, plein & solide, sec, non mengé, ny rongé de vermoullure, sans odeur ingrâte, de goüst chaud & acre. Chacq examine bien le Zedoaria vulgaire des Boutiques, & il trouuera à peu pres que toutes les notes cy amenees luy conuiennent tresbien. Encore y a il vne chose qui ayde beaucoup à l'opinion d'iceluy, c'est que Dioscoride attribue au Costus vertu de tuer & pouffer hors les vers du corps de la personne, ce qui est vne des principales vertus que lon trouue au Zedoaria vulgaire, comme mesme le comun peuple scait & l'experimente tous les iours. Ce que i'ay bien voulu icy annoter en brief à fin de ne frustrer personne de son labeur; laissant toutesfois vn chacun en iuger comme bon luy semblera, & reiecter ou approuer l'opinion d'iceluy.

## LE LIEU.

Le Zedoaria des Arabes est amené de Syrie: l'autre d'Arabie.

## LES NOMS.

La premiere racine qui est ronde est appelée des Arabes Zurrumb (combien que Serapio descric en core vn autre Zurrumb de quel il en fait vn arbre) des Grecs plus Modernes Zeduares es Boutiques de France aussi Zurrumb du nom Arabes: en bas Alemā Zeduar, sloch. On en trouue aucunesfois parmy le Zedoaria vulgaire, mais les Apothicaires ignorans le reiectent comme inutile, ne considerans que c'est le vray Zedoaria des Arabes.

La seconde racine qui est longue, est appelée es Boutiques & du vulgaire Zedoaria: & si c'est le Costus, en Grec κόστος, & en Grecien Latin Costus Arabicus.

## LE TEMPERAMENT.

Le vray Zedoaria est chaud & sec au second degré, & hautre pareillement.

## LES VERTVS ET OPERATIONS.

- A Zedoaria comme dit Mesue chasse les vérolitez, & engrede la personne qui en vse, par quelque propriété occulte qu'il a de ce faire.



Il oste la sorte aleine & mal plaisant e qui prouient d'auoir mengé aux oignons, ou d'auoir beu trop de vin.

Il digere & dissipe les grosses ventosités de l'estomach, & allège douleur Colicqueil refout tumeurs, principalement celles qui sont en la matrice.

Il engarde de vomir, il ferré le ventre, & est fort vtile contre morsures de Serpens, & resiste au venin: pourtant dit Auicéne qu'il n'est rien plus souverain contre le venin de Napellus, si par fortune on en auoit beu.

Si le Zedoaria vulgaire est Costus, il a vertu de prouoquer l'vrine, & les fleurs aux femmes. Il est vtile à tous accidens de la matrice soit par application, soit par fomentation, soit en parfum.

Il est vtile contre morsures de Viperes: contre douleur du thorax qui vient de cause froide beu avec vin & aloÿne, & contre inflations de l'estomach, & conuulsions causées par humeurs grosses & visqueuses.

Il tue les vers plats & larges, ce que fait aussi le Zedoaria vulgaire à quoy il est singulier.

On l'induit vtilement avec huile sur l'espine du dos quand les frissons commencent à venir, & contre resolutions de nerfs.

Il efface les taches de la face qui viennent du hale du Soleil, induit dessus avec eau & miel.

On le melle aussi parmy les Antidotés: & prins avec vin cuit, il incite auieu d'amour.

Dauantage on a trouué par experience que le Zedoaria vulgaire est fort singulier contre infection de l'air, & cõtre maladies contagieuses comme la peste: car tenue en la bouche il prelerue la persone d'estre frappé de telle maladie. Et quiconque apres auoir prins ceste racine en vinaigre pourra suer, sera incontinent deliuré de la peste.

## De Curcuma.

## Chap. XXIX.

## LA FORME.

CE que les Apothicaires appellent de non Bárbare Curcuma, sont racines de la lögueur & grosseur d'un petit doigt, semblables aux racines de Gingembre, mais iualnantes par dedans. Or si nous les venons bien à examiner, nous trouuerons que ce n'est autre chose que le Cypirus Indicus descript par Dioscoride au premier liure chap. 4. en ceste sorte. On dit qu'il croist en Inde vne autre sorte de Cypirus, semblable au Gingembre de façon, lequel maché iault comme Saffran, il est de goût amer: Toutes lesquelles notes se trouuent au Curcuma des Boutiques: car maché il teint en iaulne cõme Saffran, il est amer, on en vse encore à present es Depilatoires: brief, il n'y a note qui ne conuieue tresbien à la description de Dioscoride. Ce que tous les Scauís modernes ont bien obserué. La cause pour laquelle les Apothicaires appellent ceste racine Curcuma est amplement declarée par le trescauant Matthiolus es commentaires qu'il a escrit sur Dioscoride au chap. de Cypirus. Mais il est à noter, dit il, que ce n'est pas le Curcuma descript par l'Interprete de Serapio au lieu de Chelidonium: car il n'entend autre chose par Curcuma sinon le Chelidonium descript par Dioscoride. Parquoy on pourroit à bõ droit douter s'il y a faute ou de l'Interprete, ou de l'Auteur, attendu que Curcuma n'est vn vocable Arabe ne Grec. Car les Arabes appellent le Chelidonium Kauroch, parquoy il est tout certain que Curcuma se lit fausement au lieu de Kauroch. De là vient que les Medecins & Apothicaires du temps passé, qui n'auoient iamais prins garde à cela, se sont trompés: car ignorans, la racine de quelle plante estoit Cypirus Indica, ilz ont pensé que ce fut la racine de Chelidonium mais, pour la similitude du ius iaulne quelle rend & suyuant herreur de l'Interprete de Serapio, ilz ont appelé le Cypirus Indicus Curcuma: ce qui est facile à presumer par ce que Serapio au chap. de Cypirus suyuant Dioscoride fait aussi mention du Cypirus Indicus.

## LE LIEU.

Il prouient selon le dit de Dioscoride en Inde dont il a prins le furnom.

## LES NOMS.

Ceste racine est appelée en Grec *κάρυρις* ou *κάρυρον* en Latin Cypirus ou Cypirus Indicus: es Boutiques comme auons dit Curcuma.

## LE TEMPERAMENT ET VERTVS.

Nous ne trouuons en nul Auteur ancien le temperament ne les vertus de ceste racine, sinon en Dioscoride, lequel dit qu'il est amer, & a vertu de soudain desuier de poël le lieu sur lequel il est induit, ce qu'on a expérimenté aussi au Curcuma des Boutiques.

## De Doronicum.

## Chap. XXX.

## LA FORME.

DORONICUM selon Serapio est vide. Racine blanche par dedans, iualnante par dehors, bien pres de la grosseur d'un pouce, quelque peu dure, & pesante, laquelle est amenée de Syrie: car celle

qu'on ameine de là est la meilleure. Voyla la vraye description de Doronicum, & on ne trouue pas qu'autre Auteur en ayt escrit fors que Serapio entre les Anciens: car de ceux qui sont venus apres luy, l'un le décrit d'une forte, l'autre d'une autre.

Les Cordeliers, qui ont commenté sur l'Antidotaire de Mesue, descriuent deux fortes de Doronicum, vne laquelle ilz veulent ramener à celuy de Serapio, & vne autre laquelle ilz se disent auoir trouuée en quelques montaignes d'Italie, les racines de laquelle ressemblēt du tout au Doronicum apporté du Leuant, sinon que les racines de celuy d'Italie sont plus odoriferantes, & en les machant on trouue avec la douceur vne aromaticité delectable qui conforte grandement le cerueau & la teste, laquelle toutesfois on ne trouue pas en celles qui viennent d'Orient, parquoy ilz les preferent aussi à celles d'Orient. Il a les feuilles de Gyrosdier, vne seule tige pour la plus part, d'une coudee de haut ou dauantage, ronde, droite, laquelle au sommet se fend en plusieurs branchettes qui portent fleurs doubles, jaunes, plus grandes que celles de Bupthalmum. De l'autre forte ilz en parlent ainsi. Il se trouue dauantage aux champs d'alentour Verone vne racine fort petite, nō plus longue de la ioincture d'un pouce, non plus grosse d'un petit doigt, pesante, jaunatre par dehors blanche par dedans, douce, tirant sur le goust de Chastaigne, de forme non guere differente au Calamus aromaticus vulgaire, sans odeur, laquelle ceux de Venize appellent Dulcichinum, ceux de Verone Trasci ou Trasi. Elle porte feuilles de Froment ou de Cyperus, plus molles toutefois. Les enfans la mengent volontiers. Ceste racine est parauanture le vray Doronicum de Serapio: car nous pensons que d'icelle ont parlé Simō Ianuensis & Luminare mais. Voila ce quen ont escrit les Cordeliers: & pour ce que ie n'ay point veu les Plantes qu'ilz descriuent n'en scauroye que pronocer.

Les Apothicaires de France ont bien vn autre Doronicum q̄ la description des dessus allegués ne porte: Car comme ie l'ay souuent veu croistre en leurs iardins. Il a les feuilles larges d'une paulme ou dauantage bien pres rōdes, cinq, ou six fortans d'une racine, lesquelles sont quelque peu houlues, du milieu desquelles sort vne tige droite, rōde, quelque peu aussi houlue, le log de laquelle sont semées en quelques endroits des feuilles semblables, mais beaucoup plus petites, ayans le pedicule fort court, par lequel elles sont attachées à la tige: au sommet la tige se diuise en trois ou quatre branchettes, à l'extremité desquelles croist sur chacune vne fleur double, jaune, semblable à la Soufie, ou Pissenlit. La racine est aucunesfois de la grosseur du bout du petit doigt, de la longueur de l'extreme ioincture d'iceluy, ayant d'un costé & d'autre des marques come de ioinctures, ou genoux, de couleur blanchatre quand elle est nouvelle, & cōme trāsparente, & quand elle est seche jaunatre par dehors & blanchatre par dedens, de saueur douce. Lesquelles notes ie trouue aussi es racines que lon vend es Boutiques de ce pais sous le nom de Doronicum Romanum, & desquelles ilz vsent iournellement pour iceluy.

Me trouuant vn iour es Alpes de Saouye ou i'estoye allé pour chercher des herbes ie trouuay au pendant d'une montaigne en lieux ombrageux le Lycoctonon Pōticum à fleurs palles en grande quantité, & tout ioignant iceluy vne herbe, qui de prime face me remit en memoire la plante que i'auoye veu en France plantée es iardins des Apothicaires pour Doronicum Romanum, & l'ayant bien considerée, ie veis que c'estoit la mesme. Or pour ce que ie l'auoye trouuée entre l'Aconitum Lycoctonum & que le lieu ou elle croissoit de soy mesme au sauuage, n'estoyēt que pierres & rochers, ie veins à douter si ce ne seroyt pas l'Aconitum Pardalianches décrit par les Anciens. Mais quoy l'ayant diligemment considerée avec la description qu'en baille Dioscoride, & puis apres avec ce quen disent Theophraste & Pline, certes ie trouuay qu'elle conuenoit grandement à la description qu'il en baillet. Toutefois pour ce que ie ne veux icy rien arrester de certain, mais seulement proposer les choses par maniere de dispute, me semble que ne seroye pas mal si ramenoie les descriptions de l'Aconitum Pardalianches hors des Auteurs anciens, & si quant & quant ie bailloie le pourtrait de l'Herbe que ie trouuay es dites montaignes, & que plusieurs Apothicaires tiennent pour Doronicum Romanum, à fin que chacun puisse conferer l'un costé l'autre, & apres les auoir bien examinés, puis apres en dire son opinion. Venons donc premier à Dioscoride lequel décrit ainsi son Aconitum Pardalianches au li. 4. chap. 66. Aconitum, qu'aucuns appellent Pardalianches aucuns Cammoron, aucuns Telyphonon, aucuns Myoctonon, les autres Theriophonon: a trois ou quatre feuilles semblables à celles de Cyclaminus, ou bien du Concombre, plus petites toutes fois & quelque peu houlues & apres: la tige d'une paulme de long. La racine ressemble à la queue d'un Scorpion, & est claire comme Albastre. Laquelle description voulant représenter Marthioli, il nous a donné le pourtrait d'une herbe forgée plustost selon sa fantasie, que croissant de tel le forte qu'il la represente.

Theophraste au li. 9. de son histoire ch. 19. le décrit en ceste sorte. Telyphonon, qu'aucuns appellent Scorpion, à cause qu'il a la racine semblable au scorpion, mis contre le scorpion, on dit qu'il le rend

fans vertu & comme mort, & qu'il se reueille, & reprend vigueur si on le touche de la racine d'Hel le bore blanc. Il tue aussi toutes bestes à quatre pieds comme beufs, vaches, ouailles & cheuaux, en vn iour, si on applique la racine d'iceluy sur leurs genitoires: & beu, il prouffite contre piqures de Scorpions. Il a les fueilles semblables à Cyclaminus: la racine (comme auons dit dessus) semblable au Scorpion, & se coule sous terre en maniere de Gramé & est genoillée: il ayme lieux ombrageux.

Pline aussi apres auoir disputé de la vertu d'iceluy au chap. 21. du li. 17. il en baille la description au Chap. ensuyuant. Il a les fueilles semblables à Cyclaminus ou au Concombre, non pas plus de quatre venans d'vne racine, puelque peu houlues. La racine est petite, semblable à Câmarus ( qui est vne petite sorte d'Escreuice qu'on appelle communement en Languedoc Ciuae, en Auuers *Crabben*, grosse comme le bout du petit doigt.) Pourtant l'ont appelle aucuns Cammaron, aucuns Thelyphonon pour ce qu'il tue les bestes, principalement les femelles, au iour mesme: La racine est quelque peu courbee en forme de Scorpion, pourtant l'ont aucuns appelée Scorio. Aucuns Myoctonon à cause que par son odeur il tue les Souris de bien loing. Par laquelle description de Pline il semble que celle de Dioscoride est corrompue, & que au lieu de Cammaron, on doit lire Cammaron avec Pline ce que j'ay bien icy voulu annoter en passant à fin de baille r occasion au Lecteur d'y penser plus auant.

Maintenant venons à examiner la plante icy representée, par le menu, pour voir si elle n'approche point grandement à l'Aconitum décrit par les Anciens:

Premierement ceste Plante a les fueilles semblables à celles de Cyclaminus, plus grâdes toutefois & bié pres du tout semblables aux fueilles du Concombre sauvage, sinon qu'elles sont plus petites, non si tres frudes (houffues toutefois) ne si blâches, mais plus tost verdes, trois ou quatre fortans d'vne racine, aucunefois d'auantage, d'entre le milieu des quelles sort la tige d'vn grand pied de haut, principalement en lieux froids & fort ombrageux comme là ou j'ay trouué celle icy, ayant quelques fueil lettes semées par la tige, plus petites beaucoup que les autres, & ioinctes tout pres de la tige, comme la figure le demôstre, laquelle se fend au sommet en trois ou quatre branchettes qui portent chacune vne fleur iulne & double côme le Bupthalmum, Soufie, ou Pissenlît. La racine est petite, du tout semblable à celle que lon trouue es Boutiques sous le nom de *Doronicum Romanum*, blancheatre quand elle est nouvelle, & comme transparente, courbe en forme de ceste petite escreuice dessus mentionée, comme dit Pline, & distinguée comme par ioinctu ré, ainsi que lon voit sur le dos des Scorpions ou des tiges escreuices, & ayant petites racines fibreuses à costé qui ressemblent proprement aux pieds pendis du Scorio ou du Câmarus: & ce que faut noter on trouue aucunefois trois ou quatre de ces racines tenans ensemble par longues queues de forte qu'elles s'estendent bien loing, tout ainsi que le Gramé, ce que Theophraste a bié annoté quand il dict *Nascitur gramini modo, & geniculis constat*. El le croist en lieux ombrageux, entre les pierres nues sans auoir nourrissentment quelconque de terre, de sorte que la trouuant ainsi, il me touuenoit du pais sage de Pline au lieu dessus allegué qui dit, *Nascitur nudis cauisibus, quas acotas nominant (& ideo Aconitum aliqui dixere) nullo iuxta, ne puluere quidem nutritie: c'est à dire. Il croist es rochers nus, lesquels sapellent Acone (pourtant l'ont aucuns appelé Aconitum) sans auoir nourrissentment quelconque, non pas feu'ement de la terre. Et de ce que dit Ouide au 7. liure de sa Metamorphose:*

*Que, quis nascuntur dura vincosa cauce,*

*Agrestes Aconita vocant.*



Il croist es rochers nus, lesquels sapellent Acone (pourtant l'ont aucuns appelé Aconitum) sans auoir nourrissentment quelconque, non pas feu'ement de la terre. Et de ce que dit Ouide au 7. liure de sa Metamorphose:

Se trouuans donques toutes les notes descrites par les Anciens au chap. d'Aconitum en ceste Plante icy, il ne reste seulement que les Gens scauans en donnent leur iugement, ou qu'ilz trouuent que les raisons par moy amenees ne soient assez suffisantes, qu'ilz la reduisent sous quel chapitre bon leur semblera.

## LE LIEU.

Doronicum selon Serapio croist en Sin, qui est Syrie comme interprete le Pandecriarius. La plante icy representee ne se trouue croistre de soy mesme sinon en lieux ombrageux & entre les rochers: il s'en trouue aucunes fois de plantee es iardins de quelques Apothicaires de France.

## LE TEMPS.

Ceste plante fleurit au mois de Iuin, & la tige stérile, elle rejette de nouvelles feuilles.

## LES NOMS.

La racine descrite par Serapio est appelée des Medecins Arabes *Haronigi*, *Doronigi*, ou *Durungin*: incogne es Boutiques.

L'autre de laquelle nous baillons la figure est appelée es Boutiques *Doronicum Romanum*, & la tiennent pour chose cordiale, toutesfois si c'est celle que nous presumons, ilz s'abusent grandement, & ne baillent pas seulement *Opium pro Apio*, comme on dit communement, mais vne medecine tresdangereuse & mortifere au lieu d'une bonne & salutaire, qui n'est pas vn petit abus. Elle se nomme roit en Grec *ἀκόνιτιον παραδολιχίσι, μοκράτιον, θαλάσσιον, και κάμαρον*: en Latin *Aconitum Pardalichense, Myosotonum, Thelyphorum, Cammaron*, ou selon que dit Pline *Cammaron*.

## LA CAUSE DV NOM.

Si la plante icy representee est *Aconitum*, elle a prins son nom d'un village appelé *Aconi* là ou elle croist en abondance: ou comme dit Pline, pour ce qu'elle croist es rochers: ou qu'il ne se trouue point de poudre ou terre auzes, car *κόνις* en Grec signifie poudre: ou bien qu'elle a telle vertu soudaine à faire mourir la personne comme la pierre de queux a d'aguaiser le fer.

Les Poëtes ont aussi faict qu'il est creu premierement de l'escume de Cerberus chien infernal quand Hercules l'emmena hors d'enfer, & que pourtaut en Heracles Pontica (là ou ilz disent estre la descente aux enfers) il y en croist en abondance.

## LE TEMPERAMENT.

Serapio escrit que *Doronicum* est chaud & sec au tiers degré, ce qui ne se trouue au *Doronicum* des Boutiques, mais il y a sans plusvne douceur sans acrimonie, ou s'il y en a, elle est si debile, qu'on ne la sent guere: parquoy elle n'a garde de paruenir iusques au tiers degré, qui est vne note assez manifeste, pour donner à cognoistre, que le *Doronicum Romanum* des Boutiques, ne peut estre celuy que Serapio descrit.

La plante icy representee a la saveur douce ne plus ne moins que le *Doronicum Romanum* des Boutiques.

## LES VERTUS ET OPERATIONS.

- A Le *Doronicum* des Arabes chasse & dissipe toutes ventosités & inflations des parties interieures, & principalement de la matrice, il conforte le cueur, & est fort singulier contre battemens, & de failllemens d'iceluy.
- B Il est fort bon contre tout venin, & cõtre morsures & piqures de serps & de toutes bestes venimeuses, prins par dedis, ou appliqué par dehors sur les morsures en forme d'emplastre avec figues.
- C Si la plante icy representee est l'*Aconitum*, elle n'a nulle faculté conuenable à la personne, mais au cõtraire elle est tresnuisible. Mais pour ce que (comme dit Pline) il ne se trouue nulle chose mauuaise qui ne soit participante de quelque bien, On le mesle parmy les medecines des yeux pour donner allegeance à la douleur d'iceux.
- D Dauantage prins en vin il est utile contre piqures de Scorpion.

## LES NVISANCES.

Atten du toutesfois qu'il a beaucoup plus grãde vertu de nuire que profiter, il vaut mieux s'en abstenir: car le profit qu'il ameine n'est pas si grand qu'il se faille beaucoup auenturer à le prendre dedans le corps. Il est de telle nature, comme dit Pline, prins par dedens, qu'il tue la personne, si ce n'est qu'il trouue en l'homme ce qu'il puisse tuer: car adonc avec cela seul s'attache il, comme ayant trouue son pareil, & se combat contre le venin là trouue: & qui est chose merueilleuse, deux choses tresnuisibles à l'homme & trespernicieuses meurent en l'homme, icy demourant sauue. Le reste des nuissances est assez amplement traité au Tiers liure de l'Histoire des Plantes Chap. LXXVII.

**Index Græcorum nominum quibus Veteres  
& Viri docti in stirpium herbarumq; appella-  
tionibus vtuntur.**

Αβρότονου 2	ἀβρότονου ἄρβυ 2	ἀκάρου 578	ἀκάρου 149	Βαλαύστου 495
Αβρότονου δίκυ 2	ἀβρότονου δίκυ 2	ἀκνή 257	ἀκνή 468	Βαλλωθῆ 181
Αβρότονου σκυλαύστου 2	ἀβρότονου σκυλαύστου 2	ἀκρίνα 400	ἀκρίνα 370	Βατραχίου 286, 287
ἀβροθῶ 2	ἀβροθῶ 2	ἀκτακτοφύλον 354	ἀκτακτοφύλον 499	Βεῖτα 462
ἀβροθῶ δ' αἵμου 209	ἀβροθῶ δ' αἵμου 209	ἀλάκτα 405	ἀπία 214-499	βότα 463
ἀβροθῶ 577	ἀβροθῶ 577	ἀλαθικῶν ibid.	ἀπολλυνίαιος 306	βότα δ' αἵα 463
ἀβροθῶ 545	ἀβροθῶ 545	ἐλικάκτου 304	ἀρακῶ 326	βότα ἑλλου 554
ἀβροθῶ 68, 176	ἀβροθῶ 68, 176	ἐλίμ 397	ἀρακῶ 330	βουνοῦ 20, 117
ἀβροθῶ φώτις 177	ἀβροθῶ φώτις 177	ἀκτα 404	ἀρθμιστῶ λυτῶφυλ- λος 12	βίχου 35
ἀβροθῶ 484	ἀβροθῶ 484	ἀκταβιάνου 7	ἀρθμιστῶ μονίλου 14	βίχου 330
ἀβροθῶ 491	ἀβροθῶ 491	ἀκταβιάνου 518	ἀρθμιστῶ 119	βίχου 335
ἀβροθῶ 518	ἀβροθῶ 518	ἀκταβιάνου 381	ἀρθμιστῶ 403	βίχου 375
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 439	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 439	ἀκταβιάνου 239	ἀρθμιστῶ 212	βίχου δ' ὀδύμου 449
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 506	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 506	ἀκταβιάνου 40	ἀρθμιστῶ 415	βίχου 149
ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀκταβιάνου 81	ἀρθμιστῶ 415	βίχου 170
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 361	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 361	ἀκταβιάνου 15, 165	ἀρθμιστῶ 11	βουκῶνου 28
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 167	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 167	ἀκταβιάνου 392	ἀρθμιστῶ 536	βουκῶνου 9
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 432	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 432	ἀκταβιάνου 551	ἀρθμιστῶ 400	βουκῶνου 123
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 345	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 345	ἀκταβιάνου 564	ἀρθμιστῶ 478	βουκῶνου 359
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 149	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 149	ἀκταβιάνου 160, 455	ἀρθμιστῶ 218	βουκῶνου 347
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 484	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 484	ἀκταβιάνου 415	ἀρθμιστῶ 70	βουκῶνου 139, 141
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 6	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 6	ἀκταβιάνου 259	ἀρθμιστῶ 501	βουκῶνου 141
ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀκταβιάνου 415	ἀρθμιστῶ 215	βουκῶνου 505
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 179	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 179	ἀκταβιάνου 445	ἀρθμιστῶ 214	βουκῶνου 538
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 87	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 87	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 49	βουκῶνου 511
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 87	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 87	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 346
ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 346
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 118	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 118	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 272, 282
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 577	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 577	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 283
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 321	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 321	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 437
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 265	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 265	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 259
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 317	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 317	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 272, 282
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 518	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 518	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 283
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 95	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 95	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 437
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 120	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 120	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 259
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 320	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 320	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 272, 282
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 480	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 480	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 283
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 98	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 98	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 437
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 163	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 163	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 259
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 165	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 165	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 272, 282
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 361	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 361	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 283
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 362	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 362	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 437
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 365	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 365	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 259
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 362	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 362	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 272, 282
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 536	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 536	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 283
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 170	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 170	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 437
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 291	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 291	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 259
ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 272, 282
ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀβροθῶ ἀβροθῶ ibid.	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 283
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 289, 384	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 289, 384	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 437
ἀβροθῶ ἀβροθῶ 170	ἀβροθῶ ἀβροθῶ 170	ἀκταβιάνου 498	ἀρθμιστῶ 429	βουκῶνου 259

# Index.

γαλυκίτικος	270	ελαβερή	235	επαύριον	45	κάλαμος φραγματίας	ib.	
γαλυκίτικον	ibid.	ελαβερ@ λυκός	134	εραβίλιον	109	καμάριον	147	
γαλυκισίδη	227	ελαβερ@ μίλας	237	εραβίλιον	137	καμάριον	75	
γαλυκισίς	ibid.	ελεγκ	39	εραβίλιον	391	κάλαμου	302	
γαλακτίον	68	ελεγκιασάμπυλος	267	εραβίλιον	357	καμάριον	279	
γαλακτίον	411	ελεγκ	318	εραβίλιον	338 9	καλαμιάριον	265	
γαλακτίον	ibid.	ελεγκ	304	εραβίλιον	247	καμμορον	289, 584	
γαλακτίον	413	επατίτις	265	εραβίλιον	127	καμμορον	198	
γαλακτίον	205	επατίτις	262	εραβίλιον	328	καμμορον	55	
γαλακτίον	200	επατίτις	81	εραβίλιον	457	καπνίτις	28	
γαλακτίον	476	επατίτις	501	εραβίλιον	ibid.	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	542	επατίτις	235	εραβίλιον	509	καπνός φραγματίας	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	473	εραβίλιον	273	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	70	εραβίλιον	289, 584	καπνός	476	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	64, 210	εραβίλιον	7	καπνός	439	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	327	εραβίλιον	390, 396	καπνός	414	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	475	εραβίλιον	395	καπνός	572	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	390	καπνός	193	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	320	καπνός	265	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	518	καπνός	512	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	ibid.	καπνός	515	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	162	καπνός	513	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	250	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	162	καπνός	155	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	439	καπνός	572	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	96	καπνός	520	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	390	καπνός	570	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	ibid.	καπνός	272	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	ibid.	καπνός	512	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	119	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	355	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	524	καπνός	348	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	111	καπνός	415	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	ibid.	καπνός	517	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	473	καπνός	198	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	384	καπνός	442	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	422	καπνός	537	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	76	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	77	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	143	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	32	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	372	καπνός	315	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	303	καπνός	220	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	114, 364	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	522	καπνός	508	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	222	καπνός	ibid.	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	K.	καπνός	519	
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	555	καπνός	519
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	198	καπνός	205, 450
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	540	καπνός	458
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	353	καπνός	162
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	174	καπνός	523
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	352	καπνός	399
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	353	καπνός	461
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	352	καπνός	569
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	351	καπνός	240
γαλακτίον	ibid.	επατίτις	ibid.	εραβίλιον	Καμάριον	ibid.	καπνός	392

# Index.

κίσσιον	461	κράμβη λιλία	380	λειμίσταρον	465	μάσπετον	501
κισσινίδιον	222	κράνιον	509	λίθειον	147-149	μαστίχη	548
κισσαρον	461	κραταπόγονον	347	λεϊθύμ	280	μίστικα	343
κιάκαρος	263	κραταπότου	ibid.	λίκνυθ	325	μαχαρανιον	145
κίσταυ	214-212	κραταπίος	ibid.	λειπτεπίδιον	106	μίον	226
κίσταθ	263	κρίδιον	398	λεπίδιον	419-440	μολαμπίδιον	237
κισσοφύλλον	214-222	κρίθι	315	λεπτοκαρυον	515	μολαμπυρον	122
κίτος	461	κρίθιον	398	λευκόκαυθια	364	μολαμφύλλον	362
κνύφρον	388-392	κράσανθιον	147	λυκαείδιον	137	μολοδιον	196
κλήθρα	51	κρήνον	ibid.	λύκικ	527	μολοδύβηξ	237
κλιματίς ἔτρα	262	κρήνον πύρφουρον	ibi.	λυκούριον	114-151	μολον πίπτερι	443
κλιματίς δαφνοειδής	fol. 26.	κρήνον	391	λυκόν πίπτερι	443	μολύτα	359
κλιματίτις	165	κροκοφύλλον	359	λύδον	461	μολία	525
κλιποπίδιον	166	κρόκος εστιακίμων	466	λίβανος	543-551	μολύτωτος	341
κλίφαρον	350-359	κρούως	322	λιβανωτίς	198	μολύνθ	318
κλιφίτες κίκκος	355	κρότον	240	λιβανωτίς σιφανωματι		μολοσόφυλλον	183
κρίθι	98	κυκλάμιος	222	κί 185		μολιφύλλον	183
κρίθιον	343	κυκλάμιον ἔτρα	fol. 222-262	λιβανωτός	551	μολιούλον	511
κρίθ	26	κυβέλιον	30	λιβανωτός φλοιός	ibid.	μολιούλον	ibid.
κρίκον ἄγρια	366	κύνου ἄγριου	194	λίθυσκόν	206	μολοπίθ	501
κρίστις	528	κύνου ἡμίρου	193	λίθυσκόν	ibid.	μολιθία	342-343
κρυκάλος	542	κυνισθίμιος	119	λίθυσκόν	205	μολοπία	293
κρυμυθία	505	κύνου	360	λίθυσκόν ἄγρια	60	μολοπία ἄγρια	ibid.
κρυμυθία ἄγρια	506	κύνου	90	λίθυσκόν	54	μολοπία κρητιτίσ	295
κρυμυθία	505	κύνου τοσία	139	λίθυσκόν	337	μολοπία βίαις	ibid.
κρυμυθία ἄγρια	ibid.	κύνου λωσάνου	8	λόβος	323	μολοπία ἀρωματικῆ	498
κρίκ	243	κύνου λωσάνου	ibid.	λογγίτις τραχία	277	μολοπία μολυθία	499
κρίκον κριθίσις	250	κύνου ἔλαιον	355	λόπιμα	512	μολοπία	492
κροκοκίτον	218	κυνεκράμβη	60	λόπιθ	484	μολοπία ἀρωματικῆ	498
κροκοκίθια	409	κυνεκίθιον	291	λύκικον	490	μολοπία κρητιτίσ	496
κροκοκίθια ἄγρια	254	κύνου ἡμίρου	355	λυκακίτον	291	μολοπία μολυθία	495
κροκοκίθια ἰσόδιμος fo. 409		κύνου ἡμίρου	355	λυκακίτον ποικίλον	ibid.	μολοπία πικρῆ	497
κροκοκίθια	254	κύνου ἡμίρου	458	λυκακίτον	283	μολοπία κρητιτίσ	495
κροκοκίθια	516	κύνου ἡμίρου	459	λύκικ	418	μολοπία κρητιτίσ	496
κροκοκίθια	518	κύνου ἡμίρου	476-489	λυκακίτον	57	μολοπία πικρῆ	497
κροκοκίθια	528	κύνου ἡμίρου	155	λύτρον	ibid.	μολοπία κρητιτίσ	405-408
κροκοκίθια	248	κύνου ἡμίρου	199	λυχνίς	459	μολυθία	172
κροκοκίθια	511	κύνου ἡμίρου	39	λυχνίς ἄγρια	119	μολυθία	343
κροκοκίθια	124	κύνου ἡμίρου	233	λυχνίς σιφανωματικῆ		μολυθία	267
κροκοκίθια	392	κύνου ἡμίρου	181	fol. 118		μολυθία τραχία	268
κροκοκίθια	28	κύνου ἡμίρου	495	λυχνίτις	130	μολοπία	540
κροκοκίθια	551	κύνου ἡμίρου	461	λατῆς	511	μολοπία	501
κροκοκίθια	194	κύνου ἡμίρου	558	λατῆς ἡμίρου	339	μολοπία	ibid.
κροκοκίθια	ibid.	κύνου ἡμίρου	107	Μ		μολοπία	ibid.
κροκοκίθια	257	κύνου ἡμίρου	542	Μαγνύθια	561	μολοπία	462
κροκοκίθια	72	κύνου ἡμίρου	344	μάκικ	515	μολοπία	fol. 463
κροκοκίθια	580	κύνου ἡμίρου	461	μακρόν πίπτερι	443	μολοπία	513
κροκοκίθια	518	κύνου ἡμίρου	ibid.	μολοπία	189	μολοπία	337
κροκοκίθια	30	κύνου ἡμίρου	245	μολοπία κρητιτίσ	267	μολοπία	429-472
κροκοκίθια	ibid.	κύνου ἡμίρου	326	μολοπία	401	μολοπία	437
κροκοκίθια	180	κύνου ἡμίρου	385	μολοπία ἄγρια	401-403	μολοπία	506
κροκοκίθια	ibid.	κύνου ἡμίρου	384	μολοπία κρητιτίσ	401	μολοπία	ibid.
κροκοκίθια	381	κύνου ἡμίρου	ibid.	μολοπία κρητιτίσ	296	μολοπία	ibid.
κροκοκίθια	268	κύνου ἡμίρου	ibid.	μολοπία κρητιτίσ	189	μολοπία	289-384
		κύνου ἡμίρου	555	μολοπία	165	μολοπία	437
		κύνου ἡμίρου		μολοπία		μολοπία	73
		κύνου ἡμίρου		μολοπία		μολοπία	DD ij

# Index.

μυός ἔγρθε	73	ὀποπόναξ	560	πίρσιον	304	πυροσκόπια	368
μυός ὄτα	42	ὀπός κρεθναίος	561	πιτρωτίης	16	πυροσφαιρῶν	320
μυρῖκα	474	ὀπός μυθικός	ibid.	πιτρωσίλιον	421	πυρίνα	489
μυρσίφυλλον	81	ὀπός σκαγαπῆ	563	πιτρωσίλιον μακίδου	421	πύρινον	230
μυροβόλινα	574	ὀπός σφιστικός	565	πικρα	421	πυρίτης	230
μυρῖα	427	ὀρεσφύλια	528	πικριδίου	209	πυρίτης	309
μυρῖβίς	ibid.	ὀρεσίλιον	421	πίτυς	541	πυρίτου	230
μυρσίση	481	ὀρηγῶναι	167	πίτυς ἀγρία	ibid.	πυρῖν	489
μυρσίση ἀγρία	471	ὀρίση	ibid.	πίτυς ἡμερῶν	ibid.	Ρ	22
μυρσάκασθα	472	ῥοι.	ibid.	πίτυς ἰδία	542	ῤ	488
μυλῶν	349	ὀρίση	ibid.	πίτυς παρὰ λῆαν	ibid.	ῤα	22
<b>Ν</b>	224	ὀρμιον	180	πῆγαρον	184	ῤαφανίς	414
Νάρκη	149	ὀρεσθόγαλον	451	πῆγαρον ἀγριον	184	ῤαφανίς ἡμερῶν	415
Νάρκη	149	ὀρεσθόδιον	333	πῆγαρον κληπτον	ibi.	ῤαφανίς	415
νάς	352	ὀρεσθόχμη	465	πηνάτιζαρον	234	ῤαφανίς ἀγρία	414
νίφριον	418	ὀρεσθόχμη	327	πῆστις	293	ῤαφῶν 221. ῤητιν	543
νίφριον	292	ὀρεσθόχμη	339	πικριδίου	387	ῤητιν ἑλατίνη	545
νίφρις	ibid.	ὀρεσθόχμη	334	πικριδίου	388-390	ῤητιν καλοφραγία	543
νυμφαία	135	ὀρεσθόχμη	155	πίσημ	545	ῤητιν λαρκίνη	545
νυμφαία ἡγρία	273	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ	343	ῤητιν ῤαφῶν	543
νύμφιον	11	ὀρεσθόχμη	465	πίσημ	ibid.	ῤητιν ῤαφῶν	ibi.
νύμφιον	149	ὀρεσθόχμη	61	πίσημ ἡγρία	ibid.	ῤητιν πικρῆ	ibid.
νύμφιον	145	ὀρεσθόχμη	510	πίσημ ἡγρία	515	ῤητιν σφοδρῆ	ibid.
νύμφιον	577	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ ἡγρία	212	ῤητιν ῤαφῶν	548
νύμφιον	476	ὀρεσθόχμη	355	πίσημ ἡγρία	244	ῤητιν τριμυθῆ	547
νύμφιον	145	ὀρεσθόχμη	31	πίσημ ἡγρία	543	ῤητιν ἡγρία	545
νύμφιον	510	ὀρεσθόχμη	418	πίσημ ἡγρία	531	ῤητιν ἡγρία	495
νύμφιον	351	ὀρεσθόχμη	103	πίσημ ἡγρία	199	ῤητιν ἡγρία	230
νύμφιον	455	ὀρεσθόχμη	418	πίσημ ἡγρία	233	ῤητιν ἡγρία	292
νύμφιον	169	ὀρεσθόχμη	445	πίσημ ἡγρία	164	ῤητιν ἡγρία	292
νύμφιον	20, 335	ὀρεσθόχμη	355	πίσημ ἡγρία	164	ῤητιν ἡγρία	458
νύμφιον	169	ὀρεσθόχμη	451	πίσημ ἡγρία	288	ῤητιν ἡγρία	495
νύμφιον	351	ὀρεσθόχμη	361	πίσημ ἡγρία	38	ῤητιν ἡγρία	485
νύμφιον	503	ὀρεσθόχμη	227	πίσημ ἡγρία	78-364	ῤητιν ἡγρία	ibid.
νύμφιον	311	ὀρεσθόχμη	543	πίσημ ἡγρία	74	ῤητιν ἡγρία	ibid.
νύμφιον	455	ὀρεσθόχμη	560	πίσημ ἡγρία	ibid.	ῤητιν ἡγρία	ibid.
νύμφιον	370	ὀρεσθόχμη	560	πίσημ ἡγρία	75	ῤητιν ἡγρία	562
νύμφιον	111, 332	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ ἡγρία	ibid.	ῤητιν ἡγρία	380
νύμφιον	359	ὀρεσθόχμη	351	πίσημ ἡγρία	70	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	490	ὀρεσθόχμη	14, 60	πίσημ ἡγρία	274	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	458	ὀρεσθόχμη	355	πίσημ ἡγρία	212, 237	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	468	ὀρεσθόχμη	334	πίσημ ἡγρία	315	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	384	ὀρεσθόχμη	304	πίσημ ἡγρία	279	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	489	ὀρεσθόχμη	70	πίσημ ἡγρία	80	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	ibid.	ὀρεσθόχμη	63	πίσημ ἡγρία	181	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	337	ὀρεσθόχμη	227	πίσημ ἡγρία	447	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	384	ὀρεσθόχμη	443	πίσημ ἡγρία	447	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	472	ὀρεσθόχμη	246	πίσημ ἡγρία	70	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	491	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ ἡγρία	237	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	344	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ ἡγρία	11	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	351	ὀρεσθόχμη	407	πίσημ ἡγρία	528	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	293	ὀρεσθόχμη	39	πίσημ ἡγρία	273	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	343	ὀρεσθόχμη	265	πίσημ ἡγρία	278	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	ibid.	ὀρεσθόχμη	96	πίσημ ἡγρία	273	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	510	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ ἡγρία	92	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	293	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ ἡγρία	368	ῤητιν ἡγρία	575
νύμφιον	293	ὀρεσθόχμη	ibid.	πίσημ ἡγρία	490	ῤητιν ἡγρία	575



σίσιλι	274	γαλιωτάκων	571	τραγέαινα	367, 368	φλίξ	112
fol.	199	ζαχάριος	571	τραγίου	231, 176	φοινικόβλαστος	317
σίσιλι πύλοπαιστικόν		ζαχών	181	τραγύνατον	119	Φοινίξ	349, 317
ibid.		ζαφές ἀγρία	252	τραγύνου	88	Φε	229
σινυλαμαλάχη	381	ζαφάλοι	417	τραγυπότον	124	Φε ἀγριον	229
σύνλου	377	ζαφάλη	418	τραγυρήσιος	168	φύλλιτις	276
σινυλίτης	103	ζαφάλη	417	τραγυρής	155	φύλλου	364
σημίνα	533	ζαφάλη	417	τραγύ	88	φύκος	283
σηκία	507	ζαφάλοδένδρον	516	τραγυόσφοι	319	φυσάλις	302
σηκίαιος	309	σηράβρον	87	τραγυλίον	118	<b>Χ</b>	
σιδερήτις	100	σησας	187	τριβάλου	369	Χαλδία	563
σίδηρον	495	σησας	ibid.	τριβαλι	87	Χαμαίωκτη	258
σικνοπέπων	407	σηστιάτης	109	τριβαλι	301	Χαμαϊβάλατος	214, 336
σίκος	408	σηστιάτης	109	τριβαλι	301	Χαμαϊβάτος	462
σίκος ἀγριος	233	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάφνη	26
σίκος ήμας	405	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδρος	20
σίλφιον	361	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδρασος	508
σίηπι	430	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	264, 267
σίηπι ἀγριον	430, 437	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	23
σίηπι κικαίων	430	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	359
σίον	424, 435	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	355
σίσαρον	418	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	ibid.
σίσιμβρον	173	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	136
σίσιμβρον καρδμηνη		σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	212
fol.	435	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	541
σίσιμιον	501	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	22
σίκαβονιάς βύζα	269	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	418
σίκαμναία	ibid.	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	490
σίκαμνώνιον	ibid.	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	250
σίκαδία	472	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	224
σίλλα	451	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	259
σίμβρον	173	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	25
σίκαλοπιδριον	278	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	ibid.
σίκαλυμ	368	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	137, 142
σίκαρδιον	84	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	355
σίκαροδον	444	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	109
σίκαροδύπρασον	445	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	374, 385
σίκαροπειδής	49	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	493
σίκαροπιον	88	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	233
σίκαροπιον	47	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	109
σίμαλα	540	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	401
σίμαλα κηπαία	323	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	Ψ
σίμαλα λία	267	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	436
σίμαλα τραχέα	268	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	188
σίμαλα	553	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	72
σίμαλα βαυτικη	ibid.	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	349
σίμαριον	422	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	186
σίγχιτις	390	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	229
σίγγχος	389	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	259
σίμφος	410	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	78
σίπερα	146	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	205
σίπερα	466	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	83
σίπερα	ibid.	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	169
σίπλο	282	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	169
σίπλο	265, 277	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	169
σίπλο	360	σηστιάτης	109	τριβαλι	309	Χαμαϊδάτος	325

# Index Latinorum nominum quibus Veteres & Viri docti in stirpium herbarumq; appella- tionibus vtuntur.

<b>A</b> Biegna resina liquis	Alnus	531	Apium pascuere	286.420	Basilicum	169
da	Alnus nigra	533	Apium rusticum	ibid.	Bati	398
Abiegnam oleum	Aloë	239	Apium saxatile	421	Barrachij genera	284.28
Abies	Aloë Gallica	224	Apium syluestre	286.	inde	288
Abiga	Alfine	40	422.423		Barrachium Apulei	286
Abrotonum	Alfine marina	ibid.		290	Bdellium	554
Abrotonum femina	Althea	402.403	Apollinaris minor	304	Bellis	127
Abrotonum mas	Alyssum	81.370	Apollinaris	306	Bellus	ibid.
Abrotoni scilicet	Amaracus	15.165	Aquifolia	491	Bene olens	157
Abfinthium marinum	Amara dulcis	270	Arabis	438	Beta	377
Abfinthium Pontici	Amaranthus	125	Arabis	330.332	Betonica	20.205
Abfinthium rusticum	Amaranthus luteus	68	Aracus	326	Betonica Pauli	20
Abfinthii fontonicum	Amaranthus purpureus	125	Arbutus	511	Betula	533
Acacia	Ambrosia	170	Arcium	11	Bibulus	351
Acantha	Ambrosia	388	Aris	219	Bisacutum	426
Acanthium	Ambuxum	266	Arisaris	ibid.	Blattaria	93
Acanthus	Anani	192	Arisarum	ibid.	Elephara	135
Acanthus Germanica	Ammoniacum	564	Aristarthea	403	Blitum	125.375
Acanthus syluestris	Ampeloprasum	445	Aristolochie genera	221	Bonus genus	209
Acer	Amygdala	498	Aronia	501	Borrys	170
Accipitrins	Amygdalum	ibid.	Artemisia genera	12.14	Brachyle	505
Acetabulum	Amygdalus	ibid.	Arum	218	Brasica genera	377.28
Acetabulum alterum	Apyrum	366	Arum pascuere	227	inde.	
Achillea	Anagallis aquatica	399	Arundinis genera	352.353	Brasica marina	268.381
Achillea fideritis	Anagallis syluestris	134	Asarum	215	Brasica rusticata	381
Acidonium	Anagallis virrag	42	Asclepias	214	Brasica syluestris	ibid.
Acinos	Anagyris	521	Ascyrum	49	Briza	313
Aconitum lycostonum	Anaracium malum	493	Asia	314	Bromus	346
fol.	Anchusa genera	6	Aspalathum	233	Bromus herba	ibid.
Aconitum pardalicheres	Androsenum	51	Asparagus	428.429	Bruta	198
Acorum	Anethum	190	Asparag. syluestris	429	Brurbes	ibid.
Acorus	Anisum	191	Asphodelus	452.453	Bryonia alba	239
Acon syluesticum	Anomis	468	Asphodelus femina	453	Bryonia nigra	ibid.
Acula	Anonium	99	Asplenium	278	Bucinum	123
Adiantum	Anthemum	119	Asplenium magnum	277	Buglossum	9
Agilops	Anthemum foliosum	ibid.	Asplenium syluestre	ibid.	Buglossum magnum	390
Aethiops	Anthyceylon	9	Asplenium	278	Bulbus	496.490
Aethiops fefeli	Anthyllion	ibid.	Aster atricus	28	Bulbus agrestis	249
Agalochum	Anthyllis	343	Astracilis	366	Bulbus esculentus	449.490
Agaricum	Anthyllis altera	10.87	Atretilis bifurcior	ibid.	Bulbus littoralis	451
Ageratum	Anthyllon	9	Atriplex	374	Bulbus syluestris	450
Alga	Anthirinum	134	Auena	318	Bulbus vomitorius	149
Alba spica	Antimasum	296	Auena herba	346	Bunium	399
Albucum	Anydron	304	Aurelia	68	Buphthalmi	139.141.142
Albus	Anydros	149	Aureolus	374.385	Bupleurum	347
Alcea	Apononius	99	Auricula muris	42	Eucromon	353
Alcea Veneta	Aprine	370	Bacca iuniperi	516	Buxus	490
Aleibiacum	Aphace	332	Bacca renana	488	Baxus asinina	ibid.
Alga 285. Alifum	Apiastrum	183.286	Balensisium	495	<b>C</b> acalia	104
Alium	Apios	214.400	Ballote	180.181	Cacbrys	198
Allium angustatum	Apium	420	Barba herci	124	Calathiana viola	128
Allium sativum	Apium borrense	ibid.	Barbula herci	125	Calami genera	352.353
Allium syluestre	Apium montanum	422	Basilica	224	Calamintha	174

# Index.

<i>Calamus gratissimus</i>	351	<i>Celcus</i>	511	<i>Clavicula</i>	263	<i>Cnemis agrestis</i>	235
<i>Calicerylonium</i>	523	<i>Centaurium</i>	210	<i>Claus Veneris</i>	355	<i>Cuca anguinus</i>	253-405
<i>Callicularis</i>	306	<i>Centaurium minus</i>	220, 255	<i>Clematis Aegyptia</i>	26	<i>Cuca citrulus</i>	407-408
<i>Calix roserum</i>	458	<i>Centuncula capitata</i>	357	<i>Clematis altera</i>	262	<i>Cucumis erraticus</i>	253
<i>Callion</i>	302	<i>Centuncularis</i>	68	<i>Clematis daphnoides</i>	26	<i>Cucumis Galeni</i>	408
<i>Callitricheum</i>	279	<i>Centunculum</i>	ibid.	<i>Clinopodium</i>	266	<i>Cucumis sativus</i>	405
<i>Caltha</i>	122, 242	<i>Cepa</i>	446	<i>Cnecus</i>	26	<i>Cucumis sylvestris</i>	253
<i>Caltrula</i>	121	<i>Cepaea</i>	399	<i>Cnecus sylvestris</i>	366	<i>Culices</i>	528
<i>Cammaron</i>	584	<i>Cerasta</i>	508	<i>Cnecron</i>	250	<i>Cuminum Aethiopicum</i>	192
<i>Campfanema</i>	198	<i>Cerastium</i>	ibid.	<i>Cnicus</i>	26	<i>Cuminum Alexandrinum</i>	ibi.
<i>Canchrys</i>	198	<i>Cestrum</i>	250	<i>Colchicum</i>	248, 249	<i>Cuminum laium</i>	199
<i>Cania</i>	98	<i>Cherophyllum</i>	425	<i>Colocasion</i>	218	<i>Cuminum regium</i>	192
<i>Canina brasica</i>	60	<i>Cherophyllum</i>	ibid.	<i>Colochyntis</i>	254	<i>Cuminum ruficum</i>	194
<i>Cantharus</i>	459	<i>Chamaebalanus</i>	214, 336	<i>Columbaris</i>	96	<i>Cuminum sativum</i>	193
<i>Cannabium</i>	56	<i>Chamaecissus</i>	267	<i>Colombina vtracq;</i>	ibid.	<i>Cuminum sylvestris</i>	194
<i>Cantabrica</i>	217	<i>Chamaecyparissus</i>	23	<i>Colus rufica</i>	366	<i>Cunila</i>	160, 162, 167
<i>Capbura</i>	557	<i>Chamaedaphne</i>	26	<i>Colutea</i>	516	<i>Cunila bubula</i>	207
<i>Capillaris</i>	279, 280	<i>Chamaedrys</i>	20	<i>Colymbades</i>	518	<i>Cunilogo</i>	28
<i>Capillus Veneris</i>	279	<i>Chamaelea</i>	250	<i>Colyrea</i>	528	<i>Cupressus</i>	539
<i>Capita roserum</i>	458	<i>Chamaelea Germanica</i>	251	<i>Coma</i>	125	<i>Cupressus cretica</i>	538
<i>Capnium</i>	18	<i>Chamaelea tricoecus</i>	250	<i>Condrilla vtracq;</i>	192	<i>Cyanus flos</i>	220
<i>Capnosporogonis</i>	18, 233	<i>Chamaelea vtracq;</i>	355	<i>Condrilla</i>	ibid.	<i>Cyanus maior</i>	ibi.
<i>Capnos Plinij</i>	18	<i>Chamaemeli genera</i>	137	<i>Condrillon</i>	ibid.	<i>Cyclaminus</i>	222
<i>Capparis</i>	476	<i>Chamaemeli</i>	136	<i>Coniugulum</i>	267	<i>Cyclaminus altera</i>	222, 262
<i>Capsella</i>	437	<i>Chamaemeli albu</i>	137, 239	<i>Coniugulum nigrum</i>	ibid.	<i>Cymbalium</i>	30
<i>Capsici genera</i>	441, 442	<i>Chamaemeli luteum</i>	137	<i>Conisilio Plinij</i>	237	<i>Cyminalis</i>	224
<i>Cerdanavice</i>	439	<i>Chamaemeli purpureu</i>	ib.	<i>Conus</i>	542	<i>Cynobemis</i>	139
<i>Cerdanomonum</i>	572	<i>Chamaemeli sylvestris</i>	139	<i>Convolvulus</i>	267	<i>Cynog</i>	360
<i>Cerdanum hybernium</i>	436	<i>Chelidonium vtracq;</i>	25	<i>Conyza</i>	27	<i>Cynobetane</i>	139
<i>Cerdui sylvestres</i>	368	<i>Chiliodynanis</i>	224, 233	<i>Cotiantrum</i>	194	<i>Cynoerande</i>	60
<i>Cerduus</i>	360	<i>Chiliophyllum</i>	109	<i>Cornus</i>	509	<i>Cynoglosson Plinij</i>	8
<i>Cerduus irineus</i>	355	<i>Chironia vicia</i>	259	<i>Coronaterre</i>	264	<i>Cynomorphos</i>	151
<i>Cerduus lacteus</i>	355	<i>Chironion</i>	224	<i>Coronopodium</i>	237	<i>Cynoforbis</i>	155
<i>Cerduus niger</i>	355	<i>Chrysaemium</i>	139, 242, 286	<i>Coronopus Ruellij</i>	72	<i>Cyperis</i>	233
<i>Cerduus rampionis</i>	361	<i>Chrysipterum</i>	355	<i>Corychus</i>	42	<i>Cyperus</i>	ibid.
<i>Cerduus sativus</i>	360	<i>Chrysiotis</i>	109	<i>Corruda</i>	429	<i>Cyperus Indicus</i>	582
<i>Cerduus sylvaticus</i>	355	<i>Chrysiotis</i>	109	<i>Corylus</i>	514, 515	<i>Cypripus</i>	233
<i>Cerduus verinus</i>	ibid.	<i>Chrysiotis</i>	64	<i>Costas Arabicus</i>	580	<i>Cypripus Indicus</i>	582
<i>Cerduus Veneris</i>	359	<i>Chrysiotis</i>	327	<i>Cotyledon</i>	30	<i>Cytisus</i>	495
<i>Cerym</i>	198	<i>Cicuta</i>	326	<i>Cotyledon aquatica</i>	29	<i>Cytisus</i>	516
<i>Cerice</i>	214, 503	<i>Cicercula</i>	ibid.	<i>Cotonea</i>	496	<b>D</b> <i>Actylitis</i>	212
<i>Carpinus</i>	531	<i>Cichorium</i>	388, 392	<i>Crepula</i>	362	<i>Daphnoides</i>	249
<i>Cerum</i>	193	<i>Cicuta</i>	307	<i>Cratogeomom</i>	224, 347	<i>Dardans</i>	11
<i>Ceryophyllum</i>	571	<i>Cinara</i>	360	<i>Cratogeomom</i>	347	<i>Daucum</i>	200
<i>Casta</i>	186, 570	<i>Cinara acuta</i>	ibid.	<i>Crataeus</i>	ibid.	<i>Daucum</i>	200
<i>Casta nigra</i>	520	<i>Cinara rufica</i>	359	<i>Cranbe</i>	380	<i>Daucum creticum</i>	ibid.
<i>Cassia</i>	578	<i>Cinamalis</i>	96, 279	<i>Crinia</i>	279	<i>Daucum</i>	417
<i>Cassithe</i>	271	<i>Cinnamomum</i>	569	<i>Crista</i>	354	<i>Daucus pastinaca</i>	ibid.
<i>Castanea</i>	512	<i>Cinnamomum</i>	ibid.	<i>Cristum</i>	398	<i>Daucus sylvestris</i>	425
<i>Castor</i>	351	<i>Circea</i>	296	<i>Crocus</i>	151	<i>Delphinium</i>	123
<i>Catanance</i>	348	<i>Cirsium</i>	391	<i>Cucurbita</i>	409	<i>Delphinium atherum</i>	ibi.
<i>Caucalis</i>	425	<i>Cissanthemon</i>	262	<i>Cucurbita anguina</i>	410	<i>Democritus</i>	96
<i>Cauda vulpine</i>	413	<i>Cissophilon</i>	ibid.	<i>Cucurbita barbarica</i>	ibi.	<i>Dicliannum</i>	188
<i>Caulis</i>	561	<i>Cistus</i>	461	<i>Cucurbita comaricaria</i>	409	<i>Dicliannum creticum</i>	188
<i>Cedria</i>	537	<i>Citrugo</i>	183	<i>Cucurbita penticularis</i>	ibi.	<i>Dicliannum no creticum</i>	ibi.
<i>Cedula</i>	ibid.	<i>Citrium malum</i>	493	<i>Cucurbita sativae</i>	ibid.	<i>Diodeda</i>	109
<i>Cedrus</i>	ibid.	<i>Citrulus</i>	408	<i>Cucurbita sylvestris</i>	254	<i>Dionysia</i>	263

# Index.

Dipsacum vtrūq; 358.359	Eryngium	ibid.	Fufterna	544	Helleborine	157.235	
Dolichus	Erythra	213	Fufus agrestis	366	Helleborus niger	237	
Draba	438	Erythra Diofco.	438	Galatium	371	Helixine ciffampelos	267
Draco	433	Erythra Theophr.	431	Galbani	563	Hemionitis	277
Dracunculus maior	217	Erythra Theophr.	96.233.361	Galerion	371	Hemerocallis	148
Dracunc. Martioli	216	Erythra	534	Galeopsis	371	Hemeraton	220
Dracunculus minor	217	Eupatorium	45	Galla	523	Hepatorium	45
Dracunculus paluftris	ibi.	Eupato. adulerianū	46	Galla	523	Heraclion	109
Dracunculus Plinij	17	Eupato. aquaticum	ibid.	Gallica	535	Heratubentum	140
Dryophonum	438	Eupator. Auicenne	ibid.	Galium	371	Herba cafta	217
Dryopteris	275.276	Euphorbium	563	Genifta	464.466	Herba coxendicum	30
Dulcamara	270	Euphorofone	31	Gentiana	224	Herba lutea	53
Dulcivradix	486	Exupera	96	Geraniorum genera	371	Herba pedicularis	252
Dulciflida	227	Faba	322	inde.	107	Herba pulicaris	78
Dulcis radix	486	Faba lupina	306	Gingidium	416	Herba fanguinalis	96
Duracina Perfica	497	Faba fuilla	ibid.	Gingiberis	579	Herba Sardoa	285.286
Ebulus	258	Fabulonia	ibid.	Gladolus	145	Herba fcanaria	427
Ebulum	ibid.	Fabulam	306	Gladolus lucens	144	Herba feclerata	289
Echion	7	Fagus	532	Gladolus fegetalis	145	Hermoadactylus	249
Elaphobofcum	418	Farrago	314	Glaus	523	Herba vlciana	304
Elaetrium	253	Fafelus niger	322	Glandes terreftrcs	336	Herbulum	393
Elaeine	44	Fafelus vterque	ibid.	Glaus ferdiana	512	Herculis fanguis	151.220.
Elicryfum	68.176	Pafeolus	323	Glaus vnguentaria	573	234	
Ellochryfon	68	Ferraria	96	Glaftum	52	Hiberis	439
Epaphrofiton	271	Ferrulago	247	Gleax	38.342	Hibifcus	403
Eperingium	ibid.	Ferula filueftris	247	Glex	38	Hibifcus Theophr.	ibid.
Epibatou	ibid.	Feftuca	321	Glaucium	566	Hiera botane	96
Epibryon	ibid.	Ficus	505	Glycyrrhiza	486	Hieracium	390
Epichama drys	ibid.	Picus fatina	ibid.	Glycyrrhiza cōmunis	ibid.	Hieracopodium	119
Epigenifton	ibid.	Fiducula	280	Glycyrrhiza Diofco.	ibid.	Hippogoffum	472
Epigetis	262	Filix femina	273	Gnaphalium	68	Hippofelinum	422
Epilinum	271	Filix mas	ibid.	Gofipium	476	Hippofelinū agrefte	424
Epimedium	81	Filix querna	276	Gramen	345	Hirci fplna	567
Epimelis	501	Filicula	274	Gramen arundinaceū	333	Hirundinaria	25
Epipactis	235	Floama	112	Gramen parafium	349	Holofochanus	351
Epithymum	271	Floamula	288	Gramen enidium	250	Holoftemum	73
Epirhymum	ibid.	Flos anellus	28	Graiola	255	Hordeum	314.315
Epirithymalos	ibid.	Flos Apbricamus	311	Groffula	503	Hordeum cantherium	315
Equapium	422	Flos Indicus	ibid.	Grains	37	Hordeum galatinum	ibid.
Equinalis	76	Flos rofo	458	Grainalis	ibid.	Horminum	186
Equifeta	ibid.	Flos rinctorius	45	Gammii iuniperi	558	Horminū fatiū	189.180
Equifetum maius	75.76	Poeniculum	189	Gymnocriton	312	Horminum folueftrc	ibid.
Equifetum minus	76	Poeniculum erraticum	ibi.	Halioacbon	304	Humibuxus	490
Equitium	77	Pannum Græcum	336.337	Halinus	397	Hamirubus	462
Eranthemum	137	Polia roferum	458	Haradinis genera	352.353	Hyacinthus	149
Erica	474.475	Ponalis	80	Hæftula regia	43	Hyacinthus Ouidij	147
Erica altera	475	Pontinialis	ibid.	Hedera folium	214	Hydropiper	440
Erica	ibid.	Praga	64	Hedera genera	263	Hyofoyanus albus	305
Erigerum	393	Pragaria	65	Hedera mollis	267	Hyofoyanus luteus	306
Eriphion	184	Praxinea arbor	525	Hed. terreftris	264.267	Hyofoyanus niger	ibid.
Eriofeptrum	233.355	Praxinus	ibid.	Hedera	214.263	Hypococum	33
Eriudales	87	Praxinus bubula	ibid.	Hedypnois	388	Hypericum	49
Eruangina	467	Praxinus folueftris	ibid.	Hedysarum	334	Hypociftis	461
Eruca	432	Priacura	564	Helenum	225	Hypopheum	34
Eruftia	324.325	Prugiperda	522	Hele. ægyptiacum	225	Iberis	439
Eruam	329	Pucus	283	Heliotropiū vtrūq;	47	Ibige	22
Erynge	357	Pumaria	18	Helix	263	Ibifcus	403

# Index.

<i>Idem Dactylus</i>	127	<i>Laserpitium</i>	561	<i>Lapulus salicarius</i>	272	<i>Medica</i>	340-342-343
<i>Illecebra</i>	87	<i>Laser friacum</i>	ibid.	<i>Lustrago</i>	96	<i>Melampodium</i>	237
<i>Inguinalis</i>	28	<i>Lathyrus</i>	245	<i>Luteum herba</i>	52	<i>Melampyru</i>	112-320-337
<i>Intybum agreste</i>	390	<i>Lathyrus</i>	316	<i>Lycbuis</i>	459	<i>Melanorhizon</i>	137
<i>Intybum sativum</i>	387	<i>Lanandula</i>	186-187	<i>Lychnis coronaria</i>	118	<i>Melanthium</i>	196
<i>Intybum sylvestre</i>	388	<i>Lauer</i>	424-435	<i>Lychnis fatua</i>	ibid.	<i>Melanib. danascenum</i>	ibi.
<i>Insula</i>	225	<i>Laur Cratena</i>	424	<i>Lychnis fyluestris</i>	119	<i>Melanthium sativum</i>	ibi.
<i>Inula campana</i>	ibid.	<i>Lauri bacca</i>	482	<i>Lychnis</i>	92-120	<i>Melanthiu fyluestre</i>	ibid.
<i>Ionis faba</i>	306	<i>Laurus</i>	ibid.	<i>Lycium</i>	490	<i>Melilotus</i>	341
<i>Ionis flamma</i>	508	<i>Laurus Alexandrina</i>	473	<i>Lycostonon</i>	291	<i>Melilotus germanica</i>	340
<i>Ionis glans</i>	512	<i>Laurus ideo</i>	473	<i>Lycostonon Pöricü</i>	291	<i>Melilotus italica</i>	341
<i>Iris</i>	143	<i>Laurus rosea</i>	292	<i>Lycopodium</i>	283	<i>Melilotus fyluestris</i>	340
<i>Iris lutea</i>	144	<i>Ledum</i>	461	<i>Lycopsis</i>	6	<i>Melissophyllum</i>	182
<i>Iris fyluestr.</i>	144-145-146	<i>Leguminum leo</i>	465	<i>Lycopsis fyluestris</i>	ibid.	<i>Melitena</i>	183
<i>Iris</i>	438	<i>Lens</i>	333	<i>Lysimachia</i>	57	<i>Melo</i>	408
<i>Isopyrum</i>	372	<i>Lens lacustris</i>	81	<i>Lysimachium</i>	ibid.	<i>Melocarpou</i>	212
<i>Isatis virgata</i>	51	<i>Lens palustris</i>	ibid.	<i>Lysimachium ceruleü</i>	58	<i>Melopoepo</i>	408
<i>Ischias</i>	214	<i>Lenticula</i>	333	<i>Lysimachium purpureum</i>	fol. 57-58	<i>Melopoepo Galeni</i>	405
<i>Iunci</i>	350	<i>Lepidium</i>	426-439-440	<i>Macer</i>	513	<i>Menta sativa</i>	172-173
<i>Iunci flos</i>	351	<i>Leibe</i>	293	<i>Magadaris</i>	561	<i>Menthastrü</i>	172-173-174
<i>Iuncus acutus</i>	ibid.	<i>Lethasa</i>	ibid.	<i>Maiores</i>	165	<i>Mercurialis</i>	60
<i>Iuncus angulosus</i>	333-351	<i>Lescolon</i>	351	<i>Mala armenica</i>	498	<i>Mercurialis fyluestris</i>	60
<i>Iuncus leuis</i>	350	<i>Libanum</i>	9	<i>Mala cirria</i>	493	<i>Mesphum</i>	501
<i>Iuncus odoratus</i>	351	<i>Libanotis</i>	197-198	<i>Mala infusa</i>	297	<i>Meliopium</i>	563
<i>Iuncus quadratus</i>	233	<i>Libanotis Theo.</i>	197-198	<i>Malicorium</i>	495	<i>Menum</i>	226-400
<i>Iuncus triangularis</i>	ibid.	<i>Lichen</i>	280	<i>Mala generä</i>	400-401	<i>Milax</i>	267
<i>Iuniperus</i>	336	<i>Licinia</i>	96	<i>Mala Theophrasti</i>	404	<i>Militaris millefolia</i>	109
<i>Iunonis rosa</i>	147	<i>Ligusticum</i>	106-207	<i>Malam</i>	492	<i>Milium</i>	315
<i>Jali nucum</i>	513	<i>Ligustrum</i>	483	<i>Malam anaracium</i>	493	<i>Milium indicum</i>	316
<i>Jaxia</i>	315	<i>Ligustrum album</i>	267	<i>Malam anarum</i>	ibid.	<i>Millefolium</i>	81
<b>L</b> <i>Abrusca</i>	455	<i>Ligustrum nigrum</i>	ibid.	<i>Malam cotoneum</i>	496	<i>Mitridarium</i>	84
<i>Labrum veneris</i>	359	<i>Lillium</i>	147	<i>Malam granatum</i>	495	<i>Moly</i>	349
<i>Laburnum</i>	521	<i>Lilium rubrum</i>	ibid.	<i>Malam limonium</i>	493	<i>Moly Plinij</i>	348-349
<i>Lachryma abiegna</i>	544	<i>Lilium rufum</i>	ibid.	<i>Malam punicum</i>	495	<i>Mouritubus</i>	528
<i>Lachryma abietis</i>	ibid.	<i>Lilium fyluestre</i>	148	<i>Malam terre</i>	212-222	<i>Morus</i>	359
<i>Lactaria</i>	142-143	<i>Lilium Theophrasti</i>	132	<i>Malus</i>	492	<i>Morum</i>	501
<i>Lactuca sativa genera</i>	394-395	<i>Lionites</i>	368	<i>Malus armenica</i>	498	<i>Morum rubi</i>	462
<i>Lactuca-leporina</i>	389	<i>Lingua</i>	103	<i>Malus cirria</i>	493	<i>Morum rubi ideo</i>	463
<i>Lactuca minor</i>	390	<i>Lingua bovis</i>	9	<i>Malus cotonea</i>	496	<i>Morus</i>	501
<i>Lactuca sylvatica</i>	390	<i>Lingua bubula</i>	ibid.	<i>Malus medica</i>	493	<i>Mala herba</i>	277
<i>Lactuca fyluestris</i>	396	<i>Linguace</i>	103	<i>Malus Persica</i>	497	<i>Malones</i>	528
<i>Ladum</i>	461	<i>Lingua certina</i>	145	<i>Mandrageras</i>	296	<i>Mardalis</i>	39
<i>Ladanum</i>	ibid.	<i>Lingulace</i>	103	<i>Mandrageras Theophras</i>	303	<i>Masa</i>	494
<i>Lagopus</i>	344	<i>Linum</i>	54	<i>Mania</i>	306	<i>Masus</i>	282
<i>Laminum</i>	99	<i>Linum criticum</i>	337	<i>Martiscus</i>	350	<i>Masus marinus</i>	283
<i>Lampada</i>	119	<i>Lithospermum</i>	205	<i>Marmoraria</i>	392	<i>Myagram</i>	337
<i>Lampfana</i>	385	<i>Lobi</i>	313	<i>Maronium</i>	220	<i>Myosaron</i>	73
<i>Lampuca</i>	390	<i>Lolium</i>	310	<i>Marrubiacstrum</i>	181	<i>Myrica humilis</i>	473-474
<i>Lanaria</i>	210	<i>Lonebilis aspera</i>	277	<i>Marrubium</i>	180-181	<i>Myriomorphos</i>	109
<i>Lapathum</i>	384	<i>Lotus</i>	511	<i>Marrubium nigrum</i>	181	<i>Myriophyllum</i>	ibid.
<i>Lapathum magnum</i>	ibid.	<i>Lotus sativa</i>	339	<i>Marrubiu palustre</i>	100-181	<i>Myrobasan. genera</i>	574
<i>Lapathum sativum</i>	382	<i>Lotus fyluestris</i>	340	<i>Marrubi</i>	181	<i>Myrobalanum</i>	573
<i>Lapathum fyluestre</i>	384	<i>Lotus urbana</i>	339	<i>Marrum</i>	165-166	<i>Myrrha</i>	533
<i>Larix</i>	545	<i>Lupinus</i>	237-291	<i>Mastiche</i>	548	<i>Myrrha toxicis</i>	ibid.
<i>Laser</i>	561	<i>Lupulus salicarius</i>	272	<i>Mecon</i>	243	<i>Myrris</i>	437
<i>Laser cyrenaicum</i>	561					<i>Myrris</i>	

# Index.

Myrtaria	243	Opopanax	560	Pentadactylon	402	Polemonium	133
Myrrus	481	Opsego	304	Pepones	407	Polemonium <i>Abstrahi</i>	173
Myrtus <i>sylvestris</i>	472	Opalus	509	Pepones <i>cucumerales</i>	ibid.	Policaria	28
Myxa	506	Orbicularis	222	Pepones lati	ibid.	Podopodium	274
Myxaria	ibid.	Origana	167	Pepones magni	ibid.	Polium	164
<b>N</b> Apis	412	Organu heracleoticu	ibid.	Perdicalis	39	Polium montanum	ibid.
Nerantion mali	493	Organum oniris	ibid.	Perdictum	ibid.	Polyantherum	287, 288
Neracophium	596	Organum <i>sylvestre</i>	ibid.	Perichymenum	269, 548	Polyantherum <i>aquaticum</i>	
Nerac	224	Orchios genera folio	153	Perpeusa	215	<i>foli. 8c</i>	
Narcissus	149, 233	Ornithogalum	451	Personata	11	Polyantheru <i>pallidum</i>	ib.
Narcissus luteus	150	Ornithopodium	333	Personaria	ibid.	Polygala	38, 333
Nardus radice	225, 229	Ornus	525	Pes cornicis	72, 237	Polygonatum	78, 264
Nardus <i>sylvestris</i>	229	Orobanche	467	Pes gallinaceus	18	Polygoni genera	74
Nasturtium	434	Orobisam	327	Petasites	16	Polybidion	220
Nasturtium <i>sylvestre</i>	439	Oronium	134	Petrapium	421	Polyritxon	222, 377
Nepa	88	Oxyris	61	Petrofelinum	421, 424	Polytrichos	279
Nepeta	174	Oxboma	131	Petrofelinu <i>alexandr.</i>	422	Polytrichos <i>Apulei</i>	280
Nerium	292	Oxalis	383	Petrofelinum <i>macedo.</i>	422	Ponium	492
Neslion	210	Oxylapathum	382	Peucedanum	209	Potamo cytonium	496
Nigella	196	Oxys	344	Pbalaris	316	Pomus	492
Nigella <i>damoscena</i>	ibid.	Oxytonon	293	Pbselus sativus	322	Populus <i>aba</i>	527
Nigella domestica	ibid.	<b>P</b> æonia	227	Pbselus <i>sylvestris</i>	ibid.	Populus <i>libyca</i>	ibid.
Norion	269	Palatia	222	Pbsili	372	Populus <i>nigra</i>	ibid.
Nuces cupressi	539	Paludapium	420	Pbsiolon	322	Porrum	447
Nuces fagi	532	Palma	517	Pbanix	346	Porrum <i>capitatum</i>	ibid.
Nax	512	Palmule	ibid.	Pbilyrea	483	Porrum <i>sectium</i>	ibid.
Nux auelona	515	Panaces	207	Pbu	229	Portulaca	396, 397
Nux castanea	512	Panaces <i>Afsclepij</i>	560	Pbu <i>græcum</i>	ibid.	Portulaca <i>marina</i>	397
Nux heracleotica	515	Panaces <i>Centaurion</i>	225	Pbu <i>paruum</i>	ibid.	Portulaca <i>sylvestris</i>	foli.
Nux iuglans	513	Panaces <i>Chironium</i>	folio.	Pbysitis	276	Potamogeton	80
Nux myrtifolia	ibid.	176, 225, 560.		Pbyrama	564	Præcocia	498
Nux persica	ibid.	Panaces <i>heracleum</i>	560	Picea	543	Præcoqua	ibid.
Nux pinea	542	Panax	ibid.	Pignatortis	234	Præsepium	366
Nux pontica	515	Pancratium	451	Pilula cupressi	519	Præcium	237
Nux prænestina	ibid.	Panicum	318	Pingster	541	Præserpinaca	74
Nux regia	513	Panis porcinnus	222	Pinus	541, 542	Profopon	293
Nymphaea vtraj.	135	Papaver	293	Piper agreste	484	Pruna <i>afinina</i>	506
<b>O</b> Cimastrum	20, 170	Papaver <i>cornutum</i>	295	Piper indianum	442	Pruna <i>cerea</i>	ibid.
Ocularis	31	Papaver <i>erraticum</i>	293	Piperitis	439, 440, 442	Pruna <i>cereola</i>	ibid.
Ocymum	169	Papaver <i>fluidum</i>	295	Piper omne	443	Pruna <i>damoscena</i>	505
Oenanthe	455	Papaver <i>pulsifro</i>	135	Pira	459	Pruncolum	506
Olea	518	Papaver <i>rhœas</i>	295	Pirus	ibid.	Prunulum	ibid.
Oleago	250	Papaver <i>sennium</i>	292, 293	Pissaphaltes	537	Prunum	505
Oleagellus	ibid.	Papaver <i>sylvestre</i>	ibid.	Pistacia	515	Prunum <i>sylvestre</i>	506
Oleaster	518	Papyrus	551	Pistacia <i>germanici</i>	526	Prunus	505
Olea <i>sylvestris</i>	ibid.	Parietaria	39	Pistolochia	222	Prunus <i>sylvestris</i>	506
Oleofaresius	544	Parthenium	15	Pisum	324, 325	Pseudachatus	363
Olinia	518	Pastinaca	418	Pitibiris	293	Pseudocorus	144
Olsatrum	422	Pastinace <i>gene.</i>	416, 417	Pituitaria	252	Pseudocoronopus	72
Olyra	321	Pedicularis	354	Pityusa	244	Pseudodistansium <i>folio</i>	
Omphacium	455	Pelecion	334	Plataginis <i>genera</i>	69, 70	188, 232.	
Omiron	293	Pelechonia	220	Plantago <i>aquatica</i>	73	Pseudobelleborus <i>niger</i>	
Onobrychis	122, 332	Pentaphylli <i>genera</i>	63	Planta <i>veris</i>	23	fol. 237	
Ononis	468	Peplion	246	Platanus	530, 531	Pseudobepatorium	46
Ophris	157	Peplis	ibid.	Polemonia	233	Pseudolinum	61
Ophthalmica	31	Peplus	ibid.				
Opium	293						

# Index.

Pseudonox	349	Rheponicum	221	Satureia vulgaris	160	Sinapi fylueftre	430.431
Pseudonoxifine	471	Rhecoma	ibid.	Satyrium	159	Siferum	418.419
Pseudonoxifissus	110	Rheum	ibid.	Satyrium basilicum	159	Sifer	419
Pseudonoxerdis	186	Rheum Indicum	ibid.	Satyri. erythronium	ibid.	Sifymbrium	173
Pseudopbu	229	Rheum ponticum	ibid.	Satyrium regium	ibid.	Sifymbrium cardamine	435
Pfora	83	Rbizias	561	Satyrium trifolium	ibid.	Sitibales	390
Pfolium	78	Rbos	485	Scammonium	269	Sium	424.435
Pulegium	163	Rbus	ibid.	Scandix	426.427	Sium Crataeus	424
Puleg. fylueftre	174.188	Rbus coriariorum	ibid.	Scandalacrum	437	Smilax aspera	268
Pulicaria	28	Rbus obfonorum	ibid.	Scaparium lafer	561	Smilax hortensis	323
Pycnitis	92	Rb. fyluefttris Plinij	470	Schaenoprasum	448	Smilax lenis	267
Pyra	499	Ricinus	240	Schaenanthos	351	Smyrnium	422.424
Pyra cytonia	496	Robus	309	Sciara	359	Solanum	301
Pyrethrum	230	Rofa	458.459	Scilla	451	Solanum hortense	301
Pyrethrum fylueftre	231	Rofa canina	458	Scimbron	173	Solanum lethale	303
Pyxantha	490	Rofa tanonis	147	Scolytus	367	Solanum manicum.	304
<b>Q</b>		Rofa mariana	118	Scordium	84	Solanum foenisiferum	ibi.
Qvercus	522	Rofea arbor	292	Scordis	446	Solidago	100.110
<b>R</b>		Rofmarinum	398	Scordorblapi	437	Solidago farracenea	107
Radicaria lafer	161	Rofm. coronariu	185.186	Scorodoprasum	445	Sombos	410
Radicula	210.414	Rubia fatua	376	Scorpioides	48.49	Sonchi	189
Radicula palaftris	414	Rubia fyluefttris	ibid.	Scythica radix	486	Sonchus aspera	389
Radicula fatua	ibid.	Rubus	462	Secale	314	Sonchus leuis	ibid.
Radicula fyluefttris	ibid.	Ru. canis	459.476.489	Securidaes	334	Sorbus	510
Radix caua	213	Rubus idaeus	465	Sedi genera	87	Sorbus	ibid.
Radix rhodia	230	Rumicis genera	382. &	Selago Plinij	471.475	Sorbus aucuparia	515
Radix rofata	ibid.	inde	1.1	Semen	310	Spagas	543
Radix fyluefttris	214	Rufcam	471.472	Seminalis	75	Sparganium	146
Ranunculi genera	234. &	Rufcus fyluefttris	491	Semperuini genera	87	Spartum	466
inde		Ruta	184	Sena	256	Sphaelus	178
Ranunculus auricomus		Ruta hortensis	ibid.	Senecio	393	Spina acuta	489
fol.	184.286	Ruta muraria	279	Semis	462	Spina alba	360.361.364
Rapa	411	Ruta fyluefttris	184	Semis canis	476.489	Spina arabica	365
Rapa fyluefttris	413	<b>S</b>		Seprifolium	64.210	Spina mollis	391
Raphanus	414.415	Sabina falix	522	Serica	507	Spina peregrina	361
Raphanus magnus	415	Sacopeniam	563	Seriphidium	4	Spine regia	ibid.
Raphanus montanus	415	Sacra herba	96	Serpentaria	7.17.217	Splenium	277
Rapum porcinam	ibid.	Sagapeni succus	563	Serpillium vulgare	163	Spondylium	363
Rapum terre	222	Sagapenium	562	Serrula campana	341	Stachys	181
Remenia	306	Sagapenium	562	Sesfeles genera	199.200	Stagonitis	563
Refina	543	Salicaftrum	260	Seranium	309.501	Stichas	187
Refina abiegna	545	Salicum genera	522	Sicula	377	Stachas	ibid.
Refina arida	543	Saluarias	230	Sicyonia	254	Staphi agris	252
Refina colophonia	ibid.	Salix amerina	484.522	Sideritis	100	Staphylinus luteus	417
Refina laricea	545	Salix equina	76	Sideritis heraclea	37.100	Staphylinus niger	ibid.
Refina lorigna	ibid.	Salix marina	484	Sideritis prima	100	Staphylinus fatuus	ibid.
Refina lentifcica	548	Salsia	177	Sideritis tertia	37	Staphylinus fyluefttris	ibi.
Refina liquida	543	Sambucus	257	Sidium	495	Staphyloendro Plinij	516
Refina picea	ibid.	Sambucus humilis	258	Siligo	309	Stataria	209
Refina pinea	ibid.	Sanera	528	Siliqua	337.509	Sternutamentaria.	231
Refina picuina	ibid.	Samolus Plinij	470	Siliqua dulcis	519	Stracioricon	109
Refina ftrobilina	ibid.	Sanguinalis	74.75	Silique	323	Strucea ruia	496
Refina tercbinthina	547	Sanguinaria	74	Siliquaftrum	442	Struthium	210
Rbu	221	Santalum	575	Sinapi	430	Strution	224
Rhabarbarum	ibid.	Sapinus	544	Sinapi commune	430	Strygis	309
Rhacoma	ibid.	Sarcocolla	517	Sinapi Perficum	215	Stryx	556
Rhamnus	487.488	Serdiana glans	512	Sinapi ruficum	437	Succus cyrenicus	561
Rhemus foliatus	488						

# Index.

Succus medicus	161	Thymra	162	Trixago palustris	84	Viola Mariana	119
Supercilium terræ	279	Thymum	161	Tuber terræ	222	Viola maritima	114
Supercilium Veneris	109	Thymum creticum	160, 161	Tusilago	15	Viola nigra	111
Sycomorax	502	Thymum durius	161	Typha	312, 352	Viola peregrina	115
Sylus macer	165	Tilia	519	Typha cerealis	312	Viola purpurea	ibid.
Symphitum magnum	110	Tithymali omnes	344-343	Typha palustris	352	Viperula	184
Symphonisa	306	Tithymalus 2-7 <sup>1</sup>	343-345	V Acinia	462, 469	Viperina	7
T Amari	474	Tomentita	68	Vaccinium	111, 149	Viscum	524
Tanus	260	Toparia	362	Valeriana	229	Vitalis 267, Vitex	484
Taxus	540	Tordylium	200	Valeriana genera	ibid.	Vitis alba	259
Teda	542	Trachelium vtrung;	118	Veneris lanacrum	359	Vitis nigra	ibid.
Telephium	89	Tragacantha	567	Veratrum adulterinum ni		Vitis sylvestris	260, 455
Terebinthus	547	Tragacantha lacryma:		grum	237	Vitis vinifera	455
Terræ capillus	279	fol.	568	Veratrum album	234	Vlinus	528
Testiculus	155	Tragium	231, 376	Veratrum nigrum	237	Vmbilicus terræ	222
Testiculus canis	ibid.	Tragium germanicum	376	Verbasci genera	90, 91, 92	Vmbilicus Veneris	30
Testiculus hirci	ibid.	Tragonatum	119	Verbascula	94	Vitido	512
Testiculus leporis	ibid.	Tragorabis	154	Verbascum minus	94	Vnefera	210
Testiculus odoratus	ibid.	Tragorigantum	168	Verbena	96	Vngues rosarum	458
Testiculus serapias	ibid.	Tragotrophon.	319	Verbena	ibid.	Vulnerum maius	265
Testiculus vulpis	ibid.	Tragus	88	Vernilago	355	Vreolaris	39
Tenerium	85	Tribulus aquaticus	368.	Vernix	536, 558	Vrinamuris	404
Tentorium	164	369		Vesicaria	302	Vrtice genera	98
Tenxinon	212	Trichomanes	280	Vesicaria nigra	ibid.	Vrtice iners	99
Thalictrum	89	Trifolium	339-343	Vesicaria peregrina	ibid.	Vrtice labeo	34
Thalictrum	33, 89	Trifolium bituminosum	343	Vesicula	ibid.	Vrtice mortua	99
Thapsia	247	Trifolium foetidum	ibid.	Veronica	117, 205	Vstilago	321, 355
Thlaspi	457	Trifolium odoratum	ibid.	Veronica altalis	117	Vua taminca	260
Thlaspi crataegæ	115	Trifolium pratense	338	Veronica coronaria	ibid.	Vua vrsi	478
Thrausina	564	Trigrania	501	Veronica sylvestris	ibid.	Vulgago	215
Thridaciaz	296	Trionum	431	Vicia	330	X Anchium	11
Thryallis	120, 130	Triorchis	155	Viola alba	114, 351	Xylum	476
Thryon	304	Tripolium	247	Viola alba Theophr.	151	Xyris	145
Thus	543-551	Triticum	309	Viola autumnalis	128	Z Ea	198, 310
Thuris cortex	551	Triticum boeotum	122	Viola flamma	112	Z Eopyron	312
Thyia	538	Triticum trimesstre	309	Viola byemalis	114	Zingiberis	579
Thyium	ibid.	Triticum vaccinum	112	Viola latifolia	115	Zizipha	507
Thylacitis	293	Trixago	20, 96	Viola lutea	113	Ziziphus	ibid.

## Index appellationum & nomenclaturarum omnium Stirpium, hoc opere contentarum, quibus passim Officina Pharmacopolarum, Arabes, & nostri temporis Herbarij vtuntur.

A Absinthium	4	Acus pastoris.	37, 427	Albotin	547	Alphesera	259
Absinthium Romanum	ibid.	Acucella	468	Alcea Veneta	404	Altercagenum	306
Abrotanum	2	Adiantum	276	Alchimilla	106	Altercum	ibid.
Aburilon	403	Affodillus	148, 433	Alcoacium	360	Alumen catinum	88
Acetosa	384	Agalagi	577	Algalolan	577	Amerella	15
Acetosa Romana	ibid.	Agaloian	ibid.	Alkalcengi	302	Ambegi	574
Acetosella	ibid.	Agaricus	545	Alkali	10, 88	Ambrosiana	178
Achomilla	106	Agnius castus	484	Alleluja	344	Ameos	192
Acorus	144	Agreste	455	Alliaria	446	Amleg	574
Acus moschata	37	Agrimonia	45	Allium vrsinum	445	Amonum	421
		Agrimonia sylvestris	65	Aloes	239	Anagallis aquatica	399



# Index.

Aenebum	190	Beta	377	Carduus benedictus	366	Cochlearia	89
Angelica	203	Betonica	205	Carduus fullonum	359	Coloquinida	254
Angine lini	271	Bibinella	202	Carduus Marie	361	Colabrina	17.117
Anguria	405.407	Bifolium	157	Carduus stellatus	357	Concordia	45
Anisum	191	Bipennula	105.202	Carlina	364	Conditi	210
Ambra	458	Bisacutum	426	Carlina sylvestris	365	Constrilla	392
Amhos	185	Bislingua	472.473	Cerobe	519	Consolida	100
Antophillum	571	Bismala	403	Carolina	364	Consolida maior	110
Apiaria	460	Bistorta vtraj	17	Cerota	417	Consolida media	100. 101
Apium	420	Blapifecula	110	Carthamus	26	Consolidaminor	117
Apium rifus	285.286	Balbonac.	115	Cartham sylvestris	366	Consolida regalis	123
Aquilegia	114	Bombax	476	Cerui	193	Consolida regia	ibid.
Aquileia	ibid	Bombasum	ibid.	Cerunfel	571	Consolida sarracenicafol.	
Aranium	493	Bonifacia	473	Cesbia fistula	520	107	
Arcocum	360	Borago	9	Cesilago	306	Corallina	283
Argentina	65	Borda	10	Castangula	34	Cordialis	371
Aristologia	212	Bracea vrsina	362.363.	Cataputia maior	240	Cordumeni	572
Armoniacum	564	418		Cataputia minor	245	Coriandrum	194
Arresta bouis	468	Bracilla	101	Cauda equina	76	Corona regia	299
Arbmita	222	Bruscus	472	Cauda murina	73	Corona terre	264
Arthemisia	12	Bryonia	299	Cauda muris	ibid.	Cornu ceruinum	72
Arthe tica	94	Buglossa	6	Canta	139.141	Corrigiola	75
Arcticoca	360	Buglossa sylvestris	ibid.	Caustiflores	380	Cor salinum	177
Arcticoculus	ibid.	Eugula	101	Caulis	380	Cortula alba	139
Afa	561	Bursa pastoris	61.62	Caulis murina	381	Cortula foetida	ibid.
Afarum	215	<b>C</b> Achla	141	Centauria minor	210	Cortula non foetida	ibid.
Asperula	371	Calabrina	277	Centrum galli	179	Cotula lutea	ibid.
Asprella	76	Calamentum	174	Centammodia	75	Cotum	476
Aspa foetida	561	Calamentum montanum	ibid.	Centaminorbida	60	Crassula maior	30
Asterancium	310	Calceolus aromaticus	578	Cepe	446	Crassula minor	87
Astochodos	187	Calcitrapa	357	Cepe muris	451	Crescio	414
Arbanasia	14	Calendula	111	Cerefolium	425	Creta marina	398
Axungia vietri	88	Celiba	141	Cerui ocellus	418	Crista galli	354
<b>B</b> Abyron	417	Canonilla	137.139	Cerucaria	228	Crista gallinacea	96. 354
Balsamina	300	Canonilla fatua	139	Cestrum mortonis	352	Crocus hortensis	26
Balsaminum	299.300	Canonilla foetida	ibid.	Ceterach	278	Crocus sarracenicus	ibid.
Balsamita maior	175.176	Canonilla inodora	ibid.	Chachule	572	Crucata	124.372
Balsamita minor	ibid.	Campana laxura	267	Chafur	557	Cucullus monachi	291
Ran	573	Campanula	118.267	Chamedrys	20.96	Cucumber	405
Baptifecula	120	Campanula cerulea	130	Chamedrys	96	Cucumber anguinus	405
Barba Atron	218	Campanula sylvestris	130	Chamedrys femina	20	Cucumber asininus	253
Barba capri	33	Camphora	557	Chamepiteos	22	Cucumber marinus	407
Barba louis	87	Candela regis	92	Charantia	299.300	Cucumber tarticus	ibid.
Barbarea	436	Candelaria	ibid.	Cherunfel	571	Cucurbita	409
Barbarica	117	Camicularis	306	Chelidonia	25	Cupule glandium	523
Baucia	418	Camiculata	ibid.	Cherna	240	Carcuma	581
Becabunga	399	Capillus veneris	279	Cheravilla	419	Cuscuta	271
Bedeguar	361.459	Cappa monachi	291	Cicer	327	Cyclamen	222
Been album	233	Caprifolium	265.548	Cicerebita	389	Cynium	193
Behen	ibid.	Cardamoni	572	Cicorea domestica	388	Cynoglossa	8
Behen rubrum	ibid.	Cardamomum maius	ibid.	Cicorea sylvestris	ibid.	Cyperus	233
Bellegi	574	Cardamomum minus	ibid.	Cicustaria	427	Cypressus	539
Belle videre	130	Cardiaca	100	Cinnamomum	570	<b>D</b> Adillus	517
Bellileg	574	Cardobenedictus	366	Cuocacium	250	Darseni	569
Ben	573	Cardoparium	364	Citronium	496	Daucus	201.417
Benedicta	102	Cardamoni	572	Citrone	493	Daucus ceticus	2 201
Berberis	479	Carduus asininus	368	Citrullum	407	Dens caballinus	306

# Index.

Dens leonis	392	Frumentum turcicum	316	Hepatica 46.81.280.	371	<b>L</b> <i>Acerolles</i>	389
Denticula canis Ruchly	73	Fugadenomum	49	Hepatica aquatica	81	<i>Lactuca</i>	395
Diagredium	269	Fumax terræ	18	Hepatica palustris	81	<i>Lactucella</i>	389
Diapensia	106	Funis arborum	267	Herba caucæ	47	<i>Lanceæ Christi</i>	103
Digitalis	130	Fusenum	314	Herba clausulata	112	<i>Lancrola</i>	70
Digitalis eitrini	139	Fufaria	ibid.	Herba fortis	107	<i>Lanceolata</i>	ibid.
Dilegi	574	<b>G</b> <i>Alanga</i>	579	Herba fullonum	210	<i>Lapsium</i>	384
Dipranum	188.231	<i>Galbanum</i>	563	Herbe Gerardi	ibid.	<i>Lapsium acutum</i>	ibid.
Doronicum Roman.	584	<i>Galega</i>	335	Herba hungarica	404	<i>Lapdum</i>	461
Doronigi	ibid.	<i>Gallierium</i>	179	Herba giulia	176	<i>Lappa inuerfa</i>	12
Draco	433	<i>Gariophyllata</i>	102	Herba S. Iacobi	51	<i>Lappa maior</i>	ibid.
Durugin	584	<i>Gariophylli</i>	371	Herba impia	68	<i>Lappaminor</i>	ibid.
<b>E</b> <i>Lactarium</i>	233	<i>Genestella</i>	467	Herba margarita	127	<i>Larga</i>	345
<i>Embleg</i>	574	<i>Genestra</i>	464	Herba D. Marie	176	<i>Lassulata</i>	176
<i>Endiua</i>	387.396	<i>Genestra hispanica</i>	466	Herba parafyfis	94	<i>Laurudula veraque</i>	186
<i>Enule campana</i>	215	<i>Genista</i>	464	Herba Paris	289	<i>Laureola</i>	249
<i>Ernea</i>	430	<i>Genista humilis</i>	466	Herba S. Petri	94	<i>Lenticula aque</i>	81
<i>Efula</i>	244	<i>Genista spinofa</i>	467	Herba pinola	306	<i>Leporis cuminum</i>	344
<i>Euforbium</i>	365	<i>Genista sylvestris</i>	ibid.	Herba Roberti	37	<i>Leucopiper</i>	443
<i>Eufrafia</i>	31	<i>Genistella</i>	ibid.	Herba Simonis	404	<i>Lewificum</i>	207
<i>Eupatorium</i>	46	<i>Genziana</i>	224	<i>Nerba stella</i>	72	<i>Lignum aloës</i>	377
<i>Eupatorium aquaticum</i>	ib.	<i>Gibbago</i>	119	Herba stellaris	371	<i>Lilium</i>	147
<i>Ezula</i>	245	<i>Glandes terreftres</i>	336	Herba trinitatis	46.112	<i>Lilium comallium</i>	132
<i>Ezula rotunda</i>	246	<i>Glandiola</i>	30	Herba tunica	107.133	<i>Lilium inter spinas</i>	265
<b>F</b> <i>aba</i>	312	<i>Gluten albotin</i>	547	<i>Hernodactilus</i>	249	<i>Linotes</i>	495
<i>Faba crassa</i>	301	<i>Grana taniperi</i>	536	<i>Hippia veraque</i>	40	<i>Linaria 61 Lilium</i>	54
<i>Fabaria</i>	30	<i>Granatum pomum</i>	495	<i>Hirundinaria</i>	214	<i>Lingua anis</i>	515
<i>Faciens viduas</i>	250	<i>Granum ben</i>	573	<i>Hifpanach</i>	382	<i>Lingua bonis</i>	6
<i>Fagotriticum</i>	319	<i>Gratum viride</i>	547	<i>Hifpanicum olus</i>	381	<i>Lingua canis</i>	8
<i>Farfera</i>	15	<i>Gratia dei foli.</i>	37.255.	<i>Hoad</i>	377	<i>Lingua cermis</i>	276
<i>Febriofugia</i>	220	470.471		<i>Hypericum</i>	49	<i>Lingua pagana</i>	475
<i>Fel terra</i>	ibid.	<i>Groffularia</i>	477	<i>Hypoquifitoides</i>	461	<i>Lingua pafferina</i>	515
<i>Peria</i>	96	<i>Groffularia rubra</i>	478	<i>Hyffopus</i>	159	<i>Lingua ferpentis</i>	103
<i>Ferraria</i>	34	<i>Groffularia tranfmarina</i>	ibid.	<b>I</b> <i>aced</i>	212	<i>Liquiritia</i>	486
<i>Ferraria minor</i>	45	<i>Groffula</i>	477	<i>Iacca nigra</i>	83	<i>Lofium rubrum</i>	346
<i>Picaria</i>	21.34	<i>Groffula rubra</i>	478	<i>Iacoba</i>	51	<i>Longina</i>	277
<i>Filago</i>	67	<i>Groffula tranfmarina</i>	ib.	<i>Iaron</i>	218	<i>Lubia</i>	323
<i>Felicafram</i>	274	<i>Gruamatis</i>	38	<i>Iefuinum</i>	460	<i>Lucciola</i>	103
<i>Filipendula</i>	32	<i>Gulam</i>	52	<i>Iefumin</i>	ibid.	<i>Luch</i>	485
<i>Filius ante patrem</i>	57	<i>Gulugem</i>	579	<i>Iecoraria</i>	371	<i>Luf</i>	217
<i>Filix aquatica</i>	274	<i>Gummi armoniacum</i>	564	<i>Iefominum</i>	460	<i>Lunaria</i>	91.103
<i>Fifizi</i>	515	<i>Gummi betzui</i>	561	<i>Iofmenum</i>	ibid.	<i>Lunaria maior</i>	81.174
<i>Flammula</i>	262.288	<i>Gummi benzui</i>	ibid.	<i>Iofne</i>	ibid.	<i>Lunaria minor</i>	103
<i>Flos Adonis</i>	140	<i>Gummi dragaganthi</i>	568	<i>Ireos</i>	143	<i>Lupha</i>	218
<i>Flos anoris</i>	125	<i>Gummi vluu</i>	528	<i>Iringus</i>	357	<i>Lupulus</i>	272
<i>Flos cuculi</i>	435	<b>H</b> <i>Abel</i>	573	<i>Iris florentina</i>	143	<b>M</b> <i>Acis</i>	513
<i>Flos equeftris</i>	123	<i>Hallig</i>	574	<i>Iua arctica</i>	22	<i>Macropiper</i>	443
<i>Flos indianus</i>	431	<i>Haronigi</i>	584	<i>Iua mufcata</i>	20.12.371	<i>Maiorana</i>	165
<i>Flos S. Iacobi</i>	53	<i>Harnel</i>	148.307	<i>Iuibe</i>	507	<i>Mala infans</i>	297
<i>Flos regius</i>	123	<i>Hedera</i>	263	<i>Iafquianus</i>	306	<i>Mada</i>	401
<i>Flos tinctorius</i>	3.467	<i>Heil</i>	572	<b>K</b> <i>Ali</i>	10.88	<i>Mada Teophradi</i>	404
<i>Forniculus</i>	189	<i>Heilbane</i>	ibid.	<i>Kapher</i>	557	<i>Malmufcum</i>	403
<i>Forniculus porcicus foli.</i>	193.209	<i>Helleborus albus</i>	234	<i>Karobe</i>	519	<i>Mandradora</i>	296
<i>Fraxinella</i>	232	<i>Helleborus niger</i>	237	<i>Kerna</i>	240	<i>Marmorella</i>	45
<i>Frumentum afiaticum</i>	316	<i>Hepataria</i>	371	<i>Kcyri</i>	113	<i>Marium</i>	167
<i>Frumentum loculare</i>	313	<i>Hepatorium Mefue</i>	176	<i>Kivan</i>	357	<i>Materfilon</i>	83
				<i>Kalugem</i>	579	<i>Mater herbarum</i>	12

# Index.

Mater folia	265	Nux moschata	513	Pilosella	66, 67	Romora aratri	468
Mater violarum	111	Nux vesicaria	516	Pimpinella	105, 202	Rosina arida	543
Mastix	548	<b>O</b> Cellus	117	Pinastellum	209	Rosina pini	543
Matricaria	15	Ocellus cerni	643	Pionia	227	Rosina bovis	468
Matri salvia	179	Ocimum gariopbillatum	169	Piper aquaticum	440	Rubarbarum monacho-	
Medicina familia	545	fol.	169	Piper Calecutium	442	ram	384
Melanopiper	443	Oculus bovis	141	Piper hispanum	ibid.	Rapontica	210
Melica	318	Oleander	292	Piperitis	439, 440	Rheu	221
Mellilotus	341	Olibanum	551	Pira citonia	496	Rhesbarbarum	ibid.
Melissa	183	Opium	293	Pisaveli	325	Ribes	478
Melo	408	Opoponacum	560	Pix navalis	543	Ribes nigrum	ibid.
Melospinus	299	Origanum	167	Plantago	70	Ribes rubrum	ibid.
Membr	566	Origanum Hispanicum	ibid.	Planta leonis	106, 237	Ribesum	ibid.
Membrha	295, 567	Osmunda	274	Podagra lini	271	Robertiana	37
Menta aquatica	173	Osmundi	330	Polipodium	274	Rosavitrarumina	401
Menta graeca	176	Osteritium	110	Polytrichon	280	Rosmarinus	185
Menta romana	173	Ostritium	ibid.	Poma amoris	298	Ros solis	283
Menta sarracenia	ibid.	Ostritium	ibid.	Pomum amoris	ibid.	Rostum ciconiae	37
Mercurialis	60	<b>P</b> Aldia	222	Pomum aureum	ibid.	Rostum porcinum	392
Mes	226, 423	Palma Christi fo.	159, 240	Pomum granatum	495	Rouglione	325
Mezereon	250, 251	Pampinula	105, 201	Pomum Hierosolymita-		Ruberta	37
Milium foler	205	Paniculi	344	nam	300	Rubia sinforum	370
Milium folis	ibid.	Panic porcinus	222	Pomum mirabile	ibid.	Rubia 184 Rufcus	472
Millefolium	109	Papaver album	293	Pomum spinosum	299	<b>S</b> ac	555
Millemorbis	34	Papaver commune	ibid.	Porram	447	Sacolla	572
Monardica	300	Papaver magnum	ibid.	Potentilla	65	Salicaria	57
Mora basii	462	Papaver nigrum	ibid.	Prasium	181	Salicornia	88
Mora bati	ibid.	Papaver rubrum	ibid.	Prasium foetidum	ibid.	Sal alkali	ibid.
Mora celsi	501	Paracoculi	299	Primula veris	94	Salibacha	570
Morella	301	Peritaria	39	Prunella	101	Salvia agrestis	177, 178
Morsus diaboli	84, 190	Passula de corinbo	455	Pulegium	163	Salvia maior	177
Morsus galline	40, 44	Pastinaca	418	Pulmonalis	95	Salvia minor	ibid.
Morsus rane	81	Pera pastoris	62	Pulmonaria	95, 282	Salvia nobilis	ibid.
Mulstradix	220	Perfoliata	104	Pulsatilla	286	Salvia romana	176
Mumia	557	Perfoliatum	ibid.	Pyrethrum	230	Salvia visa	279
Myrabolani	574	Perforata	49	Pyrola	102	Salvia vnaalis	177
Myrrha	553	Periscaria	441	<b>Q</b> Vercula minor	10	Salsindria	196
Myrtilli	472, 481	Persicum	497	Quinquefolium	36	Sambucus aquatica	535
Myrtus	471	Perninea	26	Quinqueneruia	70	Sambucus ceruinus	257
Myrtus brabantica	471	Pes aserinus	375	<b>R</b> Apa genestre	465	Sambucus palustris	535
<b>N</b> Apellus	291	Pes asinus	446	Rapa rubra	377	Sambucus sylvestris	257
Napium	385	Pes columbe	37	Rapecanlis	380	Samarunda	102
Nardus rustica	102	Pes cornicis	286	Raphanus minor	414	Sandal	575
Nasturtium aquaticum	435	Pes corni	ibid.	Raphanus sylvestris	440	Sandalum	ibid.
Nasturtium commune	414	Pes leonis	106	Rapiens bitan	290	Sandaraca	316, 558
Nasturtium hybernum	436	Pes leopardi	286	Rapistrum	413	Sandarax	538
Nasturtium tectorum	457	Pes leporis	344	Rapontium	413	Sanguis draconis	384
Negre caules	380	Pes lupi	281	Rapum geniste	465	Sanguisorba	105
Nepita	175	Pes vituli	218	Rapunculum	413	Santula	106
Nenuphar	355	Petrasindula	202	Rapunculum minus	ibid.	Santolina	23
Nigellastrum	119	Petrofelinum	420	Rapunculum parvum	ibid.	Saponaria	119, 210
Nola sylvestris	130	Petrofelinum macedoni-		Raued	221	Sarcecolla	557
Noli me tangere	60	cum	422	Raued ferni	ibid.	Satargia	160
Noces cyprosi	539	Pescadanum	209	Raued tartaricum	ibid.	Satyriones	152 & inde
Noces pinee	542	Philipendula	32	Rauet	ibid.	Saurina	538
Nymphularia	60	Pigamum	33	Rauet ferni	ibid.	Savina	ibid.
Nux	513			Regina prati	33	Saxifraga	202

# Index.

<i>Saxifraga alba</i>	203	<i>Sigilla beate Marie</i>	260	<i>Suchaba</i>	365	<i>Viperina</i>	7
<i>Saxifraga aurea</i>	ibid.	<i>Sigillum Salomonis</i>	78	<i>Sumach</i>	485	<i>Virga aurea</i>	108
<i>Saxifraga alba femē</i>	202	<i>Siler montanum</i>	199	<i>Superba</i>	117	<i>Virgopastoris</i>	359
<i>Saxifraga lutea</i>	342	<i>Sinapis</i>	430	<b>T</b> <i>amarifco</i>	474-540	<i>Viscus quercinus</i>	524
<i>Saxifraga rubra</i>	32	<i>Sinapium</i>	ibid.	<i>Tanacetum</i>	14	<i>Vitaba</i>	262
<i>Saxifraga minor</i>	101	<i>Spasachea</i>	381	<i>Tanacetum sylvestre</i>	65	<i>Viscella</i>	259
<i>Saxifraga minor</i>	ibid.	<i>Sparta parilla</i>	269	<i>Tapsus barbatus</i>	92	<i>Vmbilicus veneris</i>	30
<i>Scabiosa genera</i>	82-83	<i>Spartula foetida</i>	145	<i>Taraxacon</i>	389	<i>Vngula caballina</i>	15
<i>Scammonia</i>	269	<i>Spelta</i>	310	<i>Terebinthina</i>	545	<i>Vnfolium</i>	132
<i>Scariola</i>	387	<i>Speragus</i>	429	<i>Terebinthina veneta</i>	544	<i>Volubilis</i>	267
<i>Scarla</i>	179	<i>Spergula</i>	44	<i>Testiculus herci</i>	155	<i>Volubilis acuta</i>	269
<i>Scatum coeli</i>	30	<i>Spergula odorata</i>	371	<i>Testiculus lepoyis</i>	ibid.	<i>Volubilis media</i>	267
<i>Scatum cellus</i>	ibid.	<i>Spica celtica</i>	283	<i>Testiculus vulpis</i>	155-156	<i>Volubilis pungens</i>	269
<i>Secvola</i>	77	<i>Spicata</i>	08	<i>Thymianna</i>	556	<i>Vrindis</i>	61
<i>Scirpus</i>	146	<i>Solanon lignosum</i>	270	<i>Thus</i>	543-545	<i>Vrta</i>	282
<i>Scelopendria</i>	276	<i>Solatrum</i>	301	<i>Thus Indecorum</i>	556	<i>Vtilago</i>	321-355
<i>Serophularia maior</i>	43	<i>Solatrum mortale</i>	303	<i>Thymus</i>	161	<i>Vna cristfa</i>	477
<i>Serophularia minor</i>	52	<i>Solbaftrilla</i>	105	<i>Tinearia</i>	68	<i>Vna lapina</i>	289-301
<i>Sebesten</i>	506	<i>Soldanella</i>	268-283	<i>Toea bona</i>	385	<i>Vna versa</i>	289
<i>Segala</i>	314	<i>Soppia</i>	89	<i>Tornemilla</i>	64	<i>Vna vulpis</i>	301
<i>Sebycha</i>	570	<i>Sorgi</i>	317-318	<i>Trifolium acetosum</i>	344	<i>Vulgago</i>	215
<i>Semen contra</i>	4	<i>Spinachea</i>	381	<i>Trifolium bituminosum</i>	343	<i>Vularia</i>	376
<i>Semen sanctum</i>	ibid.	<i>Spinachem olus</i>	381	<i>Trifolium humile</i>	344	<i>Vularia</i>	128-473
<i>Semen lambriocorum</i>	ibid.	<i>Spina mollis</i>	391	<i>Trifolium odoratum</i>	339-343	<b>X</b> <i>ylotracta</i>	519
<i>Sena</i>	256	<i>Squilla</i>	451	<i>Turbid Mesue</i>	247	<b>Y</b> <i>sopus</i>	159
<i>Serapinum</i>	563	<i>Squinatum</i>	351	<i>Turbit Serap.</i>	ibid.	<i>Yrcos</i>	143
<i>Serbin</i>	537	<i>Staphisagria</i>	252	<i>Typha aquatica</i>	352	<b>Z</b> <i>abafan</i>	151
<i>Serpentaria</i>	17-60	<i>Stellaria</i>	72-106-317	<i>Valeriana</i>	229	<i>Zambach</i>	460
<i>Serpentaria maior</i>	117	<i>Sticados arabicum</i>	187	<i>Verbena</i>	99	<i>Zarfaparella</i>	169
<i>Serpillium</i>	163	<i>Sticados cistrinum</i>	68	<i>Vernicularis</i>	87	<i>Zedoaria</i>	520
<i>Serratula</i>	20	<i>Sticcas arabica</i>	187	<i>Veronica</i>	20-205	<i>Zinziber</i>	579
<i>Serullia</i>	ibid.	<i>Sticcas cistrina</i>	68	<i>Verrucaria maior</i>	47	<i>Zinziber caminum</i>	442
<i>Serratulum</i>	419	<i>Storax calamita</i>	556	<i>Victoriola</i>	473	<i>Zinzania</i>	310
<i>Sicla</i>	377	<i>Storax rabyra</i>	ibid.	<i>Vinea peruvica</i>	26	<i>Zuccomerin</i>	407
<i>Siclicia</i>	ibid.	<i>Seramania</i>	299	<i>Viola</i>	111	<i>Zarumbeth</i>	580
<i>Sicba</i>	417	<i>Succifa</i>	84	<i>Violaria</i>	ibid.		

F I N I S.

## TABLE DES NOMS FRANCOIS DES Herbes contenues en cest Herbicr.

<b>A</b> <i>bricos</i>	497-498	<i>Alliaire</i>	446	<i>Arbonfes</i>	571	<i>Auelaine</i>	555
<i>Ache</i>	410	<i>Aloyne</i>	4	<i>Argentine</i>	66	<i>Aueron</i>	346
<i>Ache d'eauē</i>	414	<i>Alquequanges</i>	302	<i>Armoiries</i>	116	<i>Aulne</i>	551
<i>Grande Ache</i>	422	<i>Aluyne</i>	4	<i>Armoiries fauuag.</i>	ibi.	<i>Aulne noir</i>	551
<i>Ache fauuage</i>	413	<i>Aluyne marine</i>	ibid.	<i>Armoife</i>	11	<i>Auoyne</i>	393
<i>Agaric</i>	545	<i>Aluyne romaine</i>	ibid.	<i>Arreste beuf</i>	468	<i>Aurōne</i>	2
<i>Agoure de lin</i>	270-271	<i>Amandes</i>	498	<i>Arroches</i>	373-374	<i>Aurōne odoriferate</i>	2
<i>Agripaulme</i>	100	<i>Amandier</i>	ibid.	<i>Arroches fauuag.</i>	374	<i>Aureille de lieure</i>	49
<i>Aigras</i>	435	<i>Ammi</i>	192	<i>Artichaus</i>	359-360	<i>Aureille de fouris</i>	42
<i>Aigremoine</i>	45	<i>Ancoflye</i>	114	<i>Asperges</i>	428-429	<b>B</b> <i>acille</i>	398
<i>Aiguille de berger fol.</i>		<i>Angelique</i>	208	<i>Aspergoute menue</i>	28	<i>Baguenaudier</i>	516
<i>Ail</i>	444 (426-427)	<i>Aneth</i>	190	<i>Anis</i>	191	<i>Barbe de bouq</i>	125 (517)
<i>Ail de chien</i>	449	<i>Anthillis</i>	9-10	<i>Athanasie</i>	13-14	<i>Barbe de Cheure</i>	33
<i>Ail de iardin</i>	444	<i>Apparitoire</i>	39	<i>Aubeau</i>	526	<i>Bardane</i>	11
<i>Ail d'ours</i>	444-445	<i>Arbofes</i>	511	<i>Aube espine</i>	489	<i>Basilic grand</i>	169
<i>Ail fauuage</i>	ibid.	<i>Arboficr</i>	ibid.	<i>Aubifoin</i>	120	<i>Basilic petit</i>	ibid.
						<i>Basilic fauuag.</i>	169-170
						<i>Bafinet</i>	

# Table.

Bafinet 186.187.188	Byus poignant 472	Chou blanc 380	Couillô de Renard 155
Bafinet blanc 186	<b>C</b> Abaret 215	Chou de mer 268	Couillô odoriferât ib.
Bafinet d'eauë ibid.	Calament 174	Chou favauge 381	Couleurée blanche fol.
Bafinet de pres 25	Calamêt de môaigne	Choux 378.379.380	258.259
Baulme crefpu 171.173	Cameline 37 (ibid.)	Choux cabus 378.380	Couleurée noire 259
Bayes de Jeneure 536	Camomille 136	Choux crefp 379.380	Couleurée fauva. 260
Bayes d'yurongne 251	Camo. blanche 136.137	Choux floriz 378.380	Courge 408.409
Bayes de laurier 481	Camomille de chié 139	Choux rouges 379.380	Courge grande 410
Bec de cocoigne 35.36	Camomille iaulne fol.	Choux de fauoye 380	Courge lôg. 409.410
Bec de grue ibid.	136.137	Cices 327	Courge petite ibid.
Bec d'oye 66	Camom. purpurée 137	Cichorée 386.387.388	Coulines 469.470
Benioin 561	Camo. favauge 138.139	Cichorée domestique	Cresson alnois 414
Benoitte 101	Campanette 267	378.388	Cressô de eauë 434.435
Berle 399.424	Camphre 557	Cichoréeiaulne ibid.	Cresson rustique 437
Bete 377	Cappres 476	Cichorée favaug. ibii.	Creste de coq 355
Bete blanche 376.377	Canne 352.353	Cicutaire 427	Crette marine 398
Bete rouge ibid.	Canne de fucce 353	Cigue 307 Coing 496	Croyfée 224.372
Betoëfne 250	Canelle 570	Citrons 493	Croyfette 372
Betoiné ibid.	Carline 364	Coignacièrè ibid.	Curaige 440.441
Biftorte 17	Carline favauge 365	Coingnaffe ibid.	Cuyderelles 117
Blanc d'eauë 135	Carottes 193	Clous de Gyroffle 571	Cypres 539
Blattaire 92.93	Carotte fauva. 200.201	Coloquinte 254.407	Cypres de jardin 23
Blaucolé 120	Carrobes 519	Comin 193	<b>D</b> Actes 517
Blé de mars 309	Carrouges ibid.	Comin large 199	Dactier ibid.
Blé de Turquie 316	Carui 193	Comin fauva. 194.196	Dent au chien 72.345
Blé de vache ou de	Catherine 462	Concombre 405.408	Dictam 188
beuf 122	Centaurée 219.220	Concôbre citrin 407	Dictâ bastard 188.231
Blé noir 320	Cerfueil 425	Concôbre de Turquie	Digitale 130
Blé farrasin 316	Cerifes 508	ibid.	Double fueille 157
Blette 374.375	Cerifer 507.508	Concôbre marin ibid.	Dragée aux cheuaux
Bleüet 120	Chanure 56	Concôbre favauge 223	Dragon 433 (329)
Bluet ibid.	Chardô à card. 358.359	Côfoulde moyêne 100	<b>E</b> llebore blanc 234
Bolbonac 115	Chardô à cêt teffes 357	Confoulde royale 123	Ellebore blanc fau
Bonnes dames 373.374	Chardô à foulon 359	Côfoulde farrasine 107	uage 157.235
Bouillon 92	Chardô aquatique fo.	Confyre 110	Ellebore noir 236.237
Bouillon blanc 90.91	368.369.	Coq grand 175	Ellebore noir bastard
Bouillon noir 91	Chardon argentin 362	Coq petit ibid.	fol. 236
petit Bouillon 93.94	Chardon benit 366	Coquelicoq 294.295	Encens 551
Bouillon favauge 91	Chardon d'afne 368	Coquelourde 150	Endiue 387
Bouleau 53	Chardon efrâger 361	Coqueluchon de moy	Englentier 459
Bourfâche 9	Chardon. N. dame 360	ne 291	Enule campane 225
Bourfe de berger 62	Char. fau. 367.368 (361	Coquu 94	Erable 530.535
Boys à faire lardoires	) 75	Coralline 283	Ers 329
Boys d'aloës 577 (534	Chaffe boïle 75	Coriandre 194	Efciaire 25
Boys puant 511	Chafnaigne 512	Corme 510	Efpargoutte 15
Branche vrfine 362	Chafnaignier ibid.	Cormuer ibid.	Efpautre 320
Brâche vrfine balt. 363	Chaufte trape 357	Côrne de cerf 71.72	Efperon de cheualier
Bruiere 474.475	Chelidoine 25	Cornelle 57	fol. 123
Bruiere favauge 474	Cheneuc 56	Cornilier 509	Efpi de eauë 80
Bruflure 321 Bugle 101	Chenneuis ibid.	Cornoilles ibid.	Efpinars 381.382
Bugloffe 6	Cherui grand 418	Corrigiole 75	Efpine de bouq 567
Bugloffe favauge ibid.	Cherui petit 419	Coton 476	Efpine vinette 479
Bulbe à menger 449	Cherui favauge 418	Couillon 152.153.154	Efpurge 245
Bulbe de sardin ibid.	Chefne 523	Couillon de bouq 154	Eftoillée 28
Byus 499	Chefnette 20	Couillon de chien 155	Eupatoire 45
Byus d'afne 490	Cheure fueille 265.548	Couillô de lieure 155	Eupatoire bastard 46
Byus efpineux ibid.	Cheueux de venus 179	Couillô de preftre 134	Euphrate 31
	Chicotrin 30		<b>E</b> iii Faine

# Table.

Faine 532 Fau	ibid.	Gentiane sauvaige	224	Herbe au foye	45	Langue de beuf	69
Fenegrec	337	Germandrée	20	Herbe au lait	38. 242.	Langue de beuf sauvaige	ibid.
Fenoil	189	grande Germandr.	85	243		Langue de brebis	ibid.
Fenoil de cheual	ibid.	Gingembre	579	Herbe aux cloches	30	Langue de cerf	276
Feno.de pourceau	209	Giroflée	114.117	Herbe aux cuillers	89	Langue de chien	8
Fenoil grand	189	Gyrofl. de eaué	80.81	Herb. aux grappes	170	Langue de serpent	103
Fenoil marin	398	Giroflée iauline	113	Herbe aux mittes	93	Lappe	11
Fenoil sauvaige	189	Gland	523	Herbe aux perles	205	Lauande femelle	186.
Fenugrec	336.337	Gland terrestre	336	Herbe aux pouds	354	187	
Feuchere	273	Glaieu	144.145	Herbe aux pouilleux	(32)	Lauande mafle	186
Feucere aquatiq	274	Glaieu de marés	144	Herbe aux poul-	95.281	Laureole	249
Feue	322	Glaieu puant	145	mons	78	Laurier	482
Feue de bouq	372	Glaieu de riuere	144	Her. aux fcorpions	48	Laurier Alexádrin fol.	472.473
Fiel de terre	220	Gleteron	11	Herbe aux serpens	7	Lentille	333
Figue	503	Glorieufe	117	Herbe aux tigneux	16	Lentille d'eaué	81
Figuier	ibid.	Glouteron	11	Herbe aux viperes	7	Lentisque	547
Figuier d'Inde	565	Glouteron aigu	11	Herbe de chat	376	Leueffe	207
Figuier sauvaige	503	Goute de lin	170.271	Herbe de chien	39	Limons	498
Filipende	32	Grace de Dieu	37	Herbe de Chrifl	237	Lin 34 Linaire	61
Filipendule	ibid.	Graciote	255	Herbe de cucur	95.172	Lin sauvaige	ibid.
Fior di criflallo	88	Grain de canare	37	173		Liferon alpre	268
Flambe	143	Grain d'Espaine	ibid.	Herbe d'Efpruiuer	390	Liferon blanc	266.267
Flambe baftarde	144	Graine de paradis	372	Herbe militaire à mille	108.	Liferon noir	267
Flambe blanche	143	Grame	343	ficilles	108.	Lifet	ibid.
Flamble bleüe	144	Gramé de Parnas	349	Herbe militaire aquati	que	Lifet piquant	269
Flámule aquatique	288	Grateron	370	que	ibid.	Liuefche	206.207
Fleur de coqu	117	Gremil grand	104.205	Herbe Robert	36	Locar	313
Fleur de criflal	88	Gremil petit	104	Herbe S.Barbe	436	Lunsaire	303
Fleur de mars	359	Grenadier	495	Herbe S.Iaques	54	Lupin	328
Fleur de S.Cather	296	Grenouillette	286	Herbe S.Iean	11	Lyarre	263
Fleur dorée	142	Grenouil.aquatique ib.		Herbe vermineufe	93	Lyarre noir	ibid.
Fleur monnoyere	115	Grenouille, dorée ibid.		Heritage de geline	44	Lyarre petit	ibid.
Fleur de S.Iaques	54	Grenouill.de bois ibid.		Hermodaéte	248	Lyarre terrestre	264
Foin de bourgongne	fol. 342.343	Greno.heriffonnée ib.		Heflre	529	Lyerre	263
Foin dur	50	Groifcher	477	Houblon	272	Lyonne	225
Fourdeines	506	Groiffelles	ibid.	Houx 491 Hyeble	258	Lys blanc	146.147
Fouteau	512	Groi.d'oultre mer	478	Hyflope	159	Lyfimachie	32ca.
Fraifes 65 Fraifier	ibid.	Groiffelles noires	ibid.	Hyfl.de Garignes	470	Lyfimachie bleüe	ibid.
Framboifes	463	Groiffelles rouges	ibid.	Iacynthe	148.149	Lyfimachie iaulfie	ibid.
Framboifier	ibid.	Gryotes	508	Ialmin	460	Lyfimachie rouge	ibid.
Frefne	515	Gryotier	ibid.	Iaune d'eaué	35	Lys rouge	146.147
Frefne sauvaige	ibid.	Guimaulue	402.403	Ienere 536 If	540	Lys sauvaige	148
Froment	309	Guimaulue de Venife	fol.404	Ionc	350	M	
Fumeterre	18	Guina.fauu.	403.404	Ióc à faire nattes	351	Macres	369
Fulfain	534	Guines	508	Iofemin	460	Mandragore femelle	296
G		Guiner	ibid.	Iotte	377	Mandragore mafle	ib.
Antelée	228	Gueffe 52 Guy	524	Ioubarbe	86.87	Marguerite grande fo.	116
Gans N.dame	ibid.	H		Iuibes	507	Marguerites	117
Garance	369.370	Acheroyalle fol.	452.453	Iufquame	305.306	Mariolaine	165
Garipot	543.545	Halicacabon	302	L		Mariol. baftarde	167
Gaffe 320	Genefle	Hannebane	305.306	Aiéctron	388.389	Mariolau. d'Angleter-	re
Genefle d'Espai.	467	Hepatique	46.280.371	Laiétue	394.395	ibid.	
Genefle epineux	ibid.	Hepatique d'eaué	81	Laiétue sauvaige	396	Marrubin	180.181
petit Genefle	468	Herbe à cét malad.	60	Laiétue tefue ou pom	mée	395	Marru-
Genefle sauvaige	467	Herbe à cotton	67				
Genéure	336	Herbe à feu	237.288				
Gentiane	223.224						

# Table.

Magrubin	180.181	Mouffe de mer fol.	282	Orge	314.315	grand Perfil	422
Marrubin noir	ibid.		283	Orge mondé	312	Perfil de iardin	420
Marrubin puant	181	Muguet	371	Origan	166.167	Perfil de macedo.	421
Martean	352	grand Muguet	372	Origan de bouq	168	Perfil de mares	420
Mastix	548	petit Muguet	371	Origan fauuage	167	Perfil de montaig.	421
Maffes	352	Myrabolans	574	Orme	518	Perfil de roches	ibid.
Matricaire	15	Myrrhe	533	Orme fauuage	ibi.	Perfil fauuage	423
Maulue	400.401	Myrte	481	Orpin	30	Peruence	25
Maulue de iardin	401	Myrte fauuage fo.	471.	Ortye	98	Pefches	496
Maulue fauuage	ibid.	472.		Ortye grande	ibid.	Pefches	ibid.
Melilot	341.342	<b>N</b> Afitort	434	Ortye griefche	ibid.	Peucedanon	208.209
Meliffe	183	Nauveau	411	Ortye morte	ibid.	Peuplier	326.327
Melon	408	Nauveau de S. Antoine		Ortye pesite	ibid.	Phaleoles	333
Mente	171.172	287		Ortye romaine	ibid.	Pied d'Alexandre	230
Mente aquatique fol.		Nauveau de Gene.	465	Ouale	178	Pied d'Aloüette	123
172.173		Nauveau rond	410	Ozeille	274	Pied de coq	286
Mente cheualine	ibid.	Nauet	411.412	Ozeille	383.384	Pied de corbeau	ibid.
Mente crefpue	171.172	Nauet fauuage	411.412	Ozeille de brebis	384	Pied de corneille	71
Mente Noft. Dame fo.		413		Ozeille petite	383.384	Pied de geline	18
171.173		Neffe	501	Oziere	512	Pied de lieure	344
Mente Romaine	173	Neffber	500	<b>P</b> Ain de cocu	344	Pied de Loup	283
Mente fauuage	ibid.	Nenuphar blanc	135	Paï d'oyseau	86.87	Pied de lyon	106
Mercuriale femelle	60	Nenuphar iaulne	ibid.	Pain de pourceau	222	Pied d'oyseau	333
Mercuriale mafle	ibid.	Nid d'oyseau	317.201	Palais au lieure	388.389	Pied d'oyfon	375
Merueille femelle fol.		Nielle	195.196	Palmier	517	Pied de pigeon	35
299.300		Nielle de damas	196	Panic	317.318	Pied de veau	218
Merueille mafle	ibid.	Nielle fauuage fol.	195.	Panic d'Inde	ibid.	Pignons	542
Meteil	312	196		Parelle	382.384	Pilofelle	66.67
Meures	501	Nielle vulgaire	199	Parelle fauuage	384	Pimpinelle	109
Meurier	ibid.	Noifettes	515	Parietaire	39	Pin	541.542
Meurons	462	Noifette S. Antoine	516	Pas d'Asne	15	Piffenlicé	391.392
Micocoules	511	Noifettier	514.515	Pas de cheual	ibid.	Piftaces	515
Micocoulier	ibid.	Noifille	515	Pafquettes	127	Piftacier	ibid.
Mil	315	Noix	513	Pafcleur	286	Piuoine	227
Millefueille	110	Noix de terre	400	Pafferage	439.440	Plane	530.531
Millepertuys	49	Noix galle	523	Pafferage fauuage	435	Plantain	70
Millet	315	Noix mufcade	513	Paffevelours	125	Plantain d'eauë,	ou 2-
Moly baftard	348.349	Noyer	512	Paftenade	417	quatique	73.577
Moly de Pline	ibid.	Nombriil de venus	29.	Paftenade iaulne foli.		Plantain de mer	70
Monnoyere	60	30.		416.417		grand Plantain	ibid.
Moſelle	301	<b>O</b> Biere	534.535	Paftenade rouge	ibid.	petit Plantain	ibi.
Morgeline	40	Oeil de beuf	141	Paftenade fauuage	417	Plante Cotoniere	475
Morgel. baftarde	ibid.	Oeillets	117.118	Patience	382.384	Plante de Lion	237
Mors de diable fo.	84.	Oeillets Dieu	118	Paste de loup	282.283	Pois	314.325
390		Oeillets d'Inde	131	Paulme de Chrift	240	Pois cices	326.327
Mors de geline	44	Oeillets fauuages	119	Pauot	292.293	Pois raniers	324.325
Mors de grenotle	81	Oignon	446	Pauot cornu	295	Pois fauuages	ibid.
Mort au chien	249	Oignon de mer	451	Pauot fauuag.	293.294	Poix	543
Mofe	494	Oignon de fouris	ibi.	Pelleboffe	57	Polypode	274
Morueninc	337	Oignon fauuage	450	Penſée	112	Polytrichon doré	281.
Moſtarde	430	Oignon fauuage blanc		Perroquet	213.239	Pome	492 (283)
Moſtarde blanche	ibi.	451		Perfeueille	104.357	Pomier	ibid.
Moſtarde de iardin	ib.	Oliue	518	Perficatre	441	pomme de coing	496
Moſtarde fauuage	ibi.	Oliuier	ibid.	Perceles	120	Pomme de grena.	495
Mouche	154	Oliuier fauuage	ibid.	Perfil	410.411	Pomme d'oreng	493
Mouron	42	Opiere	535	Perfil d'afne	427	Pomme de perou	299
Mouffe	281.283	Orchanette	6	Perfil d'eauë	424	Pomme eſpineufe	ibi.

# Table.

Pommes d'amour 297	Raisins de Corint. 455	Scabieuse 82	Tournesol 47
Pômes dorées 298(198)	Recanemêt d'Asne 121	Scabieuse de brebis fo. 82.83	Toute bonne 385
Pommes de rage 297	Renouée 74-75	Scammonée 269	Trefle 343
Ponceau 295	Resine 543	Scariole 387	Trefle bas 344
Popons 406-407	Reuilematin 242.243	Scolopédie vraye 278	Trefle bitumineux 343
Porée 377	Reuilem. de vig. 246	Scrophulaire grâde 34	Trefle odoriferant 339
Porreau 447	Rha de turquie 221	Scrophulaire petite 25	Trefle de prés 338
petit Porreau 448	Rheubarbe 221	Schelles 506	Trefle puant 345
Porreau testu 447	Rheubarbe bastard 33	Sél N. Dame 260	Trefle sauage 340
Porreau fétil ibid.	Riguelisse 486	Seigle 313.314	Tremble 527
Pouliot 163	Rôpt pierre blâch. 203	Senec 256	Triplet 338
Pouliot sauage 174	Rôpt pierre dorée ibi.	Seneccon 393	Triquemadame 87
Pourcelaine 397	Ronce 462	Seneson ibid.	Troefne 483
Pourpier 396-397	Roquette 472	Seneuf 430	Tuë chien 248.249
Pourpier de mer 397	Roquette sauage ib.	Seneué de iardin 430	Tuë loup 290.291
Pourpier sau. 396-397	Rofage 291.292	Seneué rustique 437	Tuëpouds 252
Poyre 499	Rofagine ibid.	Seneué sauu. 430.437	VAciet 248.249
Poyre de Coing 496	Rofeu 353	Seriphe 4 Serpetaire 17	Valeriano 229
Poyrier 499	Rofe. à faire nattes 351	Serpellet vulgaire 163	Valeriane groque foli. 228.229
Poyuro 443	Rofe 458.459	Seseli 199.200	Valeriane sauage 229
Poyure aquatique 440.	Rofe blanche 458	Signet de salomon 78	Velar 431
Poyure blanc 443	Rofe de chien 459	Signet N. Dame 260	Venche 25
Poyure d'Espaig. 442	Rof. de outre mer 401	Smilax aspre 269	Verangenes 297
Poyu. d'in de 441. 442	Rofe de prouince 458	Solanum dormitif 304	Verd de vesie 488
Poyure long 443	Rofe mulquée ou mu- scadelle ibi.	Solanum furieux ibid.	Verge de berger 359
Poyure noir ibid.	Rofe sauage ibid.	Solanum mortel 303	Verge d'or 108
Poyurette 196	Ro. sentât la canelle ib.	Sorbe 510	Venus 455
Prune 305	Rofmarin 185	Souchet 233	Vermiculaire 86
Prunelle 101	Roufee de foleil folio 281.283	Soucy d'eauë 57	Vernis 536
Prunes de cheual 506	Ruë de iardin 183.184	Souffe 121	Vesce 330
Prunes sauages ibid.	Ruë de mur. 279	Squille 451	Vesce sauage 330-331.
Prunier 505	Ruë sauage 183.184	Stanca casallo 255	332
Prunier sauage 506	Safra 151	Staphisagire 252	Veronique 20
Pulmonaire 95.281	Safran bastard 26	Stipouille 451	Veruaine 96
Pyment 170	Safran bastard sau. 366	Suisse 54 2 Sumac 485	Veruaine basse 96.97
Pyrethre 230	Safran sauage 26	Sumac sau. de Pli. ibid.	Vigne cultiuée fo. 454
Pyrethre sauage 231	Salicot 88 Sandal 575	Sus 257	455
Pyrole 102	Sanicle 106 Sapin 544	Suy 256.257	Vigne sauag. 260.455
Queuë de cheual 75.	Sapin rouge 543	Sycomore 502	Violette blanche 351
76	SarcoColle 556	T'Abouret 62	Violette d'Autûne fo.
Queuë de pourceau f. 208.209.	Sariette 160	Tamaris 474	128
Queue de renard 413	Sarrasine 212	Tamaro 260 Tanasie 13	Violette de Damas 114
Queuë de fouris 73	Satyriion à trois fueil- les 157	Tannehe blâche 13.230	Violette de Marie 129
Quinte fueille 63	Satyriion rouge ibid.	Tânehe sauage 65.66	Violette de Mars 111
Racine blanche 78	Satyriion royal 158	Terebinthe 547	Violette de quaresme ibid.
Racine creufe 213	Sauge 177	Terebinthine 545	Violette herbue 117
Racine fanguine 37	Sauge franche ibid.	ze 544	Viome 212.262
Rac. sentât les roses 230	Sauge grande ibid.	Thim 161	Vnefueille 132
Racine souffreuse 209	Sauge sauage 178.181	Thymbre 162	Vifnaga 426
Raifort 414	Sauz 522 Sauvier 538	Thlasp 436.437	Vit de prestre 218
Raifort d'eauë ibid.	Saxifrage 201	Thlasp de candie 438	Vitreole 267
grand Raifort 415	Saxifrage blanche 203	Tillet 529 Tilleu ibid.	22
Raifort sauage 414	Saxifrage dorée ibid.	Tithimale 241.242.243	Yue musquée ibid.
Raiponce 413	Saxifrage iaulne 342	Tormentille 64	Yuraye 310
Raiponce grâde 412.413		Tortelle 431	
Raïin de renard 289			



# Register vanden Brabantſchen

ende Nederlantiſchen naemen ende toenaemen van alſen cruyden ende  
ghewaffen die in deſen Cruydenboeck beſchreuen  
ende ghefigureert ſtaen.

<b>A</b> Weelboom 527	witte andoren <i>ibid.</i>	roode Deet <i>ibid.</i>	Doelkenſcruct mā-
Acacia 480	Androſemou 50	Boomſche Deet <i>ibid.</i>	nekey 45
Aceris 53. 535	Angelica 208	witte Deet <i>ibid.</i>	doelkenſcruct wiſ-
Aconitum 289	Anijs 191	Den 573	ken <i>ibid.</i>
Adick 258	Antyſtis 9	Derckenboom 52	boom varen 274
Aelbeſien 478	Apſace 32	Dernagie 9	boom wolle 476
roode Aelbeſien <i>ibid.</i>	Apios 214	Deſekens ouer 3er	booney 32
ſwerte Aelbeſien <i>ibid.</i>	Appelboom 492	478	grootte booney 33
Aethiopia 94	Appelen <i>ibid.</i>	Deſſenſcruct 437	roomſche Doonkens
Affodillen 453	Arangie appelen ſo.	Detonie 205	<i>ibid.</i>
Algaricus 545	493	deyn witte Detonie	ſwerte booney <i>ibid.</i>
Alnus caſtus 484	granaet Appelt ſo.	94	wilde booney <i>ibid.</i>
Algrimonie 45	495	witte Detonie <i>ibid.</i>	zeuſche booney <i>ibid.</i>
Alijenij 446	queappelen 496	Dertram 230	bonagie 9
Belt Alijenij 450	Arabis 430	wilden Dertram 231	boſekens 62
wit Belt Alijenij 451	Arbutus 518	Deuernaect 202	Water bloemen 288
zee Alijenij <i>ibid.</i>	Ariſarum 219	Beuernelle <i>ibid.</i>	Blauw boterbloe-
Aleſey 124	Artechants 360	Diefen 350	men 37
Alantwortel 225	Auroey 2	matten Diefen ſol.	dobbel boterbloem
Alſſſranche 270	Auroey manniken	351	288
Algoede 385	<i>ibid.</i>	merck Diefen 350	enckel boterbloem
Alpſſoj 81	Auroey wiſke <i>ibid.</i>	ſtrop Diefen <i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>
Aloe 239	welriekende Auroe	ſſeren Diefen <i>ibid.</i>	grootte boterbloem
Alrupn manniken	<i>ibid.</i>	Diefſlooch 448	<i>ibid.</i>
296	<b>B</b> Aelae 482	Wijnoot 12	water boterbloet 81
Alrupn wiſke <i>ibid.</i>	Balfene 176	Wiffen 306	witte boterblo. <i>ibid.</i>
Alſene 4	Balfen appel 300	Wiffenſcruct <i>ibid.</i>	Dracmen 462
Rooſche Alſene <i>ibid.</i>	Balfen munte 173	geel Wiffen <i>ibid.</i>	Dracmbefien <i>ibid.</i>
zee Alſene <i>ibid.</i>	deyn Balfen 176	ſwerte Wiffen <i>ibid.</i>	Drantlatouwe 15
Amandelboom 498	grootte Balfen <i>ibid.</i>	witte Wiffen <i>ibid.</i>	Drant 321
Amandelen <i>ibid.</i>	Baſilicum 170	Dingelſcruct 60	Dreemen 462
Amezoey 31	edel Baſilicum <i>ibid.</i>	Dingelſcruct man-	Drem 467
Ameos 192	groue Baſilic. <i>ibid.</i>	niken <i>ibid.</i>	Dremrape <i>ibid.</i>
Animi <i>ibid.</i>	wilde Baſilicum ſo.	Dingelſcruct wiſke	aiker bren 466
Anumoniaam 564	coden	<i>ibid.</i>	Spaenſche bren <i>ib.</i>
Anagiris 521	Deſſiam 554	wilt dingelſcruct <i>ib.</i>	ſtehende bren 467
Andoren 181	Deſelaers luſpen u	bladeloofe 87	baſſilie pepee 442
Andoren manniken	Weeckſcrupn 34	bloet wortel 37	Dyonie 259
<i>ibid.</i>	Deeren clauw 363	ſoepbaert 125	ſwerte Dyonie ſol.
Andoren wiſke <i>ibid.</i>	Deeren clauwen <i>ibid.</i>	ſoepbooney 144	coden
riekende Andor. <i>ibid.</i>	duyſche beerclauw	ſoepſcruct 376	wilde Dyonie ſol.
ſwerte Andor. <i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>	ſoepſulſekens 155	261
water Andoren <i>ibid.</i>	Deer wortel 198	ſoechweit 319	Dionius 346
	Deete 377	ſoeghout 535	Dyapſeyſſighe 172
			ff ff Dyapnelle

# Register banden Zabanschen ende

Duymelle	101	Lattkens	59	Sleyn Cloophens	cleyn creestcruyt is,
Duymnetkens	140	Lattencruyt	175	winde	ibid.
Ducyboom	490	Lattensteert	77	groote Cloophens	groot creestc. ibid.
Ducydoren	ibid.	Laucahis	425	winde	ibid.
Buechtenboom	52	Lauwoiden	409	Loecheocryfbloemen	creta marina 398
Buecken noothens	ibid.	cleyn cauwoide	410	117. 435	criechenboom 408
Duglossie	6	groote Lauwoiden	409	Loecheocryfboom so.	criechen ibid.
Dupleurum	347	409		344	criechen Vā ouer zee 302
Aerden	359	langhe Lauwo.	410	Goedisse	319
tamme Laerdē	ibid.	wilde cauwoide	254	Loemraet	50
Bolders Laerdē	ib.	Lederboom	557	Loeoooghe	141
wilde Laerden	ibid.	Chamelea	250	Loetonghe	9
Salamentum	174	Charadons	360	Loeloquintappelen	
Calfo nuese	194	Christus ooghen	18	254	243. 417
Calfo doet	218	Cicerey	327	Gomijn	193
Calliffishout	486	Cicoeye	388	witte Gomijn	ibid.
Calmus	578	geel cicoeye	ibid.	Concommeren	405
Cameline	37	tamme Cicoeyeso.		refels Concomme-	
Camemine	38	eodem		ren	253
Camille	157	wilde Cicoeye	ibid.	touchs Conco.	407
geel roomsche Ca-		Cyprios	23	wilde Concom.	253
mille	ibid.	Cyressenboem	537	zee Concomm.	407
roomsche Camil. ib.		cinnamomum	569	Londrilla	392
stinchende Camille		cistus	461	Confilie de greyn	
39		citroenen	493	183	
wilde Camille	ibid.	citrusken	407	Conyza	28
witte roomsche Ca-		clapper roosen	295	Loninghinne cruyt	
mille	37	claueren	38	46	
Lamphet	557	cleyn steen claueren		Lozalcruyt fol.	283
Landerbloem	392	340		429	
Lanceel	570	cleyn geel claueren		Lozenbloemen	120
Lanijnen cruyt	389	ibid.		groote Lozenbloe-	
Lappers	475	ghemeyn clauer.	38	men	ibid.
Lardamomū groot		groote claueren	343	Looyen roosen	119
ende cleyn	572	herts claueren	46	Lozander	194
Lardobenedictus		Italiaensche clauer-		Lozoelieboom	509
367		ren	343	Lozoelien	ibid.
Larduus	368	steen claueren	340	Lottoen	476
Carlina	364	wilde steen claueren		Strabben claw	107
witte Carlina	ibid.	ibid.		Grayt bloemens	117
Caroten	417	cleescruyt	370	Grayen doet	72
Carthamus	366	clermatis altera	261	Walshen crayt doet	
wilden Carthamus		clynopodium	166	ibid.	
ibid.		cliffen	11	Crakebesien	470
Cassia fistula	520	cleyn cliffen	ibid.	roode crakebesie	ib.
Castaniensboom	512	groote cliffen	ibid.	swarte crakebesien	ibid.
Castanien	ibid.	cloophens	30	cranenberch	37
Catanance	348	blauw cloophens	ib.	cranenshals	ibid.
		cloophens winde so.		creestcruyt	47
		267			

## Nederlantſchen namen ende toenamen.

onſer Vrouwen Di- ſtel 377	Erdtbeſie cruyt 65	<b>F</b> Enigrieck 37	Stranct appel ſol. 495
roomsche Diſtel ib.	Erdtbeſien ibid.	F fpecruyt 89	Gras 345
ſterre Diſtel ibid.	Erdt noten 36	fierikonſonſa 561	Gras Va parnaſſo 349
weemde Diſtel ibi.	kleyn Erdt noten 399	fiſticey 55	knep Gras 345
wilde Diſtelen 368	Erdt roock 18	fflouweelbloem 125	ledt Gras ibid.
wilde oft groote wit te Diſtelen 362	kleyn Erdt roock ibid.	ffockie 53	riet Gras 33
witte wech Diſtel ibid.	Errenpyp manni- ken 20	ffonteyncruyt 80	Verkens Gras 75
Doche bladeren 16	Errenpyp wiſf. ib.	<b>G</b> Algel 471	Statia Dei 471
Dodden 352	Eggetoey 288	Galätwortel 225	Stratiola 255
Donderbaert 87	Eggetruyt 60	Gallbanum 563	Griſſacom 18
kleyn Donderbaert ibid.	Egyptenaers cruyt 181	Galega 35	Groſſels nagel 571
groot Donderb. ibi.	Elſenboom 53	Galigaen 579	Grooten ghepen baert 33
Donen 352	Epcken appel 523	wilde Galigaen 23	Gulden appel 298
Dozen appel 299	Epckenboom ibid.	Galiſſhout 486	Gulden roede 108
Doricum 584	Epndegrayn 81	Galnoten 523	Guycheſheik man- neken 43
Dotterbloemen 25	Endeloos 357	Samanderſijn 20	Guycheſheik wiſſu. ibid.
Draba 438	Engſentier 459	groot Samander- ſijn 85	<b>H</b> Aldick 258
Dragon 433	Endiuie 387	Ganſenbloem 142	Hagbeſien 462
Drakenbloet 384	Eppe 420	geel Ganſenbloem ibid.	Haghedoren 489
Drakenwortel 217	berch Eppe 421	Ganſen doet 375	white Hagedoer ibi.
Dravick 321	kleyn water Eppe 424	Ganſerick 66	halſcruyt 123
Dye buldichz bloe- men 112	groot Eppe 422	Gariophylacte 102	kleyn halſcruyt ibi.
Dronchaerts beſien 251	groot water Eppe 424	Gaspidooren 467	groot halſcruyt ibi.
Duerwas 104	ſieck Eppe 421	Geel wortelen 417	Hädekens cruyt mā niken 159
Duyuels beet 84	water Eppe 424	Geneueer 596	Hädekes cruyt wiſf. ibid.
Duyuels melck ſo. 246	uilec Eppe 423	Gentiaen 224	Hanenhammekens 335
Duyuen cruyt 170	Erwen 328	Gerſte 35	Haney Doet 286
Duyuen keruel 18	Erwoten 325	winter Gerſte ibid.	apilſche Hanē Doet ibid.
Duyuen Doet 37	kleyn Erwoten ibi.	ſomer Gerſte ibid.	kleynē Hanē Do. ibi.
Duyſent cracht 22	groot Erwoten ibi.	Geruwe 110	water Hanē Doet ib.
Duyſent knop man- niken ende wiſſh. 75	middel Erwot. ibi.	Ghepen blat 265	wittē Hanē Doet ib.
Duyſent ſchoen 128	roomsche Erwoten ibid.	Ginoffelen 117	haſelaer 515
Dulcruyt 303	ſtock Erwoten ibi.	kleyn ginoffelen ibi.	tammen haſelaer ibid.
Dulle appel 297	Eryſimon 439	Gladiolus 145	wilden haſelaer ib.
Dulle beſien 303	Effchen 525	Glaſcruyt 39	haſelwortel 25
Dulle keruel 307	Effchen boom ibid.	Glaucium 566	haſen kattouwe 389
Dulle peterſelie ib.	hauer Effchen ibi.	Godts ghenade 37 35	haſen ooren 49
<b>E</b> Eckelboom 53	Euerwortel 364	Goeden henderick ibid.	haſen poothens 344
Eckelen ibi.	witte Euerwort. ib.	Goutbloemen 121	haſen ſcruyck 389
Endlat 12	Euforbium 565	Gouwe 25	haſen doethes 344
Encoooren 33	Ezula 244	kleyne Gouwe ibid.	haſen ff ſ ſ Hauer
Erdt appel 222	kleyn Ezula ibid.	groot Gouwe ibi.	
	groot Ezula ibid.	Gouwortel ibid.	

# Regifter vanden Zabanschen ende

Hauer	38	Hontsoofen fo. 142.	water Kerffe	435	Lefkens Van cal-
Hauerbesien	470	392	wilde Kerffe	437	uarien
Hauickcruyt	390	Hontfonghe	winter Kerffe	436	blauw Lefien
cleyn Hauickcruyt		Hoppe	Keruel	425	roode Lefien
ibid.		Hoppencruyt	ibid.	naelde Keruel	wilde Lefien
groot Hauick. ibid.		Houminum	180	wilde Keruel	ibid.
Heyde	475	Huel	293	Knawel	witte Lefien
cleyn Heyde	ibid.	geelen Huel	295	Kneseley	Leney
Heydens bloemen	148	rooden Huel	ibid.	Koofen	Lepelcruyt
Heydens cruyt	181	tammen Huel	293	bloemkoofen	Leuercruyt
Heyden hysope	471	wilden Huel	295	cabbys Koofe	edel Leuercruyt
Heydens wunde		witten Huel	253	ghetronckelde Kroo-	siet Leuercruyt
cruyt	107	Hulft	491	len	water Leuercruyt
heyligh kerfcruyt		Hysope	159	gheschackelde Koofe	Leuiftock
237		Hysop	ibid.	ibid.	Lijnen
heylighe	173	Acintey	149	grootte roode Koofe	Lijnen doeck
Helmcruyt	34	Jasminum	460	ibid.	Lijnen lakem
Hemionitis	277	Iberis	439	raeps koofen	Limoney
Hermodactilen	249	Ibenboom	540	roode fuyt Koof. ib.	Linden
Heranthemum	140	Jenettekens	119	roofsens koofen ib.	Lindenboom
Herentect	528	roode Jenettekens	ibid.	saoye koofen	Linsen
Herick	43	ibid.		floo:ey	Lombacche linsen
Kerfeloet	528	spaensche Jenette-		swarte koofen	water Linsen
Kerf	543	kens	149	wilde zee Koofe	Lifch
mo:uwe Kerf	ibid.	witte Jenet.	119	witte fuyt koofen	Lifch bodden
spiegel Kerf	ibid.	Fefeminum	460	380	Lifch ouer zee
Kerthop	50	Jingber	218	zee koofen	geel Lifch
Kerfgherpan	100	Jingroey	26	Kroesbesien	marten Lifch
Kerfhoey	72.276	Joffrouw melck fo.	420	L Auburnum	ftinckende Lifch
Kerfonghe	17	Jofepo bloemen fo.	125	L Lacha	water Lifch
cleyne Kerfstdg. ibi.		Jofme	46	Ladanum	wilde Lifch
fted Kerfong. ibid.		Jofmenum	ibid.	Limekens oore	wit te Lifch
Kertwortele	198	Juibey	506	Lampfana	Lochtfchoof
fwerte Kertwortele	ibid.	K Anney cruyt	76	La'er	Lofium
witte Kertwort. ibi.		Kerlcruyt	473.483	Lattouwe	320.346
Kinnebesien	463	Keeren faet	32	ghetronckelde Lat-	Longhenccruyt
Kinne bramen	ibid.	Keefkenscruyt	401	touwe	Loock
Kiro	315	Keekens	117	ibid.	Loock sonder loock
Koefbladeren	15	Keepkens	56	ghelloten Latt. ibi.	446
Hoe langer hoe lie-		Keefelaer	508	ta'mme Latto. ibid.	bieft Loock
uet	22	spaensche Keefelaer	ibid.	wilde Lattou.	445
Hoender beet	40.42	ibid.		Laureole	hons Loock
Hoender erue	44	Keefen	ibid.	Lauender	tam Loock
Holwortel	213	spaensche Keefen	ib.	Lauender mannik	water Loock
boonskensholwortel	ibid.	Keefouwen	127	ibid.	wilt Loock
Hontfridde	70	kerffe	434	Lauender wijf. ibid.	tgroot
		Boeren Kerffe	437	Lauetfe	445
				Laurus boom	wilt Looc teleyn ibi.
				Laurus Van Alexā	Loopicruyt
				drinen	Lochanboom
				Lefien	Lotus
					Luyfcruyt
					252.291
					Luyfpoes

## Nederlantſchen namen ende toenamen.

Lapſpoeder 252	Deer 370	zee moſch 283	doone Netelen iſid.
Lapaceto clauwen 286	Deer crappen iſid.	moſtaert 437	grootte Netelen 98
Lupiney 328	Deertſbloemen 159	Boereny moſtaert 437	heete Netelen iſid.
tamme Lupiney iſid.	witte Deertſbloemen iſid.	tamme moſtaert 430	Roomſche Net. iſid.
wilde Lupiney iſid.	Deerte wortel 357	wilde moſtaert iſid.	Nieſcruyt 234
<b>N</b> adelgeer 224	Deerſter wortel 210	motten cruyt 93	wilof wit Nieſcruyt 234
Madefiney 125	Deerſloemē 32.149	muer 40	25
grootte Madefiney iſid.	blauw Deerſlo. 149	cleyn muer iſid.	wit Nieſcruyt 234
tamme Madefiney iſid.	Deſcheruyt 38	grootte muer iſid.	Nieſſwortel iſid.
wilde Madel. iſid.	Deſck weye 369	middel muer iſid.	ſwerte Nieſwo. 237
Maechden palm 26	Deſde 374	zee muer iſid.	witte Nieſwo. 234
Maencruyt 103	cleyn Deſde iſid.	munchy capke 291	Nigel 196
cleyn Maenc. iſid.	tamme Deſde iſid.	munte 172	Nigel Van Damaſco iſid.
Mageſeyne 165	wilde Deſde iſid.	balſem munte 173	tamme Nigel iſid.
Maice 375	Deſſiſſe 133	berch munte 174	wilde Nigel iſid.
Malcouie 181	Deſſilote 341	carſmunte 173	ſloten 512
Malcouenie iſid.	Duytſche Deſſilote iſid.	onſer Vrouwen munte iſid.	ſloten muſcaten 513
ſinckende Malcouie iſid.	ghemeyn Deſſi. iſid.	roode munte iſid.	oher ſloten iſid.
ſwerte Malcouie. iſid.	Italiaenſche Deſſilote iſid.	roomschemunte iſid.	roode haſel ſlot. 515
Malouwe 401	Koomſche mel. iſid.	Velſt munte 175	tamme haſel ſloten iſid.
cleyne wilde Malouwe iſid.	meſoerney 408	roode water mu. 173	wilde haſel ſloten iſid.
grootte Malou. iſid.	Turckſche meſoerney 407	witte water munte iſid.	pimper ſloten 516
Venetſch Malouwe 404	mercuriael 60	muſſe met ſteerckens 36	<b>D</b> uerſberck 37
witte Malouwe 403	wilde mercuria. iſid.	muſſdozene 472	ſleanderboed 292
Bamheſcruyt 265	meun 226	muſſfooren 42	ſlijfboom 518
Bancop 293	mezercon 251	muſſe ſteerckens 73	ſpuey iſid.
Bandiagara 296	miſie 315	muſſa 494	ſlindenboom 528
Bandiagara manniken iſid.	mincklyfers 369	<b>N</b> aacht ſchaede 301	ſonderhane 264
Bandiag. wiſ. iſid.	myrabolana 574	Nagelcruyt 67	onſer Vrouwen bedſtroo 163
Banſooren 215	myrthe 553	iſid.	onſer Vrouwen mātel 107
Barentacken 524	myrthus 481	Nardus 149	onſer Vrouw. melckcruyt 95
Bargen dieſen 157	mispelboom 501	Nardus ſaet iſid.	onſer Vrouw ſpin iſid.
Bariettes 129	mispelen iſid.	Nascaye 301	ons Heeren ſpeer-cruyt 103
Bariolſeyne 165	pote miſpelen iſid.	grootte Nascaye 303	Doghen trooſt 31
Enghele mariole. 167	moeder cruyt 15	vaſernie maekende Nascaye iſid.	Dogen trooſt gras 347
groue Bariolſeyne iſid.	moerbeſter 501	ſlapende Naſc. iſid.	Doppanay 549
Haſtbloemen 227	moerbeſterboom iſid.	Natertonghe ſkens 103	Drant 53.34
Haſtboom 544	melk 349	Navelcruyt 30	cleyn Drant 134
Haſtiy 548	mollen cruyt 240	water navelcru. iſid.	groot Drant iſid.
Hater 15	mondthout 483	Nagheſbloemen 119	Drganon 167
Haterſiloy 83	moorkens 322	Nepte 175	ff iſid. offen.
	mooren 418	Netelen 98	
	tamme mooren iſid.	doode Netelen 99	
	wilde mooren iſid.		
	moſtaert bloemen 53		
	moſch 282		

# Regifter banden Zabauſchen ende

offentonghe	6	Peper	443	gemeyn porcel. ibi.	thuer cruyt	63
clepne offentong. ib.		Peper cruyt	440	roomſche porceleyn	ridder ſpoeten	123
offentong	212	Peper Van Indien		ne	tamme ridder ſpoet	
lange offentong. ib.		442		ibid.	ibid.	
ronde offentong. ib.		breet Peper Van In-		tame porceleyn	wilde ridder ſpo.	161.
<b>D</b> iddensloemē		dien	ibid.	wilde porceleyn. ibid.	tiet	352
139		breſkie Peper	ibid.	zer porceleyn	rietgras	353
Paefſchbloemen	115	lanck Peper Van In		poſtelbeſien	tiet Van Indien	ib.
Paeyre	163	dien	ibid.	prang wortele	tiet Van Spangien	
Paſſoey	506			prymboom	ibid.	
Paſmboom ſo.	472.	muet Peper	87	prymen	ibid.	
490		ſweet Peper	443	prymen Van da-	ſuycker tiet	ibid.
ſiekende Paſm	472	water Peper	440	maſch	reyn wilghen	483
Panaces	560	wit Peper	443	ibid.	rijnſchen	543
Panichooten	318	Pepoenen	407	ro'prymen	robrichts cruyt	37
Papercullchens	87.	breede Pepoenen	ib.	<b>Q</b> Walſter	vogghen	314
218		groote Pepoe.	ibid.	496	vogghelbloemen	120
Papencruyt	392	ronde Pepoen.	ibid.	<b>Q</b> uendel	rooſen	458
Papenhout	534	Perſen	497	163	caneelrooſen	ibid.
Papiri ſpecies	351	Perſendoom	ibid.	<b>Q</b> uerpeeren	dun rooſen	ibid.
Paeyre	447	anant Perſen	498	496	hontrooſen	142
Paritarie	39	Voegge Perſen	ibid.	<b>R</b> meer Radijs	maſcaet rooſen	458
Partijſchen	57	Perſick cruyt	441	415	provincie rooſt	458
Paſſinaey	417	Perſifctie wortel	16	water Radijs	roode rooſen	ibid.
Patich	384	Peterſelie	420	ibid.	wilde rooſen	ibid.
groot Patich	ibid.	ghemeyn Peterſelie	ibid.	Rakette	witte rooſen	ibid.
water Patich	ibid.	ibid.		Roomſche raket. ib.	rooſeroutel	230
wit Patich	ibid.	Breemde peterſ.	421	wilde Rakette	roomſche terwe	312
Patientie	384	Dijſhout	53	Rapen	roſmarin	185
Peck	543	pijnboom	541	pariſche Rapen	root meliſoen cruyt	
ſteyn Peck	ibid.	pijnappel	542	ſteck Rapen	58.89	
Peey	427	wilde pijnboom	541	Raphanns	370	
geel Peey	ibid.	piſofelle	67	Raponceſen	cruyte	184
roode Peey	ibid.	pimpinelle	105	cleyn Raponcelē	ſteyn cruyte	279
wilde Peey	ibid.	pioenbloemen	227	groote Raponceſen	tamme cruyte	370
Peerboom	499	pioend mannikē	ibid.	ibid.	wijneuyte	ibid.
Peeren	ibid.	pioenen wijf.	ibid.	Kateſen	wilde cruyte	ibid.
Peerdich	384	platanus	53	geel Kateſen	cruytercruyt	107
Peeren cruyt	205	plompen	135	roode Kateſen	water Cruytercruyt	
Peertſbloemen	122	geel plompen	ibid.	witte Kateſen	ibid.	
Peertſclaw	15	witte plompen	ibid.	Rauen Doet	rundſooghe	141
Peertſteert	76	plumkens	117	Reynette	<b>S</b> aet Van Lana	
cleyn Peertſteert	77	polemonia	233	reyn Baet	rien	37
groote Peertſteert	76	polemonium	ibid.	reyn wilghen	Spaenſch Saet	ibid.
		poſium	164	thabarbare	Saffraen	151
Pennich bloemē	115	poſey	163	Valſche thabarbare	wilden Saffraen	26
Pennich cruyt ſol.	30.60	wilde poſey	ibid.	3	Sagapenum	562
Penſey	112	pooten	417	thagwortele	Salomons Segghel	
		popelaere	527	vannus	78	
		popelierboom	ibid.	thepnbloemen	breet Salo. Segghel	
		porceleyn	397	thepnbeſien	ibid.	
				thepnbeſendooren	ibid.	

# Nederlantſchen namen ende toenames.

Smal Salomdo ſe ghet	78	S. Anthonis raep	287	Spurgie	245	ſoance terwe	ibid.	
Sandel	575	S. Carjn ſcrypt	35	Spurie	44	Thapſia	247	
Sannihel	106	S. Chriſtoffels cru.	274	Stalſcrypt	468	Therſenſcrypt	62	
groot Sannihel	ibid.	Si. Jacobs bloene	54	Standel crupt	155	Thynis bloemen	12	
Santozie	220	S. Jacobs bloene	54	cleyn Standelcrupt	156	Thymus	161	
cleyn Santozie	ibid.	S. Jacobs crupt	ib.	groot Stadelcrupt	ibid.	widen Thymus	163	
groot Santozie	ibid.	S. Jans groot	59	ibid.	ibid.	geel Thideloſen	150	
Sapgray	488	S. Jans crupt	12.49	welriekende Stan-	delcrupt	ibid.	witte Thideloſen	151
Saraffins crupt	212	S. Joris crupt	229	Steenbreck	32. 203	Tongheſlat	473	
Sarcocolla	556	S. Petrus coey	33	galdey Steelbreck	203	Toodyſion	200	
Saturepe	160	S. Petrus crupt	94	root Steenbreck	32	Toedijkſhoey	316	
Sauelboom	58	Slehen	506	witten Steenb.	203	Toumentille	64	
Sauie	177	Slehendoren	ibid.	Steencrupt	436	Toutſcrupt	92	
cruffſauie	ibid.	Slaer bloemen	94	Steenruyt	279	Tragacantha	567	
edelſauie	ibid.	cleyn Sluetelbloe-	men	Steenſaet	205	Tripolium	247	
groot ſauie	ibid.	men	ibid.	Stechelbeſien	477	Tragos	88	
grote ſauie	ibid.	enckel Sluetelbloe-	men	Stiercrupt	28	Tweſlat	157	
oorkens ſauie	ibid.	men	ibid.	Strichas crupt	187	Uleucrypt	237	
wilde ſauie	178	welriekende Sluetel	bloemen	Strichs crupt	187	Valeriacy	229	
Sauſeboom	479	bloemen	ibid.	Striap	556	Valeriacy vā grie	ibid.	
Scabioſe	8	witte Sluetelb.	ibid.	Strichs bloemen	139	ken	ibid.	
Schaps ſcabioſe	ibid.	Smarte	485	Suegſhen groot	223	cleyn wilde Valeri-	acn	
Scammonia	269	Smere wortel	30	Suechout	486	acn	ibid.	
Scarlepe	179	Smium	424	ſumach	485	groot wilde Wale-	riacn	
Schaps tonghe	6	Smout vā gelafey	88	Sutacelle	384	ibid.	Waren	
Scerlinghe	307	Sofraey	151	Sutacelle	384	Waren mannekē	ib.	
Scorſt	271	Sondaw	283	groot ſurckel	ibid.	Waren wiſken	ibid.	
Scorſt bloemen	392	Sonnewardt	47	beſt ſurckel	ibid.	boom Waren	274	
Scorpioencrupt mā-	nihen	cleyn Sonnewardt	47	ſuperwortelkens	419	epchen Waren	ibid.	
Scorpioenc. wiſf. ib.	506	ibid.	ibid.	419	ibid.	gracht Waren	277	
Sebeſten	334	Sorbē	510	Swalwortel	214	ſteen Waren	278	
Securidaca	210	Sorbenboom	ibid.	Swelcken	555	sweet Waren	274	
ſeepcrupt	210	Sorgſaet	38	Swelckenhout	ibid.	water Waren	ibid.	
ſena	256	Spaenſche ienette	149	Sycomoren	502	wit epchen Ward	ib.	
ſeneboom	516	cleyn Speencrupt	25	Synnauw	106	Weey beſien	468	
ſenegroey	101	groot Speecrupt	34	Almaiſchboom	474	Weey coey	469	
cleyn ſentozie	220	Speer crupt	229	Taphenſcrupt	473	Welt cijnres	22.469	
ſerillen	419	Speerwortel	217	Terce	542	Wenckel	189	
ſerſeli	199.200	Spelte	310	Tenderick	162	Verdragines	297	
ſeud ghetijdcrupt	210.399	Spinagie	382	Terbentſhij	545	Werbene	96	
ſigmaerſcrypt ſof.	404	Spokelbloemen	151	Weneerſche Terben	thij	cruppende Werbene	mannehey ende wiſf	
ſiſſion	395	witte Spokelbloe-	men	thij	544	ken	ibid.	
ſindaw	283	ibid.	ibid.	Terbintſhijboom	547	neer Werbene	ibid.	
S. Anthonis crupt	34	Spokenhout	53	Termentſhij	545	Werckens groot	222	
S. Antjo. nooth.	516	Spūgcrupt	60. 245	Terwe	309	Werckens doot	375	
				Roomſche terwe	ib.	Werckens graſ	75	
						Werckens Wenckel.	209	

## Register banden Zabanschen ende

Derpus	455	Dogghel Doet	33	Breeweerschbree	ibid.	wolfs melck	242
Deyf	263	Dokelaer	142	clery weerschbree	ibid.	woff melck manne-	
boom Deyf	ibid.	Drouwen hayt	279	groot weerschbree	ibid.	ken ende wiffhe	ibid.
clery Deyf	ibid.	Drouwen spighel	121	root weerschbree	ibid.	breet wolfs melck	ib.
muer Deyf	ibid.	Dijf Dingeruyp	63	water weerschbree	73	zee wolfs melck	ib.
swerten Deyf	ibid.	clery / geel / groot /		zee weerschbree	70	wolfs wortele	291
Dennip	558	wit Dijf Dingeruyp	ibid.	wierooch	551	blauw wolfs worte-	
Dieruyp	237	crupt	ibid.	wijnen	522	le	ibid.
Dijchbooney	328	Dijghedoom	503	wilckruyp	271	geel wolfs wortele	
Dilieren	113	Dijghen	ibid.	wilden saffraen	26	ibid.	
geel Dilieren	ibid.	Waelwortele	110	wilghe	522	wolle bladeren	92
ionck Drouwe Dilie-		Waelmeester	371	roode wilghe	ibid.	wolle crupt	ibid.
ren	114	Walstroo	ibid.	rijn wilghe	483	wit wolle crupt man-	
steen Dilieren	113	Wankuyrcruyp	145	witte wilghe	522	neken ende wiffhe	
stoch Dilieren	ibid.	Water filieren	81	winde	267	ibid.	
Dincoade	26	Water noten	369	clery cloepkens win-		woancruyp	14
Dingerhoet crupt		Waterponghen	399	de	ibid.	wonden crupt	30
30.		Wechgras	75	groot cloepkens win-		wonderboom	240
Violetten	111	Wederdoot	280	de	ibid.	wauwe	53
Witsen	330	clery wederdoot	282	middelwinde	ibid.	wrancruyp	237
hoghels Witsen	340	groot wederdoot	ib.	stekende winde	269	wranghe	267
wilde Witsen	332	gulden wederd.	ibid.	swerte winde	267	wijn crupt	283
Wlas	55	wederick	57	zee winde	268	wijn crupt	184
wilt Wlas	61	blauw wederick	ibid.	wingaert	455	Ypessine	529
Wlierhout	335	geel wederick	ibid.	wilden wingaert	ib.	Ypercrupt	96
Wlier	257	root wederick	ibid.	winter grasen	102	Yperher	ibid.
wilt Wlier	258. 509	weedt	52	winter roosen	401	Ypoe	159
Wlopcruyp	78. 441	sam weedt	ibid.	witten heumst	403	Zeebaef	96
Wogelcrupt	49	wilt weedt	ibid.	wolfs besien	289	Zedoaria	580
Wogghel snest	157	weerschbree	70	wolfs clauwen	283	zedear block	ibid.

## Register der Doochdeutscher Kreutery

namen in disen Kreuterbuch begriffen.

Wthou	280	Ampffer	384	Anisz	191	groß Waldriaß	ibid.
Wroum	577	sant ampffer	ibid.	Aprilblumen	266	wildt Waldriaß	ibid.
Wckerreichel	336	clery sant ampffer		weiß Aprilblumen		Wassigen	169
Wstensch	2	ibid.		ibid.		wilt Wassigen	ibid.
Wgaricus	545	wasser ampffer	ibid.	Apstemkrout	83	Wissgram	ibid.
Wgeley	124	Andouy / melin / wei-		Apffelbaum	492	Wassan	173
Wgley	ibid.	blin	181	Apffel	ibid.	Wassan mantz	ibid.
Whome	51	seldt andouy	ibid.	Alpen	527	katzen Wassan	ibid.
Wlantwurtz	225	rieckender andouy		Attich	258	krautz Wassan	ibid.
Wlberbaum	527	ibid.		Auffen blat	473	spitzer Wassan	ibid.
weiß Alberbau	ibid.	schwartz andouy	ibid.	Augentruost	31	wilder Wassan	ibid.
Alcaum / mensin / wei-		weisser andouy	ibid.	Augetrost gras	347	Wassan oppfel / me-	
blin	296	wasser andouy	ibid.	Augenwurtz	229	lin / weiblun	300
Amelkorn	31	weisser andouy	ibid.	Wachelder	33	Watengel	85
Ammoniacum	564	Angelick	208	Waldriaß	229	groß Watengel	ibid.



Kreuternamen.

klein Datengel 20	welche Doney 33	waldt Cornblu. ibi.	groß donderbar ib.
Darhanie 205	Diant 321	Cornelbaum 509	klein döderbar ibid.
biig Datomic ibid.	Diant lattich 15	Creutzblumen 159	Donnerwurtz 28
Dannwool 476	Draunfleischblumē 122	Creutzbaum 240	Doit 321
Decklium 554		Creutzbeere 488	Doftey 167
Deerblat 473	Draumwurtz 34	Cucumern 405	Dotterblumen 25
Deerlap 283	Driemey 462	esels Cucumer 252	Doronicum 584
Deerwurtz 198	Driemkrait 92	Turchischer Cucu- mer 497	Drachewurtz 144
Deinwellen 110	Drombeer 462	wildt Cucumer 252	wasser drachewurtz
Deinholtzli 483	Duch beeren 470	Cucuma 581	Drepfeltichz (217 blumen 112
Den 573	Duchwurtz 45	Cypressenbaum 539	Dropffwurtz 274
Benedictwurtz 102	Dunellen 101	Lymmitriden 570	Drumpebierz 470
Bengelkraut 60	Dustbeerli 507	Acteen 517	Durchwachs 104
Bengelkraut/ men- li/weißli ibid.	Dustwurtz 208	Dänen all 543	Durwurtz 28
waldt Bengelkraut ibid.	Dußen streel 359	rot Dänebaum ibi.	Dyement 172
zamer Bengelkraut ibid.	Duchampffer 344	weiß Dannebaum 544	crans dyement ibid.
Bernslaw 363	Duchblout 344	Dausentchoon 125	Dylen 190
teutsch Bernslaw ib.	Duche 532	Deiment 172	<b>D</b> erwurtz 364
Berntaisz ibid.	Ducheschey 528	hraufz deiment ibi.	groß eberwurtz ib.
Bertram 230	handuchen ibid.	Denmarch 229	klein eberwurtz ibi.
wilder Bertram 231	Duchen 12	Deschelkraut 62	weiß eberwurtz ibi.
Betterkreutz 11	Duffenkraut 306	Des hepligz geists wurtzel 208	Erdtrauch 18
Betonick 205	Durgel 397	Dill 190	Erenbreisz menli weißli 20
Biam Betonick ibi.	hermisch Durgel ibid.	erotten Dill 39	Eiöisch 403
Bepfuz 12	wildt durgel et bürt zel ibid.	hanz Dill ibid.	Eichel 53
Biberkraut 220	Burretsch 9	ku Dill ibid.	Eichelbaum ibid.
Bibernel 202	Burgbaum 490	Dinckelhern 32	Eichel mistel 524
Biffamke aut 306	Dyren 499	Dinckelhorn 30	Eichel opffel 35
Bintzen 350	Dyrenbaum ibid.	Distel 357	acher Eichel 36
Bintzenbaum 53	<b>E</b> ldamomū 572	besegneter distel 367	Egelkraut 60
Birtzenbertz 474	<b>E</b> cardobenedict 367	brachen Distel 357	Linbeer 289
Birchwurtz 64	Calmus 578	Dreypistel 365	Linblat 132
Bysenkraut 437	Campher 557	frawel distel 361, 365	Linhorn 33
Bitterwurtz 224	Cappeten 476	genz Distel 389	Liserich 96
Blatternkraut 25	Cederbaum 537	harten Distel 359	Ellernbaum 51
Blaw gilgen 143	Chamill 39	marien Distel 361	Eschernbaum 525
Blaw miederli 96	Chamill wilde 39	moß Distel 389	Eschernholtz ibid.
Blaw schwertel 143	Chreuzblum 159	raden Distel 357, 358	stein Eschern ibid.
Blaw Diowurtz 18	Christwurtz 237	Romischer distel 362	Engelusz 274
Blicken 33	Citrinaten 493	seur Distel 365	Entzienen 224
Blutke aut 105	Cley natterkraut 90	waldt Distel 491	Epffich oder epffich 269.
Bluchtropfle 117	Coloquint opffel 254	wallen Distel 357	berch Epffich 421
Blutwurtz 37	Coriander 194	weißwege distel 362	groß Epffich 422
Boberellen 302	schwartz coriā. 196	welch Distel 361	stein Epffich 421
Bochbart 125	Cornblumen 120	Doll opffel 297	wasser Epffich 424
Bochshorn 37		Dollkraut 303, 306	wilder Epffich 423
Doney 322		Donderbar 87	<b>GG</b> schwartz

# Register der Hochteutschen

schwartzer Epssich	geel fferbblumē id.	Geest	34	geel Hanensufz id.	
263	fench	318	groß Geest	ibid.	
maur Epssich idid.	fichtenbaum	541	fuder Geest	ibid.	
Epheuw idid.	ffierberkraut	220	Geertwurtz	2	
baum Epheuw id.	ffiltzkraut	271	Geyßblat	265	
kleyn Epheuw ibi.	fingerrhut	130	Gierlin	419	
Erbsel	479	fingerkraut	ibid.	Sichtwurtz	227
Erckelen	36	55	Silgen	146	
Edamandel	36	flach hooter	338	blaw Gilgen	143
Edapffel	222	flachkraut	61	rot gold Gilgen	146
Edberren	65	Onser Dio. flach id.		speck Gilgen	165
Edfergen	36	wilde flach	ibid.	walde Gilgen	165
Ed gall	220	flachsz seide	27	wasser Gilgen	135
Ednusz	36	ffeyerschblumen	38	weiß Gilgen	146
Ed weyrauch	96	fflochkraut	441	Ginst	464
Edwurtz	222	fflohe kraut	78	Glaszkraut	139
Erenbreisz mēnli/		ffloramor	125	Glaucium	566
weide lin	20	fforenholtz	541	Glocken	130
Erdenbaum	51	ffotzzwang	30	groß weiß glocken	
Erwos	401	ffotzweyn	ibid.	ibid.	
Erwen	329	frouwen har	279	Golt oppfel	298
Erweyssen	325	frouwen kraut	176	Golt wurtz	25, 148
Eschendbaum	525	freysham	112	Golt knopflin	93
Eschern holtz idid.		freysham kraut id.		Gottheyl	101
fein Eschern idid.		froschloelkraut	73	Gottes genade	37
Euphorbium	565	fuere holtz	541	Gottes vergifz	131
Eysernhart	96	funffblat	63	Garnat oppfel	495
Eysernkraut idid.		funffingerkraut id.		Grafs blumen	117
Eysentich idid.		G Albanum	563	Grensch	66
F Aln	273	Galgen	579	Grensch idid.	
F baum sam	274	Galgdwurtz idid.		Grinde kraut	83, 393
groß farn	273	Galoffel	523	Grinde wurtz	384
fein farn	278	Gamanderle	96	Groß steinklee	342
walde farn mēnli		Gamanderlin	20	Grand erchel	336
weidlin	273	Garben	109	Grundelceeb	264
feberkraut	220	wilde Garben	32	Guntzel	101
feigbonen	238	Garthagen	2	golden guntzel idid.	
feigen	503	Gauchhroot	125	Grand reb	264
feigenbaum idid.		Gauchblum	17, 435	Gurden see	46
faulbaum	31	Gauchheil	43	Gurtelkraut	283
feigwurtzen kraut		Geel hornungs blu		Gute heinrich	385
25, 34		men	117	gyroffel	571
groß feigwurtzen		Geel weiderich	57	G Alben	318
kraut idid.		baum/ root weide		G habichkraut	390
feldtmoren	202	rich idid.		groß Habich kra.	id.
feldt yfop	471	Geelwiszblumen	25	klein Habich kra.	id.
fenschel	189	Genferich	66	zamer Hanff	56
few fenschel idid.		Genzblum	142	Hagdon	489
fench	318	Genzsfufz	375	Hanensufz	286
fferbblumen	466	Gierlin	419	acher Hanensufz idid.	

# Kreutern namen.

meer hirsch	205	Katzen wedel	87	wilderknoblauch	445	lange kurbis	ibid.
hirtzwurtz	198	Katzen wurtzel	229	feldknoblauch	445	hunderbaum	509
schwarzhirtzwurtz		Kastanibaum	512	lachenknoblauch	84	hutterkraut	2
weiß hirtzwurtz ib.		leerbesten	472	hohles kraut	105	hutter opffel	496
		Kellers hals	251	holen	380	hutterz	60
Hirtzung	276	kerbelkraut	425	dreyer eoter hofz ib.		hutterpffen	123
Hochkraut	190	Kern	312, 415	hasen hol	389	hutterholtz	541
Hochleuten	404	keensamen	312	krauser holz	ibid.	hutterholtz	ibid.
Hochmat	117	dünckel kern	312	kleinder holz	ibid.	l. Nasz knoblauch	
Holder	257	Kertzzenkraut	92	korbelkraut	425	l. Ladani 461	(84)
waldt Holder	ibid.	kesten	512	wilder kossel	427	Lafendel	187
Hofwurtz	213	kestenbaum	ibid.	korkraut	392	Lattuch	395
Hopffey	272	Ketterhals	251	hourosz	119	Lattich	ibid.
hornung oblumz	159	Kiiffer holtz	541	houmrosen	120, 295	großer Lattich	ibi.
weiß hornungs blu		Kimmel	193	waldkornblumz	120	krauser Lattich	ibi.
men	151	romsche kimmel	ib.	kranich hals	37	weiser Lattich	ibid.
Houbeeren	463	weiß kimmel	ibid.	krapenfuß	72	wilder Lattich	396
Houstrang	135	zamer kimmel	ibid.	krefz	434	Laser	561
Houwurtz	ibid.	Kinkin	163	baurenkrefz	ibid.	Lauch	447
Hunderbifz	40, 44	Kirschen	508	bay krefz	435	dyfz Lauch	448
Hundstolm	139	Kirschenbaum	ibid.	garten krefz	434	fnit Lauch	448
Hundstüll	139	Juden kirschen	302	bruner krefz	ibid.	Leberkraut	46, 371
Hundsthol	60	teuffels kirschen	ib.	wilder krefz	435, 437	edel Leberkraut	ib.
Hundzunge	8	klapperrosen	295	wisnkrefz	435	biunz Leberk.	280
Hundererb	44	klee	340	krottenbill	119	stein Leberkraut	ib.
Hynbeeren	463	buch klee	344	kromerbeeey	536	Lenen	262
Hynschkraut	270	edel stein klee	340	krottenkraut	61	Leechenbaum	545
Hypfop	159	gauch klee	344	kenfelbeer	ibid.	Leuzel	446
garten Hypfop	160	gauch gauch klee	ib.	kreuzbeer	477	Leindotter	383
zweibel Hypfop	ibid.	geel klee	340	kuang	139, 141	Leuzbaum	533
J. Meinten	149	geelweisen klee	ibid.	kuchenfchelle	286	Leuzkraut	251, 252,
J. Abenbaum	540	groffe stein klee	342	kurbill	139	291	
J. Bifch	403	katzen klee	344	kumel	163	braun leuzkra.	354
J. Senger ie liebee	22, 270	kleiner stein klee	ib.	schwartz kumel	196	Leuensfuß	106
		kleeblkraut	340	waldt kumel	199	Leventapen	ibid.
J. Angber	213, 579	sauter klee	344	weiß kumel	193	Liebstoel el	207
J. Anwan	26	stein klee	340	romsche et zamer hu		Lieftknoffen	352
J. Angwer	579	weiser klee	38	mel	193	Lilgen	146
J. Juden hutkin	302	wilder klee	340	schwartzkumich	ibid.	Linoenen	493
J. Jungfrau har	283	klein tausent guld	220	waldt schwartz hu		Linsen	333
<b>K</b> Annenkraut	76	kraut	220	nich	196	welch Linsen	516
		kletten	11	kunel	160	Lindbast	523
Keppifzkraut	30	groff kletten	ibid.	kuinig blumen	227	Lindenbaum	529
Kearten	359	spitz kletten	ibid.	kuinigo hertz	92	Linden	ibid.
weber harten	ibid.	knabenkraut	30	kuinigundkraut	46	Lofferkraut	89
Katze	344	knobloch kraut	446	kuinratz	50	Loiberbaum	482
Katzen houel	18	knobloch	444	kurbis	409	Loiberen	ibid.
Katzen sagel	77	knoblauch	444	groff kurbis	410	Loibenbaum	545
Keatzen schwantz	77	hundsknoblauch	449	hunds kurbis	259	Lungenkraut	282
Keatzen teubefin	87	waldt knoblo.	444	klein kurbis	410	Lydweyck	119

# Regifter der Hochteutschen

Lichftockel	207	Weynzorlin	42.67	stein muntz	174	Wnfer Brauwkha.	
Lynkraut	61	Weyndflumen	132	wasser muntz	173	61	
Lynen	262	blaww Weyndfl.		mutterkraut	15.183	Wiant	34
<b>W</b> Agke	293	meij	149	mutwille	117	Wierlutzen	212
Wagfamen		Weynkraut	25	myrth	553	<b>W</b> Waffel blat	392
ibid.		Weyran	365	myradofans	574	Waffel hodlin	
gehointer Wagfa-		Weyferwurtez	210	<b>W</b> Nachtschadt	301	Waffelpint	238 (25
men	295	Wiltchkeut	38	rot Nachtscha.		Waffelen rooslin	392
Waier	375	Wiltzen	374	302		Wappel	401
Waioran	165	Wiltz	374	Marckiffen eozlin fo.		garden Wappel	ibid.
Walbaum	525	Wiltzmeit	278	149		ghomeyn goet pap-	
groß Walbaum ib.		großmiltzkeut	277	Wagelkraut	67	pel	ibid.
Wandelbaum	498	miftel	524	Marckenhoßben	352	Venediger Wapp-	
Wandel	498	Wodelgece	224	klein Materkraut		404	
Wangolt	377	moen	293	60		Danay	559
holtz Wangolt	102	mollclin	498	Materwurtez menn-		Wappelbaum	527
roter Wangolt	377	mollketen	ibid.	lin/weißlin	17	Waffinachen	417
waldt Wangolt ib.		moltzen	374	Materzunglin	103	wildt Waffinacht	ib.
weiffer Wängolt	377	acher moltzen	ibid.	Wegelblumen	117	3a Waffinachen	ibid.
Wamftrew	377	garden moltzen	ibid.	Wegelien	ibid.	Waffiney	ibid.
Wargendreehen	157	hermyfch moltzen	ibid.	donder Wegelien	ibid.	rot Waffiney	ibid.
Wargentozfzlin	118	wilde moltzen	ibid.	feldt Wegelien	ibid.	wilde Waffiney	ibid.
wilde Wargentofzlin		zam moltzen	ibid.	Indiaenfche Wegel-		zam Waffiney	ibid.
119.		monkraut	103	lin	31	Paiffelbeer	479
Wariemofen	118	klein monkraut	ibid.	Wefpel	501	Peonien blumen	227
Warcobel	181	moren	418	Wefpelbaum	ibid.	Peonien eofen	ibid.
Wafzhoelder	535	feldt moren	202	Weffel	98	Peftich kraut	441
Wafzkieben	127	wilde moren	ibid.	biennend Weffel	ibid.	Peftilätzwartzel	16
Wafzufelen	ibid.	zam moren	ibid.	haber Weffel	ibid.	Peftemen kraut	83
Wartenblumen	25	wofcaten	513	hepter Weffel	ibid.	Peterfilzen	420
Waffblumen	114	wofcatenblumen	ibid.	tauf Weffel	99	Peterfien	ibid.
Waffiey	548	moßblumen	282	toet Weffel	ibid.	fein Peterfien	421
Wauflbee	501	moßblumen	25	welch Weffel	98	Pferdfehwantz	76
Wauflbeerbaum	ibid.	mottendblumen	68	Wiefwurtz	234	Pfeffer kraut	440
Wauflkeut	39	mottenkraut	ibid.	fehwartz Wiefwurtz		Pfeffer	443
Wauflpfeffer	87	muchenkraut	440	237		Lafantifcher Pfef-	
Wbeerhirfen	205	munchs kofflin	302	weiz Wiefwurtz	234	fer	442
Wbeerlinsen	81	mundtholtz	483	Rußbaum	512	Indiaenfchen Pfef-	
Wefantzan	297	muntz	172.173	baum Ruß	513	fer	ibid.
Wefiffenkeut	183	balfam muntz	ibid.	rot Ruß	515	waffer Pfeffer	440
Wefonen	408	berch muntz	174	thur Ruß	ibid.	Pfenning keut	60
Wengelwurtez	384	fifch muntz	ibid.	welch Ruß	513	Pferfing	497
Wercuriuskeut fo.		klein bach muntz	173	<b>W</b> Wiffenbrech fo.		Pferfingbaum	ibid.
60		katzen muntz	175	468		Pfing roofen	227
Wertzendblumē	159	kozen muntz	178	Wiffenzunghe	6	Pflaumen	505
Wegelkraut	105	kraup muntz	173	Wdermenich	45	Pflaumenbaum	505
Werdflumen	15	onfer Brauw. muntz		Welbaum	518	herbst Pflaume	506
Wergerkraut	28.37	ibid.		Wliuenbaum	ibid.	klein Pflaumen	ibid.
Weynzorlin	472	eofz muntz	172.173	Wmag	293	roß Pflaumen	ibid.
Weynzor	67	spitzer muntz	ibid.	geel Wmaghen	295	Pftimmen	ibid.

# Kreutern namen.

Edel Psrimen 467	Rosch 352	S. Lat hatinen blu 196	klein Scholwurtz 25
stechend Psrimen 7	Rosen 458	men 196	37
ibid.	heck Rosen ibid.	S. Peters horn 33	Schofwurtz 2
Dimpeuasß 516	leib/sachig Rose ibid.	Sant Peters kraut 39.94	Schwalben kraut 25
Doley 163	roter Rosen 458	Sarcocolla 557	groß Schwalben
wild Doley 174	weiß Rosen ibid.	Sasf kraut 446	kraut ibid.
Pomerantzen 493	wilde Rosen ibid.	Saturey 160	Schwalbenwurtz
Poppelweyden 527	Rosewurtz 230	Saurich 479	214
weiß Poppelweyden 527	Rosmarcin 185	Sawurtz 34	klein Schwalben
Portz 474	Rosshub 15	Sawbonen 306	wurtz - ibid.
Pfeben 407	Roshschwantz 76	Scarten kraut 28.37	Schwartzwurtz 110
Pungen 399	Roswedel ibid.	Scarior 387	Schwebelwurtz 209
sach Pungen ibid.	Rosweyßburtz 64	Scaunica 269	Schweinfod 385
wasser Pungen ibid.	Ruben 411	Schaben kraut 93	Schwelcer 55
Wendel 163	geel Ruben 417	Schaff gras 109	Schwertel 143
Quetsch 505	nass Ruben 412	Schaffrepp 110	blauw Schwertel. fo.
Quinten opffel 496	stecht Ruben ibid.	Schaffstheuw 76	143.144
Rden 119	Turcken steck Ru- 37	Schaffstheuw 76	geel Schwertel 144
groß Radel ib.	ben ibid.	klein / groß Schaf- 70	himel Schwertel 143
Ragwurtz 155	Rudrecht kraut 37	stheuw ibid.	weiß Schwertel ib.
Rapuntzen 413	Rundfang 139.141	Schaffung 70	welsch Schwertel. 145
klein Rapuntze. ib.	Rustbaum 528	Schaffmulle 484	Seckel kraut 62
groß Rapuntze. ib.	Rusck Holtz ibid.	Schantzwurtz 110	Seckblumen 135
zam Rapuntze 419	S. Alfran 26.151	Scharlach 179	Seidelbass 251
Rauch opffel 299	S. Adanep 160	Schlangz kraut 217	Seiffen kraut 210
Rauten 134	Safft gran 438	wasser Schlanghen 283	heil kraut 283
maut Rauten 279	Sagapenum 563	kraut ibid.	Seundenam 533
stein Rauten ibid.	Salbey 177	Schelkraut 25	Seutenkraut 303
wald Rauten ibid.	breit Salbey ibid.	groß schelwurtz ibi.	Senff 430
weyß Rauten ibid.	creutz Salbey ibid.	klein Schelw. ibid.	bauren Senff 437
zam Rauten ibid.	edel Salbey ibid.	Schieling 307	weisser Senff ibid.
Reinweyden 483	groß Salbey ibid.	Schlehen 506	wilder Senff ibid.
Kettich 414	klein Salbey ibid.	Schlehedorn ibid.	zamer Senff ibid.
mer Kettich 415	spitz Salbey ibid.	Schlusfelblum 94	Herbroot 222
wasser Kettich ibid.	wild Salbey 178	himel Schlusfel ibi.	Herbon 306
wilc Kettich 414	Samet blumen 125	wild Schlusfelblu- 375	Herwenchel 209
Reinsay 14	Sanichel 106	men ibid.	Hiben gezeyt 39
weiß Reinsay 231	groß Sanichel ibid.	weiß himel Schlus 302	Sigmars kraut sol.
Rhabarbare 221	Sandel 575	weiss / wolriechende 404	Sigmundswurtz ib.
Rhuer kraut 68	Sat Barbara kraut 436	Schlusfelblum ibi.	Dingruy 26
Rheijn blumen ibid.	S. Jacobs blom 54	geel Schlusfelblu- 318	Sorgamen 318
Rindsauz 141	Sant Johans beer 478	men ibid.	Spargen 429
Ringelblumen 121	Sant Johans blom 142	Schlutten 302	Sparoffel 510
Ritterspou 123	S. Johans brot 519	Schwartz schlutte ib.	Speerenfich 224
Roehen 314	S. Johans kraut 49	welsch Schlutte ib.	Sperwerbaum ibid.
Rodel 354	S. Johans guttel 12	Schmaltz blom 288	Speltz 310
blauw Rodel ibid.	S. Joh. treubel 478	Schmerbel 385	Spica 167
geel Rodel 355		Schmerwurtz 110	Spica nardi ibid.
Rodte 370		Scholwurtz 25	CC iij Spi.

# Register der Hochteutschen

Spicant 277	Tauszet guldekraut 220	Wasserrost 46	winden kraut 267
Spieckelkraut 272	Tausenthorn 73	Wasser gilgen 135	groß winden kraut ibid.
Spierling 510	Teuffels abbiß 84	Wassermahen ibid.	lsey windekraut ib.
Spilling 505	Teuffels clantwen 282	Wassernuß 369	mittelwinden ibid.
blaw Spilling ibid.	Teuffels dreck 561	Wardt 52	schwarts winde ibi.
Spindelbaum 514	Teuffels milch 246	Wechholder 536	stechende winde 269
Spinet 382	Teuffels ingber so. 218	Wechholderball 280	wintergrug 102
Spitznuß 369	Thannen 543	Wegerich 70	wolgemut 167
Spitzkraut 60.245	rot / schwarz / ibid.	rotcr / breyter / spitzer mittel wegerich ibi.	wolfs milch 242
Springhornet ibid.	weiß Thannē 544	Wasser wegerich 73	wolfbeer 289
Stadwurtz 2	Thierlinbaum 509	Weg grasz 75	wolfswurtz 291
Stadwurtz menelij weiblij ibid.	Thym 161	Wegtritt 75	blo wolfswurtz ibid.
wolreichender Stad wurtz ibid.	Todtern 271	Wegwarten 388	geel wolfswurtz ibi.
Stachelnuß 369	Tomentille 64	geel wegwarten ibi.	wulakraut 92
Stakkraut 488	Traubenkraut 170	wilde wegwartē ib.	wunderbaum 240
Standelkraut 155	Tragacantha 567	zam wegwarten ibi.	wundtkraut 30
groß Standelkraut 156	Treckhornet 245	Wepdt 52	wandtsceerling 307
Stechelopffel 299	Treublij 478	baum we. derich 57	wuterich 307
Stechendopffel ibi.	Turckey horn 316	edel weiderich ibid.	wutzersling ibid.
Stechpalmen 491	Ueiel 13	Weißernuß 369	Pfienholtz 528
Steindrech 203	geel Ueiel 13	Weinreb 455	Ingruen 26
golden Steinbre. 203	Uerbene 96	Weißhornligblumē 151	Pfenshut 291
rotcr Steinbrech 32. 280	Uernij 558	Weißwurtz 78	Wfope 359
weiß steinbrech 203	Uersich 479	Weschomen 89	Zamkraut 80
Steinblumen 139	winter Wioley 114	Weschkraut 210	Zecken hornet 240
Stein kraut 28	Wiokwurtz 143	Weghedorn 488	Zapfflinkraut 473
Stein somen 205	blaw Wiokwurtz ibi.	weghedornbesien ib.	Zedoaria 580
Stichwurtz 259	weiß Wiokwurtz ibi.	Wendewurtz 229	Zeitant 249
schwartz stichwurtz ibid.	Wlmenbaum 528	Weterich 307	Zeitlofen 249
Stouck schmalbel 37	Wnholderkerlz 92	Wetter rofflij 404	weisen zeitlofen ibi.
Streichelblumē fol. 139. 467	Wnser frauen man tel 106	Weydenbaum 522	Zeitloffij 127
Streichwurtz 384	Wnser frauwē schu. chlij 340	weyden ibid.	Zenff 430
Strobelorn 360	Vogelkraut 40	elgen weyden ibid.	baum zenff 437
Styrac 556	Vogel nest 201. 417	rot / weiß weiden ib.	weisser zenff 430
Susz holtz 456	Waldschey 51	weprauch 551	wilder zenff ibid.
Suszwurtzel ibid.	Waldtmeister 371	wepffen 309	zam er zenff ibid.
Synamp 106	golden waldmeister 372	wertzen ibid.	zunkling 265
<b>T</b> Ag Und nacht 39	Waldt glocklij 30	welche wertzen 32	zitterwurtz 384
Tamarischen holtz 474	Waldt hoff 50	weißwurtz 78	zuepflat 157
Tauben fuß 37	Waldt rebey 262	wermut 4	zungenslat 473
Tauben tropp 18	Waldt schell 30	acher wermut ibid.	zwibel 446
Tausentblat 110	Waldwurtz 110	wermut ibid.	seldtzwibel 450
	Waldschey 51	widder stoß 119	acher zwibel ibid.
	Waldschey 51	wicken 30	meerzwibel 451
	Waldschey 51	Vogels wicken 340	zybel 542
	Waldschey 51	wilde wicken 332	zyfer 327
	Waldschey 51	weder tot 280	zyfer erwerfen ibi.
	Waldschey 51	golde weddert 282	<b>A J M S.</b>

Les fautes plus insignes commises en cest Her-  
 bier se pourront ainsi corriger. Le premier nombre signifie  
 le fueillet: l'autre, le chap. & la letre ensuyuant les  
 Espèces, le Temps, le Lieu, les Noms, &c.  
 là ou la faute sera commise.

- 41.34.V.b. playes chaudes: ilz, vlcères chauds.  
 62.54.T. chaude: froide.  
 92.79.V.g. inflammations des yeux: vlcères des yeux.  
 79.84.V.h. contre glandules: des glandules.  
 III Traictant de la Difference, Forme, Noms, & Operations des Fleurs, Herbes  
 odoriferantes, Semences, & de leurs semblables.  
 119.11.F, 2. fueilles pareilles: fleurs pareilles.  
 149.42.L. ilz n'y croissent pas, &c. il n'y croist sinon le deuxiesme & les deux derniers, enco-  
 re ne se trouuent ilz point sinon aux iardins des Herboristes ou ilz sont semés.  
 157.48. les figures sont transposées.  
 158.48.F, 2. Millet: Lin.  
 159.48.V, b. la fieure tierce: la fieure quarte  
 181.69.N, 2. Narrubialtrum: Marrubialtrum.  
 202.88.N. appellans la petite Sison. &c. Les vns l'appellent Sison, Les autres Petroselinum  
 macedonicum, Les troisiemes en font vne espece de Daucus.  
 230.19.V, 2. secheresse, effacez-le.  
 252.38.T. iusques au tiers degré: iusques au quart degré.  
 277.7.L. (si on la doit ainsi appeller): (si on la doit appeller herbe.)  
 285.72.F, 2. Elle a les tiges: La Passifleur a les tiges.  
 304.92. LES ESPÈSES.  
 Iusquiami, selon que Dioscoride, & tous les Anciens escriuent, est de trois for-  
 tes, Noir, Faulne, & Blanc.  
 320.16.F, 1. herbe sterile: herbe inutile.  
 323.19.N. Lobis: Lobi.  
 327.22.F, 1. mais de goust amer aussi: & aussi de meilleur goust.  
 375.4.F. ou de la teste punaise d'un poisson: ou du brouet de poisson puant.  
 419.40.T. tiers degré: second degré.  
 440.46.V, b. sur la bouche: sur la hanche.  
 470.11.N, 3. Samolum: Samolus.  
 481.12. LE TEMPERAMENT.  
 Rus sauage, principalemēt la graine, est chaud & sec iusques pres du tiers degré  
 aux femmes: aux femmes, donne allegeance aux femmes &c.  
 483.15.N. Ligustrum: Ligustrum, ce n'est pas toutesfois le Ligustrum &c.  
 499.41.V, f. sur le fruiēt: sur le front.  
 508.50.T. & on en a tousiours des nouvelles: & peuvent demourer fresches.

Pourtraict du petit Tournesol, lequel  
doit estre inseré au Livre premier,  
Chapitre. 40. là tu trouueras  
sa description.

